KLATT
KUMAR

Robbins y Cotran
REPASO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

Preguntas y respuestas

CUARTA EDICIÓN



ELSEVIER
SAUNDERS

Robbins y Cotran. Repaso de anatomía patológica

Preguntas y respuestas

CUARTA EDICIÓN

Edward C. Klatt MD

Professor of Pathology
Department of Biomedical Sciences
Director, Biomedical Education Program
Mercer University School of Medicine
Savannah, Georgia

Vinay Kumar MBBS, MD, FRCPath

Donald N. Pritzker Professor
Chair, Department of Pathology
Biologic Sciences Division y Pritzker School of Medicine
The University of Chicago
Chicago, Illinois

Ámsterdam Barcelona Beijing Boston Filadelfia Londres Madrid
México Milán Múnich Orlando París Roma Sidney Tokio Toronto
ELSEVIER

Índice de capítulos

Cubierta

Portada

Página de créditos

Dedicatoria

Prólogo

A nuestros estudiantes

Agradecimientos

Unidad I: Patología general

Capítulo 1: La célula como unidad de salud y enfermedad

Capítulo 2: Patología celular

Capítulo 3: Inflamación y reparación

Capítulo 4: Trastornos hemodinámicos

Capítulo 5: Trastornos genéticos

Capítulo 6: Enfermedades del sistema inmunitario

Capítulo 7: Trastornos neoplásicos

Capítulo 8: Enfermedades infecciosas

Capítulo 9: Enfermedades ambientales y nutricionales

Capítulo 10: Enfermedades de la lactancia y la infancia

Unidad II: Enfermedades de los sistemas orgánicos

Capítulo 11: Vasos sanguíneos

Capítulo 12: Corazón

Capítulo 13: Hematopatología de los leucocitos

Capítulo 14: Hematopatología de los eritrocitos y trastornos hemorrágicos

Capítulo 15: Pulmón

Capítulo 16: Cabeza y cuello

Capítulo 17: Tubo digestivo

Capítulo 18: Hígado y vía biliar

Capítulo 19: Páncreas

Capítulo 20: Riñón

Capítulo 21: Vías urinarias bajas y aparato genital masculino

Capítulo 22: Aparato genital femenino

Capítulo 23: Mama

Capítulo 24: Sistema endocrino

Capítulo 25: Piel

Capítulo 26: Huesos, articulaciones y tumores de tejidos blandos

Capítulo 27: Nervios periféricos y músculos esqueléticos

Capítulo 28: Sistema nervioso central

Capítulo 29: Ojo

Capítulo 30: Repaso final y evaluación

Créditos de las figuras

Página de créditos

Edición en español de la cuarta edición de la obra original en inglés
Robbins and Cotran Review of Pathology

This translation of *Robbins and Cotran Review of Patholoy* by Edward C. Klatt and Vinay Kumar was undertaken by Elsevier España and is published by arrangement with Elsevier Inc.

Esta traducción de *Robbins and Cotran Review of Patholoy*, de Edward C. Klatt y Vinay Kumar, ha sido llevada a cabo por Elsevier España y se publica con el permiso de Elsevier Inc.

Copyright © 2015, 2010, 2005, 2000 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.

Revisión científica
Dra. M.ª J. Fernández-Aceñero
Médica adjunta del Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico San Carlos, Madrid Profesora asociada de Anatomía Patológica, Universidad Complutense de Madrid

© 2016 Elsevier España, S.L.U.
Avda. Josep Tarradellas, 20-30, 1.°

08029 Barcelona, España

Fotocopiar es un delito (Art. 270 C.P.)
Para que existan libros es necesario el trabajo de un importante colectivo (autores, traductores, dibujantes, correctores, impresores, editores...). El principal beneficiario de ese esfuerzo es el lector que aprovecha su contenido.
Quien fotocopia un libro, en las circunstancias previstas por la ley, delinque y contribuye a la «no» existencia de nuevas ediciones. Además, a corto plazo, encarece el precio de las ya existentes.
Este libro está legalmente protegido por los derechos de propiedad intelectual. Cualquier uso fuera de los límites establecidos por la legislación vigente, sin el consentimiento del editor, es ilegal. Esto se aplica en particular a la reproducción, fotocopia, traducción, grabación o cualquier otro sistema de recuperación y almacenaje de información.

ISBN edición original: 978-1-4557-5155-6
ISBN edición española (versión impresa): 978-84-9022-989-7
ISBN edición española (versión electrónica): 978-84-9022-990-3

Depósito legal: B. 27.938-2015
Servicios editoriales: ***Gea* Consultoría Editorial, s.l.**

Impreso en Italia

Advertencia

La medicina es un área en constante evolución. Aunque deben seguirse unas precauciones de seguridad estándar, a medida que aumenten nuestros conocimientos gracias a la investigación básica y clínica habrá que introducir cambios en los tratamientos y en los fármacos. En consecuencia, se recomienda a los lectores que analicen los últimos datos aportados por los fabricantes sobre cada fármaco para comprobar las dosis recomendadas, la vía y duración de la administración y las contraindicaciones. Es responsabilidad ineludible del médico determinar las dosis y el tratamiento más indicados para cada paciente, en función de su experiencia y del conocimiento de cada caso concreto. Ni los editores ni los

directores asumen responsabilidad alguna por los daños que pudieran generarse a personas o propiedades como consecuencia del contenido de esta obra.
El Editor

Dedicatoria

A nuestros estudiantes, por su motivación y su
estímulo constantes

Prólogo

Esta obra está diseñada para proporcionar un completo repaso de anatomía patológica, tanto la general como la específica de los distintos órganos, mediante numerosas preguntas de opción múltiple con sus respuestas razonadas. Las fuentes que la conforman son las novenas ediciones de *Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional* (PEF9) y *Robbins. Patología humana* (PH9), así como, en algunos capítulos, la tercera edición de *Robbins y Cotran. Atlas de anatomía patológica*. Las preguntas planteadas en el libro siguen los capítulos y los temas tratados en estos textos de referencia con objeto de facilitar la autoevaluación continuada a medida que los estudiantes avanzan en la asignatura, asegurando la comprensión de los conceptos clave para su posterior aplicación clínica.

Con el fin de conseguir un escenario lo más parecido al de los exámenes, se han incluido preguntas con una única respuesta correcta acompañada de otras verosímiles. Siempre que ha sido posible, se han incorporado imágenes clínicas. Este planteamiento favorece el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos y las manifestaciones de la enfermedad en el contexto clínico. También se incluyen en las preguntas resultados analíticos, radiológicos y de diagnóstico físico, que ponen de relieve las correlaciones clínico-patológicas. Aunque ello aumenta la extensión de las preguntas, la minuciosidad refuerza el aprendizaje y, por lo tanto, es obligada en un libro de estas características. Cada respuesta comprende una sucinta explicación de las razones por las que una de las opciones es correcta, mientras que las demás son incorrectas. La anatomía patológica es una disciplina en la que son importantes las referencias visuales y, por ello, muchas de las preguntas van acompañadas de imágenes en color. Las imágenes están tomadas en su mayoría de los textos *Robbins;* de esta manera, los estudiantes pueden reforzar el estudio de ellas en estos textos con preguntas que utilizan imágenes iguales o similares.

Las preguntas de esta cuarta edición abordan los nuevos temas y conocimientos relativos a los procesos patológicos incluidos en las últimas ediciones de los textos *Robbins*. Su planteamiento es intencionadamente complejo con objeto de ampliar los límites de los conocimientos sobre anatomía patológica de los estudiantes. Tal objetivo se acentúa en el capítulo final, en el que se incorporan preguntas que suponen un mayor grado de exigencia referidas a las cuestiones planteadas a lo largo de todo el libro.

El dominio de este libro prepara al estudiante de cara a futuros desafíos. Muchas de las preguntas lo obligan a enfrentarse a un proceso que incluye dos etapas: en primer lugar, interpretar la información para llegar a establecer un diagnóstico y, a continuación, resolver el problema a partir de dicho diagnóstico. De este modo, se potencia la capacidad de razonamiento clínico precisa la para la prestación de asistencia sanitaria. Ni que decir tiene que ningún libro de repaso reemplaza en modo alguno los libros de texto y los restantes materiales proporcionados por los docentes para el desarrollo de los planes de estudio. Esta obra ha de utilizarse, pues, junto con *Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional* y *Robbins. Patología humana*, y con los demás materiales que se empleen como complemento. Cabe decir, por último, que esperamos que estudiantes y profesorado valoren este libro como una herramienta de la máxima utilidad de cara al aprendizaje de la anatomía patológica.

Edward C. Klatt MD

Vinay Kumar MBBS, MD, FRCPath

A nuestros estudiantes

Aunque los conocimientos médicos han aumentado de forma exponencial a lo largo de los últimos cien años, el deseo de aprender y de poner este conocimiento al servicio de los demás no ha cambiado. El estudio y la práctica de las artes de la curación requieren más persistencia que genialidad. La formación continuada es indispensable para el crecimiento profesional de todos aquellos que desarrollan su actividad en el campo de las ciencias de la salud. Utilice este libro para saber en qué punto se halla de su camino en pos de la excelencia, e inspírese en él para avanzar en ese camino. Ha de servir como luz que ilumina el recorrido hacia el pleno conocimiento de la anatomía patológica.

Muchos de los errores frecuentes que los estudiantes cometen al responder a preguntas se deben a la falta de atención en la lectura de los enunciados y a no analizar la información con cuidado: 1) se basan en un único dato empleado como criterio de exclusión, y 2) ignoran información diagnóstica importante. La medicina es una rama del conocimiento esencialmente analógica, no digital, y la información obtenida en ella es aplicable a lo largo de un amplio espectro de probabilidades. Al seleccionar la mejor respuesta, han de recordarse estos cuatro puntos clave: 1) leer atentamente la pregunta, 2) definir los términos (con vocabulario propio), 3) ordenar las posibles respuestas por orden de probabilidad, y 4) reconocer la información diagnóstica clave que diferencia las respuestas.

En la consecución de logros académicos no hay fórmulas mágicas. Lo más importante que se debe hace es dedicar un tiempo cada día al proceso de aprendizaje. Dicho aprendizaje requiere modificación de las interfaces sinápticas a nivel dendrítico en el cerebro y, para que se concrete, es preciso que se produzca un número finito de modificaciones por unidad de tiempo, por encima del cual el grado de comprensión total disminuye. El aumento de la frecuencia o la sobrecarga de información reducen la eficacia del aprendizaje. La falta de períodos de descanso o *estudiar toda la noche* no son más que presagios de malos resultados, particularmente cuando estos son menos deseables, es decir, durante los exámenes. La capacidad de aprendizaje también se deteriora con el tiempo, con la inevitable pérdida aleatoria de capacidad de procesamiento de datos. Los momentos clave del proceso de aprendizaje, considerando que el repaso contribuye a reducir la pérdida de datos, son los que se producen entre los 20-40 minutos (transferencia a la memoria intermedia) y las 24-48 horas (transferencia a la memoria a largo plazo) desde la obtención inicial de información.

Es necesario desarrollar métodos que contribuyan a filtrar información de fuentes de calidad. Vivimos una época de sobrecarga informativa. Es esencial concentrarse en lo que se está haciendo y evitar las distracciones, identificar los datos importantes y los conceptos subyacentes, desarrollar un plan específico personalizado para abordar el repaso y la valoración de los propios conocimientos. Es preciso, igualmente, buscar una retroalimentación de calidad en lo que respecta a la motivación para el ulterior aprendizaje y para evaluar la progresión del aprendizaje.

Esperamos, pues, que esta herramienta de repaso no solo sea útil para la preparación de los exámenes, sino también para la formación continuada a lo largo de la carrera profesional. Deseamos fervientemente que haga de usted un mejor profesional en la disciplina que haya elegido.

Agradecimientos

Deseamos expresar nuestra gratitud por su apoyo en este proyecto a Laura Schmidt, especialista en desarrollo de contenidos, y a William Schmitt, responsable ejecutivo de estrategia de contenidos de Elsevier. Gracias también a Louise King, coordinadora del proyecto, por la comprensión de las necesidades de los autores, por su asesoramiento y por su paciencia al acomodarse a los múltiples cambios. Quedamos muy agradecidos, asimismo, a Nhu Trinh, de la University of Chicago, por su asistencia administrativa. Deseamos expresar igualmente gratitud a nuestros familiares y colegas por aceptar la demanda adicional de tiempo que esta obra nos ha exigido.

Los autores están también en deuda con todos los pioneros de la docencia de la anatomía patológica por todas las obras *Robbins y Cotran,* comenzando por su fundador, el Dr. Stanley Robbins, y siguiendo con el Dr. Ramzi Cotran. Estos destacados autores sentaron las bases de excelencia que caracterizan esta serie de libros, a la que se han incorporado otros muchos colaboradores que han hecho de ella una valiosa herramienta educativa.

Edward C. Klatt

Vinay Kumar

UNIDAD I

Patología general

Capítulo 1: La célula como unidad de salud y enfermedad
Capítulo 2: Patología celular
Capítulo 3: Inflamación y reparación
Capítulo 4: Trastornos hemodinámicos
Capítulo 5: Trastornos genéticos
Capítulo 6: Enfermedades del sistema inmunitario
Capítulo 7: Trastornos neoplásicos
Capítulo 8: Enfermedades infecciosas
Capítulo 9: Enfermedades ambientales y nutricionales
Capítulo 10: Enfermedades de la lactancia y la infancia

CAPÍTULO 1

La célula como unidad de salud y enfermedad

PEF9 Capítulo 1: La célula como unidad de salud y enfermedad

1 El examen de los frotis de sangre periférica muestra que los núcleos de los neutrófilos de las mujeres tienen un cuerpo de Barr, mientras que los masculinos carecen de él. El cuerpo de Barr es un cromosoma X inactivado. ¿Cuál de las siguientes formas de ARN es más probable que participe en la formación de los cuerpos de Barr?

A ARNlnc
B ARNm
C miARN
D ARNsi
E ARNt

2 En un experimento, se encuentra que un gen cromosómico nuclear está transcribiéndose activamente a ARN mensajero (ARNm), que es transportado al citoplasma celular. Sin embargo, no se aprecia un producto proteínico fruto de la traducción de este ARNm. ¿Cómo es más probable que se produzca el silenciamiento del ARNm de este gen activo?

A Ausencia de ARNt
B Unión a miARN
C Metilación del ADN
D Mutación del ARNm
E Regulación al alza del ADNmt

3 Un partidario de los vinos chilenos Malbec, Syrah y Merlot (todos ellos tintos) proclama su contribución a la longevidad, pero este aficionado al vino controla también el contenido calórico de la

dieta, de modo que su índice de masa corporal es < 22. Este estilo de vida promueve una mayor sensibilidad a la insulina y utilización de la glucosa. Confía plenamente en vivir más años porque ha leído que la restricción calórica prolonga la vida. En este hombre, ¿cuál de las siguientes sustancias intracelulares es más probable que medie el efecto de la restricción calórica sobre la longevidad?

A Caspasa
B Glutatión
C Sirtuinas
D Telomerasa
E Ubicuitina

4 Una mujer de 40 años presenta insuficiencia cardíaca congestiva crónica en los últimos 3 años. Desde hace 2 meses tiene tos productiva con esputo herrumbroso. Un análisis citológico de este muestra numerosos macrófagos cargados de hemosiderina. ¿Cuál de las siguientes estructuras subcelulares de esos macrófagos tiene más importancia en la acumulación de este pigmento?

A Cromosomas
B Retículo endoplásmico
C Aparato de Golgi
D Lisosomas
E Ribosomas

5 En un experimento, las células de un cultivo tisular se someten a un nivel elevado de energía radiante ultravioleta. El microscopio electrónico muestra daño celular en forma de un aumento de agregados citosólicos formados por proteínas desnaturalizadas. La hibridación *in situ* pone de manifiesto que los componentes proteínicos de esos agregados también están presentes en los proteasomas. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que se una a las proteínas desnaturalizadas, dirigiéndolas a ser catabolizadas por proteasomas citosólicos?

A Monofosfato de adenosina
B Calcio
C Caspasa
D Granzima B
E Peróxido de hidrógeno
F Ubicuitina

6 En el área de una incisión quirúrgica, las células endoteliales elaboran factor de crecimiento endotelial vascular. Existen brotes con migración de células endoteliales a la herida para establecer nuevos capilares. ¿Cuál de las siguientes proteínas intracelulares es la más importante para facilitar el movimiento de las células endoteliales?

A Actina
B Citoqueratina
C Desmina
D Lamina
E Miosina

7 En un experimento, la liberación de factor de crecimiento epidérmico en un área de piel denudada causa la estimulación mitógena de las células epiteliales cutáneas. ¿Cuál de las siguientes proteínas es más probable que esté implicada en la transducción de la señal mitógena desde la membrana de la célula epidérmica hasta el núcleo?

A AMP cíclico
B Ciclina D
C Cinasa dependiente de ciclinas
D Proteínas G
E Proteínas RAS

8 Varios mediadores solubles se añaden a un cultivo celular con células epidérmicas con el fin de determinar cuáles de los mediadores podrían ser útiles para promover el crecimiento de las células epidérmicas. Cuando se añade factor de crecimiento epidérmico (EGF), se une a receptores de superficie de las células epidérmicas, con las consiguientes translocación del factor de transcripción y transcripción del ADN. ¿Cuál de las siguientes vías intracelulares es más probable que medie este efecto sobre las células epidérmicas?

A Canales iónicos de calcio
B AMP cíclico
C Cinasa dependiente de ciclinas
D Sistema JAK/STAT
E Proteína cinasas activadas por mitógeno (MAP)

9 En un experimento se estudian los factores que controlan la cicatrización de las heridas. Se observan úlceras cutáneas y se

analizan los factores implicados en el proceso de cicatrización. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que resulte eficaz para promover la angiogenia?

A Factor de crecimiento de fibroblastos básico
B Endostatina
C Factor de crecimiento epidérmico
D Interleucina 1
E Factor de crecimiento derivado de plaquetas

10 En un experimento se realizan incisiones quirúrgicas a un grupo de estudio formado por ratas de laboratorio. A lo largo de un período de 2 semanas se registran observaciones sobre las heridas usando varios mediadores químicos. ¿Cuál de los siguientes pasos de la respuesta inflamatoria-reparadora es más probable que resulte afectado por la neutralización del factor de crecimiento transformante β (TGF-β)?

A Quimiotaxia de linfocitos
B Aumento de la permeabilidad vascular
C Extravasación de leucocitos
D Migración de células epiteliales
E Producción de colágeno

11 Un hombre de 62 años presenta dolor con el movimiento de la rodilla, que se ha ido haciendo progresivamente más intenso a lo largo de los últimos 10 años. Las superficies articulares de la rodilla están erosionadas, y el espacio articular, estrechado. Hay pérdida de compresibilidad y lubricación de las superficies cartilaginosas articulares. ¿Cuál de los siguientes componentes de la matriz extracelular es más probable que se haya perdido en este hombre?

A Elastina
B Fibronectina
C Hialuronano
D Integrina
E Laminina

12 Se realiza un experimento sobre aspectos celulares de la cicatrización de heridas. Se analizan los componentes de la matriz extracelular para determinar sus lugares de producción y los patrones de unión a otros elementos tisulares. ¿Cuál de las siguientes moléculas sintetizadas por los fibroblastos se une mejor

a las integrinas celulares y el colágeno extracelular y conecta las células basales epidérmicas con la membrana basal?

A Sulfato de dermatano
B Fibronectina
C Heparina
D Ácido hialurónico
E Procolágeno

13 Un experimento analiza los factores implicados en el ciclo celular durante la regeneración celular inducida por factores de crecimiento en un cultivo tisular. Se induce la síntesis de ciclina B; esta proteína se une y activa la cinasa dependiente de ciclinas 1 (CDK1). ¿En cuál de las siguientes fases del ciclo celular es más probable que la cinasa activa producida por este proceso controle la progresión?

A G0 a G1
B G1 a S
C S a G2
D G2 a M
E M a G1

14 Un experimento evalúa la implicación de los receptores de lipoproteínas de baja densidad (LDL) en la captación de lípidos por el hígado. Se genera un modelo de ratones que no expresan el gen del receptor de LDL en el hígado. ¿Cuál de las siguientes células sería la más útil para producir esos ratones inactivados?

A Células progenitoras mesenquimatosas de la médula ósea de adultos
B Células madre embrionarias en cultivo
C Células madre hematopoyéticas
D Células ovales hepáticas
E Hepatocitos en regeneración

15 Se recogen fibroblastos dérmicos de una biopsia de piel de un hombre adulto. Estos fibroblastos son transducidos con genes que codifican factores de transcripción, como SOX2 y MYC. En las condiciones de cultivo apropiadas, estas células son capaces de generar células endodérmicas, mesodérmicas y ectodérmicas. ¿En cuál de los siguientes tipos de células madre se han transformado estos fibroblastos?

A Embrionarias

B Comprometidas con un linaje
C Mesenquimatosas
D Pluripotenciales

Respuestas

1 **A** Hay formas de ARN no codificante que participan en la expresión génica. Los segmentos de ARN largo no codificante (ARNlnc) con más de 200 nucleótidos pueden unirse a la cromatina para restringir el acceso de la ARN polimerasa a los segmentos codificantes. El cromosoma X transcribe *XIST,* un ARNlnc que se une al cromosoma X y reprime su expresión. Sin embargo, no todos los genes del cromosoma X «inactivo» son silenciados. El ARN transcrito del ADN nuclear que dirige la síntesis de proteínas mediante la traducción es el ARNm. Los micro-ARN (miARN) son secuencias de ARN no codificante que inhiben la traducción de ARNm. Los ARN silenciadores de genes (ARN pequeños de interferencia [ARNsi]) tienen la misma función que los miARN, pero se sintetizan con fines experimentales. El ARN de transferencia (ARNt) participa en la traducción del ARNm a proteínas uniéndose a aminoácidos específicos.

2 **B** Los micro-ARN (miARN) son codificados por cerca del 5% del genoma humano. No codifican proteínas, sino que se unen al ARNm y lo inactivan o escinden, con lo que impiden la traducción de proteínas por el ARNm y silencian eficazmente la expresión génica sin afectar directamente al gen. En el citoplasma existe ARNt abundante que no constituye un paso limitante de la velocidad para la traducción. La metilación del ADN, especialmente en los dinucleótidos CG, es una forma de suprimir directamente la expresión génica, como se observa en la impronta genómica. Las mutaciones que afectan a genes del ADN pueden condicionar una reducción de la producción de ARNm o la formación de proteínas anómalas, pero el ARNm no está mutado. El ADN mitocondrial (ADNmt) codifica proteínas implicadas principalmente en las vías metabólicas de la fosforilación oxidativa.

3 **C** La única forma segura de aumentar la longevidad es la restricción calórica. Pero ¿por qué privarnos de lo que nos gusta,

solo para seguir privándonos durante más tiempo? Los excesos dietéticos conducen a una mayor morbilidad con menor calidad de vida, así como mayor mortalidad, por enfermedades crónicas como la diabetes mellitus. La actividad de las sirtuinas sobre la acetilación y desacetilación de histonas podría promover la transcripción de genes codificantes de proteínas que aumentan la actividad metabólica e inhiben los efectos de los radicales libres. Se ha demostrado que el vino tinto aumenta las sirtuinas, pero ¡no beba demasiado! La clave está en la moderación. El glutatión promueve la destrucción de radicales libres, aunque el consumo crónico y excesivo de alcohol acaba con el glutatión de los hepatocitos. Las caspasas desencadenan la apoptosis y la muerte celular. Las telomerasas ayudan a promover la división celular mantenida, pero no pueden modificarse por el estilo de vida y su activación es una de las características de las neoplasias. La ubicuitina es un péptido que pertenece a la vía ubicuitina-proteasoma de degradación de proteínas observada en las carencias nutricionales, de modo que, si come menos, asegúrese de seguir una dieta equilibrada.

4 **D** La heterofagocitosis por macrófagos precisa que las vacuolas internalizadas por endocitosis se fusionen con lisosomas para degradar el material ingerido. En la insuficiencia cardíaca congestiva hay extravasación de eritrocitos a los alvéolos, y los macrófagos pulmonares tienen que fagocitar los eritrocitos, degradando la hemoglobina y reciclando el hierro mediante la formación de hemosiderina. Las otras opciones son elementos que participan en las funciones sintéticas de la célula.

5 **F** Las proteínas del choque térmico se ocupan de distintas «tareas domésticas» de la célula, como reciclaje y restauración de proteínas dañadas, y retirada de proteínas desnaturalizadas. La ubicuitina marca estas últimas y facilita su unión a los proteasomas, que a continuación degradan las proteínas a péptidos. El ADP aumenta cuando se agota el ATP y ayuda a impulsar la glucólisis anaerobia. Las concentraciones citosólicas de calcio pueden incrementarse con el daño celular que agota el ATP; el calcio activa fosfolipasas, endonucleasas y proteasas, que lesionan las membranas celulares, proteínas estructurales y mitocondrias. Las caspasas son enzimas que facilitan la

apoptosis. La granzima B es liberada por linfocitos T citotóxicos y activa la apoptosis. El peróxido de hidrógeno es una de las especies de oxígeno activas generadas en situaciones de isquemia celular que producen un daño inespecífico a las estructuras celulares, especialmente a las membranas.

6 **A** La actina es un microfilamento implicado en el movimiento celular. Las opciones B a D se refieren a filamentos intermedios, más grandes que la actina pero de menor tamaño que la miosina (un filamento grueso que se entrelaza con la actina, acción necesaria para el movimiento muscular). Las citoqueratinas forman elementos del citoesqueleto en las células epiteliales. La desmina constituye el andamiaje en las células musculares sobre el que la actina y la miosina realizan la contracción. La lamina está asociada a la membrana nuclear.

7 **E** Las proteínas RAS transducen señales de receptores de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico, que poseen actividad tirosina cinasa intrínseca. Las proteínas G realizan una función similar para los siete receptores transmembrana acoplados a proteínas G. El AMP cíclico es un efector en la vía de transmisión de señales de proteínas G. Las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas regulan el ciclo celular en el núcleo.

8 **E** La cascada de la MAP cinasa participa en la transmisión de señales tras su activación mediante receptores de factores de crecimiento en la superficie celular. Esta vía resulta especialmente importante en las señales de EGF y el factor de crecimiento de fibroblastos. La unión del ligando, como la que tiene lugar con la acetilcolina en la unión neuromuscular, altera la configuración de los receptores canales iónicos para permitir la entrada a la célula de determinados iones, como, por ejemplo, calcio, que modifican el potencial eléctrico de la membrana celular. El AMP cíclico es un segundo mensajero que típicamente es activado mediante la unión de un ligando a receptores con siete segmentos transmembrana asociados a proteínas que hidrolizan el GTP; los receptores de quimiocinas actúan de esta manera. Las cinasas dependientes de ciclinas actúan en el núcleo. Las vías JAK/STAT suelen ser reclutadas por receptores de citocinas.

9 **A** El factor de crecimiento de fibroblastos básico es un potente inductor de la angiogenia. Puede participar en todos los pasos de este proceso. La endostatina es un inhibidor de la angiogenia. El factor de crecimiento epidérmico y la interleucina 1 carecen de actividad angiógena significativa. El factor de crecimiento derivado de plaquetas está implicado en el remodelado vascular.

10 **E** El TGF-β estimula muchos pasos de la fibrogenia, como la quimiotaxia de fibroblastos y la producción de colágeno por los fibroblastos, al mismo tiempo que inhibe la degradación del colágeno. Todos los demás pasos reseñados no resultan afectados por el TGF-β.

11 **C** Tiene artrosis, o enfermedad degenerativa de las articulaciones, con pérdida del cartílago hialino articular. El hialuronano (ácido hialurónico) es un mucopolisacárido de gran tamaño, un tipo de proteoglucano, que forma un gel hidratado y compresible que contribuye a la función de absorción de fuerzas de las superficies articulares. La elastina es una proteína fibrilar que aporta elasticidad a tejidos tales como piel, paredes arteriales y ligamentos que deben estirarse y recuperar su forma original. La fibronectina es una glucoproteína que desempeña una función adhesiva. Las integrinas son glucoproteínas que actúan como receptores celulares para componentes de la matriz extracelular; se unen a la actina intracelular, de modo que las células pueden alterar su forma y movilidad. Las lamininas son un tipo de glucoproteínas que ayudan a anclar las superficies epiteliales en las membranas basales.

12 **B** La fibronectina es un componente clave de la matriz extracelular y su estructura es parecida a la de un clip. Los monocitos, los fibroblastos y el endotelio pueden sintetizar fibronectina. El sulfato de dermatano, un glucosaminoglucano, forma un gel que aporta resistencia y lubricación. La heparina perfundida tiene una función anticoagulante. El ácido hialurónico se une al agua para formar una matriz extracelular gelatinosa. El procolágeno producido por los fibroblastos se transforma en cadenas de colágeno en forma de cuerdas, que aportan fuerza de tensión.

13 **D** La CDK1 controla un punto de transición extremadamente importante, el paso de G2 a M del ciclo celular, que puede

regularse mediante inhibidores de la CDK. Los otros puntos de control enumerados son regulados por un conjunto distinto de proteínas.

14 **B** Las células madre embrionarias son pluripotenciales y pueden dar lugar a todas las células, incluidos los hepatocitos. En los cultivos de células madre embrionarias se manipulan genes para producir ratones inactivados, genes que a continuación se inyectan en blastocistos de ratón y se implantan en el útero de ratones hembra. Las células madre mesenquimatosas también son multipotenciales, pero no resultan útiles para manipular genes. Las células madre hematopoyéticas dan lugar a todas las células hematopoyéticas pero no a los demás tipos celulares. Los hepatocitos y las células ovales del hígado solo pueden dar origen a células hepáticas.

15 **D** Estas células transformadas se denominan células iPS porque han sido inducidas para convertirse en pluripotenciales. Este proceso de transformación evita el uso de células madre embrionarias derivadas de la manipulación de embriones humanos, que suscita problemas éticos y religiosos. Las células madre embrionarias son totipotenciales, pero se convierten en células pluripotenciales, que pueden dividirse en muchas líneas celulares distintas aunque manteniéndose ellas mismas en una reserva de replicación. Así pues, las células pluripotenciales son las mejores después de las embrionarias para obtener células humanas que puedan reemplazar tejidos dañados o enfermos. La diferenciación posterior de las células pluripotenciales origina células cuya capacidad de desarrollo es más restringida, como, por ejemplo, células madre mesenquimatosas, capaces de dar lugar a músculo y cartílago, pero no genera células endodérmicas ni ectodérmicas.

CAPÍTULO 2

Patología celular

PEF9 Capítulo 2: Respuestas celulares ante el estrés y las agresiones tóxicas: adaptación, lesión y muerte

PH9 Capítulo 1: Lesión y muerte celulares, y adaptaciones

1 Una mujer de 77 años padece insuficiencia renal crónica. Presenta un nivel de nitrógeno ureico sérico de 40 mg/dl. Recibe un diurético y pierde 2 kg. Reduce las proteínas de la dieta, y el nitrógeno ureico sérico baja a 30 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor las respuestas celulares a la enfermedad y el tratamiento en esta mujer?

A Adaptación
B Apoptosis
C Necroptosis
D Lesión irreversible
E Alteración metabólica

2 Una mujer de 53 años sin antecedentes de interés acude a su médico para una revisión rutinaria. En la exploración presenta una presión arterial de 150/95 mmHg. Si la hipertensión permanece durante años sin tratamiento, ¿cuál de las siguientes alteraciones celulares es más probable que se observe en el miocardio?

A Apoptosis
B Displasia
C Degeneración grasa
D Hemosiderosis
E Hiperplasia
F Hipertrofia
G Metaplasia

3 Una mujer de 22 años se queda embarazada. La ecografía fetal a

las 13 semanas de gestación muestra que el útero mide 7 × 4 × 3 cm. En el parto del recién nacido a término, el útero mide 34 × 18 × 12 cm. ¿Cuál de los siguientes procesos celulares ha contribuido en mayor medida al incremento del tamaño uterino?

A Hiperplasia glandular endometrial
B Proliferación de fibroblastos del miometrio
C Hipertrofia del estroma endometrial
D Hipertrofia de músculo liso del endometrio
E Hiperplasia del endotelio vascular

4 Una mujer de 20 años amamanta a su hijo. En la exploración, las mamas están ligeramente aumentadas de tamaño. Es posible obtener leche presionando ambos pezones. ¿Cuál de los siguientes procesos que tuvieron lugar en las mamas durante la gestación le permite amamantar al lactante?

A Metaplasia ductal
B Displasia epitelial
C Depósito de lípidos intracelulares
D Hiperplasia lobulillar
E Hipertrofia del estroma

5 Un joven de 16 años sufrió un traumatismo abdominal cerrado al colisionar a alta velocidad con el contrafuerte de un puente mientras conducía un vehículo. El lavado peritoneal muestra hemoperitoneo, y en la laparotomía se resecó una pequeña porción del lóbulo izquierdo del hígado lesionado. A los 2 meses, una TC del abdomen muestra que el hígado casi ha recuperado el tamaño previo al traumatismo. ¿Cuál de los siguientes procesos explica mejor este hallazgo de la TC?

A Apoptosis
B Displasia
C Hiperplasia
D Degeneración hidrópica
E Esteatosis

6 Un hombre de 71 años presenta problemas para orinar, con dificultad en el inicio de la micción y polaquiuria desde hace 5 años. El tacto rectal pone de manifiesto una duplicación del tamaño normal de la próstata palpable. Se realiza una resección transuretral de la glándula y la imagen microscópica de los «trocitos» de próstata obtenidos es de nódulos de glándulas

separados por estroma. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que haya tenido lugar en esta próstata?

A Apoptosis
B Displasia
C Degeneración grasa
D Hiperplasia
E Hipertrofia
F Metaplasia

7 Un hombre de 29 años sufre una fractura del fémur izquierdo en un accidente de motocicleta. Le aplican una escayola en la pierna. Tras 6 semanas de inmovilización, el diámetro de la pantorrilla izquierda ha disminuido de tamaño. ¿A cuál de las siguientes alteraciones de los músculos de la pantorrilla es más probable que se deba este cambio de tamaño?

A Aplasia
B Atrofia
C Distrofia
D Hialinosis
E Hipoplasia



8 Una mujer de 34 años con obesidad ha presentado ardores por reflujo gástrico tras ingerir comidas copiosas en los últimos 5 años.

Se le realiza una endoscopia digestiva alta y se obtiene una muestra de biopsia del esófago distal. ¿Cuál de los siguientes cambios microscópicos, mostrado en la figura, es más probable que se haya producido?

A Metaplasia cilíndrica
B Hiperplasia de células caliciformes
C Atrofia de la lámina propia
D Displasia epidermoide
E Hipertrofia mucosa

9 Una niña de 11 años resulta infectada por hepatitis A y sufre náuseas leves durante 1 semana. En la exploración física, presenta dolor leve a la palpación en el hipocondrio derecho e ictericia de las escleróticas. Los hallazgos de laboratorio son AST sérica de 68 U/l, ALT de 75 U/l y bilirrubina total de 5,1 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes cambios en los hepatocitos es más probable que explique estos parámetros analíticos?

A Defectos de la membrana celular
B Autofagia lisosómica
C Tumefacción de las mitocondrias
D Acumulaciones de cromatina nuclear
E Dispersión de ribosomas

10 Una mujer de 33 años ha presentado letargo progresivo y disminución de la diuresis en la última semana. Las pruebas de laboratorio muestran que la creatinina sérica es 4,3 mg/dl, y el nitrógeno ureico, 40 mg/dl. Se realiza una biopsia renal y la muestra se examina mediante el microscopio electrónico. ¿Cuál de los siguientes cambios morfológicos celulares es más probable que apunte a un diagnóstico de necrosis tubular aguda?

A Acumulaciones de cromatina
B Tumefacción de las mitocondrias
C Fragmentación nuclear
D Ampollas en la membrana plasmática
E Desagregación de los ribosomas



11 Un hombre de 50 años ha presentado un episodio de dolor torácico de 6 h de duración. La figura muestra un corte histológico representativo del miocardio de su ventrículo izquierdo. No hay hemorragia ni inflamación. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que haya producido esas alteraciones del miocardio?

A Trombosis arterial
B Autoinmunidad
C Traumatismo torácico cerrado
D Dieta con carencia de proteínas
E Infección vírica



12 Una mujer de 38 años presenta dolor abdominal intenso de 1 día de evolución. En la exploración tiene hipotensión y está en shock. Las pruebas de laboratorio muestran una lipasa sérica aumentada. De acuerdo con la imagen macroscópica representativa del mesenterio que muestra la figura, ¿cuál de los siguientes trastornos es más probable que se haya producido?

A Pancreatitis aguda
B Colecistitis gangrenosa
C Infección por el virus de la hepatitis B
D Infarto del intestino delgado
E Linfoadenitis tuberculosa

13 Una mujer de 68 años perdió el conocimiento de repente y al despertarse 1 h después no podía hablar ni mover el brazo derecho. A los 2 meses, una TC craneal mostró una gran área quística en el lóbulo parietal izquierdo. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que haya tenido lugar en el encéfalo?

A Apoptosis
B Necrosis coagulativa
C Necrosis grasa
D Cariólisis
E Necrosis por licuefacción



14 Una radiografía de tórax de cribado en un hombre de 37 años asintomático muestra un nódulo de 3 cm en el lóbulo medio del pulmón derecho. El nódulo es extirpado con una resección pulmonar en cuña, y su corte muestra una masa muy bien delimitada con un centro blando y blanco. La figura muestra la imagen microscópica. La prueba de liberación de interferón γ sérico es positiva. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que haya tenido lugar en este nódulo?

A Apoptosis
B Necrosis caseosa
C Necrosis coagulativa
D Necrosis grasa
E Degeneración grasa
F Necrosis gangrenosa
G Necrosis por licuefacción

15 Se demuestra que un compuesto experimental administrado a una preparación tisular inhibe la fosforilación oxidativa celular cuando es empleado en dosis altas y que la producción de ATP se reduce al 5% del nivel normal. La función de las membranas celulares disminuye. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que esté presente en una mayor concentración en el líquido de cultivo que baña el tejido?

A Calcio
B Glucosa

C Cetonas
D Potasio
E Sodio

16 Una mujer de 47 años tiene diabetes mellitus mal controlada y desarrolla enfermedad arterial coronaria. Presenta un gasto cardíaco reducido, con presión arterial de 80/40 mmHg y fracción de eyección del 18%. ¿La elevación de cuál de las siguientes sustancias sanguíneas es más indicativa de daño celular reversible secundario a una reducción de la perfusión arterial sistémica de múltiples órganos y tejidos?

A Dióxido de carbono
B Creatinina
C Glucosa
D Ácido láctico
E Troponina I

17 Una preparación tisular se somete experimentalmente a un medioambiente hipóxico. Las células de este tejido comienzan a hincharse y la cromatina empieza a formar acumulaciones en los núcleos celulares. Se activan las ATPasas y disminuye la producción de ATP. ¿La acumulación de cuál de los siguientes iones en las mitocondrias y el citosol contribuye en mayor medida a estos hallazgos y a la muerte celular en último término?

A Ca^{2+}
B Cl^-
C HCO_3^-
D K^+
E Na^+
F PO_4^{3-}

18 En un experimento, se administra una gran cantidad de un compuesto a organismos experimentales, y el citocromo P-450 lo convierte en un metabolito tóxico. La acumulación de este metabolito provoca un aumento de la peroxidación de lípidos intracelulares. ¿La depleción de cuál de las siguientes sustancias intracelulares dentro del citosol empeora esta forma de daño celular por este mecanismo?

A ADP
B Glutatión
C NADPH oxidasa

D Enzima óxido nítrico sintasa
E ARNm
F Sodio

19 En un experimento, se aplica energía radiante en forma de rayos X a células con actividad metabólica. Esto provoca un daño celular causado por la hidrólisis del agua. ¿Cuál de las siguientes enzimas intracelulares ayuda a proteger a las células de este tipo de daño?

A Endonucleasa
B Glutatión peroxidasa
C Lactato deshidrogenasa
D Fosfolipasa
E Proteasa

20 Un niño de 5 años ingiere 50 comprimidos de hierro, cada uno de los cuales contiene 27 mg de hierro. A las 6 h desarrolla dolor abdominal y letargo. En la exploración física se observa hipotensión. Las pruebas de laboratorio revelan acidosis metabólica. ¿La formación de cuál de los siguientes compuestos es más probable que esté mediando el daño celular en este niño?

A Ácido ascórbico
B Hemosiderina
C Radical hidroxilo
D Óxido nítrico
E Superóxido dismutasa



21 Un hombre de 63 años tiene insuficiencia cardíaca congestiva, que ha empeorado en los últimos 2 años. Un ecocardiograma muestra estenosis de la válvula mitral con dilatación de la aurícula izquierda, en la que existe un trombo mural. Un mes después, sufre dolor en el costado izquierdo y hematuria. Las pruebas de laboratorio muestran un nivel de AST sérica elevado. En la figura se observa una imagen microscópica representativa de la lesión. ¿Cuál de los siguientes patrones de necrosis tisular es más probable que esté presente en este hombre?

A Caseosa
B Coagulativa
C Grasa
D Gangrenosa
E Por licuefacción

22 Un hombre de 54 años presentó dolor subesternal intenso durante 3 h. El ECG mostró cambios compatibles con un infarto agudo de miocardio. Tras el tratamiento trombolítico con activador del plasminógeno tisular (t-PA), la concentración de creatina cinasa (CK) sérica aumentó. ¿Cuál de los siguientes fenómenos tisulares es más probable que tuviera lugar en el miocardio tras el tratamiento con t-PA?

A Regeneración celular
B Toxicidad farmacológica
C Aumento de la síntesis de CK
D Atrofia de fibras musculares
E Lesión por reperfusión

23 En el día 28 del ciclo menstrual, una mujer de 23 años empieza con la regla, que dura 6 días. Ha tenido ciclos regulares desde la menarquia. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que tenga lugar en las células endometriales para desencadenar el inicio de la menstruación?

A Apoptosis
B Atrofia
C Necrosis caseosa
D Heterofagocitosis
E Necrosis por licuefacción

24 Un experimento introduce una mutación inactivadora de gen en una línea celular. La frecuencia de células reducidas de tamaño con

acumulaciones de cromatina, cariorrexis y ampollas citoplásmicas es mayor que en una línea celular sin esa mutación. La supervivencia global de la línea celular mutada está reducida. ¿A cuál de los siguientes genes es más probable que afecte esta mutación?

A *BAX*
B *BCL2*
C *C-MYC*
D *FAS*
E *p53*



25 Una mujer de 22 años con leucemia se somete a un trasplante de médula ósea y recibe médula de donante parcialmente compatible. Un mes después presenta un exantema cutáneo con descamación. Se realiza una biopsia cutánea y el examen microscópico revela las alteraciones celulares mostradas en la figura. ¿Cuáles de las siguientes reacciones bioquímicas es más probable que haya provocado estas alteraciones celulares?

A Activación de caspasas
B Elaboración de lipasas
C Aumento de la glucólisis
D Peroxidación de lípidos
E Reducción de la síntesis de ATP

26 Un hombre de 47 años tiene un carcinoma de pulmón con metástasis. Recibe quimioterapia. Un mes después, el examen histológico de una lesión metastásica muestra múltiples focos en los que las células tumorales individuales están reducidas de tamaño y muy eosinófilas. Sus núcleos tienen agregados de cromatina condensados bajo la membrana nuclear. ¿Cuál de las siguientes sustancias liberadas al citosol es más probable que haya desencadenado el proceso patológico de estas células tumorales reducidas de tamaño?

A BCL2
B Catalasa
C Citocromo *c*
D Lipofuscina
E Fosfolipasa

27 En el estudio de la infección por el virus de la hepatitis, se observa que los linfocitos T citotóxicos (LTC) provocan la muerte de los hepatocitos infectados por virus. Los LTC liberan perforina para posibilitar la entrada de sus gránulos. ¿Cuál de las siguientes sustancias, presente en esos gránulos, activa directamente la muerte celular programada?

A BCL2
B Endonucleasa
C Granzima B
D Óxido nítrico
E p53

28 Un estudio experimental de la esteatosis hepática en el síndrome metabólico revela que se produce lesión de la membrana celular de los hepatocitos con necrosis en respuesta a una mayor cantidad de factor de necrosis tumoral (TNF). Cuando se administra un compuesto farmacológico inhibidor de las caspasas sigue produciéndose necrosis celular. ¿Cuál de las siguientes sustancias forma un complejo supramolecular que aumenta la generación de especies reactivas del oxígeno?

A Catalasa
B Citocromo *c*
C Enzima conversora de interleucina 1-β
D Proteína de interacción con el receptor
E Ubicuitina ligasa

29 En un hombre de 71 años diagnosticado de cáncer de páncreas se observa que el índice de masa corporal está disminuyendo. Sus tejidos conjuntivos normales sufren atrofia en relación con el atrapamiento de orgánulos y citosol en una vacuola, que a continuación se fusiona con un lisosoma. Sin embargo, el cáncer continúa aumentando de tamaño. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que esté sucediendo en las células normales pero que se encuentre inhibido en las células cancerosas de este hombre?

A Envejecimiento
B Apoptosis
C Autofagia
D Degeneración hialina
E Cariorrexis

30 Se está desarrollando un nuevo fármaco que se une a los microtúbulos celulares. La función de estos disminuye, de modo que se inhibe la formación del huso mitótico. ¿Cuál de los siguientes es el uso más probable de este compuesto?

A Antimicrobiano
B Quimioterapia
C Analgesia
D Prevención de la ateroesclerosis
E Reducción de peso



31 Un hombre de 46 años ha notado un incremento del perímetro abdominal en los últimos 6 años. En la exploración física el hígado está aumentado en 18 cm. Una TC abdominal muestra un hígado agrandado con atenuación reducida difusamente. Los hallazgos de laboratorio revelan un aumento de las concentraciones séricas de colesterol total y triglicéridos, mayor tiempo de protrombina y descenso del nivel de albúmina. La figura muestra una imagen microscópica representativa del hígado. ¿Cuál de las siguientes actividades es más probable que haya conducido a esos hallazgos?

A Beber cerveza
B Consumir ácido acetilsalicílico
C Inyectarse heroína
D Jugar al baloncesto
E Fumar cigarrillos

32 Una mujer de 69 años ha sufrido ataques isquémicos transitorios en los últimos 3 meses. En la exploración física tiene un soplo audible en la auscultación del cuello. Se realiza una endoarterectomía carotídea derecha. La placa ateromatosa resecada tiene un aspecto firme y es de color amarillo oscuro a simple vista. Microscópicamente, ¿cuál de los siguientes materiales puede encontrarse en abundancia en forma de cristales dentro de los espacios aciculares?

A Colesterol
B Glucógeno

C Hemosiderina
D Inmunoglobulinas
E Lipofuscina

33 Una mujer de 45 años presenta disnea que ha empeorado de forma progresiva en los últimos 5 años. Una TC torácica pone de manifiesto enfisema panlobulillar. Las pruebas de laboratorio revelan un déficit de α_1-antitripsina (AAT). Su genotipo de AAT es PiZZ. Una muestra de biopsia hepática estudiada al microscopio muestra abundantes glóbulos positivos para PAS en los hepatocitos periportales. ¿Cuál de los siguientes mecanismos moleculares es más probable que explique este hallazgo en los hepatocitos?

A Menor catabolismo de la AAT en los lisosomas
B Síntesis hepática excesiva de AAT
C Alteración en la disociación de la AAT de las chaperoninas
D Incapacidad de metabolizar la AAT en las células de Kupffer
E AAT mal plegada retenida en el retículo endoplásmico



34 En la autopsia, el corazón de un hombre de 63 años solo pesa 250 g (normal, 330 g) y los dos ventrículos son pequeños. El miocardio es firme, de un color marrón achocolatado oscuro en todas las zonas. Las arterias coronarias muestran mínimos

cambios ateroescleróticos. ¿Cuál de las siguientes sustancias, mostrada en la figura, es más probable que se encuentre en una cantidad excesiva en las fibras miocárdicas de ese corazón?

A Bilirrubina
B Glucógeno
C Hemosiderina
D Lipofuscina
E Melanina

35 Una mujer de 69 años presenta tos crónica de 1 año de evolución. La radiografía de tórax pone de manifiesto una masa de 6 cm en el pulmón izquierdo. La biopsia con aguja revela un carcinoma. Se realiza una neumonectomía, y el examen de los ganglios linfáticos del hilio muestra una superficie de corte uniforme, negra oscura. ¿A cuál de los siguientes factores es más probable que se deba el aspecto de esos ganglios linfáticos?

A Efectos del envejecimiento
B Trastorno hemorrágico
C Tabaquismo
D Insuficiencia hepática
E Metástasis múltiples

36 Una mujer de 22 años procedente de Albania presenta anemia congénita que precisa múltiples transfusiones de eritrocitos durante muchos años. En la exploración física la piel es de color bronce. Las pruebas de función hepática revelan un descenso del nivel de albúmina sérica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que aparezca en una biopsia hepática?

A Amiloide en las tríadas portales
B Bilirrubina en los canalículos
C Glucógeno en los hepatocitos
D Hemosiderina en los hepatocitos
E Esteatosis de los hepatocitos



37 Un hombre de 72 años falleció súbitamente debido a una insuficiencia cardíaca congestiva. En la autopsia, el corazón pesaba 580 g (normal, 330 g) y mostraba una hipertrofia notable del ventrículo izquierdo y mínima ateroesclerosis de las arterias coronarias. Un panel bioquímico sérico solicitado antes de su muerte era normal. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos explica mejor el aspecto de la válvula aórtica observada en la figura?

A Amiloidosis
B Calcificación distrófica
C Hemosiderosis
D Degeneración hialina
E Depósito de lipofuscina

38 Un hombre de 70 años con hipercalcemia falleció súbitamente. En la autopsia, el examen microscópico reveló depósitos amorfos no cristalinos de sales de calcio en la mucosa gástrica, en el intersticio renal y en las paredes alveolares de los pulmones. ¿Cuál de los siguientes trastornos subyacentes es más probable que explique estos hallazgos?

A Hepatitis crónica activa
B Hiperplasia paratiroidea difusa

C Tuberculosis diseminada
D Ateroesclerosis generalizada
E Envejecimiento normal
F Enfisema pulmonar

39 Un experimento analiza en las células la actividad enzimática asociada a proliferación celular mantenida. ¿Cuál de las siguientes células es más probable que tenga la actividad telomerasa máxima?

A Células endoteliales
B Eritrocitos
C Células germinales
D Neuronas
E Neutrófilos

40 Un estudio sobre el envejecimiento muestra que las células senescentes acumulan daños de subproductos tóxicos del metabolismo. Hay un aumento de los depósitos intracelulares de lipofuscina. ¿La ingesta prolongada de cuál de las siguientes sustancias es más probable que contrarreste este mecanismo del envejecimiento?

A Antioxidantes
B Analgésicos
C Antimicrobianos
D Antineoplásicos
E Glucocorticoides

Respuestas

1 **A** Las células normales se ocupan de las demandas fisiológicas y mantienen las funciones metabólicas dentro de unos márgenes estrechos, proceso denominado *homeostasis.* En situaciones de enfermedad, con estrés en las células, se produce una adaptación al nuevo estado de equilibrio. En este caso, el deterioro de la función renal conduce a un aumento de la concentración del nitrógeno ureico, así como a retención de líquidos. El diurético provoca la pérdida del líquido en exceso hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. La restricción proteínica reduce la excreción de nitrógeno ureico, que también lleva a un nuevo estado de equilibrio. Ambos son adaptaciones. El término apoptosis hace referencia a la necrosis de células

individuales en respuesta a la lesión. Una lesión irreversible provoca la muerte celular, pero los cambios descritos no son indicativos de necrosis celular. El metabolismo de las células realiza el mantenimiento para la adaptación, con respuesta al diurético y a la restricción de proteínas.

2 **F** La carga de presión sobre el ventrículo izquierdo determina un aumento de los miofilamentos de las miofibras existentes, de modo que estas se alargan. El resultado de la tensión continua por la hipertensión es, en último término, insuficiencia cardíaca con reducción de la contractilidad. La apoptosis provocaría la pérdida de células y un menor tamaño. La displasia no es un diagnóstico hecho para el corazón. El depósito de hemosiderina en el corazón es un proceso patológico secundario al aumento de las reservas de hierro del organismo. Aunque es posible la hiperplasia secundaria a proliferación de miofibroblastos, esta no contribuye significativamente al tamaño cardíaco. No se produce metaplasia en el músculo, pero sí hay pérdida muscular con el envejecimiento y la isquemia, y las miofibrillas son sustituidas por tejido fibroso.

3 **D** El incremento del tamaño del útero es, básicamente, el resultado de un aumento de tamaño de las células del músculo liso del miometrio. El endometrio también se agranda, principalmente por hiperplasia, pero sigue siendo un delgado revestimiento de la pared muscular y no contribuye apenas al cambio de tamaño. Hay muy poco estroma en el miometrio y una mayor proporción en el endometrio, de modo que el estroma contribuye en un porcentaje menor que el del músculo al aumento de tamaño. Los vasos son un componente menor pero esencial del incremento de tamaño, pero no son el elemento más importante.

4 **D** Los lobulillos mamarios tienen un mayor número de células bajo la influencia de hormonas (principalmente progesterona) para asegurar la lactancia normal. La metaplasia ductal es un proceso patológico de la mama. El término displasia epitelial denota una alteración en el crecimiento y la maduración de las células epiteliales que puede progresar a cáncer. La acumulación de grasa dentro de las células es una manifestación frecuente de daño celular subletal o, con mucha menos frecuencia, de errores

innatos del metabolismo de los lípidos. El estroma mamario no participa en la lactancia y puede aumentar en los procesos patológicos.

5 **C** El hígado es uno de los pocos órganos humanos capaces de regenerarse parcialmente. Esta es una forma de hiperplasia compensadora. El estímulo de la actividad mitótica en los hepatocitos cesa cuando el hígado ha alcanzado su tamaño normal. Los hepatocitos pueden volver a entrar en el ciclo celular y proliferar para regenerar el hígado; no se limitan a hipertrofiarse (aumento de tamaño). La apoptosis es la muerte de células individuales y se produce a menudo en las hepatitis víricas. La displasia es una alteración del crecimiento de las células epiteliales con potencial premaligno. La degeneración hidrópica, o tumefacción celular, no produce regeneración. La esteatosis (degeneración grasa) puede causar hepatomegalia, pero no como proceso regenerativo. Es el resultado de una lesión tóxica/metabólica de los hepatocitos.

6 **D** La hiperplasia nodular prostática (también conocida como hiperplasia prostática benigna [HPB]) es un trastorno frecuente en ancianos secundario a la proliferación de las glándulas y del estroma prostáticos. La próstata se hace más sensible a la estimulación androgénica con la edad. Este es un ejemplo de hiperplasia patológica. La apoptosis ocasiona pérdida de células y no el aumento de estas. El término displasia hace referencia a una alteración del crecimiento y de la maduración de las células epiteliales. En los hepatocitos, la esteatosis puede producir hepatomegalia. Aunque la HPB suele denominarse «hipertrofia prostática benigna», este término es técnicamente incorrecto: aumenta el número de glándulas y células estromales, más que el tamaño de las células existentes. Un cambio en el epitelio de glandular a epidermoide alrededor de un infarto prostático sería un ejemplo de metaplasia.

7 **B** La disminución de la carga de trabajo hace que las células se reduzcan por la pérdida de sustancia celular, proceso denominado *atrofia*. Las células siguen estando presentes, pero son más pequeñas. El término aplasia hace referencia a la ausencia de desarrollo embrionario; con hipoplasia se describe un desarrollo de los tejidos escaso o inferior al normal. La

expresión distrofia muscular denota los trastornos hereditarios de los músculos esqueléticos que provocan la destrucción de fibras musculares, debilidad y atrofia. La degeneración hialina (hialinosis) corresponde a la imagen inespecífica de células eosinófilas cristalinas y rosadas.

8 **A** La inflamación debida al reflujo de ácido gástrico ha determinado la sustitución del epitelio escamoso normal del esófago por epitelio cilíndrico de tipo intestinal con células caliciformes. Esa conversión de un tipo celular adulto en otro se denomina *metaplasia* y tiene lugar cuando los estímulos reprograman las células madre. Las células caliciformes no son componentes normales de la mucosa esofágica y constituyen una parte poco importante de este proceso metaplásico. La lámina propia presenta algunas células inflamatorias, pero no está atrofiada. El epitelio escamoso no se hace displásico por el reflujo ácido, pero la metaplasia cilíndrica puede progresar a displasia, no observada en esta figura, si los estímulos anómalos continúan. Las células no están aumentadas significativamente de tamaño (hipertrofia).

9 **A** El daño celular irreversible se asocia a pérdida de la integridad de la membrana. Esto permite que enzimas intracelulares tales como AST y ALT lleguen al suero. Todos los demás cambios morfológicos reseñados se asocian a daño celular reversible, en el que la membrana celular permanece indemne y las células no mueren.

10 **C** La muerte celular se produce con la pérdida del núcleo celular y las células tubulares se necrosan. Todos los demás cambios morfológicos celulares señalados representan formas de daño celular reversible. La membrana plasmática y los orgánulos intracelulares conservan cierta función, a menos que un daño grave cause la pérdida de integridad de la membrana.

11 **A** La figura muestra un color eosinófilo intenso y pérdida tanto de núcleos en las fibras miocárdicas como de la estructura celular, compatible con lesión isquémica inicial, que produce una necrosis coagulativa. La isquemia y el infarto de miocardio suelen estar causados por la ausencia de flujo sanguíneo en las arterias coronarias. Un proceso inmunitario puede producir lesiones miocárdicas focales. Los traumatismos cerrados causan

hemorragias. La ausencia de proteínas lleva a un estado catabólico con reducción gradual del tamaño celular, pero no conduce a alteraciones isquémicas. Las infecciones víricas podrían ser origen de necrosis focal del miocardio, pero habitualmente esta se acompaña de un infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos y macrófagos.

12 **A** Los múltiples depósitos focales de color blanco pálido, localizados en el mesenterio y compuestos principalmente por adipocitos, son áreas de necrosis grasa. Los depósitos son secundarios a la liberación de enzimas pancreáticas, como, por ejemplo, lipasas, en pacientes con pancreatitis aguda. La necrosis gangrenosa es fundamentalmente una necrosis coagulativa que tiene lugar en un área tisular extensa. La hepatitis vírica no causa necrosis celular en otros órganos aparte del hígado, y la necrosis de los hepatocitos por infecciones víricas se produce principalmente mediante apoptosis. El infarto intestinal es un tipo de necrosis coagulativa. La tuberculosis provoca necrosis caseosa.

13 **E** El gran contenido en lípidos de los tejidos del sistema nervioso central determina que sufran necrosis por licuefacción secundaria al daño isquémico, como en este caso de accidente cerebrovascular. La apoptosis afecta a células individuales y no suele poder apreciarse a simple vista. La necrosis coagulativa es el resultado característico de la isquemia en la mayoría de los órganos sólidos. La necrosis grasa se observa en la mama y el tejido pancreático. El término cariólisis hace referencia a la pérdida de núcleos celulares en las células muertas.

14 **B** El aspecto macroscópico similar al queso da su nombre a esta forma de necrosis: necrosis caseosa. La figura muestra material acelular rosado y amorfo en la zona superior derecha rodeado de macrófagos epitelioides, y se aprecia una célula gigante de Langhans en la esquina superior izquierda. En el pulmón, la tuberculosis y las infecciones por hongos son las que producen este patrón de lesión tisular con más frecuencia. La apoptosis afecta a células individuales, sin áreas de necrosis tisular extensas o localizadas apreciables macroscópicamente. La necrosis coagulativa es más típica de la lesión tisular isquémica. La necrosis grasa se produce con más frecuencia en las mamas y

el páncreas. La degeneración grasa suele ser una característica del daño de los hepatocitos, y la integridad celular está mantenida. La gangrena hace referencia a una necrosis extensa de múltiples tipos celulares en una región o un órgano corporales. La necrosis por licuefacción se observa en los abscesos de neutrófilos o la lesión cerebral isquémica.

15 **D** La reducción de la fosforilación oxidativa condiciona una disminución de la síntesis de ATP y una menor actividad de la bomba de sodio de la membrana plasmática, que mantiene elevada la concentración intracelular de potasio. La pérdida de ATP origina la salida de potasio intracelular, mientras que la entrada neta de sodio y agua promueve la hinchazón de la célula. Una elevación notable del potasio plasmático puede denotar daño celular importante o muerte (como en la lesión por aplastamiento del músculo esquelético o la hemólisis). Cuando las células no están consumiendo glucosa por metabolismo oxidativo, la glucosa es metabolizada en otras vías y sus cifras se mantienen en el intervalo normal. Aunque las membranas celulares están formadas por lípidos, la disfunción o rotura de estas membranas no altera significativamente las concentraciones plasmáticas de lípidos.

16 **D** El descenso de la perfusión tisular secundario al shock hipotensivo conduce a hipoxemia y depleción de ATP cuando el metabolismo celular pasa de la glucólisis aerobia a la anaerobia. Este cambio agota los depósitos de glucógeno y causa una mayor producción y acumulación de ácido láctico, con lo que el pH intracelular se reduce. La creatinina aumentaría en caso de deterioro de la función renal por disminución de la perfusión renal, pero esto no explicaría las alteraciones de otros tejidos. Una concentración de glucosa elevada es indicativa de diabetes mellitus mal controlada, no de un descenso de la perfusión. El dióxido de carbono probablemente sea eliminado por pulmones normales, que siguen recibiendo la perfusión necesaria en caso de que exista un corazón debilitado. Un aumento de la troponina I es sugestivo de una lesión de miocardio irreversible.

17 **A** Es probable que se produzca un daño celular irreversible cuando aumenta el calcio citoplásmico. El calcio puede entrar en las células y, además, acumularse en las mitocondrias y el

retículo endoplásmico. El calcio en exceso activa ATPasas, fosfolipasas, proteasas y endonucleasas, que lesionan los componentes celulares. La permeabilidad mitocondrial aumenta y se libera citocromo *c*, que activa las caspasas responsables de la apoptosis. De los demás iones señalados, el sodio entra en la célula, mientras que el potasio difunde al exterior cuando falla la bomba de sodio a medida que descienden las concentraciones de ATP, pero esto es potencialmente reversible.

18 **B** El paracetamol puede convertirse en metabolitos tóxicos de esta forma. El glutatión del citosol ayuda a reducir el daño celular debido a muchos metabolitos tóxicos y radicales libres. El ADP se convierte en ATP en las vías celulares oxidativa y glucolítica con el fin de proporcionar energía que impulse las funciones celulares, y una reducción del ATP hace que la célula sea vulnerable al daño. La NADPH oxidasa genera superóxido, que es usado por los neutrófilos para destruir bacterias. La enzima óxido nítrico sintasa de los macrófagos produce óxido nítrico, que ayuda a la destrucción de organismos fagocitados. La síntesis de proteínas en las células depende del ARNm para una mayor supervivencia y recuperación del daño causado por los radicales libres. El fracaso de la bomba de sodio provoca un aumento del sodio citosólico y tumefacción celular en caso de lesión.

19 **B** El organismo dispone de mecanismos intracelulares que previenen el daño secundario a los radicales libres generados por la exposición a los rayos X. La glutatión peroxidasa reduce ese daño catalizando la destrucción del peróxido de hidrógeno. Las endonucleasas lesionan el ADN en la cromatina nuclear. La lactato deshidrogenasa está presente en distintas células, y su elevación en el suero es un indicador de daño y muerte celular. Las fosfolipasas reducen los fosfolípidos celulares y promueven la destrucción de las membranas celulares. Las proteasas pueden dañar las membranas celulares y proteínas del citoesqueleto.

20 **C** Una ingesta excesiva de hierro, especialmente en niños, puede sobrepasar la capacidad del organismo de unir el hierro libre absorbido a la proteína transportadora transferrina. El hierro libre contribuye a la formación de radicales libres

celulares mediante la reacción de Fenton. El ácido ascórbico (vitamina C) y la vitamina E sirven de antioxidantes para protegernos del daño por radicales libres, si bien a lo largo de mucho tiempo. La hemosiderina es una forma de almacenar el hierro procedente de una acumulación excesiva local o sistémica de ferritina, y por sí misma no causa lesión celular excepto en grandes cantidades, como sucede en la hemocromatosis. El óxido nítrico generado en los macrófagos puede usarse para destruir microbios. Es posible su conversión en el anión peroxinitrito, muy reactivo. La superóxido dismutasa ayuda a degradar el anión superóxido a peróxido de hidrógeno, eliminando así radicales libres.

21 **B** La embolización del trombo provocó el bloqueo de una rama arterial renal, causando un infarto renal agudo en este paciente. Las lesiones isquémicas agudas en la mayoría de los órganos internos producen un patrón de muerte celular denominado *necrosis coagulativa*. Obsérvense las líneas desdibujadas de los túbulos renales y glomérulos en la figura, y la ausencia de núcleos celulares. La necrosis caseosa aparece en varias formas de inflamación granulomatosa, ejemplificada por la tuberculosis. La necrosis grasa suele observarse en el tejido pancreático y mamario. La necrosis gangrenosa es un tipo de necrosis coagulativa que habitualmente se debe a isquemia y afecta a las extremidades. La necrosis por licuefacción se produce con las lesiones isquémicas del encéfalo y es el patrón observado en los abscesos.

22 **E** Si el daño celular presente tras el infarto de miocardio no es grande, la restauración del flujo sanguíneo ayuda a prevenir más daño celular. No obstante, la reperfusión de las células dañadas condiciona la generación de radicales libres derivados del oxígeno, lo que causa una lesión por reperfusión. El aumento de la concentración de CK es indicativo de necrosis de células miocárdicas, porque esta enzima intracelular no sale en grandes cantidades de las células miocárdicas indemnes. Las fibras del miocardio no se regeneran en un grado significativo y las fibras atróficas tendrían menos CK que liberar. El t-PA no produce lesión química tóxica; induce trombólisis para restaurar el flujo sanguíneo en las arterias coronarias ocluidas.

23 **A** La menstruación constituye una muerte celular ordenada y programada (apoptosis) por estímulos hormonales, un ejemplo de la vía intrínseca (mitocondrial) de la apoptosis. A medida que las concentraciones de hormonas descienden, el endometrio se destruye, se descama y, posteriormente, se regenera. Con la atrofia celular a menudo no hay necrosis visible, pero los tejidos disminuyen de tamaño, como sucede en el endometrio después de la menopausia. La necrosis caseosa es característica de la inflamación granulomatosa, debida con más frecuencia a infección por micobacterias. El mejor ejemplo de heterofagocitosis es la limpieza de un área de necrosis mediante la ingestión de células necróticas que llevan a cabo los macrófagos. La necrosis por licuefacción puede producirse en cualquier tejido tras una infección bacteriana aguda o en el encéfalo por isquemia.

24 **B** Estos hallazgos histológicos son característicos de la apoptosis. El producto del gen *BCL2* inhibe la apoptosis celular uniéndose a Apaf-1. Así pues, la inactivación elimina esta inhibición. El producto del gen *BAX* promueve la apoptosis, y una inactivación sería protectora frente a esta. El gen *C-MYC* está implicado en la oncogenia. El gen *FAS* codifica un receptor celular del ligando Fas que señaliza la apoptosis. La actividad del gen *p53 (TP53)* normalmente estimula la apoptosis, pero su mutación favorece la supervivencia de la célula.

25 **A** Se observa una célula apoptósica *(flecha)* que está reducida de tamaño y se ha convertido en una masa eosinófila densa. Hay una reacción inflamatoria alrededor con linfocitos citotóxicos. Este patrón es característico de la apoptosis. La activación de las caspasas es un fenómeno universal de la apoptosis, independientemente de la causa desencadenante. La apoptosis inducida en células del receptor por linfocitos del donante tiene lugar en la enfermedad del injerto contra el huésped. Las lipasas se activan en la necrosis grasa enzimática. Cuando una célula sufre anoxia, se reduce la síntesis de ATP y aumenta la glucólisis, pero estos cambios son reversibles. La peroxidación de lípidos se produce en el daño celular por radicales libres.

26 **C** Esta imagen histológica es característica de la apoptosis producida por compuestos quimioterápicos. La liberación del

citocromo *c* de las mitocondrias es un paso clave en muchas formas de apoptosis y conduce a la activación de las caspasas. La BCL2 es una proteína antiapoptósica que impide la liberación de citocromo *c* y la activación de las caspasas. La catalasa es una sustancia que elimina peróxido de hidrógeno. La lipofuscina es un residuo pigmentado que representa orgánulos celulares no digeridos en vacuolas de autofagia. Las fosfolipasas se activan en la necrosis y dañan la membrana celular.

27 **C** La granzima B es una proteasa de serina presente en los LTC que puede desencadenar directamente la apoptosis. Los LTC expresan el ligando Fas sobre la superficie y, al contactar con los receptores de Fas en la célula diana, el ligando induce la apoptosis por la vía extrínseca (iniciada por el receptor de muerte). El BCL2 favorece la supervivencia celular. El óxido nítrico ayuda a destruir los microbios fagocitados. Las endonucleasas se generan tras la activación de las caspasas y conducen a la fragmentación nuclear. La apoptosis se inicia cuando la p53 resulta activada por daño intrínseco del ADN durante la proliferación celular. Las mutaciones de *p53* pueden permitir la acumulación de daños genéticos, proceso que promueve el crecimiento celular no regulado (neoplasia).

28 **D** La necroptosis se produce cuando el mecanismo de la apoptosis da lugar a necrosis morfológica tras la rotura de la membrana celular, independientemente de la liberación de caspasas. El complejo RIP1-RIP3 se denomina *necrosoma*. Las catalasas ayudan a destruir el peróxido de hidrógeno para prevenir daños causados por radicales libres. El citocromo *c* participa en la apoptosis, y un inflamasoma, en la necroptosis. La ubicuitina ligasa participa en el procesamiento de las proteínas mal plegadas en los proteasomas.

29 **C** La autofagia es una forma de reducción del tamaño celular en respuesta al estrés: la célula se consume a sí misma, regulando al alza los genes *Atg*. Los gránulos de lipofuscina son cuerpos residuales resultantes de este proceso. La muerte celular puede estar desencadenada, en último término, por autofagia, pero mediante un mecanismo distinto del de la apoptosis, un tipo de necrosis de células individuales con fragmentación celular. Las células cancerosas adquieren la

capacidad de impedir la autofagia, quizá gracias a la regulación a la baja de la expresión del gen *PTEN*, y mantienen una ventaja respecto a la supervivencia, incluso cuando el paciente se está muriendo. Con el envejecimiento hay una autofagia lenta, pero se acelera en presencia de factores de estrés, como malnutrición y enfermedades crónicas. Hialino es un término genérico aplicado a las acumulaciones intra- o extracelulares de proteínas que tienen un color rosado y un aspecto homogéneo con la tinción de H-E. La cariorrexis es la fragmentación del núcleo en una célula necrótica.

30 **B** Los microtúbulos son componentes del citoesqueleto necesarios para el movimiento celular. Los husos mitóticos resultan imprescindibles en la división celular, y, si las células cancerosas no se dividen, la neoplasia no podrá crecer. Los antibióticos están dirigidos contra microorganismos que carecen de microtúbulos. El dolor lo produce mayormente la liberación de mediadores de la inflamación. La formación del ateroma se ve afectada por el daño endotelial y la acumulación de lípidos; aunque sí hay proliferación celular, esta sucede a lo largo de muchos años. La reducción de peso se realiza fundamentalmente por la atrofia de los adipocitos, no mediante la inhibición de la proliferación celular.

31 **A** La imagen de vacuolas lipídicas en muchos de los hepatocitos es característica de la degeneración grasa (esteatosis) del hígado. Las anomalías en el metabolismo de las lipoproteínas pueden provocar esteatosis. El alcohol es una hepatotoxina que actúa a través de una mayor acumulación de acetaldehído, promotor de esteatosis hepática. El descenso de la concentración sérica de albúmina y el aumento del tiempo de protrombina son indicativos de lesión hepática inducida por el alcohol. El ácido acetilsalicílico ejerce un efecto significativo sobre la función plaquetaria, no en los hepatocitos. El abuso de sustancias como la heroína produce pocos hallazgos anatomopatológicos específicos del órgano. El ejercicio apenas tiene efectos directos sobre la función hepática. Fumar daña directamente el tejido pulmonar, pero carece de efectos hepáticos directos.

32 **A** El colesterol es un lípido depositado habitualmente en las

placas de ateroma de las paredes arteriales, que confiere color amarillo a esas placas y un aspecto brillante si es abundante. La lesión directa del ateroma puede generar émbolos de colesterol. El glucógeno es un tipo de depósito de hidratos de carbono presente, principalmente, en el hígado y en músculo. La hemosiderina es una forma de depósito del hierro que se observa en tejidos del sistema mononuclear fagocítico (p. ej., médula ósea, hígado, bazo), pero está distribuida ampliamente en la hemocromatosis hereditaria. En ocasiones se observan inmunoglobulinas en forma de glóbulos redondeados en las células plasmáticas (es decir, cuerpos de Russell). La lipofuscina es un pigmento de color pardo dorado que aumenta con el envejecimiento en el citoplasma de las células, sobre todo en los miocitos cardíacos y los hepatocitos.

33 **E** Las mutaciones del gen *AAT* dan lugar a moléculas de AAT incapaces de plegarse correctamente. En el genotipo PiZZ, ambos alelos tienen la mutación. Las moléculas parcialmente plegadas se acumulan en el retículo endoplásmico de los hepatocitos y no pueden secretarse. La alteración de la disociación de la proteína CFTR de las chaperoninas causa muchos casos de fibrosis quística. No hay anomalías en la síntesis, en el catabolismo ni en el metabolismo de la AAT en pacientes con déficit de AAT. Esta proteína AAT es la α-globulina circulante principal que protege los tejidos, por ejemplo, del pulmón, de las proteasas nocivas.

34 **D** La lipofuscina es un pigmento «de desgaste» que aumenta con el envejecimiento, especialmente en el hígado y el miocardio. Este pigmento granular de color pardo dorado visible al lado del núcleo del miocito en la figura apenas tiene efectos sobre la función celular en la mayoría de los casos. Rara vez se encuentra un depósito notable de lipofuscina en un corazón pequeño, la llamada atrofia parda. La bilirrubina, otro producto de la degradación de la hemoglobina, confiere un aspecto amarillo (ictericia) a los tejidos. La hemosiderina es el producto de la degradación de la hemoglobina que contiene el hierro. Los corazones con un depósito excesivo de hierro suelen ser grandes. El glucógeno está aumentado en algunos trastornos enzimáticos hereditarios y, cuando el corazón resulta afectado,

su tamaño aumenta. El pigmento melanina es el responsable del color de la piel: cuanta más melanina haya, más oscura será la piel.

35 **C** Los ganglios linfáticos del hilio y de los pulmones acumulan una pigmentación negruzca cuando se inhala pigmento de carbón del aire contaminado. El alquitrán del humo de los cigarrillos es una fuente fundamental de ese pigmento de carbón. Las personas de mayor edad suelen tener más pigmento antracótico, pero este no es inevitable con el envejecimiento: los residentes en áreas rurales con aire ambiental de buena calidad tienen menos pigmento. La resolución de una hemorragia puede producir pigmentación por hemosiderina, que confiere un color marrón a los tejidos. La insuficiencia hepática puede provocar ictericia, caracterizada por el color amarillo de los tejidos. Las metástasis son lesiones de tipo masa que confieren a los tejidos un color que varía del marrón claro al blanco.

36 **D** Cada unidad de sangre contiene unos 250 mg de hierro. El organismo carece de mecanismos para eliminar el hierro en exceso. Con la descamación normal de los epitelios se pierden cerca de 10-20 mg de hierro al día; durante la menstruación, las mujeres pierden ligeramente más. Todo el hierro en exceso se convierte en hierro de depósito, o hemosiderina. Con el tiempo, la hemosiderosis afecta a cada vez más tejidos del organismo, especialmente al hígado, pero también a la piel. Inicialmente se encuentran depósitos de hemosiderina en las células de Kupffer y otros fagocitos mononucleares de la médula ósea, del bazo y de los ganglios linfáticos. Si el exceso de hierro es grande, las células hepáticas también lo acumulan. El amiloide es una proteína anómala derivada de distintos precursores, como cadenas ligeras de inmunoglobulinas. La bilirrubina, producto de degradación de la sangre, se excreta por la bilis, de modo que la persona no presenta ictericia. Las enfermedades por depósito de glucógeno (glucogenosis) son hereditarias y aparecen en la infancia. La esteatosis suele producirse con la ingesta de hepatotoxinas, como el alcohol.

37 **B** La válvula está estenosada por depósitos nodulares de calcio. Se trata de un proceso «distrófico» porque el calcio se deposita en los tejidos dañados. El daño de este paciente es el

resultado del desgaste excesivo por el envejecimiento. El depósito de amiloide en el corazón se produce típicamente en el miocardio y los vasos. La hemocromatosis hereditaria es un defecto genético de la absorción del hierro que produce un depósito extenso de hierro en el miocardio (hemosiderosis). *Degeneración hialina* es un término descriptivo usado por los histólogos para describir los depósitos de proteínas que son rosados y cristalinos. La cantidad de lipofuscina aumenta en las fibras miocárdicas (no en las válvulas) al envejecer.

38 **B** Los hallazgos microscópicos apuntan a calcificación metastásica, con depósito de sales de calcio en tejidos que tienen mecanismos fisiológicos para perder ácido, lo que da lugar a un medioambiente interno alcalino que favorece la precipitación del calcio. La hipercalcemia puede deberse a varias causas, como hiperparatiroidismo primario y secundario, destrucción de hueso por metástasis, síndrome paraneoplásico y, con menos frecuencia, intoxicación por vitamina D o sarcoidosis. La enfermedad renal crónica reduce la excreción de fosfato por parte del riñón, con el consiguiente aumento del nivel de fosfato sérico. Como el producto de solubilidad de calcio y fósforo debe mantenerse, el calcio sérico desciende y se activa una mayor producción de hormona paratiroidea para aumentar la concentración de calcio, lo que promueve el depósito de este ión. La hepatitis crónica provoca hiperbilirrubinemia e ictericia. Los granulomas de la tuberculosis tienen necrosis caseosa con calcificaciones distróficas. Otra forma de calcificación distrófica es la que sucede cuando se calcifican las lesiones ateroescleróticas. La calcificación distrófica se observa con más frecuencia en ancianos, pero es el resultado de toda una vida de cambios patológicos, no del propio envejecimiento. El enfisema pulmonar puede provocar acidosis respiratoria que se compensa mediante alcalosis metabólica, de modo que la concentración sérica de calcio se mantiene relativamente invariable.

39 **C** Las células germinales tien en la máxima actividad telomerasa, y la longitud del telómero puede estabilizarse en ellas. Esto permite que las células germinales del testículo conserven durante toda la vida la capacidad de dividirse. Las células somáticas normales carecen de actividad telomerasa y los

telómeros se acortan progresivamente con cada división celular hasta que se produce la detención del crecimiento. Los eritrocitos ni siquiera tienen núcleo.

40 **A** Los antioxidantes pueden contrarrestar los efectos de las especies reactivas del oxígeno (ROS) que se pueden acumular de forma aguda y crónica en las células como consecuencia de agresiones ambientales y procesos patológicos. Sin duda, las tiendas de alimentos saludables promueven este concepto con la venta de productos tales como vitamina E. Sin embargo, el daño celular es multifactorial, y resulta difícil demostrar que un determinado compuesto ejerza un efecto significativo. Los analgésicos alivian la percepción del dolor secundario a daño celular, pero ni previenen ni disminuyen este; solo lo enmascaran. Los antimicrobianos podrían ayudar a las propias defensas inmunitarias del organismo frente a agentes infecciosos y acortar o disminuir el daño tisular. No obstante, se desaconseja el uso crónico de antimicrobianos porque alteran la útil flora microbiana propia del organismo, y es posible que promuevan el desarrollo de cepas resistentes a fármacos que suponen un riesgo grave para la salud de la población general. (Como señaló Mr. Spock: «Las necesidades de muchos anteceden a las necesidades de pocos».) Los antineoplásicos se administran para las neoplasias malignas y casi nunca resultan útiles en la prevención del cáncer. Los glucocorticoides aportan bienestar a corto plazo pero, si se usan durante períodos más prolongados, tienen efectos perjudiciales.

CAPÍTULO 3

Inflamación y reparación

PEF9 Capítulo 3: Inflamación y reparación

PH9 Capítulo 2: Inflamación y reparación

1 Un niño de 11 años se hace un corte en la mano al caerse. La herida se infecta. Las bacterias se expanden a la matriz extracelular alrededor de los capilares. En la respuesta inflamatoria frente a esta infección, ¿cuál de las siguientes células elimina las bacterias?

A Linfocito B
B Fibroblasto
C Macrófago
D Mastocito
E Linfocito T



2 Una mujer de 53 años presenta fiebre alta y tos productiva con esputos amarillentos de 2 días de evolución. Sus constantes vitales

son 37,8 °C de temperatura, frecuencia cardíaca de 103 latidos/min, frecuencia respiratoria de 25 respiraciones/min y presión arterial de 100/60 mmHg. En la auscultación del tórax se aprecian crepitantes en ambas bases pulmonares. La radiografía de tórax muestra infiltrados pulmonares parcheados bilaterales. La figura se corresponde con la imagen microscópica del pulmón. ¿Cuál de los siguientes tipos de células inflamatorias es más probable que se observe en abundancia en la muestra de esputo?

A Células gigantes de Langhans
B Macrófagos
C Mastocitos
D Neutrófilos
E Linfocitos T

3 Una niña de 4 años lleva 2 días con diarrea de volumen alto. En el momento de la exploración está deshidratada. La muestra de heces evaluada mediante análisis serológico es positiva para rotavirus. Recibe tratamiento con líquidos intravenosos y se recupera. ¿Cuál de los siguientes componentes está presente en las células intestinales para reconocer el ARN de doble cadena de este virus y activar los factores de transcripción que regulan al alza la producción de interferón con vistas a eliminarlo?

A Caspasa 1
B Receptor del complemento
C Lectina
D Receptor de linfocitos T
E Receptor de tipo señuelo *(toll)*

4 Un hombre de 72 años con enfisema grave ha presentado insuficiencia ventricular derecha progresiva en los últimos 5 años. Lleva 4 días con fiebre y disnea en aumento. Una radiografía de tórax muestra acumulación de líquido en los espacios pleurales. El líquido obtenido mediante toracocentesis tiene una densidad de 1,03 y contiene neutrófilos en degeneración. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de esta acumulación de líquido si sufre variaciones?

A Presión oncótica
B Diapédesis leucocítica
C Presión linfática
D Retención renal de sodio

E Permeabilidad vascular

5 Un hombre de 35 años presenta disnea progresiva en las últimas 24 h. La radiografía de tórax muestra un derrame pleural bilateral de gran tamaño. Mediante toracocentesis se obtienen 500 ml de un líquido amarillo ligeramente turbio de la cavidad pleural derecha. El examen citológico del líquido revela múltiples neutrófilos, pero no hay linfocitos ni eritrocitos. ¿Cuál de los siguientes mecanismos contribuye más a la acumulación del líquido pleural?

A Vasoconstricción arteriolar
B Contracción endotelial
C Inhibición de la adhesión plaquetaria
D Obstrucción linfática
E Liberación de lisosomas por los neutrófilos

6 Un niño de 6 años tiene antecedentes de infecciones de repetición por bacterias piógenas, incluidas *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pneumoniae.* Las infecciones se acompañan de leucocitosis con neutrofilia. El examen microscópico de una biopsia obtenida de un área de necrosis de tejido blando muestra microorganismos, pero muy pocos neutrófilos. Un análisis de la función de los neutrófilos muestra un defecto en el rodamiento. ¿Cuál de las siguientes moléculas es la causa más probable de la mayor susceptibilidad de este niño a las infecciones si sufre defectos?

A C3b del complemento
B Integrinas
C Leucotrieno B_4
D NADPH oxidasa
E Selectinas

7 En un experimento se introducen bacterias en un preparado de tejido perfundido. Los leucocitos salen de los vasos y migran a la zona de inoculación bacteriana. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que medie el desplazamiento de esos leucocitos?

A Bradicinina
B Quimiocinas
C C3a del complemento
D Histamina
E Prostaglandinas

8 Un niño de 12 meses con infecciones de repetición en los últimos

6 meses tiene fiebre y tos de 3 días de evolución. Una tinción de Gram del esputo muestra muchos cocos grampositivos en cadenas. El hemograma revela neutrofilia. Las pruebas de laboratorio ponen de manifiesto que los neutrófilos del paciente fagocitan y matan a los microorganismos rápidamente en presencia de suero humano normal, pero no en su propio suero. Los neutrófilos migran normalmente en un análisis de quimiotaxinas. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que explique la mayor susceptibilidad del niño a las infecciones?

A Anomalía de la expresión de selectina
B Reducción de la opsonización
C Producción insuficiente de peróxido de hidrógeno por los neutrófilos
D Déficit de integrinas
E Defecto de las proteínas de los microtúbulos en las células fagocíticas

9 Un niño de 5 años tiene antecedentes de infecciones bacterianas recidivantes, incluidas neumonía y otitis media. El análisis de los leucocitos recogidos de sangre periférica muestra un déficit de mieloperoxidasa. ¿Cuál de los procesos siguientes es la causa más probable de la mayor susceptibilidad a las infecciones de este niño cuando se reduce?

A Elaboración de peróxido de hidrógeno (H_2O_2)
B Formación de radical hidroxihaluro ($HOCl^-$)
C Fracaso de la migración debido a déficit del complemento
D Consumo de oxígeno por las células fagocíticas
E Producción de prostaglandinas

10 En un experimento, se analizan los neutrófilos recogidos de sangre periférica en busca de un «estallido» de consumo de oxígeno. ¿En cuál de los siguientes procesos este estallido respiratorio es un paso esencial en la respuesta inflamatoria aguda?

A Unión a las células endoteliales
B Generación de actividad microbicida
C Aumento de la producción en la médula ósea
D Opsonización de bacterias
E Fagocitosis de bacterias

11 Una niña de 4 años ha presentado numerosas infecciones por

Staphylococcus aureus desde la lactancia. Las pruebas genéticas muestran un defecto causante de la ausencia de producción de β_2-integrina. ¿Cuál de las siguientes anomalías de la función de los neutrófilos es más probable que sea la causa de estos síntomas clínicos?

A Menor producción de radicales hidroxihaluros ($HOCl^-$)
B Reducción de la fagocitosis de bacterias opsonizadas con IgG
C Fracaso de la migración a la zona de infección
D Adhesión inadecuada al endotelio activado por citocinas
E Estallido respiratorio reducido tras la fagocitosis

12 En un experimento, se aíslan células sanguíneas de sangre periférica y se colocan en un medio de cultivo que mantiene su actividad metabólica. Al cultivo se le añade interferón γ, así como microorganismos *Escherichia coli* viables. ¿Cuál de los siguientes tipos de células sanguíneas de este medio es más probable que posea actividad bactericida frente a *E. coli*?

A Basófilos
B Linfocitos B
C Linfocitos CD4+
D Linfocitos CD8+
E Monocitos
F Linfocitos citolíticos naturales
G Neutrófilos

13 En un experimento, se sumergen linfocitos T de sangre periférica en un medio que preserva su función. Los linfocitos son activados mediante contacto con un antígeno e incubados durante 4 h. Se recoge el líquido sobrenadante y en él se descubre una sustancia que es un estimulador principal de monocitos y macrófagos. ¿Cuál de las siguientes sustancias liberadas a este medio líquido es más probable que estimule los macrófagos?

A Histamina
B Interferón γ
C Leucotrieno B_4
D Óxido nítrico
E Fosfolipasa C
F Factor de necrosis tumoral (TNF)

14 Una mujer alérgica a los gatos visita a un vecino que tiene varios de estos animales. Durante la visita, inhala epitelio de gato y a los

pocos minutos desarrolla congestión nasal con secreción nasal abundante. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que provoque estos síntomas?

A Bradicinina
B C5a del complemento
C Histamina
D Interleucina 1 (IL-1)
E Fosfolipasa C
F Factor de necrosis tumoral (TNF)

15 En un estudio aleatorizado de 6 meses con un fármaco, un grupo de pacientes recibe un inhibidor de la ciclooxigenasa 2 (COX-2) y otro grupo control no. Ambos grupos de hombres adultos tenían insuficiencia cardíaca congestiva leve y artritis simétrica bilateral de pequeñas articulaciones. Los parámetros analíticos medidos durante el estudio no mostraron diferencias significativas entre los grupos respecto al recuento de leucocitos, plaquetas, hemoglobina o creatinina. El grupo que recibe el fármaco refiere hallazgos subjetivos distintos de los correspondientes al grupo control. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que refiriera el grupo que recibió el fármaco?

A Mayor tumefacción de los tobillos
B Mayor susceptibilidad a los hematomas
C Más brotes de asma
D Menor gravedad de la urticaria
E Numerosos episodios febriles
F Reducción del dolor artrítico

16 Una mujer de 19 años desarrolla irritación de garganta y fiebre el día anterior. En la exploración física se observan eritema y edema faríngeo. Los hallazgos de laboratorio revelan leucocitosis. Se le administra naproxeno. ¿A cuál de los siguientes elementos de la respuesta inflamatoria aguda afecta más este fármaco?

A Quimiotaxia
B Migración
C Leucocitosis
D Fagocitosis
E Vasodilatación

17 Una mujer de 35 años toma ácido acetilsalicílico para la artritis.

Aunque el dolor articular disminuye con este tratamiento, el proceso inflamatorio continúa. ¿Cuál de los siguientes mediadores es el principal responsable del alivio del dolor cuando se reduce su síntesis por acción del ácido acetilsalicílico?

A C1q del complemento
B Histamina
C Leucotrieno E_4
D Óxido nítrico
E Prostaglandinas

18 Una mujer de 77 años pierde el conocimiento súbitamente, con ausencia de movimiento en la parte derecha de su organismo. La angiografía cerebral muestra una oclusión de la arteria cerebral media. ¿Cuál de los siguientes mediadores es más útil para prevenir que se agrave la lesión isquémica en la corteza cerebral?

A Bradicinina
B Leucotrieno E_4
C Óxido nítrico
D Factor activador de plaquetas
E Tromboxano A_2

19 En un experimento, se inoculan bacterias en alícuotas de sangre humana normal que ha sido tratada con un anticoagulante. Se observa que las bacterias son fagocitadas por neutrófilos o bien sufren lisis. ¿Cuál de los siguientes componentes del plasma sanguíneo es más probable que facilite estos efectos?

A Complemento
B Fibrina
C Calicreína
D Plasmina
E Trombina

20 Los pacientes con daño endotelial extenso en relación con una sepsis por *Escherichia coli* presentan consumo de factores de la coagulación, así como una respuesta inflamatoria generalizada. ¿Cuál de las siguientes sustancias, cuya cantidad disminuye con la administración de proteína C activada, es más probable que reduzca esta respuesta inflamatoria?

A Complemento
B Fibrina
C Calicreína

D Plasmina
E Trombina

21 Una mujer de 95 años toca una olla llena de agua hirviendo. A las 2 h, tiene eritema marcado en la piel de los dedos de la mano y pequeñas ampollas en las yemas de los dedos. ¿Cuál de las siguientes respuestas inflamatorias ha provocado este accidente?

A Inflamación fibrinosa
B Inflamación granulomatosa
C Inflamación purulenta
D Inflamación serosa
E Úlceras

22 Una mujer de 24 años sexualmente activa ha notado dolor abdominal bajo en el último día. Su temperatura es 37,9 °C y, a la palpación, la parte inferior izquierda del abdomen es muy dolorosa. Los resultados de laboratorio son leucocitos totales de 29.000/mm^3 con el 75% de neutrófilos segmentados, el 6% de cayados, el 14% de linfocitos y el 5% de monocitos. La laparotomía pone de manifiesto una trompa de Falopio enrojecida, distendida y llena de líquido que está a punto de romperse. Se realiza una salpingectomía izquierda. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable observar en el examen microscópico de la trompa de Falopio resecada?

A Proliferación fibroblástica
B Células gigantes de Langhans
C Necrosis por licuefacción
D Infiltrados mononucleares
E Metaplasia escamosa

23 Un hombre de 68 años presenta disnea progresiva desde hace 1 semana. En la exploración física, la temperatura es de 38,3 °C. La percusión revela un tono mate en los campos pulmonares izquierdos. En la toracocentesis realizada en la cavidad pleural izquierda se obtienen 800 ml de líquido amarillento y turbio que tiene un recuento de leucocitos de 2.500/mm^3 con el 98% de neutrófilos y el 2% de linfocitos. Una tinción de Gram del líquido muestra cocos grampositivos en racimos. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor el proceso que está teniendo lugar en la cavidad pleural izquierda?

A Absceso

B Inflamación crónica
C Edema
D Inflamación fibrinosa
E Exudado purulento
F Derrame seroso

24 Una mujer de 87 años lleva 2 días con tos productiva y esputos amarillentos. En la exploración su temperatura es de 37 °C. La radiografía de tórax muestra infiltrados dispersos bilaterales. La sangre periférica revela leucocitosis. Una semana después no tiene fiebre. ¿Cuál de los siguientes resultados es el más probable de su enfermedad pulmonar?

A Inflamación crónica
B Cicatrices fibrosas
C Neoplasia
D Resolución
E Úlceras



25 Una mujer de 53 años sufre dolor abdominal de 2 semanas de evolución. No tiene fiebre. A la palpación, la zona superior del abdomen es ligeramente dolorosa, y se conservan los ruidos intestinales. Se realiza una endoscopia digestiva alta. La figura muestra la imagen microscópica de una muestra de biopsia correspondiente a una lesión duodenal. ¿Cuál de los siguientes

procesos patológicos es más probable que esté presente?

A Absceso
B Granuloma caseoso
C Inflamación crónica
D Exudado purulento
E Derrame seroso
F Úlceras



26 Una mujer de 92 años es diagnosticada de neumonía por *Staphylococcus aureus* y recibe un ciclo de tratamiento antibiótico. A las 2 semanas, ya no tiene tos productiva, pero aún presenta una temperatura de 38,1 °C. La TC de tórax muestra los hallazgos de la figura. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor la evolución de la neumonía de la paciente?

A Formación de abscesos
B Resolución completa
C Cicatrices fibrosas
D Inflamación crónica
E Regeneración tisular

27 Una mujer de 29 años con una comunicación interventricular lleva 3 semanas con fiebre persistente de 38,6 °C y cefalea. Una TC

craneal muestra una lesión en anillo de 3 cm, que capta contraste, en el lóbulo parietal derecho del encéfalo. ¿Cuál de las siguientes acciones de las células inflamatorias es más probable que haya producido este hallazgo en la TC?

A Elaboración de óxido nítrico por los macrófagos
B Formación de inmunoglobulinas por linfocitos B
C Generación de prostaglandinas por el endotelio
D Producción de interferón γ por linfocitos T
E Liberación de enzimas lisosómicas por los neutrófilos

28 Un hombre de 37 años sufre dolor epigástrico central en los últimos 3 meses. Una endoscopia digestiva alta muestra una úlcera profunda de 2 cm, bien delimitada, en el antro gástrico. El examen microscópico de una biopsia de la base de la úlcera revela angiogenia, fibrosis e infiltrados de células mononucleares con linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor este proceso patológico?

A Inflamación aguda
B Inflamación crónica
C Inflamación fibrinosa
D Inflamación granulomatosa
E Inflamación serosa

29 Un hombre de 65 años desarrolla insuficiencia cardíaca congestiva progresiva 2 semanas después de sufrir un infarto agudo de miocardio. El ecocardiograma muestra una fracción de eyección notablemente reducida. En ese momento, capilares, fibroblastos, colágeno y células inflamatorias han reemplazado en gran medida al miocardio infartado. ¿Cuál de los siguientes tipos de células inflamatorias es el más importante en el proceso de reparación?

A Eosinófilos
B Células epitelioides
C Macrófagos
D Neutrófilos
E Células plasmáticas

30 Un niño de 9 años presenta tos crónica y fiebre de 1 mes de evolución. La radiografía de tórax muestra un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos hiliares e infiltrados nodulares pulmonares bilaterales. La muestra de esputo contiene bacilos

acidorresistentes. Una muestra de biopsia transbronquial revela inflamación granulomatosa con macrófagos epitelioides y células gigantes de Langhans. ¿Cuál de los siguientes mediadores es más probable que contribuya a la formación de células gigantes?

A C3b del complemento
B Interferón γ
C Interleucina 1 (IL-1)
D Leucotrieno B_4
E Factor de necrosis tumoral (TNF)

31 Una mujer de 32 años presenta tos crónica y fiebre de 1 mes de evolución. En la exploración física, su temperatura es de 37,5 °C. La radiografía de tórax muestra múltiples condensaciones pequeñas, nodulares y mal definidas en todos los campos pulmonares. Una muestra de biopsia transbronquial revela infiltrados intersticiales con linfocitos, células plasmáticas y macrófagos epitelioides. ¿Cuál de los siguientes microorganismos infecciosos es la causa más probable de esta imagen?

A *Candida albicans*
B Citomegalovirus
C *Enterobacter aerogenes*
D *Mycobacterium tuberculosis*
E *Plasmodium falciparum*
F *Staphylococcus aureus*

32 Un mes después de una apendicectomía, una mujer de 25 años palpa un pequeño nódulo bajo la piel en la zona de la incisión, ya cicatrizada, en la fosa ilíaca derecha. Se extirpa el nódulo, y el examen microscópico muestra macrófagos, depósito de colágeno, linfocitos pequeños y células gigantes multinucleadas. En el nódulo se observa un material polarizable y refringente. ¿Cuál de las siguientes complicaciones de la cirugía explica mejor estos hallazgos?

A Formación de abscesos
B Inflamación crónica
C Tejido de granulación exuberante
D Formación de granuloma
E Cicatrización por segunda intención



33 Un hombre de 43 años ha presentado tos y fiebre en los últimos 2 meses. Una TC torácica muestra los hallazgos de la figura *(A)*. Se realiza una biopsia pulmonar transbronquial, de la cual se extrae la muestra cuya imagen microscópica presenta la figura *(B)*. ¿Cuál de los siguientes mediadores químicos es más importante en la patogenia de esta lesión?

A Bradicinina
B C5a del complemento
C Interferón γ

D Óxido nítrico
E Prostaglandinas

34 Una niña de 8 años presenta dificultades para la deglución desde el día anterior. En la exploración, tiene la faringe edematosa y eritematosa con un exudado amarillo sobresaliente. Las pruebas de laboratorio muestran neutrofilia. El cultivo de la faringe identifica *Streptococcus pyogenes* (estreptococo del grupo A). ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que aumente en respuesta a los pirógenos liberados por este microorganismo?

A Factor de Hageman
B Inmunoglobulina E
C Interleucina 12 (IL-12)
D Óxido nítrico
E Prostaglandinas

35 Un hombre de 41 años sufre cefalea intensa desde hace 2 días. En la exploración, la temperatura es de 39,2 °C. Se realiza una punción lumbar, y el líquido cefalorraquídeo obtenido tiene 910 leucocitos/mm^3 con el 94% de neutrófilos y el 6% de linfocitos. ¿Cuál de las siguientes sustancias es el mediador más probable de la fiebre de este hombre?

A Bradicinina
B Histamina
C Leucotrieno B_4
D Óxido nítrico
E Factor de necrosis tumoral (TNF)

36 Un hombre de 43 años con una comunicación interventricular lleva 2 días con tos y fiebre. En la exploración, su temperatura es 37,6 °C y tiene un soplo cardíaco. En un hemocultivo crece *Streptococcus,* del grupo *viridans.* La velocidad de sedimentación globular (VSG) está aumentada. Las células microbianas son opsonizadas y eliminadas. ¿Cuál de los siguientes mediadores químicos es más importante en la producción de estos hallazgos?

A Bradicinina
B Proteína C reactiva
C Interferón γ
D Óxido nítrico
E Prostaglandina
F Factor de necrosis tumoral (TNF)

37 En un experimento, se infecta a un grupo de animales de laboratorio con el virus de la hepatitis. A los 2 meses el microscopio muestra una recuperación completa de la arquitectura hepática normal. Se infecta un grupo control con bacterias y, tras el mismo período de tiempo, al microscopio se observan cicatrices fibrosas de abscesos hepáticos en resolución. ¿Cuál de los siguientes factores explica mejor los distintos resultados de los dos grupos de estudio?

A Extensión del daño de los conductos biliares
B Extensión del daño a los hepatocitos
C Daño de la trama conjuntiva
D Localización de la lesión en el hígado
E Naturaleza del microorganismo etiológico lesivo

38 Una mujer de 51 años presenta pruebas positivas de anticuerpos contra la hepatitis A. La concentración sérica de AST es de 275 U/l, y la de ALT, de 310 U/l. Un mes después, las concentraciones de estas enzimas se han normalizado. ¿Qué fase del ciclo celular describe mejor a los hepatocitos 1 mes después de la infección?

A G0
B G1
C S
D G2
E M

39 Un hombre de 54 años se somete a una reparación de hernia por laparoscopia. A pesar del pequeño tamaño de las incisiones, la cicatrización de las heridas es mala. Al profundizar en la anamnesis, se averigua que su dieta habitual tiene poco valor nutricional y es deficiente en vitamina C. ¿La síntesis de cuál de los siguientes componentes de la matriz extracelular es la más afectada por esta carencia?

A Colágeno
B Elastina
C Fibronectina
D Integrina
E Laminina



40 En un experimento, se realiza la embolización de esferas de cristal en las arterias coronarias de ratas y aparece una lesión miocárdica. A los 7 días se examinan cortes del miocardio con microscopio óptico. La figura muestra la imagen microscópica de uno de esos cortes. ¿Cuál de los siguientes mediadores es más probable que se esté expresando para dar lugar a esta imagen?

A Factor de crecimiento epidérmico
B Interleucina 2 (IL-2)
C Leucotrieno B_4
D Tromboxano A_2
E Factor de necrosis tumoral (TNF)
F Factor de crecimiento endotelial vascular

41 Una mujer de 20 años se somete a una cesárea para dar a luz un recién nacido a término, y la incisión del abdomen inferior se sutura. Las suturas se retiran 1 semana después. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la zona de la herida en el momento de retirar los puntos?

A La degradación de colágeno supera la síntesis
B Aún existe tejido de granulación
C No aumentará la fuerza de la herida
D Predomina el colágeno de tipo IV
E La fuerza de la herida es un 80% de la del tejido normal



42 Un hombre de 24 años con apendicitis aguda se somete a la extirpación quirúrgica del apéndice inflamado. La incisión se sutura. La figura muestra un corte representativo de la zona con tinción tricrómica: el colágeno está teñido de azul. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía sería más probable observar esta imagen?

A 1 día
B 2-3 días
C 4-5 días
D 2 semanas
E 1 mes

43 Un hombre de 40 años se sometió a una laparotomía por un divertículo perforado del colon sigmoide. La evolución postoperatoria se complicó con una infección de la herida y se produjo una dehiscencia de la herida quirúrgica. Ya no era posible el cierre primario, y la herida «se granuló». A las 6 semanas, la herida solo ocupa el 10% del tamaño original. ¿Cuál de los siguientes procesos explica mejor la reducción observada del tamaño de la herida en las últimas 6 semanas?

A Elaboración de glucoproteínas de adherencia
B Aumento de la síntesis de colágeno
C Inhibición de metaloproteinasas
D Contracción de miofibroblastos
E Resolución del edema subcutáneo

44 En un experimento con observaciones sobre la cicatrización de

heridas, los investigadores apreciaron que ciertos elementos del citoesqueleto intracitoplásmico, incluida la actina, interaccionan con la matriz extracelular para promover la unión y la migración de células en la cicatrización de heridas. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que sea responsable de esa interacción entre el citoesqueleto y la matriz extracelular?

A Factor de crecimiento epidérmico
B Fibronectina
C Integrina
D Factor de crecimiento derivado de plaquetas
E Colágeno de tipo IV
F Factor de crecimiento endotelial vascular

45 Una mujer de 23 años en tratamiento con corticoides por una enfermedad autoinmunitaria tiene un absceso en la parte superoexterna del brazo derecho. Se somete a cirugía menor para realizar una incisión y drenar el absceso, pero la herida cicatriza muy poco en el mes siguiente. ¿Cuál de los siguientes aspectos de la cicatrización de heridas es más probable que sea deficiente en esta paciente?

A Depósito de colágeno
B Elaboración de VEGF
C Infiltración de neutrófilos
D Reepitelización
E Producción de serina proteinasa



46 Un hombre de 18 años sufrió una laceración en la oreja izquierda que precisó suturas, que fueron retiradas 1 semana después. La cicatrización de la herida continuó, pero la zona se fue desfigurando a lo largo de los 2 meses siguientes por el proceso mostrado en la figura. ¿Cuál de los siguientes términos explica mejor el proceso que tuvo lugar en este hombre?

A Dehiscencia
B Formación de queloide
C Organización
D Resolución
E Cierre secundario

47 Un hombre de 58 años presentó dolor torácico persistente durante 4 h. Una técnica de imagen radiológica mostró un infarto que afectaba a un área de 4 cm de la pared posterior libre del

ventrículo izquierdo. Los hallazgos de laboratorio revelaron una creatina cinasa sérica de 600 U/l. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable que se observe en la lesión del ventrículo izquierdo 1 mes después?

A Inflamación crónica
B Necrosis coagulativa
C Resolución completa
D Cicatriz fibrosa
E Regeneración nodular

Respuestas

1 **C** Los macrófagos de los tejidos derivados de monocitos sanguíneos circulantes son células fagocíticas que responden a distintos estímulos y representan el personal de mantenimiento del organismo. Las demás células señaladas no son fagocitos. Los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas que secretan anticuerpos para neutralizar microorganismos infecciosos. Los fibroblastos forman colágeno como parte de la respuesta de cicatrización. Los mastocitos pueden liberar distintos mediadores inflamatorios. Los linfocitos T son un elemento clave de los procesos inflamatorios crónicos en las respuestas inmunitarias mediadas por células.

2 **D** Estos signos y síntomas son sugestivos de una neumonía bacteriana aguda. Esas infecciones inducen una inflamación aguda dominada por los neutrófilos que ocupan los alvéolos, como muestra la figura, y son expulsados por la tos, lo que confiere al esputo ese aspecto amarillento y purulento. Las células gigantes de Langhans se observan en las reacciones inflamatorias granulomatosas. Los macrófagos aumentan en número tras el inicio de los procesos agudos, limpiando los tejidos y retirando desechos bacterianos mediante fagocitosis. Los mastocitos son más conocidos por participar en las reacciones alérgicas y anafilácticas. Los linfocitos son un elemento de la inflamación crónica.

3 **E** Las sustancias microbianas no humanas, como el ARN de doble cadena de los virus, el ADN bacteriano y las endotoxinas bacterianas, son reconocidas por los receptores de tipo señuelo (TLR) en las células humanas, como parte del mecanismo de

defensa innato frente a las infecciones. La caspasa 1 se activa por un complejo inflamasoma de proteínas que responden a microorganismos bacterianos y produce interleucina 1 (IL-1) biológicamente activa. Los receptores del complemento en las células inflamatorias reconocen componentes del complemento que ayudan a activar respuestas inmunitarias a través de señales coestimuladoras. Las lectinas presentes en las superficies celulares pueden unirse a distintas sustancias, como polisacáridos fúngicos, que activan las defensas celulares. Los receptores de linfocitos T responden a antígenos peptídicos y se desencadena una respuesta inmunitaria mediada por células.

4 **E** La formación de un exudado con una cantidad significativa de proteínas y células depende de la «filtración» de los vasos sanguíneos, principalmente de las vénulas. Cuando se ha producido la exudación, aumenta el contenido en proteínas del espacio extravascular y la presión osmótica coloide extravascular asciende, lo que causa la acumulación de líquido extracelular. La leucocitosis por sí misma es insuficiente para la exudación porque los leucocitos deben ser impulsados a salir de los vasos por factores quimiotácticos. Los linfáticos recogen líquido proteínico exudado y reducen la cantidad de líquido extravascular y extracelular. La retención de sodio y agua ayuda a producir el trasudado de líquido.

5 **B** El exudado de líquido desde vénulas y capilares es un componente clave del proceso inflamatorio agudo. Se han propuesto varios mecanismos para esa permeabilidad vascular aumentada, como formación de oquedades interendoteliales por contracción del endotelio. Esta contracción podría estar causada por mediadores tales como histamina y leucotrienos. A continuación, los vasos se hacen más «permeables» y el líquido sale del espacio intravascular para acumularse en el extravascular, formando derrames en las cavidades corporales o edema en los tejidos. La vasoconstricción arteriolar es una respuesta transitoria a la lesión que ayuda a reducir la pérdida de sangre. Las plaquetas se adhieren al endotelio dañado y promueven la hemostasia. La obstrucción linfática provoca la acumulación de linfa rica en proteínas y linfocitos, con lo que se produce un derrame quiloso en una cavidad corporal. Una vez

que los neutrófilos llegan a la zona de lesión tisular fuera del espacio vascular, liberan enzimas lisosómicas que promueven la licuefacción.

6 **E** La rodadura de los leucocitos es el primer paso en la transmigración de los neutrófilos desde la vasculatura hasta los tejidos. La rodadura depende de la interacción entre selectinas (P-selectina y E-selectina en las células endoteliales, y L-selectina en los neutrófilos) y sus ligandos sialilados (p. ej., X de Lewis sialilado). Las integrinas participan en el siguiente paso de la transmigración, en el cual se produce una adhesión firme entre neutrófilos y células endoteliales. El C3b del complemento actúa como una opsonina y facilita la fagocitosis. El leucotrieno B_4 es un compuesto quimiotáctico. La NADPH oxidasa está implicada en la actividad microbicida de las células fagocíticas.

7 **B** Las quimiocinas comprenden muchas moléculas quimiotácticas de neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos y basófilos. La bradicinina causa dolor y aumento de la permeabilidad vascular. El C3a del complemento incrementa la permeabilidad vascular liberando histamina de los mastocitos. Esta provoca la extravasación vascular. Las prostaglandinas tienen múltiples acciones, pero no inducen la quimiotaxia.

8 **B** Este déficit de inmunoglobulinas impide la opsonización y la fagocitosis de los microbios. La carencia de integrinas y selectinas, y los defectos de los microtúbulos impedirían la adhesión y el desplazamiento de los neutrófilos. La producción de H_2O_2 es una parte del mecanismo destructor dependiente de oxígeno. Este mecanismo está indemne en este paciente porque los neutrófilos son capaces de destruir las bacterias cuando las inmunoglobulinas del suero normal permiten la fagocitosis.

9 **B** La mieloperoxidasa está presente en los gránulos azurófilos de los neutrófilos. Convierte el H_2O_2 en $HOCl^-$, un potente oxidante y antimicrobiano. La desgranulación tiene lugar cuando se forman fagolisosomas con las bacterias introducidas en vacuolas fagocíticas del citoplasma de los neutrófilos. El consumo de oxígeno con un estallido oxidativo o respiratorio tras la fagocitosis recibe la ayuda de la oxidación de la glucosa y activación de la NADPH oxidasa del neutrófilo, lo que condiciona la generación de superóxido que se convierte por

dismutación espontánea en H_2O_2. Por el contrario, la producción de prostaglandinas depende de una vía ciclooxigenasa funcionante en el metabolismo del ácido araquidónico.

10 **B** El estallido respiratorio u oxidativo de los neutrófilos genera especies reactivas del oxígeno (p. ej., anión superóxido) que son importantes para la destrucción de las bacterias ingeridas. Este estallido puede cuantificarse mediante citometría de flujo. La unión de los neutrófilos al endotelio se apoya en moléculas de adhesión del propio endotelio y la superficie de los neutrófilos. Estas moléculas son integrinas y selectinas. La mielopoyesis no depende de la generación de superóxido. Las bacterias son opsonizadas por el C3b del complemento y la IgG, lo que permite que sean fagocitadas más fácilmente.

11 **D** Durante la inflamación aguda, en la primera fase de la extravasación, los neutrófilos «ruedan» a lo largo del endotelio. En este período, la adhesión entre neutrófilos y células endoteliales es débil. La rodadura está mediada por la unión de selectinas a oligosacáridos sialilados. El siguiente paso, la adhesión firme, está mediada por la unión de las integrinas a sus receptores en los leucocitos, la molécula de adhesión intercelular 1 o la molécula de adhesión vascular 1 (VCAM-1) sobre las células endoteliales. Las integrinas tienen dos cadenas, α y β. La carencia genética de cadenas β impide la adhesión firme de los leucocitos a las células endoteliales. Este proceso depende de moléculas de adhesión expresadas en los neutrófilos y las células endoteliales. La formación de $HOCl^-$ requiere mieloperoxidasa liberada de los gránulos de neutrófilos. La fagocitosis de los microorganismos opsonizados depende de su ingestión, que precisa proteínas contráctiles en el citoplasma del neutrófilo. La migración de los neutrófilos a una zona de infección depende de la presencia de factores quimiotácticos tales como C5a del complemento que se unen al neutrófilo y activan la fosfolipasa C para dar comienzo a una serie de procesos que culminan en la entrada de calcio, que activa proteínas contráctiles. El estallido respiratorio destinado a destruir los microorganismos fagocitados depende de la NADPH oxidasa, y el déficit de esta enzima provoca una enfermedad granulomatosa crónica.

12 **E** Los monocitos que se transforman en macrófagos contienen óxido nítrico sintasa inducible (iNOS) por citocinas, que genera óxido nítrico. Este, por sí mismo y mediante la interacción con otras especies reactivas del oxígeno, tiene actividad antimicrobiana. Los linfocitos CD4+ o CD8+ son fuentes de interferón γ (IFN-γ), que estimula la producción de NOS en los macrófagos. Las células endoteliales contienen una forma de NOS (eNOS) que promueve la vasodilatación. Los linfocitos B producen inmunoglobulinas capaces de opsonizar bacterias. Los basófilos liberan histamina y metabolitos del ácido araquidónico, que participan en la respuesta inflamatoria aguda. Los linfocitos citolíticos naturales tienen receptores Fc y pueden lisar células diana recubiertas por IgG; también generan IFN-γ. Los neutrófilos son capaces de fagocitar microbios, pero utilizan la NADPH oxidasa y otras enzimas distintas de la NOS para destruir los microbios.

13 **B** El interferón γ secretado por los linfocitos estimula monocitos y macrófagos, que secretan sus propias citocinas, que activan más linfocitos. El interferón γ también es importante para transformar los macrófagos en células epitelioides en la respuesta inflamatoria granulomatosa. La histamina liberada de los mastocitos es un potente vasodilatador y aumenta la permeabilidad vascular. El leucotrieno B_4, generado en la vía de la lipooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico, es un factor quimiotáctico de neutrófilos muy potente. El óxido nítrico generado por los macrófagos colabora en la destrucción de los microorganismos; el liberado por el endotelio media la vasodilatación e inhibe la activación plaquetaria. La unión de agonistas tales como adrenalina, colágeno o trombina a los receptores de la superficie plaquetaria activa la fosfolipasa C, que cataliza la liberación de ácido araquidónico a partir de dos de los fosfolípidos principales de la membrana, fosfatidilinositol y fosfatidilcolina. El factor de necrosis tumoral (TNF), producido por los macrófagos activados, media muchos efectos sistémicos, como fiebre, hipotensión y síndrome catabólico.

14 **C** La histamina se encuentra en grandes cantidades en los mastocitos, que normalmente están presentes en los tejidos conjuntivos contiguos a los vasos sanguíneos por debajo de las

superficies mucosas en las vías respiratorias. La unión de un antígeno (alérgeno) a anticuerpos IgE que se han unido previamente a los mastocitos mediante el receptor Fc desencadena la desgranulación de los mastocitos, con liberación de histamina. Esta respuesta causa un aumento de la permeabilidad vascular y de las secreciones de moco. La bradicinina, generada desde el sistema de cininas al contacto de superficie del factor de Hageman con el colágeno y la membrana basal por un daño vascular, promueve la permeabilidad vascular, la contracción de músculo liso y la aparición de dolor. El C5a del complemento es un potente factor quimiotáctico de neutrófilos. La interleucina 1 (IL-1) y el factor de necrosis tumoral (TNF), ambos producidos por macrófagos activados, median muchos efectos sistémicos, como fiebre, hipotensión y síndrome catabólico. La fosfolipasa C, que cataliza la liberación de ácido araquidónico, se genera en la activación de las plaquetas.

15 **F** La enzima COX-2 es inducible en las reacciones inflamatorias agudas, especialmente en neutrófilos, membranas sinoviales y sistema nervioso central. La vía de la ciclooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico genera prostaglandinas, que median el dolor, la fiebre y la vasodilatación. Es más probable que la tumefacción del tobillo se deba a edema periférico secundario a insuficiencia cardíaca congestiva. La mayor susceptibilidad a los hematomas es el resultado de la administración prolongada de glucocorticoides, que también causa leucopenia. El asma se debe a la broncoconstricción mediada por leucotrienos generados por la vía de la lipooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico. La inhibición de la histamina liberada de los mastocitos ayuda a reducir la urticaria. La fiebre puede estar mediada por la liberación de prostaglandinas, no por su inhibición.

16 **E** El naproxeno, un antiinflamatorio no esteroideo, antagoniza la vía de la ciclooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico y reduce la generación de prostaglandinas. Estas promueven la vasodilatación en áreas de inflamación. La quimiotaxia es una función de varias quimiocinas, y el C3b del complemento puede promover la fagocitosis, pero ninguno de ellos se ve afectado por el ácido acetilsalicílico. Varias moléculas

de adhesión colaboran en la migración de los leucocitos. La liberación de leucocitos de la médula ósea está impulsada por las citocinas interleucina 1 (IL-1) y factor de necrosis tumoral (TNF).

17 **E** Las prostaglandinas se producen por la vía de la ciclooxigenasa en el metabolismo del ácido araquidónico. El ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos bloquean la síntesis de prostaglandinas, causantes de dolor. El C1q del complemento se genera en la fase inicial de la activación del complemento, que, en último término, da lugar a lisis celular. La histamina es, principalmente, un vasodilatador. Los leucotrienos se producen en la vía de la lipooxigenasa, no bloqueada por el ácido acetilsalicílico. El óxido nítrico liberado del endotelio es un vasodilatador.

18 **C** Las células endoteliales liberan óxido nítrico, que promueve la vasodilatación en áreas de lesión isquémica. La bradicinina, básicamente, aumenta la permeabilidad vascular y produce dolor. El leucotrieno E_4, el factor activador de plaquetas y el tromboxano A_2 tienen propiedades vasoconstrictoras.

19 **A** La activación del complemento puede producirse mediante componentes de la pared celular microbiana, tales como polisacáridos (vía alternativa) o manosa (vía de la lectina), o bien por anticuerpos unidos a antígenos de superficie (vía clásica). Se generan distintos componentes del complemento, como C5a, un atrayente químico de neutrófilos; C3b, una opsonina, y C5-9, el complejo de ataque a la membrana. Los demás elementos están más asociados con la coagulación. La fibrina se genera por el sistema de coagulación, no el de anticoagulación. La calicreína podría ayudar a la producción de bradicinina y plasmina, pero solo participa en la génesis del C5a del complemento. La plasmina se produce a partir del plasminógeno y ayuda a lisar los coágulos. La trombina es producida por la cascada de la coagulación.

20 **E** La activación mantenida de la coagulación genera una respuesta inflamatoria que amplifica aún más la coagulación, con lo que se crea un círculo vicioso. La proteína C antagoniza el factor V de la coagulación, que cataliza la activación de la protrombina a trombina, rompiendo así el ciclo de generación

de trombina. Los componentes del complemento pueden ser activados por plasmina (C3) y calicreína (C5), y formar anafilotoxinas (C3a y C5a) que promueven la inflamación. La fibrina, el producto final de las vías de la coagulación, forma una red que atrapa plaquetas y crea un tapón. La calicreína se produce mediante la activación del factor de Hageman (XII) y provoca la formación de bradicinina. La plasmina se genera a partir del plasminógeno activado por la trombosis para promover la lisis del coágulo.

21 **D** La inflamación serosa es la forma más leve de inflamación aguda. Una ampolla es un buen ejemplo. Se asocia principalmente a exudado de líquido al espacio subcórneo o subepidérmico. Como la lesión es leve, el líquido tiene relativamente pocas proteínas. Un exudado rico en proteínas provoca la acumulación de fibrina. La inflamación granulomatosa se caracteriza por acumulaciones de macrófagos transformados llamados *células epitelioides.* Las células de la inflamación aguda, principalmente los neutrófilos, extravasadas a una cavidad o un espacio corporal forman un exudado purulento (supurativo), asociado típicamente con necrosis por licuefacción. La pérdida del epitelio lleva a la ulceración.

22 **C** Esta paciente está presentando una reacción inflamatoria aguda, con edema, eritema y dolor de escasa duración. Los neutrófilos forman un exudado y liberan varias proteasas, capaces de producir necrosis por licuefacción, que comienza por la mucosa y se extiende a través de la pared de la trompa. Este mecanismo produce perforación. Los fibroblastos participan con más frecuencia en las respuestas inflamatorias crónicas y de cicatrización, que aparecen habitualmente más de 1 semana después del proceso inicial. Las células gigantes de Langhans son características de la inflamación granulomatosa. Los infiltrados mononucleares son más típicos de la inflamación crónica de la trompa de Falopio, en la que la rotura es menos probable. La metaplasia epitelial es más frecuente en casos de irritación crónica con inflamación.

23 **E** Las infecciones bacterianas a menudo provocan una respuesta inflamatoria aguda dominada por los neutrófilos. Los neutrófilos extravasados intentan fagocitar las bacterias y

destruirlas. En el proceso, algunos neutrófilos mueren, y la liberación de sus enzimas lisosómicas puede causar necrosis por licuefacción del tejido. Estos desechos licuados y los neutrófilos vivos y muertos forman el pus, o exudado purulento. Este tipo de exudado es característico de las infecciones bacterianas que afectan a cavidades corporales. Otro término que describe un exudado purulento en la cavidad pleural es *empiema*. Un absceso es una acumulación localizada de neutrófilos en los tejidos. La inflamación crónica aparece cuando hay un predominio de células mononucleares, como linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, en un proceso que lleva más de unos días presente –semanas o meses con más probabilidad– o que acompaña a brotes repetidos de inflamación aguda. El término edema se refiere al aumento de líquido celular y a la acumulación de líquido en los tejidos, que provocan tumefacción tisular. En la inflamación fibrinosa, la salida de proteínas sanguíneas (incluido el fibrinógeno, que se polimeriza a fibrina) confiere una imagen macroscópica rugosa a las superficies suprayacentes a la inflamación. Un derrame seroso es un trasudado con aspecto acuoso parecido a un ultrafiltrado de plasma sanguíneo, con escaso contenido de células y proteínas.

24 **D** Si la inflamación es limitada y breve, y el tejido afectado es capaz de regenerarse, la resolución será el resultado más probable, sin pérdida de función significativa. En ancianos esto puede tardar más, pero sigue siendo posible. Los brotes múltiples de inflamación aguda, o una inflamación mantenida, pueden convertirse en crónicos y suele perderse cierta función del tejido. En caso de destrucción tisular significativa, probablemente se forme una cicatriz fibrosa en esa región. La inflamación aguda no es un proceso preneoplásico. El término ulceración se refiere a la pérdida de una superficie epitelial con la inflamación aguda; si el epitelio se regenera, se producirá la resolución.

25 **F** La inflamación que afecta a una superficie epitelial puede causar una necrosis tan extensa que la superficie quede erosionada y se forme una úlcera. Si la inflamación continúa, la úlcera seguirá avanzando hacia abajo en la submucosa y en la muscular. Otras posibilidades son que la úlcera cicatrice o bien

se mantenga crónicamente inflamada. Un absceso es una acumulación localizada de neutrófilos en los tejidos. El granuloma caseoso es una inflamación granulomatosa con necrosis central; la necrosis tiene elementos de la necrosis por licuefacción y coagulativa. La inflamación crónica se produce cuando hay un predominio de células mononucleares, como linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, en un proceso que lleva presente más de unos días –semanas o meses con más probabilidad– o que acompaña a brotes repetidos de inflamación aguda. El pus, o exudado purulento, es semilíquido y amarillento por el gran número de granulocitos que contiene. Un derrame seroso es un trasudado con aspecto acuoso parecido al ultrafiltrado de plasma sanguíneo, con escaso contenido de células y proteínas.

26 **A** La condensación redondeada del lóbulo inferior del pulmón derecho tiene contenidos licuados que forman un nivel aire-líquido central. Hay infiltrados circundantes. La formación de una cavidad llena de líquido tras una infección por *Staphylococcus aureus* indica que se ha producido necrosis por licuefacción. La cavidad está llena de desechos tisulares y neutrófilos viables y muertos (pus). Las cavidades localizadas llenas de pus se denominan *abscesos.* Algunas bacterias, como *S. aureus*, son con más frecuencia piógenas o formadoras de pus. Con la resolución completa, la estructura pulmonar prácticamente no varía. Tras una inflamación aguda pueden producirse cicatrices o fibrosis cuando el tejido dañado es sustituido por tejido conjuntivo fibroso. La mayoría de las neumonías bacterianas se resuelven y la progresión a inflamación crónica mantenida es infrecuente. El tejido pulmonar, a diferencia del hígado, es incapaz de regenerarse, excepto el epitelio y el endotelio.

27 **E** Esta paciente tiene una endocarditis infecciosa con un émbolo séptico que ha producido un absceso cerebral. La destrucción de teji- do que acompaña a la formación de abscesos como parte del proceso inflamatorio agudo se debe a las enzimas lisosómicas destructoras, ayudadas por la liberación de especies reactivas del oxígeno. El óxido nítrico generado por los macrófagos colabora en la destrucción de los microorganismos

infecciosos. Las inmunoglobulinas formadas por los linfocitos B neutralizan y opsonizan microorganismos infecciosos. Las prostaglandinas producidas por el endotelio promueven la vasodilatación. El interferón γ liberado de los linfocitos es un elemento principal en las respuestas inflamatorias crónicas y granulomatosas.

28 **B** Un posible resultado de la inflamación aguda con ulceración es la inflamación crónica. Esto resulta especialmente probable cuando el proceso inflamatorio se mantiene durante semanas o meses. La inflamación crónica se caracteriza por destrucción tisular, infiltrado de células mononucleares y reparación. En la inflamación aguda, el proceso de reparación con fibrosis y angiogenia aún no ha comenzado. En la inflamación fibrinosa, que típicamente afecta a una superficie mesotelial, hay una salida de líquido rico en proteínas que condiciona la precipitación de la fibrina. La inflamación granulomatosa es una forma de inflamación crónica en la que los macrófagos epitelioides for- man agregados. La inflamación serosa es un proceso inflamatorio que afecta a una superficie mesotelial (p. ej., revestimiento de la cavidad pericárdica) con salida de líquido que apenas tiene proteínas ni células.

29 **C** Los macrófagos presentes en esas lesiones son muy importantes en el proceso de reparación. Los macrófagos activados secretan varias citocinas que promueven la angiogenia y la fibrosis, como factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento de fibroblastos, interleucina 1 (IL-1) y factor de necrosis tumoral (TNF). Los eosinófilos predominan en las inflamaciones alérgicas y en las infecciones por parásitos. Las células epitelioides, agregados de macrófagos activados, suelen estar presentes en la inflamación granulomatosa, y la curación de los procesos inflamatorios agudos no supone una inflamación granulomatosa. Los neutrófilos alcanzan su cifra máxima en las 48 h posteriores al infarto, pero ya no son numerosos después de 1 semana. Las células plasmáticas secretan inmunoglobulinas y no son decisivas en la reparación de un área de lesión tisular.

30 **B** El interferón γ es secretado por linfocitos T activados y constituye un mediador importante de la inflamación

granulomatosa. Condiciona la activación de macrófagos y su transformación a células epitelioides y, posteriormente, células gigantes. El C3b del complemento actúa como una opsonina en las reacciones inflamatorias agudas. La interleucina 1 (IL-1) la secretan los macrófagos y produce distintos efectos, incluidas fiebre, adhesión de leucocitos, proliferación de fibroblastos y secreción de citocinas. El leucotrieno B_4 induce quimiotaxia en los procesos inflamatorios agudos. El factor de necrosis tumoral (TNF) es secretado por macrófagos activados y provoca la activación de linfocitos y proliferación de fibroblastos, que son otros elementos del granuloma.

31 **D** Estos hallazgos denotan inflamación granulomatosa, y la tuberculosis es una causa frecuente. *Candida* es, con frecuencia, un microorganismo comensal de la región bucofaríngea y rara vez causa neumonías en personas sanas (no inmunodeprimidas). Las infecciones víricas tienden a producir una respuesta de células inflamatorias mononucleares intersticiales. Es más probable que ciertas bacterias, como *Enterobacter* y *Staphylococcus,* produzcan inflamación aguda. *Plasmodium* es el causante del paludismo, una infección parasitaria sin afectación pulmonar significativa.

32 **D** El material polarizable es la sutura, y la reacción de células gigantes multinucleadas, típicamente con células gigantes de cuerpo extraño, es característica de la reacción granulomatosa frente a cuerpo extraño. El tejido de granulación puede adoptar una imagen nodular y comienza a aparecer a los 3-5 días de la lesión, pero es poco probable que persista 1 mes. La inflamación crónica por sí misma no suele causar nódulos localizados con células gigantes. El término edema se refiere a la acumulación de líquido en el espacio intersticial. No provoca nódulos celulares. Si una herida grande y con espacio interpuesto no se cierra con suturas, puede granularse, y la contracción de los miofibroblastos favorece, finalmente, el cierre de la herida por segunda intención.

33 **C** La figura *A* muestra condensaciones pulmonares reticulonodulares, y en la figura *B* se observan granulomas no caseosos con muchas células epitelioides y dos células gigantes de Langhans prominentes de gran tamaño. Si las tinciones

especiales y/o cultivos de microorganismos (habitualmente hongos o micobacterias) son negativos, entonces posiblemente se trate de una sarcoidosis. La estimulación de los macrófagos y su transformación en células epitelioides y gigantes son características de la formación de granulomas. El interferón γ promueve la formación de células epitelioides y gigantes. La bradicinina se libera en las reacciones inflamatorias agudas y provoca dolor. El C5a del complemento es quimiotáctico para los neutrófilos. Aunque en los granulomas se observan algunos neutrófilos, estas células no son un componente importante de la inflamación granulomatosa. Los macrófagos pueden liberar óxido nítrico para destruir otras células, pero este mediador no estimula a los macrófagos a formar reacciones granulomatosas. Las prostaglandinas están implicadas principalmente en la génesis de vasodilatación y dolor en las respuestas inflamatorias agudas.

34 **E** Los hallazgos son los correspondientes a una faringitis estreptocócica con inflamación aguda. Los microorganismos bacterianos suelen causar fiebre cuando acompañan a la infección a través de la liberación de pirógenos exógenos que inducen a las células inflamatorias a liberar pirógenos endógenos tales como factor de necrosis tumoral (TNF) e interleucina 1 (IL-1). Los pirógenos estimulan la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo para «reajustar el termostato», de modo que se produce fiebre como signo de la respuesta inflamatoria aguda. El factor de Hageman pone en marcha la cascada de la coagulación. La inmunoglobulina E suele estar aumentada en respuesta a las reacciones inflamatorias ante alérgenos y parásitos invasivos. La interleucina 12 (IL-12) liberada por los macrófagos estimula las respuestas de linfocitos T. El óxido nítrico generado en el endotelio da lugar a vasodilatación, mientras que el producido por los macrófagos ayuda a destruir microbios.

35 **E** La fiebre está producida por varios mediadores inflamatorios, pero las principales citocinas causantes de este signo son la interleucina 1 (IL-1) y el factor de necrosis tumoral (TNF), producidos por macrófagos y otros tipos de células. La IL-1 y el TNF tienen efectos autocrinos, paracrinos y endocrinos.

Median las respuestas de fase aguda, como la fiebre, las náuseas y la liberación de neutrófilos de la médula ósea. La bradicinina, generada a partir del sistema de cinina al contacto de la superficie del factor de Hageman con el colágeno y la membrana basal por la lesión de un vaso, promueve la permeabilidad vascular, la contracción del músculo liso y dolor. La histamina liberada por los mastocitos es un potente vasodilatador y aumenta la permeabilidad vascular. El leucotrieno B_4, producido en la vía de la lipooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico, es un potente factor quimiotáctico de neutrófilos. El óxido nítrico de los macrófagos colabora en la destrucción de los microorganismos, mientras que el liberado por el endotelio causa vasodilatación e inhibe la activación plaquetaria.

36 **B** Este proceso inflamatorio agudo condiciona la producción de los reactantes de fase aguda, como proteína C reactiva (CRP), fibrinógeno y proteína amiloide sérica A (SAA). Estas proteínas, especialmente el fibrinógeno, y las inmunoglobulinas aumentan la disposición de los eritrocitos en cilindros, incrementando así la velocidad de sedimentación globular (VSG), que es un indicador inespecífico de inflamación. La producción de CRP está regulada al alza por la interleucina 6 (IL-6), mientras que el fibrinógeno y la SAA se regulan al alza, principalmente, por el factor de necrosis tumoral (TNF) y la interleucina 1 (IL-1). El interferón γ es un potente estimulador de los macrófagos. El óxido nítrico induce vasodilatación o bien ayuda a la destrucción de microbios dentro de los macrófagos. Las prostaglandinas son vasodilatadoras.

37 **C** Los hepatocitos son células estables con una gran capacidad de regeneración. La capacidad de restaurar la arquitectura normal de un órgano como el hígado depende de la viabilidad de la trama conjuntiva de soporte. Si las células del tejido conjuntivo están indemnes, la regeneración de los hepatocitos puede restaurar la estructura normal del hígado. Esta regeneración tiene lugar en muchos casos de hepatitis vírica. Un absceso hepático asociado a necrosis por licuefacción de los hepatocitos y del tejido conjuntivo de soporte se repara mediante cicatrización. Las otras opciones podrían explicar el alcance de la lesión hepática, pero no la naturaleza de la

respuesta.

38 **A** Los hepatocitos son células quiescentes (estables) capaces de entrar de nuevo en el ciclo celular y proliferar en respuesta a una lesión hepática, lo que permite que el hígado se regenere parcialmente. La hepatitis aguda da lugar a necrosis de hepatocitos, marcada por elevaciones de AST y ALT. Una vez finalizado el proceso agudo, las células retornan a la fase G0 y el hígado vuelve a ser quiescente.

39 **A** El déficit de vitamina C causa escorbuto, con reducción de la actividad de la enzima lisilo oxidasa, que ayuda a formar puentes cruzados entre las fibrillas de colágeno para aportar fuerza de tensión. Aunque la elastina es una proteína fibrilar, suele regenerarse mal en el tejido cicatricial, incluso con la mejor nutrición, lo que explica por qué una cicatriz no se estira como la piel circundante. Las demás opciones reseñadas son glucoproteínas con capacidad de adherencia que no dependen de la vitamina C.

40 **F** La figura muestra un infarto subagudo con formación de tejido de granulación que contiene numerosos capilares estimulados por el factor de crecimiento endotelial vascular, que representa una respuesta de reparación. El factor de crecimiento epidérmico ayuda a la reepitelización de una herida superficial. La interleucina 2 (IL-2) media la activación de los linfocitos. El leucotrieno B_4 causa vasoconstricción y broncoconstricción. El tromboxano A_2 colabora en la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. El factor de necrosis tumoral (TNF) induce activación endotelial y muchas respuestas que tienen lugar secundariamente a la inflamación, como fiebre, pérdida de apetito, alteraciones del sueño, hipotensión y aumento de la producción de corticoesteroides.

41 **A** Una semana después, la cicatrización de la herida no es completa, y sigue habiendo tejido de granulación. En las semanas siguientes se sintetiza más colágeno. La herida alcanza su máxima fortaleza con cerca del 80% a los 3 meses, aproximadamente. El colágeno de tipo IV está presente en las membranas basales.

42 **E** La figura muestra colágeno denso con algunos vasos sanguíneos dilatados aún presentes, característicos de la fase

final de la cicatrización de heridas, que es extensa al final del primer mes. En el día 1, la herida solo contiene fibrina y células inflamatorias. Los macrófagos y el tejido de granulación se observan 2-3 días después de la cirugía. La neovascularización es más prominente en los días 4 y 5. A las 2 semanas hay un predominio del colágeno y se observan menos vasos y células inflamatorias.

43 **D** La contracción de la herida es una característica distintiva del cierre por segunda intención que se produce en las heridas de mayor tamaño. La síntesis de colágeno ayuda a rellenar el defecto, pero no lo contrae. Las glucoproteínas adhesivas, como la fibronectina, colaboran en el mantenimiento de un andamiaje celular para el crecimiento y la reparación, pero no se contraen. La inhibición de las metaloproteinasas conduce a una menor degradación del colágeno y a la alteración del remodelado del tejido conjuntivo en la reparación de las heridas. El edema disminuye con el tiempo, pero esto no ocasiona mucha contracción.

44 **C** Las integrinas interaccionan con proteínas de la matriz extracelular (p. ej., fibronectina). La incorporación de las integrinas por parte de proteínas de la matriz extracelular conduce a la formación de adherencias focales en las que las integrinas se unen a elementos del citoesqueleto intracelular como la actina. Estas interacciones provocan señales intracelulares que modulan el crecimiento, la diferenciación y la migración de las células durante la cicatrización de las heridas. El factor de crecimiento epidérmico estimula la proliferación de células epiteliales y fibroblastos. El factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) lo producen el endotelio, los macrófagos, las células de músculo liso y las plaquetas; el PDGF media la migración y la proliferación de los fibroblastos y las células del músculo liso, así como la migración de monocitos. El colágeno de tipo IV está en las membranas basales a las que se anclan las células. El factor de crecimiento endotelial vascular promueve la angiogenia (proliferación capilar) a través de la proliferación y la migración de células endoteliales en una respuesta reparadora.

45 **A** Los glucocorticoides inhiben la cicatrización de heridas al

alterar la síntesis de colágeno. Este es un efecto deseable si hay que reducir el alcance de la cicatrización, pero genera una demora de la reparación de las heridas quirúrgicas. La angiogenia derivada del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) no se ve afectada significativamente por los corticoesteroides. Los glucocorticoides no impiden la infiltración de neutrófilos. El tratamiento con corticoesteroides no afecta a la reepitelización, impulsada en parte por el factor de crecimiento epidérmico. Las proteinasas de serina son importantes en el remodelado de la herida.

46 **B** El proceso de cicatrización provoca, en ocasiones, una producción exuberante de colágeno, lo que da lugar a un queloide, que es una cicatriz nodular elevada y prominente, como muestra la figura. Esta tendencia puede tener una distribución familiar. La dehiscencia se produce cuando la herida se abre. A medida que el tejido de granulación es reemplazado por tejido fibroso, ocurre la organización. Si se restaura la arquitectura normal del tejido, se habrá resuelto la inflamación. El cierre secundario es el proceso por el que las heridas grandes se llenan y contraen.

47 **D** La concentración elevada de creatina cinasa indica que se ha producido necrosis del miocardio. Una cicatriz fibrosa sustituirá gradualmente el área de necrosis miocárdica. La inflamación crónica suele estar provocada por estímulos mantenidos, como infección persistente, autoinmunidad o irritación debida a sustancias químicas endógenas o exógenas, y no es característica de la lesión miocárdica isquémica. La necrosis coagulativa es típica del infarto de miocardio pero, después de 1 mes, habría una cicatriz. La destrucción de las fibras miocárdicas impide la resolución completa. La regeneración nodular es característica de la lesión de los hepatocitos porque estas son células estables.

CAPÍTULO 4

Trastornos hemodinámicos

PEF9 Capítulo 4: Trastornos hemodinámicos, enfermedad tromboembólica y shock

PH9 Capítulo 3: Trastornos hemodinámicos, tromboembolia y shock

1 Una mujer de 45 años que permanece de pie durante largos períodos de tiempo en su trabajo observa que tiene hinchados la parte inferior de las piernas y los pies al final de un turno de 8 h, aunque no había tumefacción al inicio de la jornada. No presenta dolor ni eritema asociados a la hinchazón. No tiene otros problemas de salud ni toma medicación; las pruebas de laboratorio muestran que la función renal y la hepática son normales. ¿Cuál de los siguientes mecanismos explica mejor este fenómeno?

A Ingesta excesiva de agua libre
B Hipoalbuminemia
C Aumento de la presión hidrostática
D Obstrucción linfática
E Hiperaldosteronismo secundario

2 Una mujer de 56 años diagnosticada de cáncer de mama izquierda se sometió a una mastectomía con disección de los ganglios linfáticos axilares. En el postoperatorio desarrolló una marcada tumefacción del brazo izquierdo, que se ha mantenido durante 6 meses. En la exploración actual su temperatura es de 36,9 °C. El brazo izquierdo no es doloroso a la palpación ni tiene eritema, y ni su movimiento ni su tacto desencadenan dolor, pero está aumentado de tamaño y su consistencia es de empastado. ¿Cuál de los siguientes es el mecanismo más probable de estos hallazgos?

A Celulitis
B Insuficiencia cardíaca congestiva
C Descenso de la presión oncótica plasmática
D Linfoedema
E Retención de agua y sodio
F Flebotrombosis

3 Una mujer de 37 años nota un bulto en la mama izquierda desde hace 2 meses. En la exploración física, la piel de esa mama está engrosada y tiene hoyuelos; su color es naranja rojizo. La mamografía revela una densidad de 3 cm en dicha zona. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina de la masa y el examen microscópico revela un carcinoma. ¿Cuál de los siguientes mecanismos explica mejor la imagen macroscópica de la piel de la mama izquierda?

A Inflamación crónica
B Congestión pasiva crónica
C Necrosis isquémica
D Obstrucción linfática
E Trombosis venosa

4 Un niño de 7 años presenta letargo progresivo de 1 semana de evolución. En la exploración física, tiene edema periorbitario y edema con fóvea de los tobillos, pero está normotenso y afebril. Las pruebas de laboratorio muestran albuminuria intensa. Recibe un diurético tiacídico y la diuresis aumenta, con lo que los edemas se resuelven. ¿Cuál de los siguientes cambios es más probable que potenciara el edema?

A Descenso de la aldosterona
B Menor cantidad de renina
C Aumento de la albúmina
D Aumento del cortisol
E Reducción de la hormona antidiurética
F Mayor retención de sal



5 Una mujer de 94 años presenta disnea y tos progresivamente mayor con esputos espumosos en el último mes. No tiene fiebre. La figura muestra su radiografía de tórax. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que influya en el desarrollo de los infiltrados pulmonares?

A Menor ingesta de sodio
B Hipoalbuminemia
C Aumento de la presión hidrostática
D Inflamación
E Obstrucción venosa pulmonar

6 Un hombre de 50 años sufre un infarto de la pared anterior del ventrículo izquierdo. Recibe tratamiento con antiarrítmicos y vasopresores. Permanece estable hasta que desarrolla disnea grave a los 3 días. El ecocardiograma muestra un descenso notable de la fracción de eyección. La figura anterior ilustra los hallazgos representativos de la radiografía de tórax. ¿Cuál de las siguientes alteraciones microscópicas es más probable que presenten sus pulmones?

A Exudado alveolar constituido por neutrófilos
B Trasudado alveolar
C Fibrosis de la pared alveolar
D Fibrosis pleural
E Exudado neutrófilo en el espacio pleural
F Trasudado en el espacio pleural



7 Un hombre de 58 años con enfisema pulmonar tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva en los últimos 10 años. En la exploración física, la pierna está aumentada de tamaño con edema con fóvea de grado 2 hasta las rodillas y distensión prominente de la vena yugular hasta la zona de la mandíbula. Las concentraciones séricas de AST y ALT están elevadas. La figura presenta una imagen macroscópica representativa del hígado. ¿Cuál de los siguientes trastornos subyacentes es más probable que padezca este hombre?
A Insuficiencia renal crónica
B Obstrucción del conducto colédoco
C Insuficiencia cardíaca congestiva
D Trombosis de la vena porta
E Trombocitopenia

8 Un hombre de 85 años, al caerse en la bañera, se golpea la zona posterior de la cabeza. A lo largo de las 24 h siguientes presenta

somnolencia progresiva. Una TC craneal muestra acumulación de líquido por debajo de la duramadre que comprime el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor esta acumulación de líquido?

A Congestión
B Equimosis
C Hematoma
D Petequias
E Púrpura



9 Se realiza un estudio de autopsias para correlacionar los patrones de hemorragia con las causas subyacentes. Los pacientes con la imagen macroscópica de hemorragia presentada en la figura tuvieron una pérdida de sangre mínima, pero muchos otros órganos mostraban un aspecto similar al mostrado aquí. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor este patrón?

A Congestión
B Equimosis

C Hematoma
D Petequias
E Púrpura

10 Una herida superficial por punción causada por una aguja produce una hemorragia muy pequeña en personas sanas. Segundos después del pinchazo, la hemorragia cede. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que detenga la pequeña hemorragia arteriolar de esta lesión?

A Polimerización de fibrina
B Quimiotaxia de neutrófilos
C Agregación de plaquetas
D Activación de la proteína C
E Vasoconstricción

11 Una joven de 15 años se corta la planta del pie al pisar un trozo de cristal. En la exploración, la laceración superficial de 0,5 cm deja de sangrar a los 5 min de aplicar presión local. ¿Cuál de las siguientes sustancias liberadas por el endotelio es más probable que contrarreste la agregación plaquetaria cerca de esta zona de lesión?

A Glucoproteína IIb/IIIa
B Factor activador de plaquetas
C Prostaciclina
D Activador del plasminógeno tisular
E Trombomodulina
F Tromboxano

12 En un experimento, se estudia la formación de trombos en áreas de lesión vascular. Se impide la propagación del trombo a las arterias normales adyacentes en un área de lesión vascular. ¿Cuál de las siguientes sustancias disminuye la propagación del trombo mediante la activación de la proteína C?

A Calcio
B Fibrina
C Factor plaquetario 4
D Protrombina
E Trombomodulina
F Factor de necrosis tumoral (TNF)

13 Una mujer de 26 años tiene antecedentes de epistaxis frecuentes y mayor flujo sanguíneo menstrual. En la exploración física, la piel

de las extremidades presenta petequias y púrpura. Las pruebas de laboratorio muestran resultados normales del tiempo de tromboplastina parcial (TTP), tiempo de protrombina (TP) y del recuento de plaquetas, pero la actividad del factor de von Willebrand está reducida. ¿Cuál de los siguientes pasos de la hemostasia es más probable que tenga alterado esta paciente?

A Polimerización de la fibrina
B Adhesión plaquetaria
C Agregación plaquetaria
D Generación de protrombina
E Inhibición de la protrombina
F Vasoconstricción

14 Una mujer de 59 años con antecedentes de diabetes mellitus tuvo un infarto de miocardio hace 3 meses. Su IMC es de 35. Actualmente toma ácido acetilsalicílico en dosis bajas para reducir el riesgo de recidiva de trombosis arteriales. ¿Sobre cuál de los siguientes pasos tiene su máximo efecto el ácido acetilsalicílico?

A Adhesión de las plaquetas al colágeno
B Agregación plaquetaria
C Producción de factor tisular
D Síntesis del factor de von Willebrand
E Síntesis de antitrombina III

15 Un experimento analiza la función plaquetaria. Se obtiene una sustancia de los gránulos de cuerpo denso a partir de un grupo de plaquetas mezcladas de donantes de sangre sanos. Cuando se añade esta sustancia a las plaquetas obtenidas de pacientes con un trastorno hemorrágico no se produce la agregación plaquetaria. La adición de la sustancia a las plaquetas de un grupo control normal induce agregación plaquetaria. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que produzca estos efectos?

A Difosfato de adenosina
B Antitrombina III
C Fibronectina
D Fibrinógeno
E Plasminógeno
F Tromboxano A_2

16 Un niño de 12 años tiene antecedentes de múltiples hemorragias de tejidos blandos desde los 2 años de edad, así como

obstrucción aguda de las vías respiratorias debida a formación de un hematoma en el cuello. En la exploración física presenta una reducción del recorrido articular en las grandes articulaciones, especialmente rodillas y tobillos. No tiene petequias ni púrpura en la piel. Las pruebas de laboratorio muestran un tiempo de protrombina normal, un aumento del tiempo de tromboplastina parcial (TTP) y un recuento plaquetario normal, pero un descenso marcado de la actividad del factor VIII. ¿Cuál de los siguientes mecanismos describe mejor el desarrollo de su enfermedad?

A Reducción de la producción de trombina
B Disminución de los fosfolípidos de la membrana
C Alteración de la agregación plaquetaria
D Alteración de la polimerización de la fibrina
E Incapacidad de neutralizar la antitrombina III
F Incapacidad de las plaquetas de liberar tromboxano A_2

17 Un hombre de 58 años ha presentado episodios de epistaxis prolongada en los últimos 6 meses. En el estudio se detecta sangre oculta en las heces. Las pruebas de coagulación muestran que el tiempo de protrombina está prolongado, pero el tiempo de tromboplastina parcial (TTP), el recuento de plaquetas y la función plaquetaria son normales. Cuando se mezcla su plasma con la misma cantidad de plasma normal, el tiempo de protrombina se corrige. ¿Cuál de las siguientes enfermedades subyacentes es más probable que se asocie a estos hallazgos?

A Síndrome antifosfolipídico
B Mutación del factor V de Leiden
C Hemofilia A
D Escorbuto
E Sepsis por *Escherichia coli*
F Déficit de vitamina K

18 Una mujer de 66 años experimenta dolor torácico de comienzo brusco que se irradia al cuello y al brazo izquierdo. En la exploración realizada 30 min después del inicio del cuadro, está sudorosa e hipotensa. Su concentración sérica de troponina I está elevada. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más probable que se administre de urgencia como tratamiento trombolítico a esta mujer?

A Ácido acetilsalicílico

B Heparina de bajo peso molecular
C Óxido nítrico
D Activador del plasminógeno tisular
E Vitamina K

19 Una mujer de 60 años con antecedentes de diabetes mellitus lleva 5 h con dolor torácico izquierdo que se irradia al brazo. Las determinaciones seriadas de las concentraciones séricas de creatina cinasa MB revelan una cifra elevada 24 h después del inicio del dolor. El tiempo de tromboplastina parcial (TTP) y el tiempo de protrombina (TP) son normales. Una angiografía coronaria muestra oclusión de la arteria descendente anterior izquierda. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es la causa más probable de la trombosis de esta paciente?

A Anticuerpo inhibidor de la coagulación
B Daño del endotelio
C Menor concentración de antitrombina III
D Reducción del activador del plasminógeno tisular
E Mutación en el gen del factor V
F Estasis del flujo sanguíneo

20 Una mujer de 21 años ha presentado múltiples episodios de trombosis venosa profunda en los últimos 10 años y un episodio de tromboembolia pulmonar el año anterior. Las pruebas de laboratorio muestran que el tiempo de protrombina (TP), el tiempo de tromboplastina parcial (TTP), el recuento plaquetario y las pruebas de función plaquetaria son normales. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es la causa más frecuente de esa coagulopatía?

A Déficit de antitrombina III
B Mutación del factor V
C Hiperhomocisteinemia
D Mutación de la proteína C
E Neoplasia maligna oculta
F Uso de anticonceptivos orales
G Fumar cigarrillos

21 Una mujer de 23 años lleva 24 h con alteración del nivel de consciencia y disartria. Una TC craneal muestra un infarto hemorrágico temporal derecho. La angiografía cerebral revela una oclusión distal de la arteria cerebral media derecha. En los 3 años

anteriores tuvo un episodio de embolia pulmonar. Una gestación hace 18 meses terminó en aborto. Las pruebas de laboratorio ponen de manifiesto un falso positivo en la serología de la sífilis, un tiempo de protrombina (TP) normal, un aumento del tiempo de tromboplastina parcial (TTP) y una cifra de plaquetas normal. ¿Cuál de los siguientes factores es la causa más probable de estos hallazgos?

A Anticuerpos antifosfolipídicos
B Coagulación intravascular diseminada
C Mutación del factor V
D Hipercolesterolemia
E Enfermedad de von Willebrand



22 Un hombre de 71 años con antecedentes de diabetes mellitus falleció por un infarto agudo de miocardio. En la autopsia, la aorta, abierta longitudinalmente y con la cara superior de los riñones por debajo de los separadores, presentó la imagen mostrada en la figura. ¿Cuál de las siguientes complicaciones asociadas a esta enfermedad aórtica es más probable que hubiera tenido este hombre durante toda su vida?

A Edema de la pierna izquierda
B Gangrena del pie
C Tromboembolia pulmonar
D Infarto renal

E Trombocitopenia

23 Una mujer de 55 años lleva 1 semana con molestias y tumefacción de la pierna izquierda, tras una cirugía abdominal importante. En la exploración física, resulta ligeramente difícil mover la pierna y hay dolor a la palpación. Una ecografía Doppler muestra trombosis de las venas profundas de la pierna izquierda. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que contribuya a su trastorno?

A Hipercalcemia
B Inmovilización
C Ingesta de ácido acetilsalicílico
D Liberación de óxido nítrico
E Flujo sanguíneo turbulento

24 Un hombre de 75 años es ingresado tras caerse y sufrir una fractura del trocánter femoral izquierdo. A las 2 semanas, tiene la pierna izquierda hinchada, especialmente por debajo de la rodilla. Siente dolor al mover la pierna; a la palpación, hay tumefacción y dolor. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que haya sucedido en este hombre?

A Coagulación intravascular diseminada
B Síndrome de embolia grasa
C Necrosis gangrenosa del pie
D Hematoma del muslo
E Tromboembolia pulmonar



25 Una mujer de 65 años sufrió fracturas del fémur izquierdo, pelvis y húmero izquierdo en una colisión de vehículo a motor. Se estabilizaron las fracturas y la recuperación cursó sin complicaciones. En una exploración física 3 semanas después, todavía ingresada, presenta tumefacción y calor en la pierna izquierda, y hay dolor local y a la palpación en el muslo izquierdo. ¿Cuál de los siguientes procesos, mostrado en la figura, es más probable que esté sucediendo en su vena femoral izquierda?

A Ateroesclerosis
B Congestión pasiva crónica
C Inflamación
D Trombosis mural
E Flebotrombosis
F Vegetación



26 Una mujer de 59 años con hiperlipidemia lleva 24 h con dolor anginoso. Los hallazgos de laboratorio muestran ausencia de incremento en la troponina I y creatina cinasa MB séricas. A las 2 semanas la situación es estable y la mujer no tiene dolor torácico, pero una pequeña arteria del epicardio ha sufrido los cambios observados en la figura. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor este hallazgo en la arteria epicárdica?

A Embolia gaseosa
B Émbolo de colesterol
C Congestión pasiva crónica
D Síndrome de embolia grasa
E Trombosis mural
F Organización con oclusión
G Flebotrombosis

27 Una mujer de 77 años tiene un episodio de desmayo breve. Hace 1 año se le diagnosticó un adenocarcinoma pancreático. La auscultación cardíaca revela un soplo. La ecocardiografía muestra una lesión nodular de 1 cm en la cara superior de la valva anterior de una válvula mitral indemne. El hemocultivo es negativo. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor esta lesión de la válvula mitral?

A Ateroma
B Congestión pasiva crónica
C Trombo mural

D Mixoma
E Flebotrombosis
F Vegetación



28 Un hombre de 70 años fue ingresado hace 3 semanas por un infarto cerebral. Ahora está deambulando por primera vez. A los pocos minutos de volver a la habitación, presenta disnea acompañada de sudoración de comienzo súbito. No es posible reanimarlo. La figura muestra la imagen macroscópica del hilio del pulmón izquierdo en la autopsia. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que contribuyera a este hallazgo?

A Anticuerpos antifosfolipídicos
B Bronconeumonía
C Mutación del factor V
D Trombosis venosa profunda
E Ateroesclerosis arterial pulmonar

29 Un hombre de 32 años tiene un accidente de tráfico y sufre fracturas del fémur y de la tibia derechos y del húmero izquierdo. Las fracturas se estabilizan quirúrgicamente. Permanece estable durante 2 días, pero después presenta disnea intensa de comienzo súbito. ¿Cuál de las siguientes complicaciones de sus lesiones es la causa más probable de la dificultad respiratoria brusca?

A Taponamiento cardíaco

B Embolia grasa
C Edema pulmonar
D Infarto pulmonar
E Hemotórax derecho

30 Una mujer de 22 años con una gestación no complicada desarrolla de forma súbita disnea con cianosis e hipotensión intraparto durante el parto vaginal normal de un niño nacido a término. Sufre una crisis epiléptica generalizada y entra en coma. Su estado no mejora en los 2 días siguientes. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que esté presente en las arterias pulmonares periféricas?

A Agregados de plaquetas
B Líquido amniótico
C Glóbulos de grasa
D Burbujas de aire
E Tromboembolia

31 Un hombre de 31 años está realizando un viaje de buceo y desciende a una profundidad de 50 m en el Gran Agujero Azul de la costa de Belice. A los 30 min, su equipo funciona mal y vuelve rápidamente al barco en la superficie. Desarrolla dificultad para respirar a los 5 min, con disnea y dolor torácico subesternal, seguidos de cefalea intensa y vértigo. Una hora después presenta mialgias y artralgia intensas y dolorosas. Estos síntomas ceden en 24 h. ¿Cuál de las siguientes sustancias, que está ocluyendo sus arteriolas, es la causa más probable del cuadro?

A Glóbulos de grasa
B Coágulos de fibrina
C Burbujas de nitrógeno gaseoso
D Trombos de plaquetas
E Placa ateromatosa rota



32 Un hombre de 53 años con insuficiencia cardíaca congestiva desarrolla una infección pulmonar por *Streptococcus pneumoniae* tras un brote de gripe. Después de recuperarse durante 2 semanas, presenta dolor torácico pleurítico. El dolor está causado por el desarrollo de la lesión mostrada en la figura. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que haya ocurrido?

A Congestión pulmonar aguda
B Congestión pulmonar crónica
C Edema pulmonar
D Infarto pulmonar
E Trombosis venosa pulmonar



33 Un hombre de 44 años con miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca desarrolla una trombosis mural en la aurícula izquierda. Sufre la complicación mostrada en la figura, que se manifiesta por hematuria. ¿Cuál de los siguientes términos es el que mejor define esta complicación?

A Absceso
B Infarto isquémico
C Necrosis por licuefacción
D Insuficiencia multiorgánica

E Trombosis venosa

34 Una mujer de 28 años con antecedentes de trombosis recidivantes de 15 años de evolución por una mutación en el gen de la protrombina desarrolla sepsis tras una infección urinaria por *Pseudomonas aeruginosa.* Sufre múltiples infartos e insuficiencia de órganos en las 2 semanas posteriores. ¿Cuál de los siguientes órganos es más probable que no resulte afectado por la lesión isquémica en esta mujer?

A Encéfalo
B Corazón
C Riñón
D Hígado
E Bazo

35 Una mujer de 80 años con disuria de 1 semana de evolución tiene fiebre en el momento actual. En la exploración, presenta temperatura de 37,9 °C, frecuencia cardíaca de 103 latidos/min y presión arterial de 80/40 mmHg. Tiene dolor en el costado derecho. El análisis de orina muestra numerosos leucocitos. El lactato plasmático está elevado. En el urocultivo y en el hemocultivo crece *Escherichia coli.* ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que contribuya al colapso cardiovascular al activar los receptores celulares de tipo señuelo *(toll)*?

A C3b del complemento
B Lipopolisacárido
C Óxido nítrico
D Factor activador de plaquetas
E Toxina 1 del síndrome del shock tóxico

36 Una mujer de 63 años refiere debilidad y fiebre de 2 días de evolución. En la exploración física, presenta temperatura de 38,4 °C, frecuencia cardíaca de 101 latidos/min, frecuencia respiratoria de 17 respiraciones/min y presión arterial de 85/40 mmHg. Tiene una vasodilatación periférica marcada. La concentración de ácido láctico sérico es de 6,8 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio es más probable que esté relacionado con la causa del cuadro clínico?

A Hemocultivo positivo para *Citrobacter*
B Descenso del hematocrito
C Creatina cinasa sérica elevada

D Aumento del nitrógeno ureico sanguíneo
E Po_2 reducida en la gasometría

37 Un hombre de 20 años desarrolla palpitaciones 1 h después de recibir un disparo en el abdomen. En la exploración, presenta frecuencia cardíaca de 112 latidos/min y presión arterial de 80/30 mmHg. La piel está fría y húmeda al tacto. ¿Cuál de las siguientes alteraciones específicas de órgano es más probable que suceda en los 2 días posteriores a la lesión?

A Infarto hepático agudo
B Hemorragia de los núcleos basales cerebrales
C Necrosis gangrenosa de las piernas
D Daño alveolar difuso pulmonar
E Congestión pasiva renal

38 Un hombre de 38 años está talando árboles solo en el bosque y se hace un corte profundo en la pierna con la motosierra. Pierde una gran cantidad de sangre. Hasta el día siguiente no es rescatado. ¿Un incremento de cuál de los siguientes parámetros sanguíneos analíticos es más probable que indique que ha llegado a una fase irreversible del shock?

A Hormona antidiurética
B Bicarbonato
C Catecolaminas
D Lactato deshidrogenasa
E Protrombina

Respuestas

1 **C** La presión hidrostática ejercida por la bipedestación provoca edema en las partes declives del organismo. En personas sanas, la función renal normal sería suficiente para eliminar el agua libre ingerida por vía oral. La hipoalbuminemia causa edemas más generalizados, aunque el efecto es más pronunciado en las áreas declives. La obstrucción linfática secundaria a infecciones o tumores puede provocar linfoedema, pero este es un proceso crónico. El hiperaldosteronismo secundario es consecuencia de la insuficiencia cardíaca congestiva y de la hipoperfusión renal, pero se trata de un proceso generalizado.

2 **D** La cirugía interrumpió el retorno linfático, lo que provocó

una obstrucción linfática funcional y linfoedema del brazo. Los canales linfáticos son importantes para retirar líquido y proteínas que han salido a los tejidos extravasculares desde el compartimento intravascular. Aunque la cantidad de líquido drenado por los canales linfáticos no es grande, puede acumularse gradualmente. La celulitis está causada por una infección de la piel y del tejido subcutáneo, y cursa con eritema, calor y dolor a la palpación. Es posible que la insuficiencia cardíaca congestiva provoque edemas periféricos, más marcados en áreas declives, como las extremidades inferiores y suprayacente al sacro (en pacientes encamados). El descenso de la presión oncótica del plasma por hipoalbuminemia o la retención de sodio y agua en caso de insuficiencia renal o cardíaca provocan edemas más generalizados. La flebotrombosis causa tumefacción con dolor espontáneo y a la palpación, pero es infrecuente en las extremidades superiores.

3 **D** La extensión del cáncer a los linfáticos dérmicos produce la imagen de piel de naranja en la mama. Como la mama tiene un drenaje venoso extenso, es improbable que el cáncer u otra lesión focal de tipo masa causen congestión y edema significativos. La inflamación crónica es infrecuente en el tejido mamario y no se asocia a cáncer. La congestión pasiva no afecta a la mama. La isquemia no es frecuente en la mama por su abundante irrigación arterial.

4 **F** Este niño tiene un síndrome nefrótico con pérdida de albúmina en la orina e hipoalbuminemia que reduce la presión oncótica plasmática, lo que provoca el desplazamiento del agua intravascular al compartimento extravascular y, en consecuencia, edemas. En respuesta, la hipovolemia con hipoperfusión renal induce una mayor producción de renina, angiotensina y aldosterona, que promueven la retención de agua y sodio, que empeora aún más el edema. Los diuréticos tiacídicos aumentan la excreción renal de sodio. La hipovolemia elevaría la producción de hormona antidiurética. Aunque los corticoesteroides se usan para tratar el síndrome nefrótico causado por la enfermedad de cambios mínimos, su efecto probablemente consista en reducir la función anómala de los linfocitos T que está provocando la lesión glomerular. El cortisol

condiciona la retención de sodio, pero no en respuesta a la hipovolemia.

5 **C** Tiene insuficiencia cardíaca congestiva, con infiltrados pulmonares difusos bilaterales secundarios a edema. El lado izquierdo del corazón es insuficiente, lo que aumenta la presión hidrostática en la vasculatura pulmonar. La presión más alta fuerza al líquido a salir a los alvéolos y entonces se expulsa con la tos. Obsérvese el corazón agrandado con el borde prominente de la aurícula izquierda en la figura. Este líquido es un trasudado porque contiene pocas proteínas y células. Por lo general, los riñones son capaces de compensar una ingesta reducida de sal, pero en la sociedad moderna adolecemos de un exceso de sal dietética, no de carencias. El edema de la hipoalbuminemia no se limita a los pulmones y es más probable que aparezca en áreas de tejido conjuntivo laxo, como la región periorbitaria. Esta mujer no tiene fiebre, de modo que es improbable que los infiltrados pulmonares representen una neumonía capaz de producir localmente edema en regiones de inflamación. La obstrucción venosa pulmonar es típica de la tromboembolia pulmonar, que podría provocar una insuficiencia cardíaca derecha y edemas periféricos en caso de ser crónica.

6 **B** La insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo tras un infarto de miocardio causa congestión venosa en el lecho capilar pulmonar y un aumento de la presión hidrostática, que conduce a edema pulmonar por trasudado al espacio alveolar. En casos de inflamación aguda del pulmón (p. ej., neumonía) se encontrarían neutrófilos y fibrina. La fibrosis y los macrófagos cargados de hemosiderina (células de la insuficiencia cardíaca) aparecerían en la insuficiencia del ventrículo izquierdo de larga evolución, no en la aguda. El exudado purulento en el espacio pleural (empiema) o en el material expulsado de los bronquios se debe a infecciones bacterianas, no a insuficiencia cardíaca. En esta radiografía no hay derrame pleural. Las acumulaciones de líquido probablemente sean trasudados (pocas células y apenas proteínas) en los trastornos no inflamatorios.

7 **C** La figura muestra el denominado hígado en nuez moscada, causado por congestión pasiva crónica debida a insuficiencia cardíaca congestiva. La elevada concentración de enzimas

apunta a que el proceso es tan grave que ya se ha producido necrosis hepática centrolobulillar. Los hallazgos físicos indican insuficiencia cardíaca derecha, que puede aparecer con el enfisema pulmonar y con la hipertensión arterial pulmonar. La obstrucción de la vía biliar produciría estasis de bilis (colestasis) con ictericia. La congestión hepática no está relacionada directamente con la insuficiencia renal y el síndrome hepatorrenal carece de una imagen macroscópica característica. Una trombosis de la vena porta reduciría el flujo sanguíneo del hígado, pero no es probable que cause necrosis por la doble vascularización de este órgano. El patrón regular de color rojo en el lobulillo observado en la figura es improbable en la hemorragia secundaria a trombocitopenia, caracterizada por petequias y equimosis.

8 **C** Tiene un hematoma subdural debido a que el traumatismo causó roturas de venas cerebrales. Un hematoma es una acumulación de sangre en un espacio potencial o dentro de un tejido. La congestión tiene lugar cuando hay dilatación vascular con estasis de la sangre venosa en un órgano. Las equimosis son áreas parcheadas de hemorragia bajo la piel, superficies serosas o membranas mucosas secundarias a una contusión (cardenal) que probablemente este hombre sufrió en la parte posterior de la cabeza. Las petequias son áreas de hemorragia puntiformes de 1-2 mm. El término púrpura se refiere a una hemorragia parcheada en la piel, en superficies serosas o en membranas mucosas mayor de 3 mm; las áreas de 1-2 cm de tamaño se denominan *equimosis.*

9 **D** Obsérvense las pequeñas hemorragias petequiales puntiformes, de 1-2 mm, en la superficie epicárdica mostrada en la figura. Ese tipo de hemorragia suele deberse a un número reducido de plaquetas o a una disminución de la función plaquetaria. Son las plaquetas las que taponan los pequeños defectos vasculares. La congestión tiene lugar cuando hay dilatación vascular con estasis de sangre dentro de un órgano. Un hematoma es una acumulación de sangre en un espacio potencial o dentro de un tejido. El término púrpura se refiere a una hemorragia parcheada en la piel, en superficies serosas o en membranas mucosas mayor de 3 mm; las áreas de 1-2 cm de

tamaño se denominan *equimosis.*

10 **E** La respuesta inicial a la lesión arteriolar es la vasoconstricción, porque hay músculo liso en la pared del vaso. Sin embargo, esta es transitoria y el mecanismo de la coagulación debe ponerse en marcha para mantener la hemostasia. La polimerización de la fibrina es parte de la hemostasia secundaria, una vez logrado el cierre inicial de la lesión vascular. Los neutrófilos no son esenciales para la hemostasia. La agregación plaquetaria ocurre por la liberación de factores tales como ADP, pero tarda unos minutos en producirse. La proteína C participa en la anticoagulación para contrarrestar la formación de coágulos.

11 **C** La lesión endotelial libera una glucoproteína, el factor tisular (factor III), que activa el proceso de la coagulación y las plaquetas. El endotelio intacto adyacente genera prostaciclina (PGI_2) a través del metabolismo del ácido araquidónico para inhibir la propagación del coágulo más allá de la zona donde es necesario. La PGI_2 y el óxido nítrico son potentes vasodilatadores e inhibidores de la agregación plaquetaria. Esto limita la formación del trombo estrictamente al área de lesión. La glucoproteína IIb/IIIa, que induce el cambio de forma, los fosfolípidos, que se unen a fibrinógeno y calcio, y el factor activador de plaquetas son procoagulantes que estimulan la trombosis y la activación de plaquetas. El activador del plasminógeno tisular promueve la actividad fibrinolítica *después* de que se haya formado un trombo. La trombomodulina se une a la trombina y forma un anticoagulante, que activa la proteína C, que a continuación escinde los factores V y VIII activados. El tromboxano se genera a partir del metabolismo del ácido araquidónico en las plaquetas y promueve la activación plaquetaria y la vasoconstricción.

12 **E** La trombomodulina está presente en el endotelio indemne y se une a la trombina, que inhibe entonces la coagulación activando la proteína C. Normalmente, la trombina activa los factores V, VIII y IX, y además estabiliza el tapón hemostático secundario mediante la activación del factor XIII, que forma enlaces cruzados en la fibrina. La trombina ayuda a activar las plaquetas. El calcio es un cofactor que colabora en la formación

del trombo en la cascada de la coagulación (el ácido etilendiaminotetraacético [EDTA] en algunos tubos de recogida de sangre se une al calcio para prevenir la coagulación). La proteína fibrina forma una malla esencial en la formación del trombo. El factor plaquetario 4 es liberado por los gránulos α de las plaquetas y promueve la agregación plaquetaria durante el proceso de la coagulación. La protrombina se convierte en trombina en la cascada de la coagulación. El factor de necrosis tumoral (TNF) no tiene una función significativa en la coagulación.

13 **B** El factor de von Willebrand (vWF) funciona como «pegamento» entre las plaquetas y la matriz extracelular expuesta de la pared del vaso tras una lesión vascular. Ninguno de los demás pasos reseñados depende del vWF. Como el tiempo de protrombina (TP) de la paciente es normal, no es probable la carencia de protrombina ni la presencia de un inhibidor. Puesto que el vWF estabiliza el factor VIII, un déficit de vWF podría prolongar el tiempo de tromboplastina parcial (TTP).

14 **B** El ácido acetilsalicílico bloquea la vía de la ciclooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico y la generación de eicosanoides en las plaquetas, incluido el tromboxano A_2, y así entorpece la vasoconstricción e inhibe la agregación plaquetaria. La adhesión de las plaquetas a la matriz extracelular está mediada por interacciones con el factor de von Willebrand. El factor tisular (factor III), producido por el endotelio dañado, por el músculo liso subendotelial y por los fibroblastos, se libera en presencia de lesiones tisulares y no depende de las plaquetas. Las células endoteliales producen factor de von Willebrand independientemente de la acción plaquetaria. La antitrombina III tiene propiedades anticoagulantes porque inactiva varios factores de la coagulación, pero su función no se ve afectada por el ácido acetilsalicílico.

15 **A** El ADP se libera de los gránulos densos de las plaquetas y es un estimulador potente de la agregación plaquetaria; también estimula una mayor liberación de ADP por parte de otras plaquetas. Los gránulos α plaquetarios almacenan muchas otras sustancias implicadas en la hemostasia, como fibrinógeno,

fibronectina y los factores V y VIII. El tromboxano A_2, otro potente estimulador de la agregación plaquetaria, se sintetiza en la vía de la ciclooxigenasa. La fibronectina forma parte de la matriz extracelular presente entre las células que «pega» unas con otras. El plasminógeno se activa para promover la trombólisis. La agregación plaquetaria requiere un metabolismo activo de las plaquetas: estimulación de las plaquetas por agonistas tales como ADP, trombina, colágeno o adrenalina; presencia de iones de calcio o magnesio y proteínas plasmáticas específicas, por ejemplo fibrinógeno o factor de von Willebrand (vWF), y un receptor plaquetario, el complejo de la glucoproteína IIb/IIIa (GPIIb/IIIa). La estimulación de las plaquetas da lugar a la generación de segundos mensajeros intracelulares, que transmiten el estímulo de vuelta a la superficie plaquetaria, exponiendo lugares de unión a proteínas en el GPIIb/IIIa. Entonces, el fibrinógeno se une al GPIIb/IIIa y entrecruza plaquetas adyacentes para producir agregados plaquetarios; el vWF se une y activa el cambio de forma y la liberación de los gránulos. Los pacientes de este experimento podrían tener tromboastenia de Glanzmann, cuadro en que los pacientes tienen carencias o defectos del complejo GPIIb/IIIa, no se unen al fibrinógeno y son incapaces de formar agregados, aunque las plaquetas sí son estimuladas por el ADP, pueden cambiar de forma y su tamaño es normal.

16 **A** Tiene hemofilia A. El factor VIII, el factor tisular (III) y el factor V actúan como cofactores o aceleradores de la reacción en la cascada de la coagulación que culmina en la producción de trom- bina. El factor VIII sirve de acelerador de la reacción de conversión del factor X y el factor Xa. La superficie plaquetaria aporta fosfolípidos para el ensamblaje de los factores de la coagulación. El tromboxano A_2 y el ADP promueven la agregación plaquetaria. El tromboxano A_2 se libera cuando las plaquetas son activadas en el proceso de adhesión plaquetaria. La polimerización de la fibrina es estimulada por el factor XIII. La antitrombina III inhibe la trombina y prolonga el tiempo de protrombina.

17 **F** El tiempo de protrombina elevado que se corrige con plasma normal apunta a un déficit de factores de la coagulación, y los

factores II, VII, IX y X se sintetizan en el hígado y afectan a esta vía de la coagulación «extrínseca» *in vitro*. Son dependientes de la vitamina K y, por tanto, también se ven afectados por el tratamiento con warfarina o hepatopatías parenquimatosas. El síndrome antifosfolipídico tiene un efecto inhibidor sobre las pruebas de coagulación *in vitro* y no se corrige con la adición de plasma normal. La mutación que da lugar al factor V de Leiden provoca dificultades en la inactivación del factor V por la acción de la proteína C y, por tanto, causa trombosis, no hemorragias. La hemofilia A se debe a la pérdida de función del factor VIII y solo afecta al tiempo de tromboplastina parcial (TTP). El escorbuto secundario a la carencia de vitamina C altera la integridad vascular, no los factores de coagulación. Una sepsis por gramnegativos libera lipopolisacáridos que activan la coagulación a gran escala, con consumo de factores de coagulación y plaquetas, de modo que tanto el tiempo de protrombina (TP) como el TTP están elevados, mientras que el número de plaquetas desciende, algo habitual en la coagulopatía intravascular diseminada.

18 **D** El activador del plasminógeno tisular (t-PA) es un compuesto trombolítico que promueve la generación de plasmina, que escinde la fibrina disolviendo los coágulos. El ácido acetilsalicílico previene la formación de nuevos trombos al inhibir la agregación plaquetaria y funciona mejor como tratamiento preventivo. La heparina previene la trombosis activando la antitrombina III. El óxido nítrico es un vasodilatador. La vitamina K es necesaria para la síntesis de los factores de la coagulación II, VII, IX y X, y facilita la capacidad de formar coágulos.

19 **B** El daño ateroesclerótico del endotelio vascular es la causa más frecuente de trombosis arterial; esta lesión se acumula casi imperceptiblemente a lo largo de muchos años. La diabetes mellitus de tipos 1 y 2 acelera la ateroesclerosis. Los inhibidores de la coagulación, como anticuerpos antifosfolipídicos, prolongan típicamente el tiempo de tromboplastina parcial (TTP), el tiempo de protrombina (TP) o ambos. La reducción de la concentración de antitrombina III y la mutación en el gen del factor V son causas hereditarias de hipercoagulabilidad; resultan

mucho menos frecuentes que la ateroesclerosis de los vasos coronarios. Es posible que disminuya la producción del activador del plasminógeno tisular por parte de células endoteliales indemnes en caso de anoxia de esas células en venas con circulación muy lenta. La estasis del flujo sanguíneo es importante en las trombosis de la circulación venosa de baja presión.

20 **B** Los episodios trombóticos de repetición a una edad tan precoz apuntan, principalmente, a una coagulopatía hereditaria. La mutación del factor V (Leiden) afecta al 2-15% de la población, y más de la mitad de todas las personas con antecedentes de trombosis venosa profunda recidivante tienen ese defecto. Las carencias hereditarias de las proteínas anticoagulantes antitrombina III y proteína C pueden causar estados de hipercoagulabilidad, pero son mucho menos frecuentes que la mutación del factor V. La hiperhomocisteinemia es una causa menos frecuente de riesgo de trombosis heredado que la mutación del factor V. También es un factor de riesgo de ateroesclerosis que predispone a la trombosis arterial. Aunque algunos cánceres elaboran sustancias promotoras de la trombosis, es improbable que esta paciente tenga cáncer, debido a que es muy joven; tampoco resulta plausible que una paciente con cáncer tenga antecedentes de trombosis de 10 años de evolución. El uso de anticonceptivos orales contribuye al riesgo de trombosis, pero principalmente en mujeres de más edad, sobre todo después de los 40 años. Fumar promueve la ateroesclerosis con trombosis arteriales.

21 **A** Estos hallazgos son característicos de un estado de hipercoagulabilidad. La paciente tiene anticuerpos que reaccionan con la cardiolipina, antígeno fosfolipídico usado en el diagnóstico serológico de la sífilis. Los llamados anticuerpos antifosfolipídicos están dirigidos contra complejos fosfolípido-proteína, como β_2-glucoproteína I y trombina, y a veces reciben el nombre de *anticoagulantes lúpicos* porque están presentes en algunos pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) y otros trastornos autoinmunitarios. Los pacientes con síndrome antifosfolipídico sufren trombosis arteriales y venosas

recidivantes y, las mujeres, abortos de repetición. *In vitro,* estos anticuerpos inhiben la coagulación al interferir en el ensamblaje de los complejos de fosfolípidos, y una «prueba mixta» con suero normal no corregirá el TTP (que mide principalmente los factores II, V, VIII, IX, X, XI y XII y el fibrinógeno en la «vía intrínseca» de la coagulación *in vitro*). En el organismo, los anticuerpos inducen un estado de hipercoagulabilidad por mecanismos desconocidos. La coagulación intravascular diseminada es una coagulopatía de consumo aguda caracterizada por el aumento de TP y TTP, y descenso del número de plaquetas. El TP y el TTP son normales en pacientes con mutación del factor V (Leiden). La hipercolesterolemia promueve la ateroesclerosis a lo largo de muchos años, y aumenta el riesgo de trombosis arterial. La enfermedad de von Willebrand afecta a la adhesión plaquetaria y provoca una tendencia a las hemorragias, no a la trombosis.

22 **B** La figura muestra un trombo mural a la derecha, ocupando un aneurisma ateroesclerótico de la aorta por debajo de las arterias renales. La diabetes mellitus acelera y empeora la ateroesclerosis, incluidas las arterias musculares periféricas. Una posible complicación de la trombosis mural es la embolización, que ocurre cuando se desprende un trozo pequeño del coágulo. El émbolo se desplaza distalmente y puede ocluir la arteria poplítea, una arteria terminal de la pierna. Un trombo venoso, no arterial, produce hinchazón de la pierna por edema. Como el trombo está en la circulación arterial, el émbolo no alcanzaría los pulmones. El trombo está por debajo de las arterias renales. Aunque las plaquetas contribuyen a la formación del trombo, el recuento plaquetario no disminuye apreciablemente con la formación de un trombo localizado, y es necesario, un proceso generalizado, como la coagulación intravascular diseminada, que consuma las plaquetas suficientes para causar trombocitopenia.

23 **B** La causa más importante y frecuente de trombosis venosa es la estasis vascular, que a menudo se produce con la inmovilización. El calcio es un cofactor en la vía de la coagulación, pero un incremento del calcio apenas tiene efectos sobre el proceso de la coagulación. El ácido acetilsalicílico inhibe

la función plaquetaria y limita la trombosis. El óxido nítrico es un vasodilatador e inhibidor de la agregación plaquetaria. Un flujo sanguíneo turbulento podría promover la trombosis, pero este factor de riesgo es más frecuente en la rápida circulación arterial.

24 **E** Tiene trombosis venosa profunda como consecuencia de la estasis venosa secundaria a la inmovilización. Los grandes trombos profundos de las venas de las piernas pueden embolizarse a los pulmones y provocar la muerte. La coagulación intravascular diseminada no es una complicación frecuente en pacientes con trombosis de las extremidades ni en aquellos que se están recuperando de una lesión. En las fracturas puede producirse embolia grasa, pero los problemas pulmonares suelen aparecer 1-3 días después del traumatismo. La gangrena tiene lugar, habitualmente, por una oclusión arterial, no venosa, de la pierna. Los vasos con trombos suelen permanecer indemnes; si se ha desarrollado un hematoma como consecuencia del traumatismo secundario a la caída, se debería haber organizado y disminuido de tamaño a las 2 semanas.

25 **E** La estasis venosa favorece el desarrollo de flebotrombosis (trombosis venosa) especialmente en las venas pélvicas y de la pierna. Esta es una complicación frecuente en pacientes ingresados en el hospital y encamados. La obstrucción puede producir dolor y tumefacción local o bien ser asintomática. Esos trombos profundos en venas grandes suponen un riesgo de tromboembolia pulmonar. La flebotrombosis se produce cuando la estasis de las grandes venas promueve la formación de trombos, habitualmente en las venas pélvicas y de las piernas; como a menudo hay tumefacción, calor y dolor clínicamente aparentes, se usa con frecuencia el término *tromboflebitis* independientemente de la presencia de una auténtica inflamación vascular. La figura muestra capas alternantes de plaquetas-fibrina rosadas y eritrocitos (líneas de Zahn) a la izquierda. Una vez formado el trombo, puede organizarse con crecimiento interno de capilares, proliferación de fibroblastos e infiltración por macrófagos, que, finalmente, eliminan parte del coágulo o la mayor parte de este y se forman una o más luces nuevas (recanalización), como se muestra en la parte derecha de

la figura. La ateroesclerosis tiene lugar en arterias, no en venas. El término congestión pasiva crónica hace referencia a la estasis de sangre capilar, sinusoidal o venosa en órganos como los pulmones o el hígado. La vasculitis suele afectar a la pared vascular con infiltrados de células inflamatorias. Los trombos murales son trombos que se forman en las superficies del corazón o de las grandes arterias. Una vegetación es un trombo localizado en el endotelio cardíaco, normalmente sobre una válvula.

26 **F** La figura muestra un trombo organizándose en una arteria pequeña. Esa oclusión arterial periférica no fue suficiente como para producir un infarto, como pone de manifiesto la ausencia de elevación de las enzimas. Los trombos se organizan con el tiempo si no se disuelven mediante fibrinólisis. Una vez formado el trombo, este puede organizarse con crecimiento interno de capilares, proliferación de fibroblastos e infiltración por macrófagos, que, finalmente, eliminan parte del coágulo o la mayor parte de este; es posible que se formen una o más luces nuevas (recanalización). Las embolias gaseosas son infrecuentes y, por lo general, se deben a traumatismos. Las producidas en la vertiente arterial son capaces de causar isquemia por oclusión, incluso aunque sean muy pequeñas, mientras que en la vertiente venosa más de 100 ml de aire atrapados en el corazón pueden reducir el gasto cardíaco. Cuando los gases que se disuelven en los tejidos a alta presión forman burbujas en la descompresión con presiones más bajas en la sangre y los tejidos, se producen embolias gaseosas. Los émbolos de colesterol pueden desprenderse de los ateromas arteriales y avanzar distalmente hasta ocluir arterias pequeñas; sin embargo, como estos émbolos suelen ser bastante pequeños, casi nunca resultan relevantes clínicamente. El término congestión pasiva crónica hace referencia a la estasis de sangre capilar, sinusoidal o venosa en órganos como los pulmones o el hígado. Los émbolos de grasa son glóbulos de lípidos que se generan con más frecuencia tras traumatismos, habitualmente de huesos largos. Los trombos murales son trombos que se forman en las superficies del corazón o las grandes arterias.

27 **F** Una masa trombótica que se forma sobre una válvula

cardíaca (o con menos frecuencia, en el endocardio mural del corazón) se conoce como *vegetación.* Esas vegetaciones pueden producir tromboembolias. Las vegetaciones en las válvulas derechas del corazón embolizan al pulmón; las del lado izquierdo provocan embolias sistémicas en órganos tales como el encéfalo, el bazo y los riñones. Los denominados émbolos paradójicos tienen lugar cuando un trombo cardíaco derecho atraviesa un agujero oval persistente y alcanza la circulación arterial sistémica. Los pacientes con neoplasias malignas pueden tener un estado de hipercoagulabilidad (síndrome de Trousseau) que favorece el desarrollo de trombosis arteriales y venosas. La ateroesclerosis se produce en las arterias, no en las cámaras del corazón. Las metástasis endocárdicas son excepcionales. El término congestión pasiva crónica hace referencia a la estasis de sangre capilar, sinusoidal o venosa en órganos como los pulmones o el hígado. Los trombos murales son trombos que se forman en las superficies del corazón o las grandes arterias. El término se emplea habitualmente para referirse a los trombos de gran tamaño en cámaras cardíacas, en una aorta dilatada o en grandes ramas aórticas; no se usa para describir lesiones trombóticas sobre válvulas cardíacas. El mixoma es una neoplasia primaria del corazón que habitualmente aparece sobre una superficie auricular; no se asocia a neoplasias malignas en otras zonas. La flebotrombosis tiene lugar cuando la estasis de las grandes venas promueve la formación de trombos.

28 **D** La figura muestra un gran tromboémbolo pulmonar. El factor de riesgo más frecuente es la inmovilización, causante de estasis venosa con flebotrombosis, denominada a menudo *tromboflebitis,* puesto que las extremidades inferiores pueden estar tumefactas y dolorosas a la palpación, pero apenas hay inflamación. Estos trombos se forman en las grandes venas profundas de las piernas o pelvis, no en las arterias pulmonares. Las coagulopatías secundarias a trastornos adquiridos o hereditarios, como las debidas al anticoagulante lúpico (anticuerpos antifosfolipídicos) o a la mutación del factor V (Leiden), son causas posibles de trombosis, pero suelen manifestarse con menor edad. Estas causas son, además,

factores de riesgo mucho menos frecuentes de tromboembolia pulmonar que la estasis venosa. Es posible que la inflamación local de una neumonía ocasione trombosis de vasos pequeños en las áreas pulmonares periféricas afectadas. La ateroesclerosis pulmonar se produce con la hipertensión pulmonar de larga evolución, no por los factores causantes de ateroesclerosis arterial sistémica.

29 **B** No conocemos los mecanismos de la embolia grasa, en concreto por qué los síntomas comienzan 1-3 días después de la lesión inicial (o hasta 1 semana después, en el caso de los síntomas cerebrales). El efecto acumulativo de muchos glóbulos de grasa pequeños ocupando las arterias pulmonares periféricas es el mismo que el de un gran tromboémbolo pulmonar. El taponamiento cardíaco y el hemotórax serían complicaciones inmediatas, no diferidas, tras el traumatismo. Sería improbable que se produjera un edema pulmonar lo suficientemente grave como para causar disnea en pacientes ingresados, porque el balance de los líquidos se controla rigurosamente. El infarto pulmonar puede causar disnea, pero la tromboembolia pulmonar secundaria a trombosis venosa profunda es típicamente una complicación de ingresos más prolongados.

30 **B** La embolia de líquido amniótico es excepcional en la gestación, pero conlleva una alta tasa de mortalidad. El líquido llega a las venas uterinas rasgadas a través de las membranas fetales rotas. Los agregados de plaquetas representan trombosis localizadas, un fenómeno improbable en los pulmones. Los glóbulos de grasa se observan en la embolia grasa, por lo general en caso de traumatismo grave. Las burbujas de gas en los vasos por embolia gaseosa son una complicación infrecuente en ciertas intervenciones obstétricas, pero se trata de un proceso improbable en los partos normales. Los tromboémbolos pulmonares periféricos tienen más probabilidad de producir hipertensión pulmonar crónica y se desarrollan en semanas o meses.

31 **C** Estos hallazgos son característicos del síndrome de descompresión (enfermedad de los buzos), una forma de embolia gaseosa. Con presiones altas, como las presentes en una inmersión profunda de buceo, el nitrógeno se disuelve en la

sangre y los tejidos en grandes cantidades. Un ascenso demasiado rápido no permite la liberación lenta del gas y la formación de pequeñas burbujas gaseosas causa síntomas por la oclusión de pequeñas arterias y arteriolas. Los glóbulos de grasa en las arterias pulmonares son característicos de la embolia grasa, que por lo general se produce después de traumatismos. Es posible que se originen trombos de fibrina en la activación generalizada de la coagulación, como sucede en la coagulación intravascular diseminada. En las anemias hemolíticas microangiopáticas, como, por ejemplo, la púrpura trombótica trombocitopénica, pueden formarse trombos plaquetarios. La ateroesclerosis suele aparecer en las arterias elásticas, no en las arteriolas.

32 **D** La figura muestra un infarto hemorrágico de color rojo oscuro que se extiende hasta la pleura, hallazgo típico cuando un tromboémbolo de tamaño intermedio se aloja en una rama periférica de la arteria pulmonar. El infarto es hemorrágico porque la circulación arterial bronquial del pulmón (proveniente de la circulación arterial sistémica y distinta de la circulación arterial pulmonar) continúa aportando una pequeña cantidad de sangre al intersticio en el área de infarto. Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares subyacentes tienen más riesgo de sufrir infartos pulmonares. La congestión pasiva, ya sea aguda o crónica, es un proceso difuso, igual que el edema, que no confiere color rojo. La trombosis venosa pulmonar es infrecuente.

33 **B** La figura muestra un infarto isquémico pálido de la corteza renal que se extiende casi hasta la cápsula renal, un hallazgo típico cuando un tromboémbolo arterial de tamaño intermedio se aloja en una rama periférica de la arteria renal. El infarto tiene forma de cuña, habitual en muchos órganos parenquimatosos, porque la circulación colateral es mínima. Un absceso es una forma de necrosis por licuefacción debido a una acumulación localizada de neutrófilos asociada a infección y, aunque podría tener un color amarillento, probablemente será redondeado. La necrosis por licuefacción debida a oclusión arterial e infarto afecta al encéfalo. La insuficiencia multiorgánica se produce con el shock, y órganos completos se ven afectados por la isquemia.

La trombosis venosa tiende a producir lesiones hemorrágicas.

34 **D** El hígado tiene una vascularización doble, con una circulación de la arteria hepática y otra de la vena porta. El infarto hepático causado por oclusión de la arteria hepática es infrecuente. Los infartos cerebrales suelen producir necrosis por licuefacción. Los infartos de la mayoría de órganos parenquimatosos sólidos como los riñones, el corazón y el bazo muestran necrosis coagulativa, y los émbolos de la cavidad cardíaca izquierda a menudo acaban en estos órganos.

35 **B** La paciente tiene un shock séptico debido a la infección por microorganismos gramnegativos con lipopolisacáridos, que se unen a las células a través de los receptores de tipo señuelo (TLR) junto a otras sustancias de origen microbiano que contienen patrones moleculares asociados a patógenos (PMAP). La unión desencadena la liberación de varias citocinas, como factor de necrosis tumoral (TNF) e interleucina 1 (IL-1), que producen fiebre. Los macrófagos son estimulados para destruir los microorganismos. Se libera óxido nítrico, que promueve la vasodilatación y el colapso circulatorio. El C3b del complemento generado por las bacterias a través de la vía alternativa actúa como opsonina. El factor activador de plaquetas media muchas de las características de la inflamación aguda y, en grandes cantidades, causa vasoconstricción y broncoconstricción. La toxina 1 del síndrome del shock tóxico es un superantígeno liberado por estafilococos, activador potente de los linfocitos T, que induce la liberación de citocinas con shock séptico.

36 **A** La elevada concentración de lactato evidencia un shock séptico progresivo con mala perfusión tisular. La vasodilatación es una característica del shock séptico, habitualmente como resultado de una endotoxemia por gramnegativos. El descenso del hematocrito es sugestivo de shock hipovolémico por hemorragia. Un aumento de la creatina cinasa es indicativo de infarto agudo de miocardio, causante de shock cardiógeno. La elevación de la concentración sanguínea de nitrógeno ureico es una característica de la insuficiencia renal, no su causa. La reducción de la Po_2 es sugestiva de problemas de ventilación o perfusión pulmonar.

37 **D** El paciente está entrando rápidamente en shock tras la

lesión. El denominado pulmón de shock, con daño alveolar difuso, es frecuente en esta situación. El infarto del hígado no es habitual por la vascularización doble de este órgano. Las hemorragias de los núcleos basales son más típicas de la hipertensión, no de la hipotensión con shock. La gangrena precisa mucho más tiempo para desarrollarse y no es una complicación frecuente del shock. La congestión pasiva es menos probable por la reducción de los volúmenes sanguíneos y de la perfusión tisular que tiene lugar en el shock.

38 **D** En la fase no progresiva del shock, los mecanismos neurohumorales son liberación de catecolaminas, activación del eje renina-angiotensina, liberación de hormona antidiurética (ADH) y estimulación simpática generalizada con taquicardia, vasoconstricción periférica y conservación renal del líquido para ayudar a la perfusión tisular. A medida que el shock avanza, se produce hipotensión con reducción de la perfusión tisular, glucólisis anaerobia y acidosis láctica. El estado irreversible del shock está marcado por lesión tisular, hipoxia, acidosis metabólica marcada, activación de las vías de la coagulación con consumo de factores de la coagulación, insuficiencia multiorgánica y salida de enzimas lisosómicas y citosólicas, como la lactato deshidrogenasa (LDH).

CAPÍTULO 5

Trastornos genéticos

PEF9 Capítulo 5: Trastornos genéticos

PH9 Capítulo 6: Enfermedades genéticas y pediátricas

1 Múltiples miembros de una familia tienen una enfermedad asociada a una alteración genética consistente en la sustitución de adenina por timina en un par de bases de cromosomas homólogos. ¿Cuál es el término que describe mejor este hallazgo?

A Variación del número de copias
B Deleción
C Cambio epigénico
D Polimorfismo de nucleótido único
E Mutación de repetición de trinucleótido
F Alteración del ARN

2 Una joven de 15 años ha desarrollado múltiples nódulos en la piel en los últimos 10 años. En la exploración física se encuentran 20 nódulos diseminados, de 0,3-1 cm y consistencia firme, en el tronco y las extremidades de la paciente. Hay 12 máculas de color marrón claro de 2-5 cm de promedio en la piel del tronco. El examen con lámpara de hendidura revela nódulos pigmentados en el iris. Un hermano y uno de los progenitores tienen un cuadro similar. El análisis genético pone de manifiesto una mutación con pérdida de función. ¿Cuál de los siguientes patrones de herencia es más probable que esté presente en esta familia?

A Autosómico dominante
B Autosómico recesivo
C Mitocondrial
D Multifactorial
E Recesivo ligado al cromosoma X

3 Una lactante nacida a término muestra retraso del crecimiento y fracaso en la consecución de los hitos del desarrollo. Un

genograma revela que, en cuatro generaciones de ambas partes de la familia, solo está afectada esta niña. Los fibroblastos tisulares obtenidos de ella revelan un cariotipo 46,XX. Los fibroblastos en cultivo muestran una acumulación de un producto intermediario de una vía metabólica en la que participan múltiples enzimas. ¿Cuál es el riesgo de recidiva más probable de este trastorno en los hermanos de la lactante?

A 3%
B 8%
C 15%
D 25%
E 50%
F 100%

4 Una niña de 8 años presenta disnea grave repentina. En la exploración tiene obstrucción de las vías respiratorias superiores debida a la tumefacción de los tejidos blandos del cuello. Una radiografía revela un hematoma que está comprimiendo la tráquea. Las pruebas de laboratorio muestran que el tiempo de protrombina (TP) es normal, pero el tiempo de tromboplastina parcial (TTP) está elevado. Otras pruebas señalan que la actividad del factor VIII es inferior al 1% de la normal. Los dos progenitores y dos hermanas no sufren este problema, pero un hermano ha tenido un episodio similar. ¿Cuál de las siguientes anomalías genéticas es más probable que explique los hallazgos de esta niña?

A Mutación autosómica dominante
B Impronta genética
C Mosaicismo en la línea germinal
D Inactivación aleatoria del cromosoma X
E Nueva mutación espontánea

5 A un hombre de 66 años se le ha prescrito clopidogrel para ayudar a prevenir futuros episodios coronarios agudos. Refiere que su padre, su tía y un hermano tomaron este fármaco y tuvieron efectos secundarios adversos, incluidas hemorragias intensas, cuando se les pautó la dosis recomendada. ¿Cuál de las siguientes pruebas genéticas ayudará a determinar la dosis más apropiada de clopidogrel para este hombre?

A Enumeración de las secuencias de repetición en tándem
B Perfil de expresión del ARNm

C Análisis del cariotipo mediante FISH
D Determinación de la concentración de una enzima
E Búsqueda de un polimorfismo cyp450

6 Un hombre de 22 años sufre una pérdida de visión brusca en el ojo derecho. En la exploración física se aprecia subluxación del cristalino derecho. La auscultación cardíaca revela un chasquido mesosistólico, y el ecocardiograma, prolapso de la válvula mitral y dilatación del cayado aórtico. Un hermano y un primo del paciente presentan un cuadro similar. Se le prescribe un β-bloqueante. ¿De cuál de las siguientes sustancias es más probable que tenga un defecto genético este paciente?

A Colágeno
B Distrofina
C Fibrilina 1
D Proteína NF1
E Espectrina

7 Una niña de 11 años ha presentado mala cicatrización de heridas, incluso con traumatismos menores, desde la lactancia. A la exploración, se observan articulaciones hiperextensibles y piel frágil extremadamente elástica. Poco después del nacimiento se reparó una hernia diafragmática. Un progenitor y uno de sus tres hermanos también están afectados. ¿De cuál de los siguientes tipos de proteínas es el gen cuya mutación constituye la causa más probable de la enfermedad de esta niña?

A Enzima
B Regulación del crecimiento
C Canal iónico
D Receptor
E Soporte estructural

8 Una niña de 4 años tiene dolor en la cadera derecha de inicio repentino. En la exploración, la cadera está luxada. La niña consigue extender el pulgar hacia atrás hasta tocar el antebrazo. La piel es extraordinariamente elástica. Las radiografías de la columna muestran que la curvatura lateral y la anterior están muy marcadas. En años posteriores de la infancia sufre varios desprendimientos de retina. Un hermano está igualmente afectado. Se identifica una mutación en la tenascina X. ¿Cuál de los siguientes procesos es la causa más probable del cuadro de esta

niña?

A Sífilis congénita
B Síntesis deficiente carencial de colágeno
C Dieta carente de vitamina D
D Múltiples malformaciones congénitas
E Traumatismo por maltrato infantil

9 Se realiza un estudio clínico con personas de familias en las que aparecieron complicaciones de enfermedades cardiovasculares ateroescleróticas y xantomas tendinosos antes de los 30 años. Algunos de los niños de estas familias presentan ateromas precoces. Estos individuos afectados se beneficiarán del tratamiento con fármacos que inhiben la HMG-CoA reductasa. ¿De cuál de los siguientes receptores de superficie celular es más probable que las personas afectadas de esta familia tengan el gen mutado?

A Cortisol
B Insulina
C Colesterol de LDL
D Leptina
E TGF-α

10 Una lactante de 1 año tiene retraso del crecimiento, escaso desarrollo neurológico y mala función motora. La exploración física revela una mancha «rojo cereza» en la mácula retiniana. El tono muscular de la niña es deficiente. Ambos progenitores, un hermano y una hermana están sanos, sin anomalías aparentes. Un hermano con un trastorno similar falleció a los 18 meses de edad. ¿En cuál de los siguientes productos es más probable que exista una mutación del gen codificante?

A Enzima mitocondrial
B Enzima lisosómica
C Proteína receptora de la superficie celular
D Proteína estructural


. . . – Arg – Ile – Ser – Tyr – Gly – Pro – Asp – . . .
. . . CGT ATA TCC TAT GCC CCT GAC
. . . CGT ATA TCT ATC CTA TGC CCC TGA C . . .
. . . – Arg – Ile – Ser – Ile – Leu – Cys – Pro – Fin
Marco de lectura alterado

11 Un lactante de ascendencia bielorrusa parecía normal en el momento del nacimiento, pero a los 6 meses se observa que tiene descoordinación motora progresiva y obnubilación. En la exploración, el lactante tiene la retina pálida con una mácula prominente. Antes de cumplir 1 año desarrolla parálisis flácida. De acuerdo con la figura, ¿cuál de las siguientes mutaciones es más probable que presente?

- A Cambio de marco
- B Sin sentido
- C Puntual
- D Deleción de 3 pares de bases
- E Repetición de trinucleótido

12 Una mujer de 22 años da a luz una niña aparentemente sana tras una gestación sin complicaciones. A los 4 años de edad, la niña presenta deterioro neurológico grave y progresivo. La exploración física revela hepatoesplenomegalia marcada. Una biopsia de médula ósea pone de manifiesto numerosos macrófagos espumosos y vacuolados. ¿El análisis de cuál de los siguientes factores es más probable que ayude al diagnóstico de su enfermedad?

- A Concentración sérica de α_1-antitripsina
- B Concentración de glucosa-6-fosfatasa en los hepatocitos
- C Concentración de esfingomielinasa en los macrófagos esplénicos
- D Número de receptores de LDL en los hepatocitos
- E Velocidad de síntesis de colágeno en fibroblastos cutáneos

13 Un niño de 2 años ha presentado retraso del crecimiento desde su nacimiento, con deterioro neurológico progresivo. En la exploración física se observan hepatoesplenomegalia y

linfoadenopatías. Las pruebas de laboratorio muestran pancitopenia. Se realiza una biopsia de médula ósea y su examen microscópico revela numerosas células fagocíticas pálidas llenas de vacuolas finas (lisosomas secundarios). ¿Cuál de los siguientes tipos de proteína anómalamente codificada es más probable que esté causando la enfermedad de este niño?

A Enzima
B Regulación del crecimiento
C Canal iónico
D Receptor
E Soporte estructural



14 Un niño de 10 años presenta otitis media de repetición desde los 2 años de edad. En la exploración física hay hepatoesplenomegalia. No existen malformaciones externas. Entre los hallazgos de laboratorio destacan anemia y leucopenia. Se realiza una biopsia de médula ósea, y una imagen de gran aumento muestra los hallazgos presentados en la figura. ¿Cuál de las siguientes enzimas es más probable que cause estos hallazgos si se produce un déficit hereditario?

A α-1,4-glucosidasa

B Glucocerebrosidasa

C Glucosa-6-fosfatasa
D Hexosaminidasa A
E Lisilo hidroxilasa

15 Los progenitores de un lactante refieren que los niños varones de tres generaciones en la familia materna se han visto afectados por un trastorno progresivo que afecta a muchos sistemas de órganos. Estos niños han tenido rasgos faciales toscos, opacidades corneales, rigidez articular, hepatoesplenomegalia y retraso mental, y muchos fallecieron en la infancia. En la autopsia, algunos de ellos tenían depósitos subendoteliales en las arterias coronarias, que fueron causa de un infarto de miocardio. Las pruebas de laboratorio del lactante muestran un aumento de la excreción urinaria de mucopolisacáridos. Se realiza una biopsia de médula ósea y se encuentran mucopolisacáridos acumulados en los macrófagos («células en globo» llenas de vacuolas minúsculas). ¿Cuál de los siguientes déficits enzimáticos es más probable que se observe en este lactante?

A Adenosina desaminasa
B α-1-iduronidasa
C Glucocerebrosidasa
D Glucosa-6-fosfatasa
E Hexosaminidasa A
F Glucosidasa lisosómica
G Esfingomielinasa

16 Un niño de 2 años con retraso del crecimiento desde la lactancia presenta actualmente una crisis convulsiva. La exploración física revela hepatomegalia y equimosis en la piel. Las pruebas de laboratorio muestran que la glucemia sanguínea es 31 mg/dl. La biopsia de hígado pone de manifiesto células llenas de vacuolas transparentes con tinción positiva para glucógeno. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que cause estos hallazgos?

A Síndrome de Hurler
B Enfermedad de McArdle
C Enfermedad de Pompe
D Enfermedad de Tay-Sachs
E Enfermedad de Von Gierke

17 Una mujer de 25 años deja de acudir a las clases de aeróbic por calambres musculares graves que ha sufrido en todas las sesiones

durante los últimos 2 meses. A las 4 h de cada sesión, observa que la orina tiene color marrón. En la exploración física el desarrollo muscular y la fuerza son normales. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que cause los síntomas cuando existe un defecto heredado?

A Distrofina
B Fibrilina
C Glucosa-6-fosfatasa
D Glucosidasa lisosómica
E Fosforilasa muscular
F Espectrina



18 Un lactante de 6 meses tiene retraso del crecimiento y aumento del perímetro abdominal. Sus padres están preocupados porque apenas se mueve desde el nacimiento. En la exploración física, el lactante tiene debilidad muscular marcada y hepatoesplenomegalia. Una radiografía de tórax revela cardiomegalia notable. Fallece por insuficiencia cardíaca congestiva a los 19 meses de edad. La figura ilustra la imagen microscópica de las fibras miocárdicas en la autopsia. ¿Cuál de las siguientes enzimas es más probable que sea deficiente en este lactante?

A Glucocerebrosidasa

B Glucosa-6-fosfatasa
C Hexosaminidasa A
D Ácido homogentísico oxidasa
E Glucosidasa lisosómica
F Esfingomielinasa

19 Un niño de 13 años bebe grandes cantidades de agua y su apetito es insaciable. Está perdiendo peso y en el último mes se siente más cansado y apático. Los hallazgos de laboratorio son hemograma normal y glucemia en ayunas de 175 mg/dl. Sus padres, dos hermanos y una hermana están sanos. Un tío materno también está afectado. ¿Cuál de los siguientes patrones de herencia es más probable en esta enfermedad?

A Autosómico dominante
B Autosómico recesivo
C ADN mitocondrial
D Multifactorial
E Recesivo ligado al cromosoma X

20 Una mujer de 20 años sana, G3, P2, Ab1, ha tenido previamente un recién nacido vivo y otro muerto, ambos con la misma anomalía en el cariotipo. En la exploración física, está en el percentil 50 de talla y peso. No presenta anomalías físicas patentes. ¿Cuál de las siguientes anomalías cariotípicas es más probable que esté presente en esta mujer?

A Deleción del brazo q: del(22q)
B Isocromosoma: 46,X,i
C Inversión paracéntrica: inv(18)
D Cromosoma en anillo: r(13)
E Translocación robertsoniana: t(14;21)

21 Un niño de 11 años con retraso mental es capaz de realizar actividades de la vida diaria, como comer y vestirse solo. En la exploración física tiene braquicefalia y aperturas palpebrales oblicuas con pliegues epicánticos prominentes. Las palmas de ambas manos muestran un pliegue transverso. En la auscultación cardíaca se escucha un soplo sistólico de grado III/VI. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que desarrolle antes de los 20 años de edad?

A Leucemia aguda
B Infarto agudo de miocardio

C Disección de la aorta
D Insuficiencia renal crónica
E Cirrosis hepática



22 Una mujer de 23 años, G2, P1, da a luz a las 37 semanas un recién nacido pequeño para su edad gestacional. La figura presenta la mano izquierda del lactante. Durante la gestación, una ecografía fetal mostró un defecto del cojinete endocárdico y polihidramnios por probable atresia duodenal. ¿Cuál de las siguientes anomalías cromosómicas es más probable que esté presente?

A 45,X
B 47,XX,+21
C 47,XY,+18
D 69,XXY
E 47,XXY

23 Una mujer de 39 años da a luz un recién nacido a término con hernia umbilical, manchas de Brushfield en el iris, macroglosia, orejas de implantación baja, aperturas palpebrales oblicuas y un soplo cardíaco. El niño llega a la infancia y muestra retraso mental solo leve. ¿Cuál de las siguientes anomalías cromosómicas, que afecta a los autosomas, es más probable que esté presente en las

células somáticas de este niño?

A Haploidía
B Monosomía
C Mosaicismo
D Tetraploidía
E Triploidía



24 Una mujer de 38 años da a luz una recién nacida de 35 semanas de gestación. La exploración física poco después del parto pone de manifiesto pies en mecedora, cara y boca pequeñas, y orejas de implantación baja. En la auscultación del tórax se detecta un soplo cardíaco. La figura muestra una mano de la lactante. La niña muere a los 4 meses de edad. ¿Cuál de los siguientes cariotipos es más probable que presente esta lactante?

A 45,X
B 46,XX
C 47,XX,+18
D 47,XX,+21
E 48,XXX



25 Una mujer de 36 años da a luz a las 34 semanas de gestación un niño que sobrevive tan solo 1 h. En la exploración física, el lactante está en el percentil 30 de talla y peso. Presenta varias malformaciones, como microcefalia, labio leporino y paladar hendido, defectos del cuero cabelludo y el hallazgo mostrado en la figura. ¿Cuál de los siguientes cariotipos es más probable que tenga el recién nacido?

A 45,X
B 46,XY
C 47,XXY
D 47,XY,+13
E 47,XY,+18
F 69,XXY



26 Se realiza una ecografía fetal a las 18 semanas de gestación a una mujer primigrávida de 27 años. El feto, de sexo masculino, tiene un retraso del crecimiento leve. Presenta múltiples malformaciones congénitas: comunicación interventricular e interauricular, riñón en herradura y onfalocele. Se realiza una amniocentesis y las células fetales obtenidas se analizan mediante FISH utilizando una sonda para uno de los cromosomas. De acuerdo con los hallazgos mostrados en la figura, ¿cuál de las anomalías del cariotipo siguientes es más probable que presente este feto?

A 45,X/46,XX
B 46,XY,del(22q11)
C 46,XY,der(14;21)(q10.0),+21
D 47,XY,+18
E 47,XXY

27 Un niño de 12 años presenta tos y dolor de oídos de 2 días de evolución. Tiene antecedentes de infecciones de repetición, como otitis media, diarrea y neumonía. La exploración física muestra eritema en la membrana timpánica derecha, paladar hendido y un soplo indicativo de cardiopatía congénita. La TC torácica revela un timo pequeño. Los resultados de las pruebas de laboratorio indican hipoparatiroidismo leve. ¿Cuál de las pruebas diagnósticas

siguientes es más probable que resulte útil para clarificar la enfermedad de este paciente?

- A Determinación de adenosina desaminasa en los linfocitos
- B Análisis de ADN ramificado para la concentración de ARN del VIH-1
- C Análisis mediante FISH con una sonda para el cromosoma 22q11.2
- D Biopsia de un ganglio linfático
- E Análisis mediante la PCR de repeticiones de trinucleótido en el cromosoma X



28 Un lactante de 9 meses ha tenido numerosas infecciones víricas y fúngicas desde el nacimiento. En la exploración física no se observan malformaciones congénitas. Los análisis de laboratorio revelan hipocalcemia. Se realiza un análisis de las células del lactante mediante FISH. La figura muestra una extensión en metafase, con sondas dirigidas a dos regiones distintas del cromosoma 22. ¿Cuál de las siguientes anomalías citogenéticas es más probable que esté presente?

A Hiperdiploidía
B Deleción
C Inversión
D Monosomía
E Translocación

29 Un hombre de 27 años y su esposa de 24 llevan 6 años intentando tener hijos. La exploración física muestra que él tiene ginecomastia bilateral, reducción del tamaño testicular, escaso vello corporal y mayor longitud entre la planta de los pies y el hueso púbico. Un análisis de semen revela oligospermia. Las pruebas de laboratorio ponen de manifiesto un aumento de la concentración de hormona estimuladora de los folículos y ligera reducción de la testosterona. ¿Cuál de los siguientes cariotipos es más probable que tenga este hombre?

A 46,X,i(Xq)
B 47,XYY
C 47,XXY
D 46,XX/47,XX,+21
E 46,XY,del(22q11)

30 Una mujer de 25 años con amenorrea no ha tenido la menarquia. En la exploración física, su talla es 145 cm. Tiene cuello alado, tórax ancho y pezones muy separados. En las extremidades superiores se palpan pulsos vivos, pero en las inferiores solo hay un pulso débil. La RM del abdomen muestra ovarios pequeños, alargados y tubulares. ¿Cuál de los siguientes cariotipos es más probable que tenga esta mujer?

A 45,X/46,XX
B 46,X,X(fra)
C 47,XXY
D 47,XXX
E 47,XX,+16

31 Una mujer primigrávida de 22 años nota que no hay movimientos fetales los últimos 2 días. Se extrae un feto muerto a las 19 semanas de gestación. El feto macerado muestra hidropesía fetal marcada y un gran higroma quístico posterior del cuello. En la autopsia, entre las malformaciones internas se observan coartación de la aorta y riñón en herradura. ¿Cuál de los siguientes cariotipos es más probable que muestren las células obtenidas de

este feto?

A 45,X
B 47,XX,+18
C 47,XX,+21
D 47,XYY
E 69,XXX

32 Una mujer de 23 años da a luz un recién nacido a término tras una gestación sin complicaciones. En la exploración física, el lactante tiene genitales externos ambiguos. Los padres desean saber el sexo, pero el médico se resiste a asignar un sexo sin más información. Un análisis cromosómico indica que el cariotipo es 46,XX. La TC abdominal revela aumento de tamaño de ambas glándulas suprarrenales y los genitales internos parecen corresponder a útero, trompas de Falopio y ovarios. ¿Con cuál de los siguientes trastornos es más compatible este cuadro clínico?

A Síndrome de insensibilidad a los andrógenos
B Excesivas repeticiones de trinucleótido
C Seudohermafroditismo femenino
D Mutación del ADN mitocondrial
E Ausencia de disyunción con pérdida del cromosoma Y

33 En una familia hay varias generaciones afectadas por retraso mental y la mayoría de las personas afectadas han sido hombres. La gravedad del retraso mental se ha incrementado con cada generación. Se realizan pruebas genéticas y cerca del 20% de los hombres que presentan la anomalía genética no están afectados. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que produzca este trastorno genético?

A Mutación con desplazamiento de marco
B Mutación con cambio de sentido
C Mutación del ADN mitocondrial
D Mutación puntual
E Mutación de repetición de trinucleótido

34 Una gestante con antecedentes familiares de síndrome del X frágil se somete a pruebas prenatales del feto. Se intenta realizar un análisis mediante la PCR para amplificar la región en cuestión del gen *FMR1* utilizando ADN de las células del líquido amniótico, pero no se obtienen productos amplificados. ¿Cuál de las siguientes pruebas es el paso siguiente más adecuado?

A Obtención habitual del cariotipo en las células del líquido amniótico
B Obtención habitual del cariotipo del padre no afectado
C Inmunotransferencia de Southern del ADN de las células del líquido amniótico
D Análisis mediante la PCR del gen *FMR1* de la madre
E Ninguna prueba más

35 Un joven de 19 años ha notado pérdida de visión y debilidad muscular progresiva en los últimos 7 años. Los antecedentes familiares ponen de manifiesto que varios de los familiares del paciente, hombres y mujeres, tienen síntomas similares. Su madre, el hermano y una hermana de esta y dos de los hijos de la tía están afectados, pero los hijos del tío no lo están. ¿Cuál de los siguientes tipos de trastornos genéticos es más probable que presente este paciente?

A Expansión de repetición de trinucleótido
B Impronta genética
C Patrón de herencia ligado al cromosoma X
D Mutación mitocondrial
E Disomía uniparental

36 Un niño de 3 años presenta retraso progresivo del desarrollo, ataxia, crisis epilépticas y risa inapropiada desde la lactancia. El niño tiene un cariotipo normal 46,XY, pero el análisis de ADN muestra que ha heredado ambos cromosomas 15 de su padre. ¿Cuál de los siguientes mecanismos genéticos es más probable que indiquen estos hallazgos?

A Impronta genómica
B Patrón de herencia materna
C Mutación del ADN mitocondrial
D Expansión de repetición de trinucleótido
E Patrón de herencia ligado al cromosoma X



37 Tres niñas de una familia con el genograma mostrado en la figura presentan antecedentes de múltiples fracturas, además de problemas dentales y alteración de la audición. En la exploración, la talla y el peso son normales para su edad, pero las escleróticas tienen un color gris metálico azulado. Ninguno de los progenitores presenta estas malformaciones. ¿Cuál de las siguientes anomalías genéticas es más probable que esté causando el cuadro clínico de estas niñas?

A Impronta genómica
B Mosaicismo gonadal
C Herencia multifactorial
D Inactivación aleatoria del cromosoma X
E Nueva mutación espontánea

38 Un estudio de familias con síndrome del X frágil revela que el 20% de los hombres no afectados son portadores, pero no desarrollan retraso mental. La secuenciación genómica muestra que estos hombres tienen premutaciones con 55-200 repeticiones de trinucleótido en el gen *FMR1.* La mitad de ellos presentan una enfermedad neurodegenerativa progresiva con signos cerebelosos después de los 50 años. ¿Cuál de los siguientes mecanismos media esta enfermedad?

A Pérdida de la transcripción del ARNm
B Metilación con silenciamiento de genes
C Inactivación aleatoria del cromosoma X
D Reducción de la traducción de la proteína FMR1
E Toxicidad por ganancia de función

39 Se realiza un estudio clínico sobre rasgos genéticos complejos, como hipertensión, cardiopatía y diabetes. El estudio utiliza las variaciones naturales en las secuencias de ADN presentes en exones e intrones que sean frecuentes y estables. ¿Cuál de los siguientes marcadores genéticos se está usando en el estudio?

A Protooncogenes
B Translocaciones robertsonianas
C Polimorfismos de nucleótido único
D Deleciones de cambio de marco de 3 pares de bases
E Mutaciones de repetición de trinucleótido

40 En un estudio de herencia del gen de la fibrosis quística *(CFTR),* se documentan las mutaciones genéticas en portadores y personas afectadas. De acuerdo con estos hallazgos, los investigadores determinan que no existe una prueba de detección sistemática simple que identifique a todos los portadores de mutaciones en el gen *CFTR.* ¿Cuál de las siguientes limitaciones es más probable que sea la mayor de cara al desarrollo de una prueba de detección sistemática de las mutaciones en el *CFTR*?

A Ambas copias del gen deben ser anómalas para su detección
B La hibridación por fluorescencia *in situ* es laboriosa y cara
C La frecuencia de mutaciones en los grupos étnicos limita la sensibilidad
D Menos de 1 persona de cada 10.000 es heterocigota
E La PCR no detecta la mayoría de las mutaciones

41 Una mujer de 32 años ha tenido tres gestaciones y todas ellas terminaron en abortos espontáneos en el primer trimestre. En la exploración física, ni ella ni su cónyuge en todas las gestaciones presentan anomalías. ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio es más apropiado realizar en esta mujer para discriminar posibles causas de los abortos de repetición?

A Estudio de asociación en todo el genoma
B Hibridación por fluorescencia *in situ*
C Determinación del cariotipo
D Análisis mediante la PCR
E Espectrometría de masas en tándem

42 Se realiza un estudio de casos y controles con personas diagnosticadas de hipertensión esencial. El análisis genético muestra desequilibrio de ligamiento. Los haplotipos de las

personas afectadas se diferencian de los controles en el cromosoma que contiene el gen del angiotensinógeno. ¿Cuál de los siguientes tipos de análisis genéticos es más probable que revele esta información?

A Hibridación por fluorescencia *in situ*
B Determinación del cariotipo mediante bandeo con Giemsa
C Expresión de ARN
D Polimorfismos de nucleótido único
E Inmunotransferencia de Southern

43 Un genograma revela que múltiples miembros de una familia a lo largo de cuatro generaciones se han visto afectados por insuficiencia cardíaca congestiva de aparición en las primeras cuatro décadas de la vida. Se sospecha una miocardiopatía, pero no se conocen las características específicas de la enfermedad ni se han realizado previamente pruebas genéticas. ¿Cuál de las siguientes técnicas de secuenciación del ADN es más probable que identifique una mutación específica de forma rentable?

A Pirosecuenciación
B Secuenciación de Sanger
C Secuenciación dirigida
D Secuenciación de exomas completos
E Secuenciación de todo el genoma

Respuestas

1 **D** Los polimorfismos de nucleótido único (SNP, del inglés *single nucleotide polymorphisms*) se encuentran en menos del 0,5% del genoma y solo el 1% de ellos están presente en regiones codificantes que afectan a la síntesis de proteínas. Algunos de estos son responsables de mutaciones puntuales que podrían estar asociadas a enfermedades. Las variaciones en el número de C (VNC) consisten en variaciones en grandes regiones contiguas del ADN de 1.000 a 1 millón de pares de bases. Los cambios epigénicos son modulaciones de la expresión génica sin variaciones del ADN. Las repeticiones de trinucleótido suponen un mayor número de pares de bases. Es posible que las variaciones del ARN modulen la expresión de ADN, como los micro-ARN no codificantes.

2 **A** La neurofibromatosis de tipo 1 (NF-1) se caracteriza por el

desarrollo de múltiples neurofibromas y lesiones cutáneas pigmentadas. Los neurofibromas alcanzan su número máximo en la dermis, pero también pueden aparecer en órganos viscerales. Es posible que los pacientes con NF-1 desarrollen, además, un tipo de neoplasia sarcomatosa conocida como *tumor maligno de las vainas nerviosas periféricas (TMVNP).* El NF-1 es un supresor de tumores que aparece con un patrón de herencia autosómica dominante, aunque algunos casos se relacionan con nuevas mutaciones espontáneas (no hay familiares con la mutación). El NF-1 muestra una expresividad variable, porque las manifestaciones (localización y tipos de neoplasias) no son iguales en todos los pacientes. Las otras formas de herencia reseñadas no se asocian a genes supresores de tumores.

3 **D** La mayoría de los errores innatos del metabolismo se debe a mutaciones en los genes que codifican enzimas. Como un alelo activo produce la mitad de la enzima necesaria, probablemente esto baste para evitar la enfermedad. La herencia de dos alelos mutantes, uno de cada progenitor, es necesaria para la aparición de la enfermedad, de modo que el patrón es autosómico recesivo y el riesgo de recidiva, 25%. La mayoría de los genes autosómicos recesivos son infrecuentes en la población, de modo que no es probable encontrar antecedentes familiares. Aunque 1 de cada 10 personas sea portadora del gen recesivo mutante, los homocigotos serán 1 de 400. El riesgo de recidiva estándar en cualquier gestación es del 3%. Esta cifra aumenta al 7% para enfermedades tales como diabetes mellitus, o cuando se identifica un síndrome sin un patrón de herencia definido o con herencia multifactorial. Los trastornos autosómicos dominantes surgen habitualmente por mutaciones en genes que codifican proteínas estructurales y su riesgo de recidiva es del 50%.

4 **D** La niña tiene manifestaciones de hemofilia A. Cabe esperar que este trastorno recesivo ligado al cromosoma X aparezca en varones que hayan heredado el único cromosoma X materno con la mutación genética, ya que carecen de otro cromosoma X con un alelo funcionante normal, como le sucede al hermano. La hemofilia en una mujer puede explicarse por la hipótesis de Lyon, que propone que solo un cromosoma X es activo en las mujeres (el cromosoma X «apagado» es el cuerpo de Barr) para

la mayoría de los genes, pero esta inactivación es un fenómeno aleatorio. Ciertas mujeres desafortunadas están en el extremo de la cola de la distribución de Poisson de acontecimientos aleatorios y tienen pocos cromosomas X activos con el alelo normal, lo que provoca que la actividad del factor VIII esté muy reducida. Las demás opciones no explican este fenómeno.

5 **E** Las pruebas farmacogenéticas podrían relevar polimorfismos que afectan al metabolismo de los fármacos. El sistema del citocromo P-450 de los hepatocitos participa en el metabolismo de muchas sustancias, incluso de medicamentos. La detección de polimorfismos aporta información sobre modificaciones de la dosis o de la necesidad de fármacos diferentes. Es posible que las mutaciones de repeticiones de trinucleótido afecten a la expresión génica, como el gen *huntingtina,* pero es improbable que esto suceda con los implicados en el metabolismo de los fármacos. Las variaciones del ADN llevan a alteraciones en la expresión de ARNm, pero la detección directa de las alteraciones del ADN suele ser una estrategia de estudio más eficaz. El análisis mediante FISH es útil para identificar regiones alteradas de cromosomas, no anomalías de genes individuales. Los trastornos autosómicos recesivos pueden afectar a las concentraciones de enzimas, como, por ejemplo, G6PD, pero es posible que los polimorfismos no afecten a las concentraciones de enzimas o sustratos fácilmente detectables.

6 **C** El síndrome de Marfan es un trastorno autosómico dominante causado con más frecuencia por defectos cualitativos en la fibrilina debidos a mutaciones con cambio de sentido del gen *fibrilina (FBN1).* Un gen anómalo del colágeno puede causar osteogenia imperfecta y el síndrome de Ehlers-Danlos. Las mutaciones genéticas del gen *distrofina* están implicadas en las distrofias musculares de Duchenne y Becker. La proteína NF1 es anómala en la neurofibromatosis de tipo 1. La alteración de la espectrina causa la esferocitosis hereditaria.

7 **E** Esta forma clásica del síndrome de Ehlers-Danlos (SED) se debe a una anomalía en la síntesis del colágeno, y la ausencia de colágeno normal afecta a los tejidos conjuntivos de la piel, los huesos, los ojos y la vasculatura. Hay múltiples formas de SED debidas a distintas mutaciones que afectan a varios aspectos de

la síntesis de colágeno. El patrón de herencia descrito en la pregunta es autosómico dominante, típico de los defectos hereditarios de proteínas estructurales. El patrón de herencia característico de los errores innatos del metabolismo debidos a alteraciones enzimáticas es el autosómico recesivo, porque basta la mitad de la función del gen para que no se produzca la enfermedad. Los genes dedicados a la regulación del crecimiento habitualmente son protooncogenes y genes supresores de tumores, y sus mutaciones pueden dar lugar al desarrollo de neoplasias malignas. La fibrosis quística se debe a mutaciones del gen *CFTR* que codifica canales iónicos de cloro. La hipercolesterolemia familiar es un ejemplo de enfermedad causada por anomalías en el receptor de LDL.

8 **B** Las articulaciones suelen estar afectadas en la mayoría de las variantes del síndrome de Ehlers-Danlos (SED) y la fuerza de tensión disminuye, de modo que la piel es hiperextensible y las articulaciones son hipermóviles. El déficit de la enzima lisilo hidroxilasa puede provocar defectos del colágeno de tipos I y III, y se hereda como un trastorno autosómico recesivo. En esta forma de SED también hay cifoescoliosis y problemas oculares. Cuando existen características de tipo SED pero no se identifican mutaciones en el gen del colágeno, es posible que la anomalía se encuentre en la tenascina X, gran proteína multimérica de la matriz extracelular que afecta a la síntesis y a la formación fibrilar del colágeno de tipos VI y I. La sífilis congénita puede ocasionar anomalías óseas, como tibia en sable por periostitis y pericondritis, pero no afecta a la piel. La carencia de vitamina D en la infancia causante del raquitismo se acompaña de deformación en arco de los huesos largos, pero no genera anomalías en la piel. El patrón de hallazgos reseñado apunta a un defecto en un gen estructural que provoca el desarrollo de anomalías y no a malformaciones congénitas sin una causa específica. Los niños maltratados suelen tener múltiples contusiones y fracturas, pero su piel y su estructura ósea son normales.

9 **C** La hipercolesterolemia familiar se produce por mutaciones en el gen del receptor de LDL, que condicionan un aumento del colesterol de LDL plasmático porque no se cataboliza ni es

captado por el hígado. Se trata de un trastorno autosómico dominante con una tasa de portadores de 1 por cada 500, de modo que la frecuencia de homocigotos es de 1 por cada millón. Los heterocigotos tienen una concentración sérica de colesterol total igual al doble de la normal; las concentraciones de los homocigotos son incluso más altas, con fallecimiento por infarto de miocardio antes de la segunda década de la vida. Los fármacos estatinas inhiben la HMG-CoA reductasa y reducen las cifras de colesterol en los heterocigotos. Los receptores de hormonas esteroideas, como los del cortisol, están situados en el núcleo celular. Los receptores de insulina participan en el metabolismo de la glucosa y el control glucémico, que podrían estar implicados en la diabetes mellitus con riesgo de ateroesclerosis; las estatinas no tienen efectos sobre la diabetes mellitus. Es posible que en algunas formas de obesidad participen receptores anómalos de la leptina. El TGF-α es un factor de crecimiento implicado en la inflamación, la proliferación celular y la reparación.

10 **B** Los hallazgos reseñados apuntan a una enfermedad neurológica hereditaria grave, y el patrón de herencia (progenitores normales, un hermano afectado) es compatible con un trastorno autosómico recesivo. Este patrón de herencia y la mancha de color rojo cereza en la retina son característicos de la enfermedad de Tay-Sachs, causada por mutaciones en el gen que codifica una enzima lisosómica, la hexosaminidasa A. Los genes mitocondriales tienen un patrón materno de transmisión. Las mutaciones de los genes que afectan a proteínas receptoras y estructurales suelen dar lugar a un patrón autosómico dominante.

11 **A** El lactante tiene la enfermedad de Tay-Sachs, trastorno autosómico recesivo que presenta una frecuencia génica más elevada en ciertas poblaciones, como judíos asquenazíes y quebequeses. El gen que codifica la enzima hexosaminidasa A en el diagrama tiene una inserción de 4 pares de bases que provoca un marco de lectura alterado (cambio de marco) y la aparición de un codón de finalización, que termina prematuramente la lectura, con lo que se produce una enzima no funcional. Una mutación de cambio de marco modifica el resto de la secuencia

de aminoácidos en una proteína. Una mutación puntual podría cambiar un codón por la secuencia de un codón de finalización que trunca la proteína que se está sintetizando, lo cual habitualmente provoca la degradación de esa proteína. Una mutación puntual suele ser una mutación con cambio de sentido que da lugar a la sustitución de un solo aminoácido por otro en la cadena proteínica; es posible que esto cause anomalías en la conformación y función de la proteína. Una deleción de 3 pares de bases conlleva la pérdida de un único aminoácido en una proteína. Una deleción de 3 pares de bases, como sucede en la fibrosis quística, provoca un cambio de marco que afecta tan solo a un aminoácido. La repetición de trinucleótido es el patrón de herencia del síndrome del X frágil, causado por la expansión de repeticiones de un triplete en el gen *FMR1*.

12 **C** Las manifestaciones clínicas de este niño –afectación neurológica, hepatoesplenomegalia y acumulación de macrófagos espumosos– apuntan a una enfermedad de depósito lisosómico. Uno de esos trastornos, bastante compatible con la historia clínica, es la enfermedad de Niemann-Pick de tipo A. Se caracteriza por la acumulación lisosómica de esfingomielina debida a un déficit grave de esfingomielinasa. En las células hepáticas de las personas con una carencia hereditaria de α_1-antitripsina se observan glóbulos de esta sustancia. La glucogenosis conocida como *enfermedad de von Gierke* se debe al déficit de glucosa-6-fosfatasa. En la hipercolesterolemia familiar hay menos receptores de LDL en los hepatocitos, lo que provoca una ateroesclerosis acelerada y precoz, presente ya al inicio de la edad adulta. La síntesis de colágeno está alterada en los individuos con síndrome de Ehlers-Danlos.

13 **A** Este niño tiene la enfermedad de Niemann-Pick de tipo A, la peor forma. Los individuos con este trastorno habitualmente fallecen antes de cumplir 3 años. Este error innato del metabolismo tiene lugar en una vía de degradación de la esfingomielina, y la acumulación del lípido intermediario anómalo conduce a la enfermedad de depósito liposómico, que afecta fundamentalmente a los tejidos del sistema mononuclear fagocítico, así como al sistema nervioso central. Los genes implicados en la regulación del crecimiento suelen ser

protooncogenes y genes supresores de tumores, y es posible que sus mutaciones se traduzcan en el desarrollo de neoplasias malignas. La fibrosis quística es consecuencia de mutaciones del gen *CFTR*, que codifica canales iónicos de cloro. La hipercolesterolemia familiar es un ejemplo de enfermedad debida a un receptor de LDL anómalo. Muchos trastornos autosómicos dominantes, como el síndrome de Marfan secundario a mutaciones del gen *fibrilina 1*, suponen anomalías en proteínas estructurales.

14 **B** La enfermedad de Gaucher de tipo 1, presente en este niño, es la responsable del 99% de los casos y no afecta al sistema nervioso central (SNC). Está causada por un déficit de glucocerebrosidasa, y la administración de esta enzima reduce su gravedad y progresión. El tipo 2 afecta al SNC y es mortal en la etapa de lactante. En el tipo 3 también está afectado el SNC, pero no tanto como en el 2. La enfermedad de Pompe se caracteriza por el déficit de α-1,4-glucosidasa. La carencia de glucosa-6-fosfatasa es la causa de la enfermedad de von Gierke. El déficit de esfingomielinasa provoca la enfermedad de Niemann-Pick de tipos A y B. El tipo A, la forma más frecuente, se asocia a un deterioro neurológico grave. El tipo B, menos habitual, podría parecerse a las características de este caso, pero el aspecto de los macrófagos es distinto: contienen múltiples vacuolas pequeñas. La enfermedad de Tay-Sachs se debe al déficit de hexosaminidasa A y cursa con retraso mental grave y el fallecimiento antes de los 10 años de edad. La carencia de lisilo hidroxilasa está presente en una de las formas del síndrome de Ehlers-Danlos.

15 **B** El síndrome de Hunter, una de las mucopolisacaridosis (MPS), se produce como consecuencia del déficit de la enzima lisosómica α-1-iduronidasa. Los glucosaminoglucanos que se acumulan en las MPS son sulfato de dermatano, sulfato de heparano, sulfato de queratano y sulfato de condroitina. Todas las variantes de MPS son autosómicas recesivas, excepto el síndrome de Hunter, que es recesivo ligado al cromosoma X. El déficit de adenosina desaminasa es una de las causas de inmunodeficiencia combinada grave (ICG), un estado de inmunodeficiencia que cursa con múltiples infecciones de

repetición tras el nacimiento. La enfermedad de Gaucher se debe a una carencia de glucocerebrosidasa; en la forma más frecuente de la enfermedad, no hay alteraciones neurológicas, y los pacientes tienen esplenomegalia y trastornos esqueléticos como consecuencia de la mayor cantidad de glucocerebrósidos lisosómicos en las células del sistema mononuclear fagocítico. El déficit de glucosa-6-fosfatasa origina la enfermedad de von Gierke, caracterizada por hepatomegalia, nefromegalia y alteración de la gluconeogenia, que provoca hipoglucemia e hiperlipidemia. La hexosaminidasa A es deficiente en la enfermedad de Tay-Sachs; las personas afectadas muestran trastornos neurológicos graves, escaso desarrollo motor y ceguera de comienzo en la lactancia. El déficit de glucosidasa lisosómica, presente en la enfermedad de Pompe, se asocia a una cardiomegalia marcada e insuficiencia cardíaca de inicio en la lactancia. La esfingomielinasa es deficiente en la enfermedad de Niemann-Pick de tipo A, caracterizada por hepatoesplenomegalia, linfoadenopatías, y trastorno motor y retraso mental graves.

16 **E** En la enfermedad de von Gierke, debida al déficit de glucosa-6-fosfatasa, el glucógeno almacenado no se metaboliza sin más a glucosa. Las personas afectadas tienen hipoglucemia grave, que causa convulsiones. Las acumulaciones intracitoplásmicas de glucógeno se producen principalmente en el hígado y los riñones. En el síndrome de Hurler, la enzima deficiente es la α-1-iduronidasa. Los niños afectados presentan deformidades esqueléticas y una acumulación de mucopolisacáridos en el endocardio y las arterias coronarias que provoca insuficiencia cardíaca. Otra glucogenosis, la enfermedad de McArdle, se debe a un déficit de fosforilasa muscular y provoca calambres musculares. La cardiomegalia y la insuficiencia cardíaca son las marcas distintivas de la enfermedad de Pompe, o glucogenosis de tipo II. La enfermedad de Tay-Sachs se caracteriza por la carencia de hexosaminidasa A y cursa con un deterioro neurológico grave.

17 **E** La enfermedad de McArdle es una forma de glucogenosis en la que el déficit de la enzima fosforilasa muscular provoca la acumulación de glucógeno en el músculo esquelético. Debuta al

comienzo de la edad adulta. Como el ejercicio intenso requiere glucogenólisis y metabolismo anaerobio, se producen calambres musculares, pero la concentración sanguínea de lactato no aumenta. Cerca de la mitad de los casos presentan proteinuria. La ausencia de distrofina, una proteína que estabiliza la membrana muscular, caracteriza la distrofia muscular de Duchenne. Una mutación en el gen de la fibrilina puede provocar el síndrome de Marfan. El déficit de glucosa-6-fosfatasa causa la enfermedad de von Gierke, caracterizada por hepatomegalia, nefromegalia y alteración de la gluconeogenia que provoca hipoglucemia e hiperlipidemia. La enfermedad de Pompe se debe a la carencia de glucosidasa lisosómica y sus manifestaciones son cardiomegalia marcada e insuficiencia cardíaca de comienzo en la lactancia. La anomalía de la espectrina, una proteína del citoesqueleto de la membrana de los eritrocitos, da lugar a un trastorno denominado *esferocitosis hereditaria*.

18 **E** La enfermedad de Pompe es una forma de glucogenosis ocasionada por el déficit de glucosidasa lisosómica (α-1,4-glucosidasa). El glucógeno depositado en el corazón provoca cardiomegalia masiva e insuficiencia cardíaca antes de los 2 años de edad. La carencia de glucocerebrosidasa se produce en la enfermedad de Gaucher. En la forma más frecuente de la enfermedad, no hay alteraciones neurológicas, y los pacientes tienen esplenomegalia y trastornos esqueléticos como consecuencia de la mayor cantidad de glucocerebrósidos lisosómicos en las células del sistema mononuclear fagocítico. El déficit de glucosa-6-fosfatasa origina la enfermedad de von Gierke, caracterizada por hepatomegalia, nefromegalia y alteración de la gluconeogenia que provoca hipoglucemia e hiperlipidemia. La reducción de hexosaminidasa A se produce en la enfermedad de Tay-Sachs; las personas afectadas muestran trastornos neurológicos graves, escaso desarrollo motor y ceguera de comienzo en la lactancia. El déficit de ácido homogentísico oxidasa causa la alcaptonuria con ocronosis, o depósito de un pigmento negro azulado en las articulaciones, causante de artropatías. La enfermedad de Niemann-Pick se debe a la carencia de esfingomielinasa; las personas afectadas

por el tipo A tienen hepatoesplenomegalia, linfoadenopatías, y trastornos motores y retraso mental graves.

19 **D** La diabetes mellitus de tipo 1 tiene una frecuencia más alta en algunas familias, pero no conocemos el mecanismo de herencia exacto. El riesgo es mayor en la descendencia cuando están afectados familiares de primer grado. Se considera que los genes ligados al HLA y otros *loci* genéticos y factores ambientales son importantes. Este patrón de herencia es multifactorial. Los otros patrones de herencia reseñados no se observan en la mayoría de los casos de diabetes mellitus.

20 **E** Casi todo el material genético normal está presente en las translocaciones robertsonianas porque solo se pierde una pequeña cantidad del brazo p de cada cromosoma translocado. El cariotipo materno es 45,XX,t(14;21). Estadísticamente, uno de cada seis fetos de una madre portadora de una translocación robertsoniana será también un portador. En la translocación recíproca equilibrada existe la misma posibilidad de heredar el defecto. Las demás anomalías estructurales reseñadas probablemente provoquen una pérdida significativa de material genético, lo que reduciría la capacidad de supervivencia o interferiría en la meiosis.

21 **A** El síndrome de Down (trisomía 21) es una de las trisomías compatibles con la vida. Aunque es posible que los niños con síndrome de Down tengan una buena funcionalidad, a menudo tienen múltiples malformaciones congénitas asociadas. Una de las más frecuentes es la cardiopatía congénita, incluida la comunicación interventricular. También presentan un riesgo 10-20 veces mayor de sufrir leucemia aguda. Prácticamente todas las personas con síndrome de Down que sobreviven hasta cumplir 40 años tienen indicios de enfermedad del Alzheimer. El infarto de miocardio a una edad temprana indica hipercolesterolemia familiar. La disección aórtica se observa en personas con síndrome de Marfan. Puede aparecer insuficiencia renal crónica en trastornos genéticos que causen riñones poliquísticos. La cirrosis hepática es una manifestación de la galactosemia.

22 **B** La figura muestra un único pliegue de flexión palmar y del quinto dedo, ambos característicos de la trisomía 21. Aunque el

riesgo de síndrome de Down aumenta en paralelo a la edad materna, la mayoría de los lactantes con este síndrome nacen de mujeres más jóvenes porque hay muchas más gestaciones en edades maternas menores. La monosomía X puede ponerse de manifiesto por un cuarto metacarpiano corto. En la trisomía 18, los dedos suelen estar flexionados, con el 2.° y 5.° por encima del 3.° y 4.°. En ocasiones, una triploidía se manifiesta por sindactilia del 3.° y 4.° dedo. No hay características distintivas de la mano en los hombres con síndrome de Klinefelter.

23 **C** Aunque estas manifestaciones son características de la trisomía 21, el niño no está gravemente afectado, lo que apunta a mosaicismo. En las personas con este trastorno existe un número mayor de células potencialmente normales con el complemento cromosómico adecuado, lo que permitiría a los fetos con anomalías del número de cromosomas sobrevivir hasta que la gestación llegue a término y posteriormente. La haploidía está presente en los gametos. La pérdida de un cromosoma autosómico es devastadora; la única monosomía asociada a posibilidades de supervivencia hasta completar la gestación a término es el síndrome de Turner (monosomía X). La mayoría de las aneuploidías (trisomías y monosomías) acaban en muerte fetal; los fetos con trisomía 21 son los que más probabilidad tienen de nacer a término. Los fetos con triploidía rara vez sobreviven después del segundo trimestre de gestación y casi nunca nacen vivos. Del mismo modo, la tetraploidía es responsable de muchos de los abortos producidos durante el primer trimestre y resulta incompatible con la vida.

24 **C** La trisomía 18 (síndrome de Edwards) conlleva una supervivencia significativamente acortada y muestra este grupo de hallazgos. El síndrome de Turner (45,X) se asocia a presencia de higromas quísticos e hidropesía fetal. Las graves malformaciones descritas en este caso hacen improbable que esté presente un cariotipo 46,XX normal. El síndrome de Down (47,XX,+21) se asocia a una supervivencia mayor que la descrita en este caso, y las características externas pueden ser bastante sutiles en el momento del nacimiento. El cariotipo «superfemenino» (XXX) provoca retraso mental leve. Por lo general, las anomalías en el número de cromosomas sexuales se

toleran mejor que las de los autosomas.

25 **D** Las manifestaciones de la trisomía 13 (síndrome de Patau) son labio leporino y paladar hendido, junto con microcefalia, defectos del cuero cabelludo y polidactilia postaxial (un dedo adicional, como se muestra en la figura). Estos recién nacidos también presentan con frecuencia malformaciones cardíacas graves y pueden tener, además, ciclopía y holoprosencefalia. El síndrome de Turner (45,X) solo afecta a mujeres. Las graves anomalías descritas en este caso podrían aparecer con un cariotipo normal (46,XY), pero el conjunto de los hallazgos, especialmente la polidactilia, apunta a una trisomía 13. El síndrome de Klinefelter (47,XXY) da lugar a hombres fenotípicos difíciles de distinguir de aquellos con un cariotipo 46,XY. Los lactantes con trisomía 18 no presentan una polidactilia y es más frecuente que tengan micrognatia que aquellos con trisomía 13. La triploidía con 69 cromosomas provoca la muerte del embrión en prácticamente todos los casos.

26 **D** El lactante presenta los hallazgos asociados a trisomía 18. En el análisis mediante FISH mostrado, los cromosomas de cada célula han sido teñidos con un marcador del cromosoma 18. En este caso, hay tres marcadores en cada célula, compatible con una trisomía. En realidad, habría que contar muchas células para excluir artefactos de la preparación. En la mayoría de los casos, la trisomía 18 se debe a fenómenos de no disyunción. La mayoría de los fetos con trisomía 18 mueren antes de nacer, y la supervivencia después de los 4 meses es infrecuente. Las demás opciones reseñadas no explican este análisis mediante FISH ni el conjunto de anomalías.

27 **C** El síndrome de DiGeorge es una inmunodeficiencia caracterizada por infecciones, timo pequeño, malformaciones congénitas e hipoparatiroidismo. Este conjunto es característico del síndrome de deleción 22q11.2, fácilmente diagnosticable con FISH. El déficit de adenosina desaminasa puede causar inmunodeficiencia, pero no se asocia a malformaciones congénitas. El análisis del ADN ramificado detecta la infección por el VIH capaz de provocar sida, pero no hay malformaciones congénitas asociadas a este trastorno. La biopsia de un ganglio linfático podría mostrar una reducción de los linfocitos T o B

asociada a varias formas de inmunodeficiencia, pero no se trata de una prueba específica que ayude a confirmar un diagnóstico concreto. Las repeticiones de trinucleótido del cromosoma X, detectadas por la PCR, se observan en el síndrome del X frágil, que se manifiesta por retraso mental en el sexo masculino.

28 **B** El lactante tiene el síndrome de DiGeorge, relacionado con una microdeleción del cromosoma 22q11.2. Esto queda indicado en la extensión en metafase por la presencia de solo tres puntos, porque esta región se ha perdido en un cromosoma 22, pero están presentes ambos cromosomas 22. El término hiperploidía hace referencia a la presencia de más de 46 cromosomas. En la aneuploidía, el número de cromosomas es anómalo (trisomía, monosomía) y la pérdida o ganancia de autosomas suele provocar la muerte del feto excepto en algunos casos de las trisomías 13, 18 y 21 y la monosomía X. Una inversión cromosómica cambiaría la región marcada a una parte distinta del mismo cromosoma. En la monosomía solo está presente un cromosoma de la pareja. Una translocación es el intercambio de material genético entre dos cromosomas.

29 **C** El síndrome de Klinefelter es una anomalía cromosómica relativamente frecuente que aparece en aproximadamente 1 de cada 660 nacidos vivos varones. Los hallazgos pueden ser sutiles. El cariotipo 46,X,i(Xq) es una variante del síndrome de Turner (solo presente en mujeres) causada por un segundo cromosoma X defectuoso. El cariotipo 47,XYY se produce en cerca de 1 de cada 1.000 nacidos vivos varones y se asocia a una talla superior a la media. Una persona con un mosaico como 46,XX/47,XX,+21 tiene características de síndrome de Down más leves que aquellas cuyo cariotipo es 47,XX,+21, más frecuente. El síndrome de deleción 22q11 se asocia a malformaciones congénitas que afectan al paladar, a la cara y al corazón y, en algunos casos, inmunodeficiencia de linfocitos T.

30 **A** Las características descritas corresponden al síndrome de Turner clásico. Las personas que llegan a la edad adulta pueden tener líneas celulares en mosaico, con algunas células 45,X y otras 46,XX. Una mujer portadora del síndrome del X frágil, X(fra), tiene menos probabilidades de manifestar la enfermedad que un hombre, pero el número de tripletes repetidos (CGG)

aumenta en sus descendientes varones. El cariotipo 47,XXY es el correspondiente al síndrome de Klinefelter; los afectados parecen fenotípicamente hombres. El cariotipo «superfemenino» (XXX) provoca retraso mental leve. La trisomía 16 es una causa de aborto en las primeras etapas de la gestación.

31 **A** Los hallazgos reseñados son característicos del síndrome de Turner (monosomía X), responsable de muchos abortos en el primer trimestre de la gestación. El higroma es bastante indicativo de este trastorno. Los fetos con este hallazgo casi nunca nacen vivos. La trisomía 18 puede estar marcada por múltiples anomalías, pero los dedos superpuestos y el cuello corto son características más típicas. Es posible que un síndrome de Down (47,XX,+21) se acompañe de higroma e hidropesía, pero la comunicación interventricular es más frecuente que la coartación y el riñón en herradura no es habitual. El cariotipo 47,XXY (síndrome de Klinefelter) no provoca la muerte del feto, y estos niños no tienen malformaciones congénitas importantes. La triploidía con 69 cromosomas es típicamente incompatible con la vida, pero la hidropesía y el higroma no son característicos de este cuadro.

32 **C** Los médicos deben ser cautelosos a la hora de asignar un sexo a un recién nacido con genitales ambiguos; cambiar de opinión es tan bien recibido como que el árbitro de un partido de béisbol modifique su veredicto. El auténtico hermafroditismo, con presencia de tejido ovárico y testicular, es absolutamente excepcional. Este lactante tiene un seudohermafroditismo femenino, secundario a la exposición del feto a una estimulación androgénica excesiva, que en este caso se debe a una hiperplasia suprarrenal congénita. El sexo gonadal y cariotípico es femenino. El seudohermafroditismo masculino puede ser de varios tipos, pero el más frecuente es la insensibilidad a los andrógenos; las personas afectadas son fenotípicamente mujeres, pero tienen testículos y un cariotipo 46,XY. Los fenómenos de no disyunción provocan monosomías o trisomías y la mayoría son causa de muerte fetal. Las repeticiones de trinucleótidos se observan en hombres con síndrome del cromosoma X frágil. Las anomalías del ADN mitocondrial siguen un patrón de transmisión materna y no

afectan a las características ni a los cromosomas sexuales.

33 **E** El síndrome del cromosoma X frágil es un trastorno en el que existen de 250 a 4.000 repeticiones en tándem de un trinucleótido con secuencia CGG. Por lo general, cuanto mayor sea el número de repeticiones, más graves serán las manifestaciones de los trastornos asociados o más pronto aparecerán. Las mutaciones del trinucleótido son dinámicas; como su número aumenta en la ovogenia, los hijos varones posteriores tendrán una enfermedad más grave que la que presentaron las generaciones precedentes. En las mutaciones de cambio de marco se insertan o eliminan 1, 2 o 3 pares de bases de nucleótido. Como resultado, la proteína transcrita es anómala. Una mutación con cambio de sentido se debe a la sustitución de un solo nucleótido y condiciona la elaboración de una proteína anómala. Las alteraciones del ADN mitocondrial, que suelen afectar a genes asociados con la fosforilación oxidativa, se transmiten por vía materna. Una mutación puntual de solo 1 par de bases puede afectar a una proteína.

34 **C** La imposibilidad de encontrar el producto amplificado mediante la PCR en este tipo de casos podría significar que el feto no está afectado o bien que existe una mutación plena demasiado grande como para que pueda ser detectada mediante la PCR. El siguiente paso lógico sería un análisis de inmunotransferencia de Southern del ADN genómico de células fetales. La determinación habitual del cariotipo en las células del líquido amniótico es mucho menos sensible que el método de Southern. El cariotipo del padre, no afectado, no informa sobre el estado del gen *FMR1* en el feto porque la amplificación del trinucleótido tiene lugar durante la ovogenia. Por la misma razón, el análisis mediante la PCR del gen *FMR1* de la madre no resulta útil.

35 **D** Este es un patrón clásico de herencia materna debido a una mutación del ADN mitocondrial. Hombres y mujeres resultan afectados, pero los primeros no pueden transmitir la enfermedad a su descendencia. Puesto que el ADN mitocondrial codifica muchas enzimas implicadas en la fosforilación oxidativa, las mutaciones de los genes mitocondriales ejercen sus efectos más nocivos sobre aquellos órganos más

dependientes de la fosforilación oxidativa, como el sistema nervioso central y los músculos. Las demás opciones no muestran una herencia materna estricta.

36 **A** Este niño muestra las características del síndrome de Angelman y el análisis del ADN revela una disomía uniparental. El gen de Angelman, situado en el cromosoma 15, es objeto de impronta genómica. Está silenciado en el cromosoma 15 del padre, pero activo en el cromosoma 15 materno. Si el niño carece de este último, no habrá gen de Angelman activo en las células somáticas. Esto origina las malformaciones típicas del trastorno. Se produce el mismo efecto cuando existe una deleción del gen de Angelman en el cromosoma 15 materno. Las demás opciones reseñadas no se producen en la disomía uniparental.

37 **B** La presencia de múltiples hermanos con un trastorno similar del que se sabe que es autosómico dominante, como la osteogenia imperfecta de tipo I, cuando ambos progenitores son fenotípicamente normales indica que uno de los progenitores tiene una mutación limitada a las células germinales gonadales. En este caso, el progenitor afectado presenta mosaicismo y las células somáticas carecen de la mutación, de modo que no hay expresión fenotípica. La impronta genómica en la disomía uniparental es característica del síndrome de Angelman. La herencia multifactorial es típica de aquellas enfermedades que carecen de un patrón de herencia definido, no de la osteogenia imperfecta. La inactivación aleatoria del cromosoma X podría ser la responsable de las manifestaciones clínicas en mujeres con un trastorno recesivo ligado al cromosoma X, como la hemofilia A, pero es improbable que se produzca tres veces en la misma generación. Una nueva mutación espontánea explica que un niño sufra una enfermedad autosómica dominante no presente en ninguno de los progenitores, pero la excepcionalidad de este fenómeno hace altamente improbable que se produzcan tres de ellos en una generación.

38 **E** La proteína FMR1 (FMRP) actúa normalmente como regulador de la traducción reduciendo la síntesis de proteínas en las uniones sinápticas. Así pues, una reducción de FMRP (pérdida de función) en el síndrome del X frágil clásico determina un aumento de la traducción de proteínas a partir de

ARNm que altera la actividad sináptica y causa retraso mental. En el síndrome del cromosoma X frágil con temblor/ataxia, el gen *FMR1* no está metilado y silenciado, sino que sigue transcribiéndose, y los ARNm de FMR1 que contienen CGG se acumulan en el núcleo neuronal y forman inclusiones intranucleares de agregados de ARNm que secuestran proteínas de unión al ARN, lo que da lugar a acontecimientos que son tóxicos para la célula. La inactivación del cromosoma X tiene lugar cuando existe más de un cromosoma X, como sucede en mujeres normales y hombres con síndrome de Klinefelter.

39 **C** Los polimorfismos de nucleótido único aparecen con una frecuencia de aproximadamente 1 nucleótido por cada segmento de 1.000 pares de bases y pueden utilizarse en los análisis de ligamiento para identificar haplotipos asociados a enfermedades. Los protooncogenes son genes que codifican proteínas implicadas en el crecimiento celular; los alelos mutantes de los protooncogenes se denominan *oncogenes* y son importantes en las neoplasias. Las translocaciones robertsonianas involucran a porciones de dos cromosomas que intercambian su lugar, pero no se pierden totalmente y están equilibradas; es posible que los portadores no resulten afectados, pero los gametos tienen el potencial de producir monosomías y trisomías. Las deleciones de cambio de marco son un tipo de mutación que puede provocar proteínas anómalas y enfermedades tales como fibrosis quística. Las repeticiones de trinucleótido presentes en el ADN son secuencias de tres nucleótidos que se repiten muchas veces y en ocasiones están amplificadas y causan ciertos trastornos, como el síndrome del cromosoma X frágil.

40 **C** Cuando una enfermedad genética (p. ej., fibrosis quística) está causada por muchas mutaciones diferentes, con frecuencias distintas según la población, no hay una prueba de detección sistemática única capaz de detectar todas las mutaciones. Aunque el 70% de los pacientes con fibrosis quística tienen una deleción de 3 pares de bases fácilmente detectable por la PCR (mutación ΔF508), en el 30% restante la enfermedad está causada por varios cientos de formas alélicas del *CFTR.* Sería necesario secuenciar los genes *CFTR* para poder detectar todas

ellas. Esto hace inviable la detección sistemática masiva. Las demás opciones reseñadas no se aplican en este caso.

41 **C** Los abortos de repetición apuntan a una causa parental. Las anomalías cromosómicas, tales como translocación robertsoniana, podrían explicar abortos, especialmente los producidos en el primer trimestre de la gestación, período en el que muchos de ellos se deben a anomalías cromosómicas. Los estudios de asociación en todo el genoma se aplican a poblaciones, no a individuos, y establecen relaciones entre enfermedades frecuentes, tales como hipertensión y diabetes mellitus, y riesgos poligénicos. El análisis de hibridación por fluorescencia *in situ* (FISH) resulta útil para establecer alteraciones en el número y la morfología de los cromosomas, como translocaciones, inversiones y deleciones, pero no es definitivo como cariotipo. Con la PCR se identifican defectos génicos específicos, no anomalías de cromosomas completos. La espectrometría de masas en tándem se emplea en la detección sistemática neonatal de errores bioquímicos innatos del metabolismo, como la fenilcetonuria.

42 **D** El genoma humano puede dividirse en bloques de ADN con un número variable de polimorfismos de nucleótido único (SNP) contiguos que forman haplotipos y se agrupan debido al desequilibrio de ligamiento, de modo que los haplotipos similares indican una herencia compartida. Con chips con más de 1 millón de SNP se podrían identificar pequeñas variaciones del ADN de una persona a otra, y el nexo de estos polimorfismos con enfermedades ayudaría a restringir la búsqueda de genes candidatos cuya función alterada podría estar relacionada con una enfermedad. Las sondas de hibridación por fluorescencia *in situ* (FISH) son útiles para identificar regiones cromosómicas específicas y pueden detectar anomalías tales como deleciones y translocaciones de cromosomas. El cariotipo estándar con bandeo aporta información sobre el número de cromosomas y alteraciones estructurales fundamentales, pero no identifica genes específicos ni sus *loci*. El análisis de la expresión del ARNm es una forma indirecta de determinar alteraciones del ADN fuente, pero es más sencillo trabajar directamente con el ADN. La

inmunotransferencia de Southern ha sido sustituida en gran medida por otras técnicas, pero resulta útil para detectar expansiones de repeticiones de trinucleótidos y reordenamientos clonales de genes.

43 **D** La secuenciación de exomas completos limita la búsqueda a solo el 2% del genoma, que consiste en exones codificadores de proteínas y es responsable de hasta el 80% de las enfermedades mendelianas; el coste disminuye notablemente respecto al empleo de la secuenciación del genoma completo. La pirosecuenciación es una forma más sensible de la secuenciación de Sanger empleada sobre todo en las pruebas de variantes de secuencia concretas con un trasfondo de alelos normales, como sucede en las células tumorales mezcladas con un gran número de células del estroma. La secuenciación de Sanger se usa junto con la PCR para permitir la secuenciación de cualquier segmento conocido del ADN. La secuenciación dirigida resulta útil en la identificación de un gen individual o un conjunto de genes, mediante la subselección de los clones relevantes a partir de una biblioteca de todo el genoma a través de sondas complementarias a medida o bien mediante preparaciones alternativas de ADN genómico como la PCR múltiple.

CAPÍTULO 6

Enfermedades del sistema inmunitario

PEF9 Capítulo 6: Enfermedades del sistema inmunitario

PH9 Capítulo 4: Enfermedades del sistema inmunitario

1 Un hombre de 33 años lleva 1 semana con náuseas y vómitos, y presenta ictericia leve. En la exploración física, la temperatura es 37,4 °C. Las pruebas de laboratorio muestran AST sérica de 208 U/l y ALT 274 U/l. Las pruebas serológicas de HBsAg y HBcAc son positivas. Una muestra de biopsia hepática examinada al microscopio revela necrosis focal de hepatocitos con infiltrado portal de células inflamatorias. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que cause el daño de las células hepáticas en estos procesos?

- A Liberación de citocinas por macrófagos activados
- B Destrucción mediada por anticuerpos de células hepáticas que expresen HBsAg
- C Reconocimiento del HBsAg circulante por parte de los linfocitos CD4+
- D Reconocimiento por parte de los linfocitos CD8+ de péptidos víricos presentados por moléculas del CPH de clase I
- E Reconocimiento por parte de los linfocitos NK de péptidos víricos presentados por moléculas del CPH de clase II

2 Cuando los cristales de ácido úrico se depositan en los tejidos blandos, se produce una reacción inflamatoria que provoca necrosis celular. Las células inflamatorias tienen un complejo inflamasoma de proteínas con un receptor citosólico que reconoce los cristales, y de este modo libera caspasa 1 y escinde la

interleucina 1 dando lugar a una forma activa. ¿Cuál de los siguientes receptores está presente en estos inflamasomas?

A Receptores de lectina de tipo C
B Receptores de manosa
C Receptores de tipo NOD
D Receptores de tipo RIG
E Receptores de tipo señuelo *(toll)*

3 Una niña de 13 años tiene una gastroenteritis vírica. Dentro del citoplasma, las proteínas víricas se procesan a péptidos. Estos péptidos son presentados junto a moléculas del CPH de clase I sobre la superficie de los macrófagos. Un heterodímero receptor compuesto por cadenas polipeptídicas α y β reconoce el péptido. ¿Cuál de las siguientes células tiene este receptor?

A Linfocitos B de la médula ósea
B Linfocitos CD8 de ganglios linfáticos de drenaje
C Células dendríticas de la piel
D Linfocitos citolíticos naturales del bazo
E Linfocitos CD4 en la submucosa digestiva

4 Un hombre de 20 años entra en un ascensor lleno de personas con gripe que están tosiendo y estornudando. Las partículas del virus de la gripe que inhala se unen al epitelio respiratorio, y la infección vírica reduce las moléculas del CPH de clase I presentadas en estas células epiteliales. ¿Cuál de las siguientes células inmunitarias es más probable que destruya rápidamente las células infectadas por el virus?

A Linfocito CD4+
B Célula dendrítica
C Macrófago
D Linfocito citolítico natural
E Neutrófilo

5 En un experimento se cultiva una línea celular derivada de una neoplasia maligna humana. Se añade anticuerpo IgG humano al cultivo, y las células tumorales quedan recubiertas por el anticuerpo, pero no se lisan. A continuación se añaden células humanas negativas para CD3, CD19 e inmunoglobulinas de superficie, pero positivas para CD16 y CD56. Las células tumorales sufren lisis. ¿Cuál de los siguientes tipos de célula es más probable que haya destruido las células tumorales?

A Linfocito B
B Linfocito CD4+
C Linfocito CD8+
D Célula dendrítica
E Macrófago
F Linfocito citolítico natural

6 En un coito heterosexual, el líquido seminal que contiene VIH contacta con la mucosa escamosa de la vagina. Las células capturan los viriones y transportan los virus a través de los vasos linfáticos a los ganglios linfáticos regionales. Dentro de los centros germinales de estos ganglios, los viriones infectan linfocitos CD4+ y proliferan, con lo que causan la lisis de los linfocitos CD4+ con la consiguiente liberación de más viriones, que son captados en la superficie de células con receptores de Fc, lo que permite la infección continuada por parte del VIH de más linfocitos CD4+ que pasen por los ganglios. ¿Cuál de los siguientes tipos de célula es más probable que capture VIH en su superficie a través de los receptores de Fc?

A Linfocito B
B Linfocito citotóxico CD8+
C Célula dendrítica folicular
D Linfocito citolítico natural
E Célula gigante de Langhans
F Macrófago
G Mastocito

7 En un estudio que analiza la formación de granulomas en el pulmón en respuesta a la infección por *Mycobacterium tuberculosis* se observa que algunas células del granuloma expresan antígenos del CPH de clase II. ¿Cuál de los siguientes leucocitos de sangre periférica es más probable que sea el origen de estas células portadoras del antígeno de clase II?

A Basófilo
B Linfocito B CD4+
C Monocito
D Linfocito citolítico natural
E Neutrófilo

8 A los 5 min de sufrir una picadura de abeja, una joven de 15 años presenta súbitamente problemas para respirar, con estridor

inspiratorio marcado debido a edema laríngeo. Presenta urticaria intensa y observa tumefacción en la mano en la que le picó la abeja. ¿Cuál de los siguientes fármacos permite tratar mejor los signos y síntomas?

A Ciclosporina
B Adrenalina
C Glucocorticoides
D Metotrexato
E Penicilina

9 Un trabajador de laboratorio que es «alérgico» a esporas de hongos se expone accidentalmente a un cultivo del hongo en cuestión un viernes por la tarde. Una hora después, desarrolla estornudos en salvas, lagrimeo y rinorrea. Los síntomas parecen resolverse unas horas después de volver a casa, pero reaparecen a la mañana siguiente, aunque el hongo del laboratorio no está presente en su domicilio. Los síntomas se mantienen durante el fin de semana. ¿Cuál de las siguientes células es más probable que predomine en el examen microscópico de la secreción nasal del paciente?

A Células dendríticas
B Eosinófilos
C Macrófagos
D Mastocitos
E Linfocitos NK

10 Un hombre de 28 años presenta hemoptisis y hematuria de 2 días de evolución. En la exploración física, presenta temperatura de 36,8 °C, frecuencia cardíaca de 87 latidos/min frecuencia respiratoria de 19 respiraciones/min y presión arterial de 150/90 mmHg. Las pruebas de laboratorio muestran concentraciones de creatinina de 3,8 mg/dl y de nitrógeno ureico de 35 mg/dl. El análisis de orina revela hematuria 4+, proteinuria 2+ y ausencia de glucosa. Una biopsia renal examinada al microscopio pone de manifiesto daño glomerular e inmunofluorescencia lineal con anticuerpos marcados contra C3 y anti-IgG. ¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos tiene mayor especificidad para la enfermedad de este paciente?

A Antimembrana basal
B Anticardiolipina

- C Anti-ADN bicatenario
- D Antihistona
- E Anti-SS-A
- F Antirribonucleoproteína U1

11 Se solicitan pruebas de laboratorio para dos pacientes ingresados. Durante la flebotomía se intercambian las etiquetas de las muestras extraídas. Uno de los pacientes recibe una transfusión de sangre horas más tarde. Cuando ha transcurrido 1 h desde el inicio de la transfusión del concentrado de eritrocitos, el paciente presenta taquicardia y su orina es de color rosa. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que produzca el cuadro clínico descrito?

- A Citotoxicidad natural dependiente de anticuerpos por parte de linfocitos citolíticos naturales
- B Depósito de complejos antígeno-anticuerpo en los glomérulos
- C Lisis de eritrocitos mediada por el complemento
- D Desgranulación de mastocitos con liberación de aminas biógenas
- E Liberación del factor de necrosis tumoral α a la circulación

12 Un hombre de 35 años refiere debilidad muscular progresivamente mayor de 5 meses de evolución. Esta debilidad es más pronunciada en músculos muy usados, como el elevador de los párpados, lo que provoca que tenga problemas de visión al final del día. Tras dormir por la noche, los síntomas disminuyen. En la exploración física no tiene fiebre. No se aprecian exantemas cutáneos. La fuerza muscular es inicialmente 5/5, pero disminuye con los movimientos repetitivos. Una TC torácica revela un aumento de tamaño del timo. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que explique la debilidad muscular en este paciente?

- A Disfunción de la unión neuromuscular mediada por anticuerpos
- B Reacción de hipersensibilidad tardía contra antígenos musculares
- C Depósito de inmunocomplejos en los capilares musculares
- D Lisis de células musculares por linfocitos CD8+
- E Secreción de citocinas por macrófagos activados

13 Un hombre de 26 años lleva 1 semana con mialgias y fiebre. En

la exploración física la temperatura es de 38,6 °C. Tiene dolor muscular difuso a la palpación, sin exantemas ni dolor articular con el movimiento. Las pruebas de laboratorio muestran aumento de la creatina cinasa sérica y eosinofilia en sangre periférica. En una muestra de biopsia de gastrocnemio hay larvas de *Trichinella espiralis* en las fibras de músculo esquelético. A los 2 años, una radiografía de tórax tan solo muestra unas pocas calcificaciones de pequeño tamaño en el diafragma. ¿Cuál de los siguientes mecanismos inmunitarios es más probable que contribuyera a la destrucción de las larvas?

A Formación de abscesos con neutrófilos
B Citotoxicidad celular mediada por anticuerpos (CCAC)
C Lisis celular mediada por el complemento
D Formación de células gigantes de Langhans
E Síntesis de leucotrieno C_4 en los mastocitos

14 Un hombre de 29 años desarrolló dolor articular intenso a los 12 días de recibir una inyección de antídoto de veneno de serpiente. En la exploración física hay dolor articular difuso con el movimiento. No se encuentra sangre oculta en las heces. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de creatinina sérica de 4,4 mg/dl y nitrógeno ureico de 42 mg/dl. El examen microscópico de una muestra de biopsia renal pone de manifiesto necrosis fibrinoide focal de la media vascular en pequeñas arterias y arteriolas, y microtrombos intravasculares. En estas áreas de necrosis hay neutrófilos diseminados. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que esté presente en la sangre del paciente?

A Linfocitosis de CD4+
B Hipocomplementemia
C Aumento de IgE
D Neutropenia
E Trombocitopenia

15 En un experimento, se usa un antígeno para inducir una reacción de hipersensibilidad inmediata (tipo I). Se secretan citocinas y se observa que estas estimulan la producción de IgE por parte de los linfocitos B, promueven la proliferación de mastocitos, y reclutan y activan eosinófilos en esta reacción. ¿Cuál de las siguientes células es más probable que genere esas citocinas?

A Linfocitos CD4+
B Células dendríticas
C Macrófagos
D Linfocitos citolíticos naturales
E Neutrófilos

16 En las personas con sensibilidad a los *piercings* se realizan pruebas cutáneas con parche con compuestos de níquel. En 24-48 h se produce eritema local e induración de la piel, acompañados de prurito y dolor. Histológicamente, hay una acumulación de neutrófilos y monocitos con algunos linfocitos T CD4. ¿Cuál de las siguientes citocinas producidas por los linfocitos T es más probable que medie esta reacción?

A IL-2
B IL-5
C IL-10
D IL-12
E IL-17

17 Un técnico de laboratorio de 40 años se inyecta accidentalmente una sustancia química en la piel. Al día siguiente observa que se está formando un área de piel indurada y eritematosa alrededor del punto de inyección. A los 2 días, la induración mide 10 mm de diámetro. Un corte microscópico de esta área, con una inmunotinción que emplea anticuerpos frente a CD4, muestra muchos linfocitos positivos. ¿Cuál de las siguientes reacciones inmunológicas es más compatible con dicho aspecto?

A Reacción de Arthus
B Enfermedad del injerto contra el huésped
C Hipersensibilidad de tipo tardío
D Anafilaxia localizada
E Enfermedad del suero

18 Una niña de 12 años refiere que lleva 3 días con dolor de garganta. En la exploración física, tiene 38,4 °C de temperatura y eritema faríngeo con un exudado mínimo. En el cultivo faríngeo crece *Streptococcus* β-hemolítico del grupo A. La faringitis se resuelve, pero 3 semanas después la niña desarrolla fiebre y dolor torácico. El título de antiestreptolisina O es de 1:512. ¿Cuál de los siguientes mecanismos inmunitarios es más probable que haya provocado el dolor torácico?

A Colapso de la anergia de los linfocitos T
B Fracaso de la supresión mediada por linfocitos T
C Mimetismo molecular
D Activación de linfocitos policlonales
E Liberación de antígenos secuestrados



19 Una mujer de 24 años presenta un malestar general cada vez

mayor y las lesiones cutáneas faciales mostradas en la figura, que empeoran ante la exposición a la luz solar, y artralgias y mialgias durante el último mes. En la exploración física tiene edema leve de los pies. La auscultación revela un soplo de fricción sobre el tórax. Entre los hallazgos de laboratorio destacan pancitopenia y creatinina sérica de 3 mg/dl. El análisis de orina muestra hematuria y proteinuria. Una prueba serológica de sífilis arroja un resultado falso positivo. La biopsia renal pone de manifiesto depósitos granulares de IgG y complemento en el mesangio y a lo largo de la membrana basal. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que esté implicado en la patogenia de la enfermedad?

A Anticuerpos antifosfolipídicos
B Eliminación defectuosa de núcleos apoptósicos
C Aumento de la producción de IFN-γ
D Mimetismo molecular
E Activación de linfocitos T por superantígenos

20 Una mujer de 29 años lleva 2 semanas con fiebre y artralgias. En la exploración física, su temperatura es de 37,6 °C y tiene un exantema eritematoso malar. Las pruebas de laboratorio iniciales son positivas para ANA con un título de 1:1.600 y para los anticuerpos anti-ADN bicatenario, con un título de 1:3.200, junto a un resultado falso positivo en la prueba serológica de la sífilis. La creatinina sérica está muy elevada, y las concentraciones séricas de complemento se encuentran reducidas. Las pruebas de coagulación *in vitro* (tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial) están prolongadas. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que presente la paciente?

A Pielonefritis aguda
B Hemorragia cerebral
C Carcinoma de células renales
D Hipertensión maligna
E Trombosis de repetición



21 Una mujer de 26 años ha presentado brotes de dolor articular en los últimos 2 años. Tiene, además, un exantema en las mejillas y el puente de la nariz. En la exploración física no hay tumefacción ni deformidad de las articulaciones, aunque existen linfoadenopatías generalizadas. Las pruebas de laboratorio revelan anemia, leucopenia, gammapatía policlonal, proteinuria y hematuria. El resultado de los ANA séricos es positivo, con un título de 1:1.024 y un patrón en anillo identificado por inmunofluorescencia. La figura son imágenes de microscopio óptico y de inmunofluorescencia (con anticuerpos anti-IgG) de una muestra de biopsia cutánea. ¿Cuál de las siguientes informaciones es la mejor que se puede ofrecer a la paciente sobre su enfermedad?

A Es probable que se quede ciega en los próximos 5 años
B Evitar la exposición al frío
C Eventualmente se producirán deformidades articulares
D Es probable que desarrolle una insuficiencia renal crónica
E En último término, será necesaria la sustitución de válvulas cardíacas

22 Una mujer de 33 años desarrolla un exantema cutáneo en la cara cuando está al sol más de 1 h. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 10,2 g/dl; de hematocrito del 31,3%; de plaquetas de 126.800/mm^3, y de leucocitos de 3.211/mm^3. El análisis de orina revela proteinuria 3+ y sangre 2+, sin glucosa. El resultado de ANA es positivo, con un título de 1:2.048 y un patrón de tinción inmunofluorescente difuso homogéneo. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que tenga esta paciente?

A Broncoconstricción
B Linfoma cerebral
C Anemia hemolítica
D Queratoconjuntivitis
E Sacroilitis
F Esclerodactilia



23 Una mujer de 31 años presenta edemas periféricos progresivos, dolor torácico de tipo pleurítico y un exantema eritematoso desde hace 6 meses. Las pruebas de laboratorio muestran un aumento de las cifras de creatinina sérica, y el análisis de orina revela proteinuria con cilindros eritrocíticos. Se realiza una biopsia renal, y la imagen al microscopio óptico de una muestra teñida con PAS es la que se muestra en la figura, en comparación con otra normal. ¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos, de estar presente, es específico de la enfermedad de esta paciente, si aparece?

A Centrómero
B Polipéptido citrulinado cíclico
C ADN topoisomerasa I
D Smith

E RNP-U1

24 Una mujer de 60 años expuesta a la tuberculosis presenta un resultado positivo en la prueba cutánea con tuberculina. Recibe un tratamiento profiláctico que incluye isoniacida. Desarrolla artralgias, mialgias y un exantema eritematoso malar 9 meses después. Entre los hallazgos de laboratorio destaca un título de ANA de 1:2.560 con patrón difuso. No hay anticuerpos anti-ADN bicatenario. ¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos es más específico de su enfermedad?

A Anti-Sm
B Anticentrómero
C Antihistona
D Anti-Jo-1
E Antirribonucleoproteína U1
F Anti-SS-A



25 Una mujer de 22 años presenta un malestar general cada vez

mayor y tumefacción de los pies en la última semana. En la exploración física tiene un edema con fóvea 2+ hasta las rodillas y tumefacción alrededor de los ojos. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de creatinina sérica de 4,6 mg/dl y de nitrógeno ureico de 42 mg/dl. La biopsia renal pone de manifiesto tinción inmunofluorescente positiva para inmunoglobulinas y C3 del complemento dentro en los glomérulos. La figura ilustra la imagen con el microscopio electrónico de un glomérulo. ¿Cuál de los siguientes mecanismos inmunitarios es más probable que haya producido la lesión renal observada en esta paciente?

A Citotoxicidad mediada por células y dependiente de anticuerpos
B Inflamación granulomatosa
C Hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos
D Anafilaxia localizada
E Citotoxicidad mediada por linfocitos T

26 Una mujer de 19 años presenta un exantema cutáneo en cara y cuero cabelludo de 9 meses de evolución. En la exploración se observan placas de 0,5 a 1,5 cm con eritema y edema. Se realiza una biopsia en sacabocados y su examen microscópico revela tapones foliculares. Hay inmunofluorescencia positiva en la unión dermoepidérmica con tinciones para IgG y C3 del complemento. ¿Cuál de los siguientes mecanismos patogénicos resulta de la unión de los TLR a ácidos nucleicos propios?

A Desgranulación de los mastocitos
B Mimetismo molecular
C Liberación de antígenos secuestrados
D Elaboración de T_H17
E Producción de interferón de tipo I

27 Una mujer de 54 años lleva 5 años con tos crónica seca. En el último año presenta visión borrosa progresiva. En la exploración física, tiene el tabique nasal perforado, cicatrices corneales leves bilaterales y fisuras en la lengua y comisuras de la boca. Las pruebas de laboratorio muestran anticuerpos contra SS-A y SS-B. La concentración de creatinina sérica es de 2,5 mg/dl, y la de nitrógeno ureico, de 25 mg/dl. Una biopsia renal examinada al microscopio revela nefritis tubulointersticial sin afectación glomerular. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es la más grave

que probablemente se produzca en la paciente?
A Endocarditis
B Linfoma no hodgkiniano
C Insuficiencia renal
D Cáncer de glándulas salivales
E Alteración de la motilidad esofágica
F Uretritis

28 Una mujer de 47 años ha presentado una sensación de quemazón ocular con una creciente visión borrosa en los últimos 5 años. En la exploración física tiene queratoconjuntivitis. También hay atrofia de la mucosa oral con úlceras de la mucosa bucal. Una biopsia del labio revela infiltrados marcados de linfocitos y células plasmáticas en las glándulas salivales menores. ¿Cuál de las siguientes estructuras es más probable que genere autoanticuerpos detectables en las pruebas de laboratorio?
A Centrómero
B ADN bicatenario
C ADN topoisomerasa (Scl-70)
D SS-B
E RNP-U1

29 Una mujer de 43 años ha notado dificultades para la deglución progresivamente mayores en el último año. También lleva 6 meses con diarrea y ha perdido 5 kg de peso. Refiere disnea progresivamente mayor en este período. En la exploración física se auscultan crepitantes en todos los campos pulmonares, pero los tonos cardíacos son débiles. El ecocardiograma revela un gran derrame pericárdico. El resultado de la prueba de ANA es positivo, con un título de 1:512 y patrón nucleolar. El título de anticuerpos anti-ADN topoisomerasa es de 1:1.024. ¿Cuál de las siguientes complicaciones graves es más probable que se produzca en los pacientes que sufren esta enfermedad?
A Insuficiencia hepática
B Hipertensión maligna
C Meningitis
D Úlcera duodenal perforada
E Carcinoma escamoso

30 Una mujer de 44 años presenta engrosamiento de la piel de los dedos de las manos desde hace 2 años, que provoca dificultades

para flexionarlos. En los últimos 8 meses tiene cada vez más problemas de deglución. En el invierno anterior los dedos se volvían cianóticos y dolorosos al exponerse al frío. En la exploración física, la piel de la cara, del cuello, de las manos y de los antebrazos tiene un aspecto firme y brillante. La presión arterial es de 200/130 mmHg. Una radiografía de tórax muestra marcas intersticiales prominentes, y las pruebas de función pulmonar indican enfermedad pulmonar restrictiva grave. El resultado de la prueba de anticuerpos contra ADN topoisomerasa I es positivo. ¿Cuál de las enfermedades siguientes es más probable que tenga?

A Espondilitis anquilosante
B Esclerodermia difusa
C Lupus eritematoso discoide
D Esclerodermia limitada
E Artritis reumatoide
F Lupus eritematoso sistémico



31 Una mujer de 48 años tiene dedos afilados en forma de garra, con reducción del movimiento en las pequeñas articulaciones. La piel de la cara no muestra arrugas. La figura presenta la imagen microscópica de la piel. La paciente tiene, además, fibrosis intersticial difusa de los pulmones, con hipertensión pulmonar y

corazón pulmonar *(cor pulmonale).* ¿Cuál de los siguientes tipos de células inflamatorias de la dermis es más probable que sea el desencadenante del proceso causante de la enfermedad cutánea?

A Linfocito CD4+
B Macrófago
C Mastocito
D Neutrófilo
E Linfocito citolítico natural

32 Una mujer de 29 años presenta debilidad progresivamente mayor en el último año y actualmente tiene problemas para subir un tramo de escaleras. La mayor parte del tiempo sufre dolor muscular. Sin embargo, apenas tiene dificultades para escribir a mano o con teclado. En los últimos 3 meses cada vez le cuesta más tragar. Lleva 1 semana con dolor torácico. En la exploración física no hay fiebre. La presión arterial es de 115/75 mmHg. La fuerza muscular es de 4/5 en las cuatro extremidades. No hay exantemas. Tiene edema con fóvea 2+ hasta las rodillas. En los campos pulmonares inferiores se auscultan crepitantes. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de creatina cinasa sérica de 458 U/l y anticuerpos Jo-1. ¿Cuál de las siguientes complicaciones adicionales de su enfermedad es más probable que sufra la paciente?

A Anquilosis ósea
B Miocarditis
C Pericarditis
D Esclerodactilia
E Uretritis
F Xeroftalmía

33 Una mujer de 51 años refiere dolor difuso bilateral en muslos y hombros de 6 semanas de evolución. Tiene problemas para levantarse de la silla y subir escaleras. Presenta un exantema violáceo claro alrededor de los ojos y en la piel de los nudillos. En la exploración física no tiene fiebre. La fuerza muscular es de 4/5 en las cuatro extremidades. Las pruebas de laboratorio muestran 753 U/l de creatina cinasa sérica y el resultado de la prueba de ANA es positivo, con un título de 1:160. ¿Cuál de los siguientes análisis serológicos es más específico para el diagnóstico de la enfermedad subyacente?

A Antipéptido citrulinado cíclico
B Anticuerpos anti-ADN bicatenario
C Anticuerpos antihistona
D Anticuerpos anti-Jo-1
E Anticuerpos antirribonucleoproteína U1

34 Una mujer de 22 años refiere sequedad de boca en los últimos 2 años. Durante este período han aparecido exantemas eritematosos en la piel de la cara y en la parte superior del cuello. En los 6 meses anteriores ha desarrollado artralgias. Los dedos de las manos se vuelven pálidos y dolorosos al exponerse al frío. En la exploración física no hay fiebre ni deformidades articulares. Entre los hallazgos de laboratorio destacan la positividad de ANA, con un patrón moteado, y altos títulos de anticuerpos antirribonucleoproteína U1 (RNP-U1). La concentración de creatinina sérica es de 1,1 mg/dl, y la de nitrógeno ureico, de 17 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que produzca estos hallazgos?

A Dermatomiositis
B Lupus eritematoso discoide
C Esclerodermia limitada
D Enfermedad mixta del tejido conjuntivo
E Artritis reactiva
F Síndrome de Sjögren
G Lupus eritematoso sistémico

35 Un hombre de 45 años con insuficiencia renal crónica recibió un trasplante de riñón de su hermano hace 36 meses. En los 30 meses posteriores solo presentó episodios de rechazo leves que se controlaron con inmunodepresores. Durante los últimos 6 meses las concentraciones séricas de creatinina y nitrógeno ureico han aumentado. En la exploración física no tiene fiebre. El examen microscópico de una muestra de orina no muestra leucocitos. Una prueba de imagen renal pone de manifiesto que el aloinjerto ha disminuido de tamaño, con flujo sanguíneo reducido. ¿Cuál de los siguientes procesos inmunitarios es más probable que explique estos hallazgos?

A Lisis celular mediada por el complemento
B Hipersensibilidad tardía
C Lisis celular mediada por macrófagos

D Liberación de leucotrieno C_4 por los mastocitos

E Lesión inmunitaria de la íntima vascular

36 Una mujer de 19 años con insuficiencia renal crónica recibió un trasplante renal de cadáver. Un mes después las concentraciones séricas de creatinina y nitrógeno ureico aumentaron, y se realizó una biopsia renal. Recibió tratamiento con inmunodepresores, corticoesteroides incluidos, y la función renal mejoró. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que se observara en la muestra de biopsia antes de instaurar el tratamiento con corticoesteroides?

A Necrosis fibrinoide de las arteriolas renales con oclusión trombótica

B Depósito glomerular de proteína asociada a amiloide sérico

C Infiltrado intersticial por eosinófilos con lesión epitelial

D Vasos sanguíneos notablemente engrosados con fibrosis del intersticio y de los glomérulos

E Lesión epitelial tubular por linfocitos CD3+

37 Una mujer de 35 años con leucemia mieloblástica recibió un trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas. En el momento actual, 1 mes después del trasplante, desarrolla un exantema extenso con descamación. También tiene ictericia y diarrea acuosa. Una biopsia de piel revela apoptosis de queratinocitos a lo largo de la unión dermoepidérmica, con infiltrados linfocíticos en la dermis superior. ¿Cuál de los siguientes mecanismos inmunitarios es más probable que ocasione estas complicaciones del trasplante de células madre recibido?

A Enfermedad del injerto contra el huésped aguda

B Citotoxicidad mediada por células y dependiente de anticuerpos

C Reacción de hipersensibilidad de tipo tardío

D Formación de inmunocomplejos

E Liberación de citocinas por los mastocitos

38 Un niño de 4 años tiene antecedentes de infecciones sinopulmonares de repetición por *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pneumoniae* desde los 17 meses de edad. También desarrolló artritis que mejoró con inmunoglobulina intravenosa. En la exploración física, está en el percentil 30 de talla y peso. La

temperatura es de 37,9 °C. No hay adenopatías, y resulta difícil palpar los ganglios linfáticos. No presenta hepatoesplenomegalia. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de proteínas séricas totales de 5,1 g/dl y de albúmina de 4,6 g/dl. La biopsia de un ganglio linfático revela centros germinales rudimentarios. En los 10 años siguientes el niño desarrolla artralgias y exantemas cutáneos eritematosos y tiene un resultado positivo en la prueba de ANA. ¿Cuál de los siguientes tipos de célula no se ha desarrollado en este paciente?

A Linfocito CD4+
B Linfocito CD8+
C Célula dendrítica folicular
D Monocito
E Linfocito citolítico natural
F Linfocito B
G Célula madre totipotencial

39 Un niño de 2 años ha presentado infecciones prácticamente continuas desde que tenía 6 meses. Entre las infecciones se cuentan impétigo, otitis media y neumonía. Los microorganismos cultivados han sido *Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae* y *Staphylococcus aureus.* También ha tenido diarrea, con presencia de quistes de *Giardia lamblia* en las muestras de heces. Los antecedentes familiares señalan que un hermano mayor con un trastorno similar falleció a consecuencia de infecciones generalizadas. Las dos hermanas del niño y los progenitores están sanos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que se encuentre en este niño?

A Ausencia de IgA
B Agammaglobulinemia
C Reducción de C3 del complemento
D Título elevado de ARN del VIH-1
E Resultado positivo en la prueba de ANA

40 Un niño de 12 años ha tenido múltiples infecciones de repetición desde los 2 años de edad, incluidas neumonía por *Pneumocystis jiroveci,* otitis media por *Streptococcus pneumoniae* e infección urinaria por *Pseudomonas aeruginosa.* En la exploración física su temperatura es de 38,5 °C y tiene eritema faríngeo con exudado. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de

hemoglobina de 9,1 g/dl; de hematocrito del 27,6%; de plaquetas de 130.900/mm^3, y de leucocitos de 3.440/mm^3 con el 47% de neutrófilos segmentados, el 3% de cayados, el 40% de linfocitos y el 10% de monocitos. Las concentraciones séricas de inmunoglobulinas ponen de manifiesto unas concentraciones de IgG muy baja, de IgM muy alta y de IgA indetectable. Un frotis de sangre periférica revela eritrocitos nucleados. ¿Cuál de los siguientes defectos inmunitarios es más probable que cause esta enfermedad?

A Ausencia de adenosina desaminasa
B Interacción anómala entre CD40-CD40L
C Deleción del cromosoma 22q11
D Infección por el VIH
E Ausencia de producción de IgA por los linfocitos B
F Mutación del gen *BTK*

41 Un niño de 4 años previamente sano ha tenido faringitis con fiebre y malestar general durante 1 semana. En la exploración física presenta adenopatías y hepatoesplenomegalia. Los análisis serológicos demuestran la presencia de una infección por el virus de Epstein-Barr. La citometría de flujo revela la presencia de linfocitos NK, pero se encuentra que no funcionan cuando se evalúan *in vitro.* Hay hipogammaglobulinemia. El niño desarrolla un linfoma no hodgkiniano de linfocitos B. Su hermano de 2 años sigue una evolución similar a partir de los 5 años. ¿Cuál de los siguientes trastornos inmunitarios subyacentes explica mejor los hallazgos?

A Síndrome de DiGeorge
B Infección por el VIH y sida
C Inmunodeficiencia combinada grave
D Síndrome de Wiskott-Aldrich
E Trastorno linfoproliferativo ligado al cromosoma X

42 Una mujer de 30 años da a luz a término una niña de aspecto normal. Una hora después de nacer presenta tetania. En la exploración física, está en el percentil 55 de talla y peso. Las pruebas de laboratorio muestran unas cifras de calcio sérico de 6,3 mg/dl y de fósforo de 3 mg/dl. En el año siguiente, la lactante tiene episodios de neumonía causados por *Pneumocystis jiroveci* y *Aspergillus fumigatus* e infecciones respiratorias altas por los virus

paragripal y del herpes simple. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que determine el desarrollo de las manifestaciones clínicas observadas en esta lactante?

A Contagio de la infección por el VIH materna durante el parto
B Ausencia de diferenciación de los linfocitos pre-B en linfocitos B
C Alteración de la maduración de los linfocitos B a células plasmáticas
D Ausencia del gen codificante de adenosina desaminasa
E Malformación de la tercera y cuarta bolsas faríngeas

43 Un lactante de 3 meses ha tenido infecciones de repetición de las vías respiratorias, urinarias y digestivas desde el nacimiento. Los microorganismos infecciosos han sido *Candida albicans, Pneumocystis jiroveci, Pseudomonas aeruginosa,* rotavirus y citomegalovirus. A pesar del tratamiento intensivo con antibióticos y antifúngicos, fallece a los 5 meses de edad. En la autopsia, los ganglios linfáticos son pequeños con muy pocos linfocitos y sin centros germinales. El timo, las placas de Peyer y las amígdalas son hipoplásicos. Hay antecedentes familiares de otros varones con hallazgos similares. ¿Cuál de las siguientes alteraciones inmunitarias describe mejor la anomalía que causó la enfermedad del paciente?

A Déficit de linfocitos CD4 debido a una infección congénita por el VIH
B Deleción del cromosoma 22q11
C Mutación en la cadena γ común de los receptores de citocinas
D Mutación en el gen de la tirosina cinasa de Bruton *(BTK)*
E Mutación del ligando de CD40

44 Un niño de 14 meses ha tenido múltiples infecciones desde el nacimiento: neumonía por *Pseudomonas aeruginosa,* adenovirus y *Aspergillus fumigatus;* diarrea por *Isospora belli;* otitis media por *Haemophilus influenzae,* e infección de las vías urinarias por *Candida albicans.* Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 13,2 g/dl; de hematocrito del 39,7%; de plaquetas de 239.100/mm^3, y de leucocitos de 3.450/mm^3 con un 85% de neutrófilos segmentados, un 6% de cayados, un 2% de linfocitos y un 7% de monocitos. Las concentraciones séricas de inmunoglobulinas son de 118 mg/dl de IgG; de 14 mg/dl de IgM, y

de 23 mg/dl de IgA. El niño fallece por una neumonía. En la autopsia se observa un timo hipoplásico, ganglios linfáticos pequeños sin centros germinales y escaso tejido linfoide asociado al intestino. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que sea la causa de esta enfermedad?

A Ligando de CD40 anómalo
B Déficit de adenosina desaminasa
C Mutación del gen *BTK*
D Deleción del cromosoma 22q11
E Déficit de C2 del complemento
F Infección congénita por el VIH

45 Una mujer de 39 años acude a su médico por disnea grave de inicio agudo. En la exploración física no tiene fiebre y presenta estridor laríngeo marcado y obstrucción grave de las vías respiratorias. Los antecedentes médicos revelan que ha sufrido episodios similares desde la infancia y cuadros de dolor abdominal de tipo cólico. Su madre y su hermano presentan manifestaciones clínicas similares. No hay antecedentes de infecciones graves o recidivantes. No tiene urticaria. Las pruebas de laboratorio muestran que las cifras de leucocitos, hematocrito y plaquetas son normales. ¿Cuál de los siguientes componentes del plasma es más probable que sea deficiente y produzca estos hallazgos?

A β_2-microglobulina
B Inhibidor de C1
C C3
D 5-hidroxitriptamina
E IgA
F IgE

46 Un hombre de 48 años siempre ha estado sano; tan solo ha presentado diarrea leve ocasionalmente. En la exploración física la temperatura es de 37,1 °C, y la presión arterial, de 125/85 mmHg. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de leucocitos totales de 6.900/mm^3 con un 72% de neutrófilos segmentados, un 3% de cayados, un 18% de linfocitos y un 7% de monocitos. Las concentraciones séricas de inmunoglobulinas son de 1,9 g/dl de IgA; de 0,3 g/dl de IgM, y de 0,01 g/dl de IgA. Los ANA son negativos. El resultado de la prueba cutánea con antígeno de *Candida* es positivo. ¿Cuál de los siguientes microorganismos

representa el mayor riesgo de infección para este paciente?

A *Aspergillus flavus*
B Virus de la hepatitis B
C Virus del herpes simple
D *Pneumocystis jiroveci*
E *Streptococcus pneumoniae*

47 Un niño de 4 años ha tenido infecciones respiratorias de repetición por múltiples patógenos bacterianos y víricos en los últimos 3 años. En la exploración física se aprecia eccema en tronco y extremidades. Los hallazgos de laboratorio son recuento de plaquetas de 71.000/mm^3 y de leucocitos de 3.800/mm^3 con un 88% de neutrófilos segmentados, un 6% de cayados, un 3% de linfocitos y un 3% de monocitos. Las concentraciones séricas de inmunoglobulinas revelan unas cifras de IgG normal, de IgM baja y de IgA elevada. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que desarrolle el paciente?

A Demencia
B Hipocalcemia
C Glomerulonefritis
D Linfoma
E Artritis reumatoide

48 Una mujer de 28 años con antecedentes de 9 años de adicción a drogas por vía parenteral ha desarrollado diarrea acuosa crónica que ha persistido durante la última semana. En la exploración física no hay fiebre y la paciente presenta una leve atrofia muscular. Su índice de masa corporal es de 18. Las pruebas de laboratorio de las heces revelan quistes de *Cryptosporidium parvum.* Un mes después desarrolla meningitis criptocócica, tratada con éxito. Al mes siguiente se diagnostica candidiasis oral. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que sufra esta paciente?

A Astrocitoma cerebral
B Carcinoma de células claras del cuello uterino
C Linfoma no hodgkiniano cerebral
D Adenocarcinoma pulmonar
E Sarcoma retroperitoneal

49 Un hombre de 41 años lleva 8 años infectado por el VIH. Comenzó a recibir tratamiento antirretrovírico, que se ha mantenido durante los últimos 18 meses con un régimen a base de

múltiples fármacos. La concentración de ARN del VIH-1 descendió inicialmente a menos de 50 copias/µl tras instaurar el tratamiento; la cifra actual es de 5.120 copias/µl. ¿En el gen de cuál de las siguientes moléculas es más probable que se hayan producido mutaciones?

A Ligando de CD40
B Receptor de quimiocinas
C Cadena γ del receptor de citocinas
D Antígeno p24
E Tirosina cinasa de proteínas
F Transcriptasa inversa

50 Una mujer previamente sana sufrió a los 19 años de edad una enfermedad aguda con fiebre, mialgia, faringitis y exantema eritematoso leve en el abdomen y los muslos. Estos síntomas cedieron en 1 mes. Posteriormente estuvo sana durante 10 años. En el momento actual presenta reducción de la agudeza visual y dolor en el ojo derecho. La oftalmoscopia muestra los hallazgos de la retinitis por citomegalovirus. La inspección de la cavidad bucal revela muguet (candidiasis). ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que estuviera presente después del comienzo de los problemas oculares?

A Título de ANA de 1:1.024
B Título de anticuerpos anticentrómero de 1:512
C Recuento de linfocitos CD4+ de 102/µl
D HLA-B27 positivo
E Concentración sérica total de globulinas de 650 mg/dl

51 En los estudios epidemiológicos de la infección por el VIH y sida, los investigadores se percataron de que ciertas personas no desarrollaban la infección por el VIH a pesar de una exposición conocida al virus en condiciones que causaban enfermedad por el VIH a todos los demás individuos expuestos a él de un modo similar. Cuando se incuban linfocitos CD4+ de las personas resistentes con el VIH-1, no se infectan. ¿Cuál de los siguientes componentes celulares es más probable que haya sufrido una mutación genética como causa de esa resistencia a la infección por el VIH?

A Receptor CD28
B Receptor de quimiocinas

C Receptor de Fc
D Receptor de interleucina 2
E Receptor de linfocitos T

52 Se realiza un estudio epidemiológico para determinar los factores de riesgo de la infección por el VIH. El estudio constata que las personas con enfermedades de transmisión sexual coexistentes, como, por ejemplo, chancro blando, tienen más probabilidad de infectarse por el VIH. Se plantea que la superficie mucosa inflamada es un lugar ideal para la transmisión del VIH durante el coito. ¿Cuál de las siguientes células de esas superficies mucosas es más importante en la transmisión del VIH a los linfocitos T CD4+?

A Linfocitos CD8+
B Células de Langerhans
C Linfocitos citolíticos naturales
D Neutrófilos
E Células plasmáticas

53 Una mujer de 34 años infectada por el VIH comienza a tener dificultades en las actividades de la vida diaria. Presenta problemas de memoria y menor capacidad de realizar funciones que requieren un control motor fino, como escribir y pintar. El recuento de linfocitos CD4+ actual es de 150/µl. ¿Cuál de los siguientes tipos de célula es más importante para la diseminación de la infección al sistema nervioso central?

A Linfocito CD8+
B Célula de Langerhans
C Macrófago
D Linfocito citolítico natural
E Neutrófilo

54 Un hombre de 45 años lleva unos días con fiebre, tos y disnea progresiva. En la exploración física, la temperatura es de 39,2 °C. La auscultación del tórax revela una disminución del murmullo vesicular en todos los campos pulmonares. Se realiza un lavado broncoalveolar, y en el líquido obtenido se encuentran quistes de *Pneumocystis jiroveci.* Las pruebas de laboratorio muestran un recuento de linfocitos CD4+ de 135/µl; una concentración sérica de globulinas totales de 2,5 g/dl, y una cifra de leucocitos de 7.800/mm^3, con un 75% de neutrófilos segmentados, un 8% de

cayados, un 6% de linfocitos, un 10% de monocitos y un 1% de eosinófilos. ¿Cuál de los siguientes resultados serológicos de laboratorio es más probable que resulte positivo en este paciente?

A Anticuerpos contra el VIH
B Anticuerpos anti-ADN bicatenario
C Autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos
D Antiestreptolisina O
E Anticuerpos contra linfocitos

55 Un joven de 17 años ha sido sexualmente activo durante los últimos 3 años. Lleva 3 semanas con fiebre, adenopatías y faringitis. Las pruebas serológicas revelan que es positivo para el VIH. Actualmente está sano y no consume drogas por vía intravenosa. ¿Cuál de las siguientes evoluciones es más probable en el año siguiente?

A Aparición de un linfoma no hodgkiniano extraganglionar
B Desarrollo de meningitis criptocócica
C Negatividad serológica en la repetición de las pruebas del VIH
D Transmisión de la infección al mantener relaciones sexuales sin protección
E Empeoramiento de la función cognitiva y motora



56 Un hombre de 37 años con VIH ha notado un aumento del número y del tamaño de las lesiones cutáneas que tiene en la cara, el tronco y las extremidades, mostradas en la figura, en los últimos 18 meses. Algunas de las lesiones más grandes parecen ser nodulares. ¿De cuál de los siguientes virus es más probable que sea el genoma que revele el análisis molecular de las células fusiformes presentes en esas lesiones cutáneas?

A Adenovirus
B Citomegalovirus
C Virus de Epstein-Barr
D VIH-1
E Virus del herpes humano 8

57 Un hombre de 40 años lleva 10 infectado por el VIH. Durante este tiempo, ha sufrido varios brotes de candidiasis oral pero ninguna enfermedad importante. En el momento actual se le diagnostica un sarcoma de Kaposi en la piel. Ha perdido 7 kg en los últimos 6 meses. Las pruebas de laboratorio revelan que la

carga vírica de ARN del VIH-1 es ahora de 60.000 copias/ml. ¿Cuál de los siguientes tipos de célula está más disminuido en sus ganglios linfáticos?

A Linfocito CD4+
B Linfocito CD8+
C Linfocito CD19+
D Macrófago
E Linfocito citolítico natural
F Célula plasmática



58 Un hombre de 63 años lleva 4 meses con dolor de espalda y

malestar general progresivamente mayores. En la exploración física, no hay fiebre y tiene atrofia muscular leve. Las pruebas de laboratorio muestran concentraciones de creatinina sérica de 4,5 mg/dl y de nitrógeno ureico de 44 mg/dl. Una tira reactiva de orina revela la ausencia de sangre, proteínas y glucosa, pero un análisis específico para la proteína de Bence-Jones obtiene un resultado positivo. La radiografía de la columna muestra lesiones redondeadas transparentes. La figura presenta la imagen microscópica del hígado con tinción con rojo Congo *(A)* y luz polarizada *(B).* ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que tenga este paciente?

A Espondilitis anquilosante
B Inmunodeficiencia variable común
C Mieloma múltiple
D Fiebre reumática
E Esclerosis sistémica

59 Un hombre de 63 años tiene artritis crónica desde hace 15 años. La exploración física revela desviación cubital con anquilosis ósea que produce deformidad en cuello de cisne de los dedos de la mano. Las pruebas de laboratorio muestran 4,2 g de proteínas en la orina de 24 h y concentraciones de creatinina sérica de 3,1 g/dl y de nitrógeno ureico de 3 g/dl. La concentración de proteína C reactiva está muy elevada. Se realiza una biopsia rectal, que pone de manifiesto un depósito de material amorfo rosado en la mucosa con la tinción de H-E. El material se tiñe con rojo Congo. ¿Cuál de las siguientes proteínas es el precursor más probable de este material de la mucosa?

A Reactante de fase aguda
B β_2-microglobulina
C Cadenas ligeras λ
D Transtiretina
E Factor reumatoide
F Proteína C reactiva

60 Un hombre de 79 años presenta insuficiencia cardíaca congestiva progresivamente más grave, y edema pulmonar y periférico en los últimos 4 años. En la exploración física, presenta temperatura de 36,9 °C, frecuencia cardíaca de 70 latidos/min frecuencia respiratoria de 16 respiraciones/min y presión arterial

de 120/75 mmHg. El ecocardiograma revela cardiomegalia con dilatación de las cuatro cavidades. Todas las pruebas de laboratorio, incluidos la electroforesis de proteínas séricas y un examen de un frotis de médula ósea, son normales. Una biopsia endomiocárdica muestra depósitos intersticiales de un material amorfo positivo para tinción con rojo Congo. ¿Cuál de las siguientes proteínas es más probable que sea precursora de este material?

A α-fetoproteína
B β_2-microglobulina
C Calcitonina
D IgE
E Cadenas ligeras
F Transtiretina
G Troponina T

Respuestas

1 **D** Las células infectadas por virus son reconocidas y destruidas por linfocitos T CD8+ citotóxicos. El receptor de linfocitos T sobre los CD8+ se une al complejo de péptido vírico y moléculas del CPH de clase I presentadas en la superficie de la célula infectada. Los linfocitos citolíticos naturales (NK, del inglés *natural killer*) también reconocen las moléculas del CPH de clase I con péptidos propios, pero este autorreconocimiento inhibe la destrucción por linfocitos NK. Los virus que inhiben la expresión de péptidos del CPH de clase I podrían esconderse de las células citotóxicas pero no de los linfocitos NK. Las demás opciones no son la respuesta inmunitaria principal a la infección por el virus de la hepatitis.

2 **C** Los receptores de tipo NOD (NLR) del inflamasoma participan en el reconocimiento del sistema inmunitario innato de los cristales de urato y la promoción de la inflamación asociada a la gota. Estos receptores quizá contribuyan también a la inflamación de la ateroesclerosis. Los receptores de lectina de tipo C (CLR) expresados en la membrana plasmática de macrófagos y células dendríticas detectan glucanos fúngicos y desencadenan reacciones inflamatorias ante hongos. Los

receptores de manosa en los fagocitos reconocen azúcares microbianos con residuos de manosa terminales e inducen la fagocitosis del microbio. Los receptores de tipo RIG (RLR) están situados en el citosol de la mayoría de los tipos celulares y detectan ácidos nucleicos de virus que se replican en el citoplasma de las células infectadas, estimulando la producción de citocinas antivíricas. Los receptores de tipo señuelo (*toll;* TLR) de la membrana plasmática y vesículas endosómicas activan factores de transcripción que estimulan la síntesis y secreción de citocinas, así como la expresión de moléculas de adhesión destinadas a reclutar y activar leucocitos.

3 **B** El sistema inmunitario adaptativo requiere la presentación del antígeno a las células efectoras. Los patógenos intracelulares, como, por ejemplo, virus, son mostrados por moléculas del CPH de clase I a los linfocitos CD4 y CD8 con receptores de linfocitos T $\alpha\beta$. Algunos linfocitos CD8 secretan citocinas, pero la mayoría son citotóxicos. Los linfocitos B expresan receptores de inmunoglobulinas que reaccionan fundamentalmente ante antígenos extracelulares, como los derivados de bacterias, en la respuesta inmunitaria humoral adaptativa. Las células dendríticas son un tipo de célula presentadora de antígenos. Los linfocitos citolíticos naturales pertenecen a la inmunidad innata y reaccionan contra células que no muestren moléculas del CPH. Un subgrupo de linfocitos T por debajo de los epitelios muestran receptores $\gamma\delta$ que son parte de la respuesta inmunitaria innata.

4 **D** Los linfocitos citolíticos naturales (NK) pueden responder sin sensibilización previa. Poseen receptores para las moléculas del CPH de clase I, que inhiben su función lítica. Cuando la expresión de moléculas del CPH de clase I está reducida en la superficie de una célula por interferencia vírica, los receptores inhibidores de los linfocitos NK no reciben esa señal negativa, y la célula marcada es destruida. Con frecuencia, los linfocitos NK son la primera línea de defensa frente a las infecciones víricas. Los linfocitos CD4+ son linfocitos T colaboradores que ayudan a otras células, como linfocitos NK, macrófagos y linfocitos B, en la respuesta inmunitaria. Las células dendríticas colaboran en la presentación de antígenos. Los macrófagos fagocitan células

necróticas, y después procesan y enseñan cualquier antígeno extraño de esas células. Los neutrófilos aportan una respuesta inmunitaria inespecífica, principalmente ante infecciones bacterianas, no por infecciones víricas intracelulares.

5 **F** Los linfocitos citolíticos naturales (NK) poseen CD16, un receptor de Fc que les permite unirse a células opsonizadas y lisarlas. Esta es una forma de hipersensibilidad de tipo II con enfermedad mediada por anticuerpos. Los NK suman el 10-15% de los linfocitos circulantes. También pueden lisar células humanas que hayan perdido la expresión del CPH de clase I debido a infecciones víricas o a transformación neoplásica. Los linfocitos B cuentan con inmunoglobulinas de superficie y son positivos para CD19; participan en la inmunidad humoral. Los CD4+ son linfocitos T «colaboradores»; tienen receptores de linfocitos T y son positivos para CD3. Del mismo modo, los linfocitos CD8+ poseen receptores de linfocitos T y quedan marcados con CD3, pero actúan como linfocitos T citotóxicos. Las células dendríticas son un tipo de célula presentadora de antígenos que expresa grandes cantidades de moléculas del CPH de clase II. Los macrófagos expresan CPH de clase II y funcionan como células presentadoras de antígenos a los linfocitos CD4+; pueden fagocitar células opsonizadas.

6 **C** Las células dendríticas son un tipo de célula presentadora de antígenos. Las células dendríticas de los epitelios se conocen como *células de Langerhans,* y las presentes en los centros germinales reciben el nombre de *células dendríticas foliculares (CDF).* Estas últimas pueden infectarse por el VIH, pero este virus no las destruye. Poseen receptores de Fc en la superficie celular que capturan viriones del VIH recubiertos de anticuerpos a través de la porción Fc del anticuerpo. Estos viriones unidos a las CDF son capaces de infectar linfocitos CD4+ en tránsito. Las células dendríticas elaboran interferones de tipo I que regulan al alza las proteínas antivíricas en células próximas. Los linfocitos B pertenecen a la inmunidad humoral, y los anticuerpos contra el VIH carecen de función protectora, pero sí permiten la detección serológica de la infección. Los CD8+ son linfocitos citotóxicos que no tienen el receptor necesario para ser infectados por el VIH. Como sobreviven selectivamente, el

cociente CD4+:CD8+ se invierte, de modo que suele ser inferior a 1 en la infección avanzada por el VIH. Las células linfoides innatas se parecen a los linfocitos NK, pero conforman las siguientes reacciones linfoides. Las células gigantes de Langhans son «comités» de macrófagos activados que forman parte de las reacciones granulomatosas. Los macrófagos son un tipo de célula presentadora de antígenos que puede infectarse por el VIH sin destruirse. Los mastocitos cuentan con IgE unida a su superficie, que puede ligarse a antígenos (alérgenos) por reactividad cruzada, lo que causaría desgranulación y liberación de aminas vasoactivas, como la histamina, por ejemplo, como parte de la anafilaxia en la hipersensibilidad de tipo I.

7 **C** Los monocitos de la sangre que expresan antígenos del CPH de clase II pueden migrar a los tejidos y convertirse en macrófagos más duraderos. En la tuberculosis, estos macrófagos se transforman en células epitelioides, que contribuyen a la inflamación granulomatosa. Los macrófagos son importantes en las reacciones de hipersensibilidad tardía asociadas a inmunidad mediada por células. Los basófilos son los homólogos circulantes de los mastocitos y quizá participen en las respuestas inmunitarias mediadas por IgE. Los linfocitos B se transforman en células plasmáticas que segregan inmunoglobulinas al ser estimuladas y son una parte esencial de la inmunidad humoral. Los linfocitos citolíticos naturales pueden funcionar sin sensibilización previa. Los neutrófilos resultan importantes principalmente en las reacciones inflamatorias agudas, aunque es posible que haya algunos neutrófilos en los granulomas.

8 **B** Esta reacción anafiláctica sistémica es debida a una reacción de hipersensibilidad inmediata de tipo I en la que el antígeno activa la IgE unida a mastocitos con liberación de mediadores preformados, como la histamina. La adrenalina es la sustancia de acción más rápida para tratar este trastorno potencialmente mortal. La ciclosporina se usa con el fin de minimizar el rechazo de trasplantes mediado por linfocitos. Los glucocorticoides pueden reducir las reacciones inflamatorias inmunitarias, pero esto se produce a lo largo de días a semanas, no en minutos. El metotrexato resulta útil en el tratamiento de la enfermedad del

injerto contra el huésped y en el de algunas neoplasias malignas. La penicilina es un antibiótico que puede inducir reacciones de hipersensibilidad de tipo I en personas sensibilizadas.

9 **B** Este cuadro es típico de la reacción de fase tardía en la hipersensibilidad de tipo I. La respuesta rápida inicial está causada, mayormente, por la desgranulación de los mastocitos. Después aparece la reacción de fase tardía sin más exposición al antígeno, y está caracterizada por un infiltrado más intenso de células inflamatorias, como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos CD4+ T_H2. Hay más destrucción tisular en esta fase tardía. La célula más característica en las secreciones de una respuesta alérgica es el eosinófilo. En el epitelio permanecen células dendríticas, linfocitos y mastocitos. Los linfocitos NK no son un elemento de las reacciones alérgicas prototípicas.

10 **A** Tiene el síndrome de Goodpasture, en el que hay autoanticuerpos dirigidos contra el colágeno de tipo IV de las membranas basales de los glomérulos y del pulmón. Se trata de un tipo de reacción de hipersensibilidad de tipo II. Los anticuerpos se unen a la membrana basal y fijan el complemento, con lo que lesionan los glomérulos. Los anticuerpos anticardiolipina, junto al «anticoagulante lúpico» anti-β_2-glucoproteína, se encuentran en el síndrome antifosfolipídico, que puede aparecer en el lupus eritematoso sistémico (LES). Estos pacientes presentan coagulopatía con trombosis, hemorragias o ambas. Los anticuerpos anti-ADN bicatenario tienen especificidad para el LES, mientras que los antihistona son característicos del LES inducido por fármacos. Los anticuerpos anti-SS-A aparecen en el síndrome de Sjögren. El anticuerpo antirribonucleoproteína U1 se observa en la enfermedad mixta del tejido conjuntivo (EMTC).

11 **C** Las reacciones de transfusión graves son consecuencia de una reacción de hipersensibilidad de tipo II. El suero del paciente contiene anticuerpos naturales contra los eritrocitos del donante incompatible. Se unen a los eritrocitos del donante e inducen la activación del complemento, lo que determina la producción del complejo de ataque a la membrana C5-9. Las reacciones de transfusión graves son infrecuentes y la mayoría

de ellas se deben a errores administrativos. La lisis por linfocitos citolíticos naturales se observa en las enfermedades mediadas por anticuerpos. La formación de complejos antígeno-anticuerpo es típica de las reacciones de hipersensibilidad de tipo III. Los mastocitos se desgranulan ante la unión de un antígeno a la IgE en las reacciones de hipersensibilidad de tipo I. El factor de necrosis tumoral α no forma parte de las reacciones de hipersensibilidad.

12 **A** La miastenia grave es una forma de reacción de hipersensibilidad de tipo II en la que los anticuerpos están dirigidos contra receptores de la superficie celular. Es probable que exista hiperplasia tímica o un timoma. Los anticuerpos contra receptores de acetilcolina alteran la función de las placas terminales motoras en los músculos esqueléticos, lo que provoca debilidad muscular. Los linfocitos B producen estos anticuerpos; los macrófagos no son un elemento importante en esta reacción de hipersensibilidad, y apenas hay inflamación muscular en la miastenia grave. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo tardío son más frecuentes en las infestaciones parasitarias de los músculos. La lesión mediada por inmunocomplejos es característica de la dermatomiositis. La lisis muscular por linfocitos CD8+ se encuentra en la polimiositis.

13 **B** Cuando los anticuerpos están dirigidos a una infección parasitaria, hay inflamación mediada por el receptor de Fc y fagocitosis, característicos de la CCAC. Los anticuerpos IgG e IgE con receptores Fc recubren al parásito. Los macrófagos, linfocitos citolíticos naturales y neutrófilos pueden entonces reconocer el receptor Fc y destruir las células en cuestión recubiertas por anticuerpos. Las reacciones inflamatorias agudas con formación de abscesos apenas tienen efectos contra los parásitos tisulares. La lisis mediada por el complemento es más característica de la destrucción inmunitaria de los eritrocitos con la hemólisis. Las células gigantes de Langhans aparecen en la inflamación granulomatosa, una forma de hipersensibilidad de tipo IV. El leucotrieno C_4 es una sustancia potente que promueve la permeabilidad vascular y la contracción del músculo liso bronquial en las reacciones de hipersensibilidad de tipo I.

14 **B** En la reacción por inmunocomplejos localizada (reacción de

Arthus) en el punto de inyección pueden existir activación y depleción de C3 del complemento. La reacción descrita en la pregunta es una enfermedad del suero en respuesta a la proteína ajena inyectada y produjo un depósito de complejos antígeno-anticuerpo más diseminado, especialmente en los riñones. Los linfocitos CD4+ colaboran en varias reacciones inmunitarias mediadas por anticuerpos y células, pero su cifra en sangre periférica no varía de forma apreciable. La concentración de IgE está aumentada en personas con atopia y posible hipersensibilidad de tipo I. Aunque los neutrófilos son reclutados localmente a la reacción inflamatoria en este caso, no hay una depleción sistémica, y es posible que aumenten en la circulación. La trombocitopenia podría aparecer en caso de una microangiopatía trombótica, como la púrpura trombótica trombocitopénica, pero típicamente no existe en la reacción de Arthus.

15 **A** Los linfocitos CD4+ del tipo T_H2 son esenciales para la inducción de la hipersensibilidad de tipo I porque secretan citocinas, como interleucina (IL) 3, IL-4, IL-5 y factor estimulador de las colonias de granulocitos y macrófagos, que son necesarios para el crecimiento, el reclutamiento y la activación de mastocitos y eosinófilos. Las células dendríticas atrapan antígenos y ayudan a su presentación. Los macrófagos son también células presentadoras de antígenos y secretan varias citocinas, pero no resultan esenciales en la hipersensibilidad de tipo I. Los linfocitos citolíticos naturales pueden lisar otras células, como las infectadas por virus, sin sensibilización previa. Las citocinas reclutan neutrófilos para que participen en las reacciones inflamatorias agudas.

16 **E** El subgrupo T_H17 de los linfocitos CD4 participa en las reacciones de hipersensibilidad de tipo tardío. Muchas personas reaccionan al níquel, especialmente al presente en *piercings.* La IL-17 podría ser útil también en el reclutamiento de neutrófilos para combatir infecciones bacterianas y por hongos, como aspergilosis y candidiasis. La IL-2 sirve de factor de crecimiento autocrino al promover la proliferación de linfocitos T. La IL-5 activa eosinófilos en las respuestas de T_H2. La IL-10 es una citocina inmunodepresora que reduce la activación de linfocitos.

Los linfocitos NK pueden secretar interferón γ en respuesta a la estimulación por IL-12.

17 **C** La acumulación perivascular de linfocitos T, especialmente de CD4+, es típica de las reacciones cutáneas de hipersensibilidad tardía, inducida por una respuesta de T_H1 mediada mayormente por la liberación de la citocina interleucina 2. La prueba cutánea de tuberculina también funciona por esa vía. La anafilaxia (hipersensibilidad de tipo I) suele aparecer de minutos a horas después de la exposición a un antígeno para el que se ha producido sensibilización; la forma localizada podría tener lugar tras la ingesta de la proteína ajena antigénica. Las enfermedades por inmunocomplejos sistémicas y localizadas (reacción de Arthus y enfermedad del suero) son reacciones de hipersensibilidad de tipo III; a menudo presentan vasculitis. La enfermedad del injerto contra el huésped se caracteriza por apoptosis epidérmica y exantema en personas que reciben un trasplante alógeno de células madre hematopoyéticas.

18 **C** Las proteínas M estreptocócicas tienen reactividad cruzada con glucoproteínas cardíacas, con desarrollo de una cardiopatía reumática, una forma de autoinmunidad. Las demás opciones reseñadas no son respuestas inmunitarias importantes a la infección estreptocócica. El colapso de la anergia de los linfocitos T suele producirse cuando el daño tisular y la inflamación localizados causan una regulación al alza de moléculas coestimuladoras en los tejidos diana. Este es un posible mecanismo de la autoinmunidad en el encéfalo y los islotes de células β pancreáticas. Aún no se ha demostrado que el fracaso de la supresión mediada por linfocitos T cause enfermedades autoinmunitarias; sigue siendo un mecanismo potencial. Ciertos productos microbianos, como endotoxinas o superantígenos bacterianos, pueden causar activación policlonal de linfocitos. La liberación de antígenos secuestrados puede provocar autoinmunidad; este mecanismo es probable en la uveítis autoinmunitaria (oftalmía simpática) que se produce después de traumatismos oculares.

19 **B** Esta joven tiene un cuadro clásico de lupus eritematoso sistémico (LES): el exantema malar eritematoso cutáneo

mostrado en la figura junto a insuficiencia renal con proteinuria y hematuria debida al depósito de inmunocomplejos en los glomérulos. El defecto de la eliminación y, por tanto, la mayor carga de cuerpos apoptósicos nucleares en el desarrollo de los linfocitos tímicos se consideran un mecanismo fundamental subyacente al LES. Esto, junto a la pérdida de tolerancia a los antígenos nucleares propios, origina los inmunocomplejos patogénicos de ADN y anti-ADN, medidos por la prueba de anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antifosfolipídicos pueden estar presentes en el LES, pero provocan coagulopatía. El IFN-γ es un producto de los linfocitos T CD4+ y NK. No hay indicios de hipersensibilidad tardía ni disfunción de linfocitos NK en el LES. El mimetismo molecular se produce cuando un antígeno microbiano presenta reactividad cruzada con un tejido normal, como sucede en la fiebre reumática. La activación generalizada e inespecífica de los linfocitos T por parte de superantígenos tiene lugar en el síndrome del shock tóxico.

20 **E** Entre las características serológicas del lupus eritematoso sistémico (LES) se encuentran una mayor sensibilidad de la prueba de ANA y una mayor especificidad de la anti-ADNbc. Las alteraciones en las pruebas de coagulación indican la presencia de anticuerpos anticardiolipina. Estos anticuerpos dirigidos contra complejos fosfolípido-proteína (anticuerpos antifosfolipídicos) también se llaman *anticoagulantes lúpicos* porque interfieren en las pruebas de coagulación *in vitro.* En el organismo vivo son trombógenos. Por tanto, estos pacientes pueden sufrir trombosis de repetición. También es posible la presencia de anticoagulantes lúpicos en ausencia de LES. No es probable que las demás opciones reseñadas sean complicaciones frecuentes o asociadas a LES.

21 **D** Muchos pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) tienen glomerulonefritis, puesta de manifiesto por proteinuria con hematuria, y en último término desarrollan insuficiencia renal. La ceguera es infrecuente en el LES. El fenómeno de Raynaud se asocia a muchas enfermedades autoinmunitarias, pero es más problemático en la esclerodermia. Aunque la inflamación sinovial es frecuente en el LES, las deformidades articulares no lo son. La endocarditis de Libman-Sacks asociada

al LES tiende a ser limitada y no deformante, de modo que la lesión valvular es mínima. Hoy día es infrecuente por el uso de corticoesteroides en el tratamiento del LES.

22 **C** Los pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) pueden desarrollar anticuerpos frente a eritrocitos, que pueden causar anemia hemolítica. Las citopenias, incluidas la leucopenia, la trombocitopenia y la anemia, también son frecuentes. La broncoconstricción es una característica del asma bronquial y es posible que aparezca en la alergia como reacción de hipersensibilidad predominantemente de tipo I. Los linfomas cerebrales son infrecuentes, pero pueden producirse en pacientes inmunodeprimidos, especialmente personas con sida. El síndrome de Sjögren cursa con queratoconjuntivitis debido a la menor producción de lágrimas secundaria a la inflamación de las glándulas lagrimales. La sacroilitis es una manifestación de muchas de las espondiloartropatías, como la espondilitis anquilosante. La esclerodactilia aparece en la esclerodermia. Cuando es extensa, suele formar parte del conjunto de hallazgos asociados a esclerodermia difusa; si solo afecta a unas pocas áreas de piel (p. ej., únicamente las manos), es más probable que indique una esclerodermia limitada (síndrome CREST).

23 **D** La figura muestra las denominadas lesiones capilares glomerulares en asa de alambre de la nefritis lúpica. Los anticuerpos Smith y anti-ADN bicatenario son más específicos del lupus sistémico eritematoso, pero la sensibilidad es baja: los anticuerpos anti-Smith solo están presentes en el 25% de los casos de LES. Los anticuerpos anticentrómero aparecen con más frecuencia en la esclerodermia limitada, mientras que los anticuerpos anti-ADN topoisomerasa I se encuentran en la esclerodermia difusa. El polipéptido citrulinado cíclico y el factor reumatoide son más frecuentes en la artritis reumatoide. El anti-RNP-U1 puede presentarse en la enfermedad mixta del tejido conjuntivo.

24 **C** Un trastorno similar al lupus sistémico eritematoso (LES) inducido por fármacos puede estar causado por compuestos tales como isoniacida, procainamida e hidralacina. Los resultados de las pruebas de ANA suelen ser positivos, pero los anticuerpos anti-ADN bicatenario resultan negativos. En

muchos casos hay anticuerpos antihistona. Es posible que no haya signos ni síntomas característicos del LES, y la afectación renal es infrecuente. La remisión se produce cuando el paciente deja de tomar el fármaco. Los anticuerpos anti-Sm muestran especificidad para el LES. Los anticuerpos anti-Jo-1 son específicos de polimiositis/dermatomiositis. Los anticuerpos antirribonucleoproteína U1 tienen especificidad para la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Es más probable que los anticuerpos anticentrómero aparezcan en la esclerodermia limitada (síndrome CREST). Los anti-SS-A son más característicos del síndrome de Sjögren.

25 **C** La figura muestra extensos depósitos densos dentro de la membrana basal glomerular característicos de la glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos. Estos activan el complemento y provocan inflamación aguda. La inflamación granulomatosa y la citotoxicidad por linfocitos T son características de la hipersensibilidad de tipo IV. La citotoxicidad mediada por células y dependiente de anticuerpos se pone en marcha cuando IgG o IgE recubre una diana para atraer a las células que participan en la lisis; no se forman inmunocomplejos. La anafilaxia localizada es una reacción de hipersensibilidad de tipo I mediada por anticuerpos IgE.

26 **E** Tiene lupus eritematoso discoide, con lesiones cutáneas similares a las del lupus eritematoso sistémico (LES), pero con mucha menos probabilidad de sufrir una afectación sistémica. Los ácidos nucleicos propios remedan sus homólogos microbianos y, junto a los TLR, inducen la producción de interferón de tipo I, que activa las células dendríticas y los linfocitos B. También promueven una respuesta de T_H1, que contribuye a la autoinmunidad. La desgranulación de los mastocitos en la hipersensibilidad de tipo I puede provocar un exantema urticarial, pero no hay depósito de complejos antígeno-anticuerpo autoinmunitarios. Es posible que una infección se siga de mimetismo molecular y conduzca a la activación policlonal de linfocitos B, pero en las enfermedades autoinmunitarias participan antígenos propios, no exógenos. La liberación de antígenos secuestrados es el mecanismo de la oftalmía simpática. Las respuestas de T_H17 pueden estar

presentes en trastornos inflamatorios crónicos, como la enfermedad inflamatoria intestinal con infiltrados de macrófagos y neutrófilos.

27 **B** El síndrome de Sjögren se caracteriza por la destrucción mediada por la inmunidad de las glándulas salivales y lagrimales y otras glándulas exocrinas que revisten las vías respiratorias y el tubo digestivo. La sequedad y la descamación de la nariz pueden culminar en la perforación del tabique nasal. En el 25% de los casos se afectan tejidos extraglandulares, como pulmón, piel, riñón y músculo. La desregulación inmunitaria que acompaña a las enfermedades autoinmunitarias aumenta el riesgo de neoplasias malignas linfoides de linfocitos B, como el linfoma MALT. La endocarditis de Libman-Sacks es con más frecuencia una característica del lupus eritematoso sistémico (LES). La insuficiencia renal resulta más probable en el LES por glomerulonefritis. Las alteraciones de la motilidad esofágica son propias de la esclerodermia. Si no es extensa, habitualmente es indicativa de esclerodermia limitada (síndrome CREST); cuando es extensa, apunta a esclerodermia difusa, con peor pronóstico. Los cánceres de glándulas salivales no suelen asociarse a enfermedades autoinmunitarias. En la artritis reactiva aparece uretritis no gonocócica, junto a conjuntivitis y artritis.

28 **D** El síndrome de Sjögren afecta principalmente a las glándulas salivales y lagrimales. La mayoría de estos pacientes tienen anticuerpos contra SS-B. Los anticuerpos anti-ADN bicatenario son específicos del lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos anticentrómero aparecen con más frecuencia en la esclerosis sistémica limitada, mientras que los anti-ADN topoisomerasa lo hacen en la esclerosis sistémica difusa. La RNP-U1 es un marcador de la enfermedad mixta del tejido conjuntivo (EMTC).

29 **B** La esclerosis sistémica difusa (esclerodermia) inicialmente se manifiesta en la piel de forma generalizada, pero progresa rápidamente a la afectación de órganos viscerales, incluidas las arterias pequeñas del riñón. Estas resultan dañadas por una arterioloesclerosis hiperplásica que puede complicarse con presión arterial muy elevada e insuficiencia renal. La insuficiencia hepática y la meningitis no son características

típicas de las enfermedades autoinmunitarias. En la esclerodermia, el tubo digestivo se fibrosa, con obstrucción y malabsorción, pero no hay tendencia a la perforación ni a la ulceración. Los factores de riesgo del carcinoma epidermoide esofágico son tabaquismo y abuso de alcohol.

30 **B** Esta paciente presenta las manifestaciones cutáneas y viscerales de la esclerosis sistémica difusa (esclerodermia difusa). El fenómeno de Raynaud, las alteraciones de la piel y los problemas de motilidad esofágica también aparecen en la esclerodermia limitada (anteriormente llamada síndrome CREST), pero no es característico que haya afectación pulmonar ni renal. En la esclerosis sistémica difusa suele estar presente el anticuerpo anti-ADN topoisomerasa I, y los pacientes pueden desarrollar neumopatía intersticial y enfermedad renal con arterioloesclerosis hiperplásica. Una característica del lupus eritematoso discoide son los exantemas cutáneos, pero los órganos internos suelen estar respetados. La espondilitis anquilosante es una de las espondiloartropatías; se caracteriza por dolor lumbar secundario a sacroilitis y serología positiva para HLA-B27. En la artritis reumatoide se producen, por lo general, deformidades articulares progresivas; las pruebas serológicas con más probabilidad de ser positivas son las del factor reumatoide y las de los anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico (anti-CCP). Los anticuerpos anti-Smith y anti-ADN bicatenario son más específicos del lupus eritematoso sistémico, y la enfermedad renal de estos pacientes más probablemente se deba a glomerulonefritis.

31 **A** Tiene esclerosis sistémica (esclerodermia). Se cree que los linfocitos CD4+ responden a alguna estimulación antigénica desconocida liberando citocinas que activan más macrófagos y mastocitos. El resultado es una fibrosis dérmica extensa que produce la imagen clínica de esclerodactilia en la esclerodermia. Si la paciente solo tuviera afectación cutánea con progresión tardía a los órganos viscerales, el diagnóstico sería esclerodermia limitada; si la enfermedad progresa rápidamente con afectación de los pulmones, tendrá esclerodermia difusa. En este proceso no participan los neutrófilos ni los linfocitos citolíticos naturales. A pesar de que la esclerodermia es una

enfermedad autoinmunitaria, la inflamación es mínima. El hallazgo principal es la fibrosis progresiva de piel, pulmón y tubo digestivo.

32 **B** La debilidad muscular de la polimiositis suele ser simétrica y los músculos proximales se afectan primero. Este trastorno se diferencia de la dermatomiositis en que no hay afectación cutánea, y la polimiositis típicamente es una enfermedad de adultos. En la biopsia, el músculo esquelético muestra infiltrados de linfocitos junto a degeneración y regeneración de las fibras musculares. Los linfocitos son CD8+ citotóxicos. Algunos pacientes tienen miocarditis, vasculitis o neumonitis pero, a diferencia de la dermatomiositis, el riesgo de cáncer es incierto. La anquilosis ósea es una característica de la inflamación articular progresiva o recidivante en la artritis reumatoide. La pericarditis es más frecuente en el lupus eritematoso sistémico y en la esclerosis sistémica difusa. La esclerodactilia es típica de la esclerodermia. Si no es extensa, habitualmente es indicativa de esclerodermia limitada (síndrome CREST); en caso de ser extensa, apunta a esclerodermia difusa, con peor pronóstico. En la artritis reactiva aparece uretritis no gonocócica, junto a conjuntivitis y artritis. La xeroftalmía (por lo general con xerostomía acompañante) tiene lugar en el síndrome de Sjögren.

33 **D** La dermatomiositis es una forma de miopatía inflamatoria en la que los capilares son la diana principal de la lesión mediada por anticuerpos y el complemento. Los anticuerpos anti-Jo-1, aunque no están presentes en la mayoría de los casos, son bastante específicos de las miopatías inflamatorias. Los infiltrados inflamatorios perivasculares y perimisiales provocan la necrosis de los miocitos de los fascículos musculares periféricos. El proceso está mediado por linfocitos CD4+ y B. El exantema violáceo, o en heliotropo, es una característica distintiva de la dermatomiositis. Los anticuerpos contra el péptido citrulinado cíclico están presentes en la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide, que se acompaña de destrucción inflamatoria de las articulaciones, no del músculo, aunque los músculos pueden atrofiarse debido a la reducción del movimiento. Los anti-ADN bicatenario son específicos del

lupus eritematoso sistémico (LES) en el que puede haber miositis sin inflamación ni necrosis significativas. Los anticuerpos antihistona se asocian a LES inducido por fármacos. Los anticuerpos antirribonucleoproteína U1 apuntan a un diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conjuntivo, trastorno que se solapa con la polimiositis.

34 **D** La enfermedad mixta del tejido conjuntivo (EMTC) puede tener características del lupus eritematoso sistémico (LES), de la miositis, de la artritis reumatoide, de la esclerodermia y del síndrome de Sjögren. A diferencia del LES y de la esclerodermia difusa, la afectación renal grave es infrecuente. La dermatomiositis causa dolor muscular, y el exantema prototípico es un exantema en heliotropo sutil con párpados de color violáceo; los anticuerpos anti-Jo-1 son el hallazgo más característico. El lupus eritematoso discoide (LED) se caracteriza por un exantema similar al del LES, pero con depósito de inmunocomplejos únicamente en las áreas de piel expuestas al sol, resultado positivo de la prueba de ANA en unos pocos casos, falta de anticuerpos anti-Smith y anti-ADN bicatenario, y ausencia de enfermedad renal grave. Algunos casos de LED progresan a LES. En la esclerodermia limitada (previamente conocida como síndrome CREST) a menudo hay anticuerpos anticentrómero. En la artritis reactiva (con conjuntivitis, artritis y uretritis no gonocócica), con frecuencia se encuentra una serología positiva para HLA-B27 y antecedentes de uretritis no gonocócica por *Chlamydia* o gastroenteritis por *Campylobacter, Salmonella* o *Shigella.* En el síndrome de Sjögren predomina la queratoconjuntivitis, y a menudo existen anticuerpos contra SS-A y SS-B. Los anticuerpos anti-Smith y anti-ADN bicatenario son más específicos del LES.

35 **E** Estos hallazgos denotan un rechazo crónico. La insuficiencia renal progresiva se debe a alteraciones isquémicas con estenosis vascular. En el rechazo agudo se produce endotelitis con lesión de la íntima, pero puede tratarse. La lisis mediada por el complemento se produce cuando el huésped tiene anticuerpos antidonante preformados que provocan un rechazo hiperagudo. La hipersensibilidad tardía no es típica del rechazo al trasplante. La lisis celular por macrófagos es característica de la

citotoxicidad mediada por células y dependiente de anticuerpos, que no resulta esencial en el rechazo crónico. La liberación de leucotrieno C_4 de los mastocitos es un fenómeno de la hipersensibilidad de tipo I.

36 **E** El rechazo agudo de los riñones trasplantados se produce semanas, meses o incluso años después del trasplante. Se caracteriza por el infiltrado de linfocitos T CD3+ que comprenden los subgrupos CD4+ y CD8+. Estas células dañan el epitelio tubular mediante citotoxicidad directa y la liberación de citocinas, como interferón γ, que activan a los macrófagos. La reacción se denomina *rechazo celular agudo* y se trata simplemente con corticoesteroides. La necrosis fibrinoide y la trombosis son más características del rechazo hiperagudo, que tiene lugar en los minutos siguientes a la implantación del órgano en el receptor, y es infrecuente por el emparejamiento alotípico del CPH y el grupo sanguíneo ABO. El amiloide derivado de la proteína sérica asociada al amiloide puede aparecer en casos de infecciones e inflamación crónicas. Los eosinófilos se acumulan en la nefritis intersticial aguda secundaria a reacciones farmacológicas. En el rechazo crónico se producen fibrosis intersticial y glomerular, así como engrosamiento de los vasos sanguíneos, y habitualmente es irreversible.

37 **A** La enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) se produce cuando la médula injertada no está emparejada totalmente respecto a los *loci* de histocompatibilidad principal y, por tanto, contiene células inmunocompetentes del donante capaces de proliferar, reconocer las células del huésped como ajenas y atacar los tejidos del huésped. La piel, el hígado y el epitelio digestivo suele resultar afectados. La apoptosis localizada de la EICH no produce proteínas sustrato significativas para la formación de amiloide. La hipersensibilidad de tipo tardío se observa con más probabilidad en la dermatitis de contacto. La formación de inmunocomplejos es más típica de la hipersensibilidad de tipo III con formación de anticuerpos autoinmunes. La hipersensibilidad de tipo I con anafilaxia sistémica se produce con la exposición a un antígeno, como la penicilina, tras una

exposición previa.

38 **F** La agammaglobulinemia de Bruton ligada al cromosoma X es una enfermedad en la que la maduración de los linfocitos B se detiene después del reordenamiento de los genes de cadenas pesadas y no se producen cadenas ligeras. Las moléculas de inmunoglobulinas completas, con cadenas pesadas y ligeras, no son ensambladas y transportadas a la membrana plasmática. La ausencia de inmunoglobulinas predispone al niño a infecciones bacterianas de repetición una vez que disminuyen los anticuerpos maternos tras la etapa de lactante. Como la función de los linfocitos T está conservada, son infrecuentes las infecciones por virus, hongos y protozoos. Los linfocitos CD4+ y CD8+ se diferencian a partir de precursores en el timo, que no se ven afectados por la mutación del gen *BTK,* causante de la agammaglobulinemia de Bruton. Las células dendríticas foliculares son un tipo de célula presentadora de antígeno que no resultan alteradas en los trastornos de linfocitos B y T. Los monocitos pueden salir de la circulación y convertirse en macrófagos tisulares, un proceso independiente de la maduración de los linfocitos B. Los linfocitos citolíticos naturales (NK) pertenecen al sistema inmunitario innato y responden a células anómalas recubiertas por anticuerpos, fenómeno mermado por la menor producción de antibióticos, pero los propios linfocitos NK no se ven afectados directamente por la falta de inmunoglobulinas. La ausencia de diferenciación de las células madre es incompatible con la vida.

39 **B** El diagnóstico más probable de este niño es agammaglobulinemia de Bruton, una inmunodeficiencia primaria ligada al cromosoma X y caracterizada por infecciones bacterianas de repetición que comienzan una vez que disminuyen las concentraciones de anticuerpos maternos. El déficit selectivo de IgA sigue una evolución más benigna, con infecciones sinopulmonares y diarrea que no son graves. La carencia de C3 del complemento es infrecuente; provoca un número mayor de infecciones en niños y adultos jóvenes, pero las infecciones por *Giardia* no son una característica de esta enfermedad. Es más probable observar ausencia de inmunidad mediada por células en la infección por el VIH en niños. Aunque

algunos pacientes con agammaglobulinemia de Bruton desarrollan las características del lupus sistémico eritematoso, por lo general no presentan un resultado positivo en la prueba de ANA.

40 **B** Estas son las características del síndrome de hiper-IgM, que se produce por la ausencia de intercambio de isótopos de IgM a otras inmunoglobulinas. Los pacientes son especialmente susceptibles a infecciones por *Pneumocystis* y bacterias. Los anticuerpos IgM anómalos en exceso pueden unirse a células circulantes y provocar citopenias. La ausencia de adenosina desaminasa caracteriza un tipo de inmunodeficiencia combinada grave. La deleción del cromosoma 22q11 es una característica del síndrome de DiGeorge, que afecta a la diferenciación y a la maduración de los linfocitos T. La infección por el VIH puede acompañarse de infecciones oportunistas, especialmente por *Pneumocystis,* pero habitualmente no se producen inmunoglobulinas anómalas. La falta de generación de IgA exclusivamente aparece en el déficit selectivo de IgA. Las mutaciones del gen *BTK* son las responsables de la agammaglobulinemia de Bruton, con reducción de las concentraciones de todas las inmunoglobulinas.

41 **E** Estos hallazgos apuntan a mutaciones en el gen que codifica una molécula adaptadora llamada proteína asociada a SLAM (SAP) que se une a una familia de moléculas de la superficie celular implicadas en la activación de los linfocitos NK, T y B, y que determina una mayor susceptibilidad a las infecciones víricas, especialmente a las producidas por el virus de Epstein-Barr (VEB). El síndrome de DiGeorge se manifiesta en la lactancia por fracaso de la inmunidad mediada por células debido a la ausencia de linfocitos T funcionales. La infección por el VIH está marcada por el defecto de la inmunidad mediada por células. Las personas con inmunodeficiencia combinada grave no vivirían tanto como este paciente con esas infecciones tan leves. El síndrome de Wiskott-Aldrich se asocia a eccema y trombocitopenia.

42 **E** El síndrome de DiGeorge puede afectar al timo, a las paratiroides, a la aorta y al corazón. La función de los linfocitos T es deficiente, lo que condiciona la aparición de infecciones

múltiples y repetidas por hongos, virus y protozoos. El tamaño de la deleción de 22q11.2 determina la gravedad de la enfermedad. La infección por el VIH no explica la hipocalcemia en el momento del nacimiento. La ausencia de maduración de los linfocitos pre-B ocasiona la agammaglobulinemia de Bruton. La alteración de la maduración de los linfocitos B a células plasmáticas es una forma de desarrollo de la inmunodeficiencia variable común. Algunos casos de inmunodeficiencia combinada grave están causados por el déficit de adenosina desaminasa.

43 **C** La inmunodeficiencia combinada grave (IDCG) tiene alteraciones en los brazos de linfocitos T y B del sistema inmunitario, de modo que se producen infecciones graves y repetidas por bacterias, virus y hongos. Cuando los antecedentes familiares revelen que los hombres son los afectados, la IDCG estará con más probabilidad ligada al cromosoma X y causada por mutaciones en la cadena γ común que forma parte de muchos receptores de citocinas, como interleucina (IL) 2, IL-4, IL-7 e IL-15. Estas citocinas son necesarias para el desarrollo normal de los linfocitos B y T, de modo que tanto la inmunidad humoral como la celular resultan afectadas. La hipoplasia linfoide marcada no es característica de la infección por el VIH. En el síndrome de DiGeorge, que afecta a la inmunidad mediada por células, se observa una deleción en el cromosoma 22q11. Las mutaciones del gen *BTK* originan la agammaglobulinemia de Bruton, con pérdida de la inmunidad humoral. Una mutación del ligando de CD40 es responsable del síndrome de hiper-IgM.

44 **B** La inmunodeficiencia combinada grave (IDCG) puede tratarse con un trasplante de médula ósea alógena. Las células madre trasplantadas en la médula ósea originan linfocitos B y T normales. La mitad de los casos de IDCG están causados por una mutación ligada al cromosoma X en la cadena γ común de los receptores de citocinas, y el resto se deben a mutaciones autosómicas recesivas en el gen que codifica la adenosina desaminasa, que provoca la acumulación de metabolitos tóxicos para los linfocitos. Una interacción anómala del ligando de CD40 con CD40 condiciona que no se intercambien los isotipos en pacientes con síndrome de hiper-IgM. El producto del gen *BTK*

es necesario para la diferenciación de los linfocitos pro-B y pre-B, y una mutación conduce a la agammaglobulinemia. La deleción de 22q11 se observa en lactantes con la anomalía de DiGeorge y condiciona la ausencia de desarrollo de los linfocitos T. Las personas que carecen del componente C2 del complemento tienen un número algo mayor de infecciones, pero principalmente sufren una enfermedad parecida al lupus eritematoso sistémico. La infección por el VIH da lugar a muchas infecciones oportunistas, que a veces se producen en la lactancia y al inicio de la infancia, pero son principalmente las cifras de linfocitos CD4+ las que están reducidas.

45 **B** El angioedema hereditario es un trastorno autosómico recesivo infrecuente de la vía del complemento en el que hay un déficit del inhibidor antigénico o funcional de C1, lo que da lugar a episodios recidivantes de edema. De las opciones restantes, solo C3 e IgA tienen estados de déficit. El déficit de C3 se acompaña de infecciones de repetición por bacterias piógenas. El déficit de IgA provoca infecciones leves recidivantes del tubo digestivo y de las vías respiratorias, y predispone a reacciones anafilácticas por transfusión. La β_2-microglobulina es un componente del CPH de clase I; puede aumentar en la infección por el VIH y ser un sustrato para las fibrillas de amiloide en pacientes que reciben hemodiálisis de forma crónica. La 5-hidroxitriptamina (serotonina) tiene un efecto similar al de la histamina, causante de vasodilatación y edema. La IgE participa en la anafilaxia localizada o sistémica con edema.

46 **E** Las personas con un déficit selectivo (aislado) de IgA presentan infecciones sinopulmonares banales de repetición y diarrea. La IgA es útil en la inmunidad innata contra microorganismos bacterianos en las vías respiratorias y en el tubo digestivo. Los anticuerpos frente a IgA presentes en su suero pueden provocar reacciones de transfusión anafilácticas con los IgA del suero del donante. Las reacciones inmunitarias frente a infecciones fúngicas y víricas están mediadas principalmente por linfocitos T. Las infecciones víricas suelen manejarse con respuestas de linfocitos T. Las hepatitis infecciosas no están relacionadas directamente con estados de

inmunodeficiencia, aunque los pacientes con sida y antecedentes de uso de drogas por vía parenteral suelen estar infectados por el virus de la hepatitis B o C. Las infecciones herpéticas en la enfermedad por el VIH suelen ser molestas pero no mortales. Las infecciones por *Pneumocystis* aparecen en pacientes con inmunodeficiencias adquiridas o hereditarias más graves, especialmente en aquellos con sida, que afecten a la inmunidad mediada por células.

47 **D** El trastorno ligado al cromosoma X denominado *síndrome de Wiskott-Aldrich (SWA)* se caracteriza por trombocitopenia, eccema y reducción de IgM. En ocasiones, la IgA está aumentada. Al igual que en muchas inmunodeficiencias, hay desregulación inmunitaria, y en el SWA existe un mayor riesgo de linfoma no hodgkiniano. Los pacientes con sida pueden presentar demencia. La hipocalcemia se observa en neonatos con síndrome de DiGeorge, que afecta a las glándulas paratiroideas. La artritis reumatoide puede complicar el déficit aislado de IgA y la inmunodeficiencia variable común, trastornos con supervivencia hasta la edad adulta. La carencia de C3 del complemento se complica en ocasiones con glomerulonefritis por inmunocomplejos.

48 **C** Las infecciones oportunistas en un adicto a drogas por vía parenteral apuntan al diagnóstico de sida secundario a infección por el VIH. Las neoplasias más frecuentemente observadas en asociación con el sida son los linfomas no hodgkinianos de linfocitos B. Las infecciones oportunistas del encéfalo y los linfomas del sistema nervioso central son frecuentes en pacientes con sida, pero las neoplasias gliales no lo son. Hay un aumento de displasias y carcinomas cervicales en mujeres con infección por el VIH, pero esas lesiones son menos frecuentes que los linfomas, y los carcinomas de células claras del aparato genital femenino se asocian a la exposición materna al dietilestilbestrol. Los cánceres de pulmón en mujeres de esta edad son infrecuentes en cualquier circunstancia. El sarcoma de Kaposi es el único sarcoma asociado a infección por el VIH en adultos. Un tumor infrecuente relacionado con el sida en niños es el leiomiosarcoma.

49 **F** El gen de la transcriptasa inversa del VIH muta una vez cada

2.000 replicaciones de media, una tasa muy elevada que explica la aparición de resistencia a los fármacos. Los medicamentos reseñados son inhibidores de la transcriptasa inversa que forman parte del tratamiento combinado inicial para la infección por el VIH. La ausencia de interacción del ligando de CD40 con CD40 es la causa del síndrome de hiper-IgM. Los receptores de quimiocinas son importantes a la hora de facilitar la entrada inicial del VIH en las células, y las mutaciones de estos receptores podrían ayudar a explicar la variabilidad en la susceptibilidad y progresión de la infección por el VIH. La cadena γ del receptor de citocinas es anómala en la inmunodeficiencia combinada grave. El antígeno p24 es un componente del virión del VIH y se usa para detectar la infección, pero no es un objetivo del tratamiento farmacológico. Las tirosina cinasas de proteínas participan en la transducción de señales; es posible que sean anómalas en trastornos tales como la agammaglobulinemia de Bruton, pero no lo son en pacientes tratados con fármacos frente al VIH. Ninguno de los medicamentos reseñados es un inhibidor de la proteasa del VIH.

50 **C** Los síntomas iniciales de esta mujer, aunque son inespecíficos, resultan característicos del síndrome retrovírico agudo observado en más de la mitad de los adultos con infección aguda por el VIH. El promedio del tiempo hasta el desarrollo de sida es de 8-10 años; cuando los linfocitos CD4+ descienden por debajo de 200/µl hay más riesgo de infecciones oportunistas. No es probable que las espondiloartropatías (HLA-B27) y las enfermedades autoinmunitarias por autoanticuerpos, como el lupus eritematoso sistémico (título elevado de ANA) o la esclerodermia (anticuerpos anticentrómero), presenten un intervalo tan prolongado entre los episodios de enfermedad, ni es tan frecuente que manifiesten infecciones oportunistas sin tratamiento inmunodepresor. Las personas con sida pueden tener una gammapatía policlonal pero no hipogammaglobulinemia marcada.

51 **B** La entrada del VIH en las células requiere la unión a la molécula CD4 y moléculas correceptoras, como CCR5 y CXCR4. Estos correceptores del VIH son receptores de quimiocinas en la superficie de los linfocitos T y los macrófagos. Las mutaciones

en los genes que codifican estas moléculas correceptoras hacen que las personas sean resistentes a los efectos de la infección por el VIH, porque el virus no consigue entrar fácilmente en linfocitos y macrófagos. Los demás receptores de superficie celular no son relevantes para la entrada del VIH en las células. El antígeno p24 contenido en el virión no es parte de los mecanismos de entrada en las células, aunque su presencia ayuda a la detección de la infección por el VIH.

52 **B** Tres tipos de células tienen más probabilidad de contener el VIH: células dendríticas (células de Langerhans en el epitelio y dendríticas foliculares en los ganglios linfáticos), monocitos-macrófagos y linfocitos T CD4+. Las células dendríticas de mucosas se unen al virus y lo transportan a los linfocitos CD4+ de los ganglios linfáticos. No está claro si el virus es internalizado por las células dendríticas de las mucosas. Los monocitos-macrófagos y los linfocitos T CD4+ expresan el receptor de superficie CD4 y los correceptores de citocinas CCR5 y CXCR4; el VIH puede entrar en estas células. Las células dendríticas foliculares son distintas de las dendríticas epiteliales o mucosas; atrapan viriones del VIH recubiertos por anticuerpos gracias a sus receptores de Fc. Las demás células reseñadas no pueden ser infectadas por el VIH.

53 **C** Los macrófagos pueden resultar infectados por el VIH y no son destruidos como los linfocitos CD4+, sino que sobreviven y transportan la infección a tejidos de todo el organismo, especialmente al encéfalo. La infección encefálica por el VIH puede provocar encefalitis y demencia. Los linfocitos CD8+ no son infectados por el VIH, pero quizás ayuden a la eliminación de las células infectadas. Es posible que las células de Langerhans de superficies mucosas colaboren en la infección inicial de los linfocitos CD4+ por el VIH. Los linfocitos citolíticos naturales y los neutrófilos, como elementos del sistema inmunitario innato, no son relevantes en la infección por el VIH.

54 **A** La neumonía por *Pneumocystis jiroveci* es un hallazgo frecuente en pacientes con infección por el VIH que está progresando a sida. El bajo número de CD4+ de este paciente es característico del sida. La prueba de ANA resulta positiva en varias enfermedades autoinmunitarias, pero el descenso de los

CD4+ no es típico de esos trastornos. Los autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (C-ANCA o P-ANCA) aparecen en algunos pacientes con vasculitis. El título de antiestreptolisina O (ASO) está elevado en pacientes con fiebre reumática, pero no hay inmunodepresión grave. En distintas enfermedades autoinmunitarias, como el LES, se encuentran anticuerpos detectables contra varias células y tejidos, y es posible que también aumente el riesgo de infecciones oportunistas.

55 **D** Las personas infectadas por el VIH lo están de por vida. Pueden transmitir el virus a otros a través del coito, incluso cuando parecen estar bien, y especialmente al comienzo y final de la infección, cuando la viremia es mayor. Los síntomas del paciente apuntan a infección reciente y síndrome retrovírico agudo. El período medio para desarrollar sida tras la infección por el VIH es de 8-10 años. En la infección por el VIH no se produce la seroinversión. La infección afecta principalmente a los linfocitos CD4+, y los recuentos progresivamente menores de estas células presagian el desarrollo de sida clínicamente aparente. La progresión de la enfermedad por VIH se vigila mediante las concentraciones de ARNm del VIH-1 en la sangre y en la cifra de linfocitos CD4+. Cuando el ARN del VIH-1 aumenta y el recuento de CD4+ disminuye, el riesgo de infecciones oportunistas, neoplasias y deterioro neurológico es mayor.

56 **E** Este paciente tiene sida y presenta placas en forma de lesiones nodulares de color rojo violáceo. El sarcoma de Kaposi se asocia a un virus del herpes de transmisión sexual, el virus del herpes humano 8 (VHH-8), también llamado *virus del herpes del sarcoma de Kaposi*. Otros virus del herpes no participan en la patogenia del sarcoma de Kaposi, aunque la infección por estos virus es frecuente en las personas con sida. El VIH, aunque está presente en los linfocitos y monocitos, no se detecta en las células fusiformes que proliferan en el sarcoma de Kaposi. Con la excepción del virus de la varicela-zóster, asociado a vesículas cutáneas distribuidas a lo largo de los dermatomas (conocidas como *culebrillas*), las lesiones de la piel son manifestaciones infrecuentes de los virus del herpes, familia que comprende el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr (VEB) y el adenovirus.

57 **A** A medida que avanza la infección por el VIH se produce una pérdida continua y gradual de linfocitos CD4+. En la fase clínicamente latente de la infección, los CD4+ siguen reponiéndose, pero hay una pérdida mantenida, y el estadio de sida clínico se alcanza cuando el recuento de CD4+ periféricos disminuye por debajo de 200/µl, lo que habitualmente tiene lugar en 8-10 años. En este punto, el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas y neoplasias típicas del sida aumenta enormemente. La cuantía de la viremia también es un indicador de progresión de la infección por el VIH; cuando la contención inmunitaria del VIH fracasa aumentan las concentraciones de ARN vírico. En la infección por el VIH, el número de linfocitos CD8+ tiende a mantenerse. Las células de la serie granulocítica se conservan relativamente, aunque los pacientes con sida pueden presentar citopenias. Las células dendríticas foliculares pueden infectarse por el VIH y transportar los viriones a los linfocitos CD4+ y macrófagos, pero ni demasiadas células dendríticas foliculares ni demasiados macrófagos resultan destruidos por el virus y pueden convertirse en reservorios de la infección. Los linfocitos citolíticos naturales, los linfocitos B CD19+ y las células plasmáticas no resultan afectados directamente por el VIH.

58 **C** El amiloide muestra una birrefringencia «verde manzana» bajo la luz polarizada con la tinción con rojo Congo. La causa más frecuente de amiloidosis es una producción excesiva de cadenas ligeras en las discrasias de células plasmáticas como mieloma múltiple (amiloide AL). Sus lesiones vertebrales son acumulaciones focales de células plasmáticas neoplásicas. Las enfermedades inflamatorias crónicas, como, por ejemplo, la fiebre reumática, la espondilitis anquilosante y la esclerosis sistémica, también pueden provocar una amiloidosis (amiloide AA), pero no se asocian a la secreción de cadenas ligeras a la orina (proteinuria de Bence-Jones). Por lo general, las concentraciones de inmunoglobulinas están reducidas en los pacientes con inmunodeficiencia variable común. Tanto el factor reumatoide (FR) como la proteína C reactiva (CRP) son marcadores de inflamación y el amiloide asociado a trastornos inflamatorios crónicos deriva de la proteína asociada al amiloide

sérico (SAA).

59 **A** En las enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide, la proteína precursora asociada al amiloide sérico (SAA) forma la proteína fibrilar amiloide principal AA. La SAA es un reactante de fase aguda que aumenta en los trastornos inflamatorios. La proteína C reactiva también es un reactante de fase aguda cuya concentración aumenta en los trastornos inflamatorios; sin embargo, a diferencia de la SAA, no forma amiloide. Este se deposita en el intersticio. Todos los tipos de amiloide muestran la característica birrefringencia «verde manzana» bajo el microscopio de luz polarizada una vez teñidos con rojo Congo –cualquier otra imagen no sería amiloide–. El amiloide derivado de la β_2-microglobulina aparece en la amiloidosis asociada a hemodiálisis. El derivado de las cadenas ligeras en el mieloma múltiple contiene fibrillas AL. Las formas cardíaca y heredofamiliar de amiloidosis tienen fibrillas derivadas de la prealbúmina transtiretina (TTR).

60 **F** Estos hallazgos son característicos de la amiloidosis cardíaca. Debido a la edad del paciente, el diagnóstico más probable es amiloidosis cardíaca senil, secundaria al depósito de transtiretina. La α-fetoproteína está presente durante la etapa fetal, pero en los adultos es un marcador tumoral sérico. La β_2-microglobulina contribuye al desarrollo de la amiloidosis asociada a hemodiálisis crónica. La calcitonina forma el precursor del amiloide depositado en los carcinomas medulares de tiroides. La IgE no forma parte del amiloide. La amiloidosis relacionada con las discrasias de células plasmáticas se debe a la producción de cadenas ligeras. Aunque el corazón se afecta habitualmente en la amiloidosis por cadenas ligeras, los valores de laboratorio normales y la ausencia de acumulaciones de células plasmáticas en la médula ósea son datos en contra de una discrasia de células plasmáticas. Las proteínas troponinas del músculo cardíaco son marcadores útiles de síndrome coronario agudo, pero no participan en la formación del amiloide.

CAPÍTULO 7

Trastornos neoplásicos

PEF9 Capítulo 7: Neoplasias

PH9 Capítulo 5: Neoplasias

1 Un hombre de 40 años tuvo un resultado positivo en una prueba de sangre oculta en heces con guayacol que se llevó a cabo durante el transcurso de una exploración física programada. Se realiza una colonoscopia y se encuentra una masa pediculada delimitada de 0,9 cm de diámetro con un tallo corto en la parte superior del recto. ¿Cuál de los siguientes términos es el que mejor describe esta lesión?

A Adenoma
B Carcinoma
C Coristoma
D Hamartoma
E Hiperplasia
F Sarcoma

2 Una mujer de 32 años refiere dolor pélvico sordo de 2 meses de evolución. La exploración física revela una masa anexial derecha. La ecografía abdominal muestra una masa quística ovárica de 7,5 cm de diámetro. Se realiza una extirpación quirúrgica de la masa. Su superficie es lisa y no presenta adherencias con las estructuras pélvicas circundantes. Macroscópicamente, la masa quística está llena de pelos. Microscópicamente, se identifica epitelio escamoso, epitelio glandular cilíndrico alto, cartílago y tejido conjuntivo fibroso, que recuerdan a los equivalentes tisulares normales. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Adenocarcinoma
B Fibroadenoma
C Glioma
D Hamartoma

E Mesotelioma
F Rabdomiosarcoma
G Teratoma

3 Un hombre de 62 años ha presentado varios episodios de hematuria durante la semana previa. Refiere consumo de 48 cajetillas de tabaco-año. En la exploración física no se encuentran alteraciones. En el análisis de orina se encuentra una hematuria 4+, y la citología de orina revela presencia de células atípicas. Se realiza una cistoscopia, que identifica una masa sésil de 4 cm de diámetro con una superficie nodular ulcerada en la cúpula vesical. ¿Cuál de los siguientes términos es el que mejor describe esta lesión?

A Adenoma
B Carcinoma
C Fibroma
D Papiloma
E Sarcoma



4 Una mujer de 23 años se ha notado un nódulo en la piel de la parte superior del tórax. Dice que lo tiene desde hace muchos años y no ha observado cambios de tamaño. Se extirpa, y el aspecto microscópico es el que muestra la figura. ¿Con cuál de las siguientes neoplasias es más probable que se corresponda esta

lesión?

- A Fibroadenoma
- B Hemangioma
- C Leiomioma
- D Lipoma
- E Melanoma
- F Nevo

5 Una mujer de 50 años se somete a una colonoscopia de cribado como parte de una revisión de salud habitual. Se reconoce un pólipo pediculado aislado de 1 cm en el sigma. El estudio histológico del pólipo extirpado muestra glándulas bien diferenciadas, sin infiltración del tallo. ¿Cuál de las siguientes pruebas de investigación permitirá distinguir con mayor fiabilidad si el pólipo es una hiperplasia de la mucosa del colon o un adenoma tubular?

- A Citometría de flujo para cuantificar las células que están en fase S
- B Tinciones histoquímicas para mucinas
- C Tinción inmunohistoquímica para queratinas
- D Marcadores moleculares de clonalidad



6 Una mujer de 39 años se sometió a una revisión de salud de

rutina por primera vez desde hacía muchos años. Se obtuvo una citología cervicovaginal y el resultado fue anómalo. En la exploración pélvica se identificó una lesión rojiza, ligeramente sobreelevada de 1 cm en la parte anterior del ectocérvix en la posición horaria de las 2, que se resecó y remitió para estudio histológico. La figura muestra el aspecto histológico con mediano aumento de esta lesión. ¿Cuál de los siguientes datos es el más característico del proceso que afecta a esta paciente?

A Neoplasia endometrial primaria
B Aumento de la concentración de CA-125 sérica
C Resultado positivo en las pruebas moleculares para identificación del VHS-2 en la lesión
D Nódulos pulmonares en la radiografía de tórax
E Ausencia de recaídas tras la resección local

7 Una mujer de 53 años refiere malestar progresivamente mayor. En la exploración no se encuentran alteraciones, pero el resultado de la prueba de sangre oculta en heces con guayacol es positivo. La concentración de hemoglobina es 7,9 g/dl. Se somete a una colonoscopia, que identifica una masa sésil de 3 cm en el ciego. La biopsia de la masa revela un adenocarcinoma moderadamente diferenciado limitado a la mucosa. La TC abdominal no identifica linfoadenopatías ni lesiones hepáticas. Ante esta información, ¿cuál de las siguientes actitudes es la mejor?

A Administrar un régimen de poliquimioterapia
B Vigilar la lesión para comprobar si aumenta de tamaño
C Extirpar todo el colon para prevenir una recaída
D Resecar el tumor y algo de tejido normal circundante
E Buscar una neoplasia maligna primaria de otro órgano



8 Una mujer de 57 años refiere una sensación de inflamación progresivamente mayor en el cuello, además de una pérdida de 3 kg de peso en los últimos 3 meses. En la exploración física se identifica un área fija y firme de 3 × 5 cm en el lado derecho del cuello. La TC muestra una masa sólida infiltrante en la región del lóbulo tiroideo derecho. Se biopsia la masa, y su aspecto microscópico es el que se observa en la figura. Todas las áreas del tumor muestran una morfología parecida. ¿Cuál de los siguientes términos es el que mejor describe esta neoplasia?

A Anaplásica
B Apoptósica
C Displásica
D Metaplásica
E Bien diferenciada



9 La citología cervicovaginal obtenida durante la revisión de salud habitual de una mujer de 29 años resulta anómala. La paciente no refiere síntomas. Tiene antecedentes de múltiples parejas sexuales. Se obtienen biopsias del cérvix, cuyo aspecto microscópico muestra la figura. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Adenocarcinoma
B Carcinoma *in situ*
C Displasia
D Hamartoma
E Transformación metaplásica
F Carcinoma epidermoide

10 Una mujer de 44 años nota masas indoloras en la axila, que no estaban presentes el mes previo. En la exploración se identifican linfoadenopatías axilares derechas. Los ganglios son indoloros pero firmes. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más probable que se encuentre en la mama derecha de la paciente?

A Mastitis aguda con abscesos
B Fibroadenoma
C Carcinoma lobulillar infiltrante
D Carcinoma intraductal
E Leiomiosarcoma



11 Una mujer de 69 años refiere malestar progresivo con pérdida de 10 kg de peso durante el último año. Fallece por una tromboembolia pulmonar masiva. En la figura se muestra el aspecto macroscópico del hígado en la autopsia. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor las lesiones presentes en el hígado?

A Angiosarcoma infiltrante
B Carcinoma hepatocelular
C Infiltración leucémica
D Adenocarcinoma metastásico
E Adenomas hepáticos multifocales

12 Un hombre de 66 años con tos crónica presenta un episodio de hemoptisis. En la exploración física no se encuentran alteraciones. La radiografía de tórax muestra una masa de 6 cm en el pulmón derecho. La citología de esputo revela células escamosas neoplásicas. ¿Dónde es más probable que se encuentren metástasis originadas en su lesión pulmonar?

A Hemisferio cerebral
B Músculo de la pared torácica
C Ganglios linfáticos hiliares
D Pulpa roja esplénica
E Médula ósea vertebral

13 Se realiza un estudio epidemiológico sobre las muertes por cáncer durante la segunda mitad del siglo xx. El número de muertes por un tipo concreto de cáncer ha disminuido en los

países desarrollados, a pesar de la falta de programas de cribado y prevención generalizados. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que se identifique en este estudio?

A Glioma cerebral
B Adenocarcinoma gástrico
C Angiosarcoma hepático
D Leucemia
E Carcinoma de células pequeñas pulmonar

14 Se realiza un estudio epidemiológico sobre las muertes por cáncer durante la segunda mitad del siglo xx. El número de muertes por un tipo concreto de cáncer ha aumentado de forma notable en los países desarrollados. Más del 30% de las muertes por cáncer entre los hombres y más del 24% de las producidas por cáncer entre las mujeres se debieron a este tumor en 1998. En algunos países, las estrategias de prevención redujeron la mortalidad por este cáncer. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que se identifique en este estudio?

A Glioma cerebral
B Carcinoma broncógeno
C Carcinoma hepatocelular
D Adenocarcinoma de colon
E Adenocarcinoma de páncreas
F Melanoma cutáneo

15 Un estudio epidemiológico analiza los beneficios para la salud de las técnicas de cribado del cáncer en personas mayores de 50 años. ¿Cuál de las siguientes herramientas de cribado empleadas para el diagnóstico es la que puede reducir en mayor medida las muertes por cáncer en Europa y Norteamérica?

A Radiografía de tórax
B Mamografía
C Citología cervicovaginal
D Marcadores tumorales séricos
E Prueba de sangre oculta en heces con guayacol
F Citología de orina

16 Una mujer de 38 años presenta distensión abdominal, que ha ido empeorando en las últimas 6 semanas. La TC abdominal muestra una obstrucción intestinal causada por una masa de 6 cm en el yeyuno. En la laparotomía se reseca una porción de intestino

delgado. El análisis mediante citometría de flujo de una parte del tumor revela una población clonal de linfocitos B con una fase S elevada. ¿Cuál es la translocación con activación de oncogenes nucleares que se puede encontrar con mayor probabilidad en este tumor?

A *APC*
B *EGF*
C *MYC*
D *p53*
E *RAS*

17 Una mujer de 50 años refiere que se fatiga con facilidad y que tiene una sensación de tensión en el abdomen desde hace 5 meses. La exploración física revela que está afebril. Muestra marcada esplenomegalia, sin linfoadenopatías. Las pruebas de laboratorio indican un recuento leucocítico de 250.000/mm^3 con un recuento diferencial que presenta un 64% de segmentados, un 11% de cayados, un 7% de metamielocitos, un 5% de mielocitos, un 4% de mieloblastos, un 3% de linfocitos, un 2% de basófilos, un 2% de eosinófilos y un 2% de monocitos. Se realiza una biopsia de médula ósea, y el análisis del cariotipo de las células muestra una translocación t(9;22). ¿Cuál de los mecanismos de acción de los fármacos empleados en el tratamiento médico es más probable que induzca una remisión completa en esta paciente?

A Activación de las caspasas celulares
B Anticuerpos frente a los receptores de EGF
C Incorporación de *p53* normal a las células mediante vectores víricos
D Inhibición de la actividad de la tirosina cinasa
E Evitar la translocación de la β-catenina al núcleo



18 Una mujer de 54 años se nota un bulto en la mama derecha. En la exploración física se encuentra una masa de 2 cm fija a los tejidos subyacentes por debajo de la aréola y se palpan tres ganglios firmes no dolorosos en la axila derecha. No refiere antecedentes familiares de cáncer. Se procede a una biopsia escisional de mama, y el estudio microscópico muestra las imágenes que se recogen en la figura. En los 6 meses siguientes, la paciente presenta más ganglios aumentados de tamaño, y la TC muestra nódulos en el pulmón, el hígado y el encéfalo. ¿Cuál de las siguientes alteraciones moleculares es más probable que se encuentre en las células de este carcinoma?

A Amplificación del gen *ERBB2 (HER2)*
B Deleción de una copia del gen *RB*
C Fusión de los genes *BCR* y *C-ABL*
D Inactivación de una copia del gen *BRCA1*
E Mutación de una copia del gen *p53*

19 La madre de un niño de 5 años observa un aumento del perímetro abdominal de su hijo durante los últimos 6 meses. En la exploración física se identifica una masa abdominal mal delimitada. La TC abdominal revela una masa de 9 cm en la región de la glándula suprarrenal derecha. Se extirpa la masa y el estudio microscópico muestra células hipercromáticas primitivas. El análisis citogenético de las células tumorales muestra múltiples dobles diminutos y regiones de tinción homogénea. ¿Cuál de los

siguientes genes es más probable que haya sufrido alteraciones para ocasionar estos hallazgos?

A *BCL1* (gen de la ciclina)
B *BCL2* (genes antiapoptósicos)
C *IL2* (gen de factor de crecimiento)
D *K-RAS* (gen de las proteínas de unión a GTP)
E *Lyn* (gen de la tirosina cinasa)
F *N-MYC* (gen de factor de transcripción)

20 Una mujer de 34 años sexualmente activa se somete a una exploración física de rutina, sin que en ella se encuentren alteraciones. Como parte de la exploración pélvica, se obtiene una citología cervicovaginal. El estudio citológico de las células del frotis cervical muestra una displasia epitelial grave (lesión escamosa intraepitelial de alto grado). ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas es la más adecuada para esta paciente?

A Tratamiento antibiótico
B Escisión
C Resección de ovario
D Cribado de familiares
E Vigilancia activa

21 Un estudio epidemiológico analiza las posibles alteraciones morfológicas y moleculares que pueden contribuir al desarrollo de cánceres en una población. Los datos analizados de las lesiones de colon resecadas muestran cambios sugestivos de la evolución de un adenoma de colon esporádico a carcinoma infiltrante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la que mejor describe el mecanismo que produce estos cambios que culminan en tumores malignos de colon?

A Activación de protooncogenes mediante translocaciones cromosómicas
B Extensa regeneración de los tejidos, que aumenta la frecuencia de mutaciones en las células regenerativas
C Herencia de defectos en los genes *TP53*, que aumentan la susceptibilidad al desarrollo de cáncer
D Sobreexpresión de genes de los factores de crecimiento
E Acumulación escalonada de múltiples mutaciones en protooncogenes y genes supresores de tumores

22 Una mujer de 61 años ha percibido una sensación de pesadez en

la pelvis durante los últimos 6 meses. En la exploración física se encuentra una masa palpable e indolora en la parte inferior del abdomen. La ecografía abdominal identifica una masa sólida de 12 cm en la pared uterina. Se realiza una histerectomía total abdominal. La masa se corresponde, microscópicamente, con un leiomiosarcoma bien diferenciado. Un año después, la radiografía de tórax muestra un nódulo de 4 cm en la parte inferior del pulmón derecho. El estudio citológico del material obtenido mediante punción-aspiración con aguja fina de dicho nódulo revela un sarcoma poco diferenciado. Entre los antecedentes de la paciente se encuentra haber sido fumadora durante la mayor parte de su vida adulta. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es el que mejor explica estos hallazgos?

A Tabaquismo mantenido de la paciente
B Desarrollo de una segunda neoplasia primaria
C Herencia de un gen *RB* defectuoso
D Inmunodeficiencia por la infección por el VIH
E Metástasis de un subclón invasivo de tumor

23 Una mujer de 70 refería antecedentes de pérdida de 4 kg de peso e ictericia generalizada progresiva de 4 meses de evolución. En la exploración física muestra hipersensibilidad en la parte media del epigastrio a la palpación. La TC abdominal muestra una masa de 5 cm en la cabeza del páncreas. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina de la masa. En el análisis bioquímico, las células neoplásicas muestran una actividad continuada de las cinasas citoplásmicas. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que esté implicado en este proceso?

A *APC*
B *MYC*
C *p53*
D *RAS*
E *RET*
F *sis*

24 Un hombre de 22 años presenta una lesión pigmentada y sobreelevada en el antebrazo, que ha aumentado de tamaño y muestra mayor irregularidad de color desde hace 4 meses. La exploración física identifica una lesión pardo-negruzca asimétrica de 0,5 × 1,2 cm y con límites irregulares. La biopsia escisional

muestra agregados de células pigmentadas pleomorfas, que se extienden hacia la dermis reticular. Los antecedentes familiares del paciente indican que una tía materna falleció por un tumor parecido y que su abuelo se tuvo que someter a la enucleación del ojo izquierdo por una masa retiniana de color «marrón oscuro». ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que haya sufrido las mutaciones causantes de los hallazgos en esta familia?

A *BCL2* (gen antiapoptósico)
B *c-MYC* (gen de factor de transcripción)
C *IL2* (gen de factor de crecimiento)
D *Lyn* (gen de la tirosina cinasa)
E *p16* (inhibición del ciclo celular)
F *p53* (gen de respuesta al daño del ADN)

25 Una niña de 3 años presenta dificultades visuales en el ojo derecho. En la exploración física destaca una leucocoria en el ojo derecho, compatible con la presencia de una masa en la cámara posterior. La RM muestra una masa que casi llena por completo el globo. Se realiza una enucleación del ojo derecho de la niña. El análisis molecular de las células neoplásicas indica ausencia de las dos copias de un gen que participa en el control del ciclo celular. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que haya sufrido mutaciones en esta neoplasia?

A *BCR-ABL*
B *BCL2*
C *hMSH2*
D *K-RAS*
E *NF1*
F *p53*
G *RB*

26 Un hombre de 76 años refiere dolor abdominal de 1 año de evolución. En la exploración física se identifica una masa epigástrica. La TC abdominal muestra una masa de 10 cm en el cuerpo pancreático. La punción-aspiración con aguja fina de la masa revela un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. El análisis de mutaciones en las células de este carcinoma muestra inactivación de un inhibidor de la cinasa dependiente de la ciclina, con pérdida de la supresión del crecimiento. ¿Cuál de los siguientes genes controla la vía reguladora cuya alteración es más

probable en el carcinoma de este paciente?

A *BCL2*
B β-catenina
C *MYC*
D *p53*
E TGF-β

27 Un hombre de 55 años ha presentado hemoptisis y tos progresiva durante el último mes. En la exploración física se auscultan sibilancias en el pulmón derecho posterior. La radiografía de tórax revela una masa perihiliar derecha de 6 cm. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina, cuya morfología corresponde a un carcinoma broncógeno de células no pequeñas. El análisis molecular de las células neoplásicas identifica una mutación del gen *p53*. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es el responsable más probable de la transformación neoplásica?

A Incapacidad de hidrolizar la GTP
B Activación de receptores de factores de crecimiento
C Pérdida de la detención del ciclo celular
D Inestabilidad de microsatélites
E Activación de la transcripción

28 Un hombre de 26 años con antecedentes familiares de carcinoma de colon se somete a una colonoscopia de control, en la que se identifican cientos de pólipos en el colon y dos áreas ulceradas focales de 0,5 cm. La biopsia de la úlcera muestra glándulas de morfología irregular, que han atravesado la capa muscular. ¿Cuál de las siguientes alteraciones moleculares parece producirse en fases muy precoces de la evolución de este proceso patológico del colon?

A Activación de la vía de transmisión de señales WNT
B Incapacidad de hidrolizar RAS ligado a GTP
C Pérdida de heterocigosidad que afecta al gen *p53*
D Mutaciones de los genes de reparación de errores del ADN
E Translocación de BCL2 de las mitocondrias al citoplasma

29 Un hombre de 63 años presenta tos con hemoptisis de 10 días de evolución. Refiere antecedentes de tabaquismo con un consumo de 65 cajetillas-año. La TC torácica muestra una masa hiliar derecha de 5 cm. Se realiza una broncoscopia, y las muestras de biopsia pulmonar revelan un carcinoma anaplásico de células

pequeñas pulmonar. Entre los antecedentes familiares se encuentran tres familiares maternos de primer grado que sufrieron una leucemia, un sarcoma y un carcinoma antes de los 40 años de edad. ¿Cuál de los siguientes productos génicos es más probable que se haya alterado por una mutación para dar lugar a estos hallazgos?

A *APC* (supresor de tumores)
B *BCL2* (antiapoptósico)
C *K-RAS* (unión a GTP)
D *NF1* (activación de GTPasa)
E *p53* (respuesta a los daños del ADN)

30 Un hombre de 30 años refiere antecedentes de nódulos cutáneos benignos, cuyo número ha aumentado durante los últimos 15 años. En la exploración física, los nódulos subcutáneos, firmes e indoloros, miden un promedio de 0,5-1 cm. Una exploración más detallada muestra también numerosas máculas cutáneas pardas claras y planas de 1-5 cm de diámetro. La exploración oftalmoscópica revela nódulos hamartomatosos en el iris. La biopsia de uno de los nódulos cutáneos demuestra que está anclado a un nervio periférico. ¿Cuál de las siguientes alteraciones moleculares es más probable en relación con esta presentación clínica?

A Menor susceptibilidad a la apoptosis
B Trastornos del funcionamiento de la reparación de los errores
C Aumento de la producción del factor de crecimiento epidérmico
D Ausencia de reparación de la escisión de nucleótidos
E Activación persistente del gen *RAS*
F Expresión reducida de la proteína RB

31 Un hombre de 53 años diagnosticado de cáncer de boca y tratado con quimioterapia y radioterapia hace 1 año se somete a una tomografía por emisión de positrones (PET) cervical y se observa un solo foco de captación aumentada. Se reseca este foco y se confirma mediante estudio microscópico que es una metástasis. El análisis molecular de este tumor muestra mutaciones de los genes *p53, PTEN* y *c-MYC.* ¿Cuál de las siguientes vías metabólicas es la que con más probabilidad está regulada al alza para permitir la supervivencia y proliferación de las células de este tumor?

A Glucólisis aeróbica
B Gluconeogenia
C Derivación de la monofosfato de hexosa
D Fosforilación oxidativa
E Degradación de las purinas

32 Un hombre de 49 años presenta un bulto próximo al hombro derecho, que ha ido creciendo durante los últimos 8 meses. En la exploración física se palpa una masa firme e indolora de 4 cm en la región supraclavicular derecha. Se extirpa dicha masa, y el estudio microscópico revela una neoplasia linfoide. El análisis del cariotipo de las células muestra una translocación cromosómica t(14;18), que coloca el gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina al lado de otro gen. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que se active por esta translocación?

A *APC* (gen supresor de tumores)
B *BCL2* (gen antiapoptósico)
C *BRCA1* (gen de reparación del ADN)
D *c-MYC* (gen de factores de transcripción)
E *IL2* (gen de factor de crecimiento)
F *K-RAS* (gen de proteínas de unión al GTP)

33 Un hombre de 40 años refiere un número cada vez mayor de tumoraciones en la ingle y la axila desde hace 5 meses. En la exploración física se identifican linfoadenomegalias no dolorosas generalizadas con hepatoesplenomegalia. La biopsia de un ganglio inguinal muestra un tumor maligno de células linfoides pequeñas y bien diferenciadas. La inmunotinción de las células tumorales con el anticuerpo frente a *BCL2* es positiva en los núcleos de las células leucocíticas. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es el más probable responsable de esta neoplasia linfoide?

A Reducción de la apoptosis
B Amplificaciones génicas
C Aumento de la actividad de la tirosina cinasa
D Pérdida de la inhibición del ciclo celular
E Reducción de la reparación del ADN

34 En un experimento, las células de neoplasias humanas malignas obtenidas mediante explantación se siguen replicando en un medio de cultivo tisular. Esto permite obtener líneas de células tumorales «inmortales», que resultan extremadamente útiles para

estudiar la biología de los tumores y las respuestas a las distintas modalidades terapéuticas. ¿La activación de cuál de los siguientes componentes moleculares es más probable que dote a estas células tumorales de una capacidad de replicación ilimitada *in vivo* e *in vitro*?

A Factor inducido por la hipoxia 1
B Gen *BCL2*
C Metilación del gen de la cinasa dependiente de la ciclina
D Reparación de la replicación del ADN
E Telomerasa

35 Un hombre de 60 años refiere un nódulo cervical, que ha aumentado de tamaño con rapidez durante los últimos 2 meses. En la exploración física se identifica una masa de 10 cm firme e indolora en la parte posterolateral izquierda del cuello, que parece corresponder a ganglios cervicales fusionados. Se observa también una hepatoesplenomegalia. La TC craneal muestra una masa en el anillo de Waldeyer cerca de la faringe. Se realiza una biopsia de la masa cervical, y el estudio histológico revela células linfoides anómalas con numerosas mitosis y muchos núcleos apoptósicos. Recibe tratamiento con un cóctel de fármacos quimioterápicos que actúan sobre el ciclo celular. Durante el mes siguiente se observa una reducción espectacular del tamaño de las masas cervical y bucal. Según esta historia y la respuesta al tratamiento, ¿cuál de las siguientes características es más probable que tengan las células tumorales?

A Reducción de la vascularización
B Evolución de la policlonalidad
C Elevada fracción de crecimiento
D Capacidad limitada de producir metástasis
E Intensa expresión de antígenos tumorales

36 Un hombre de 30 años presenta un feocromocitoma de la glándula suprarrenal izquierda; uno de sus hermanos sufrió un hemangioblastoma cerebeloso. Se realiza una suprarrenalectomía, y el estudio histológico revela una extensa vascularización de la neoplasia. El análisis de mutaciones de las células neoplásicas muestra que las dos copias de los alelos de un gen se han perdido, de forma que una proteína que se une al factor inducible por la hipoxia 1 no está ya ubicuitinado y se transloca al núcleo y activa la

transcripción de *VEGF*. ¿Cuál de los siguientes genes es el más probable que esté mutado en este paciente?

A *APC*
B *BCL2*
C *EGF*
D *HER2*
E *HST1*
F *MYC*
G *VHL*

37 Una mujer de 48 años se nota un bulto en la mama izquierda. En la exploración física se reconoce una masa firme inmóvil de 2 cm en el cuadrante superior externo de la mama izquierda. Además, existen ganglios firmes aumentados de tamaño e indoloros en la axila ipsolateral. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina y el resultado es compatible con un carcinoma. La paciente se somete a una tumorectomía con disección de los ganglios axilares y se encuentra carcinoma en dos de los ocho ganglios axilares resecados. ¿La menor expresión de cuál de las siguientes moléculas por las células tumorales es más probable que cause las metástasis ganglionares?

A Receptores de estrógenos
B ERBB2 (HER-2)
C E-cadherina
D Receptores de progesterona
E Tirosina cinasas

38 Una mujer de 55 años ha notado un bulto en la mama izquierda, cuyo tamaño ha aumentado durante el último año. Se palpa una masa irregular y dura de 5 cm fija a la pared torácica subyacente en la mama izquierda. Además, se encuentran linfoadenopatías axilares izquierdas indoloras. No hay hepatoesplenomegalia. La TC muestra múltiples nódulos pulmonares bilaterales en «perdigonada». Se realiza una biopsia de la mama izquierda, cuyo estudio microscópico muestra un carcinoma ductal infiltrante de alto grado. ¿Cuál de las siguientes características es más probable que se relacione con el aspecto de los nódulos pulmonares?

A Invasión de la arteria mamaria interna por células de carcinoma
B Conexiones linfáticas entre la mama y la pleura

C Sobreexpresión de receptores de estrógenos en los núcleos de las células del carcinoma
D Proximidad del cáncer de mama a los pulmones
E Quimiocinas pulmonares que se unen a los receptores de quimiocinas de las células del carcinoma

39 Se realiza un estudio de pólipos de colon. Se comparan las células malignas localizadas en el pólipo con las que muestran infiltración del tallo. El análisis molecular revela una regulación al alza de determinadas moléculas en las células malignas infiltrantes. Las lesiones infiltrantes tienen más probabilidad de asociarse a metástasis linfáticas. ¿Cuál de los siguientes marcadores es más probable que aumente su expresión en las células epiteliales malignas infiltrantes?
A BCL2
B CD44
C EGFR
D RAS
E Vimentina

40 En un ensayo clínico se trata a pacientes diagnosticados de melanoma mediante la infusión de linfocitos T CD8+ autólogos cultivados *in vitro.* Se sabe que estos linfocitos T CD8+ destruyen células del melanoma pero no células normales. ¿Cuál de los siguientes antígenos diana en las células tumorales es más probable que reconozcan estos linfocitos T CD8+?
A Moléculas del CPH de clase I con un péptido de las células del melanoma
B Moléculas del CPH de clase I con un péptido de los melanocitos normales y de las células del melanoma
C Moléculas del CPH de clase I más un péptido derivado del antígeno carcinoembrionario
D Moléculas del CPH de clase II con un péptido de las células del melanoma
E Moléculas del CPH de clase II con un péptido de los melanocitos normales y de las células del melanoma
F Moléculas del CPH de clase II con receptores de laminina sobre células del melanoma

41 Un experimento con células de carcinoma cultivadas estudia los efectos de vigilancia antitumoral del sistema inmunitario innato.

Estas células de carcinoma no expresan antígenos del CPH de clase I. Sin embargo, se observa que las células del carcinoma se lisan cuando se activa una célula inmunitaria mediante la incorporación al cultivo de IL-2. ¿Cuál de las siguientes células inmunitarias es más probable que actúe de este modo?

A Linfocito CD4+
B Linfocito CD8+
C Macrófago
D Neutrófilo
E Linfocito NK
F Célula plasmática

42 Un hombre de 33 años ha notado cefaleas ocasionales durante los últimos 3 meses. De repente presenta una convulsión generalizada. La TC craneal muestra una masa periventricular de 3 cm en el tálamo derecho. La biopsia estereotáctica de la masa obtiene células linfoides grandes, positivas para marcadores de linfocitos B. ¿Cuál de las siguientes enfermedades de base es más probable que afecte a este paciente?

A Diabetes mellitus
B Infección por el VIH
C Hipertensión
D Esclerosis múltiple
E Tuberculosis

43 Un estudio de investigación revisa las células almacenadas de pacientes de entre 30 y 50 años de edad con cáncer de colon derecho que tenían múltiples pólipos. Habitualmente, estos pacientes desarrollan lesiones malignas múltiples en el colon en la mediana edad. El análisis molecular de las células de estas lesiones identifica cambios en los genes *hPMS1*, *hPMS2* y *hMLH1*. ¿Cuál de los siguientes principios de la carcinogenia es el mejor ilustrado en este estudio?

A La carcinogenia es un proceso de múltiples pasos
B La incapacidad de reparar el ADN es carcinógena
C Muchos oncogenes se activan por translocaciones
D Los iniciadores de tumores son mutágenos
E Los promotores tumorales inducen la proliferación

44 Una niña de 12 años y un niño de 14 han desarrollado nódulos cutáneos, principalmente en las regiones expuestas al sol de la piel

durante los últimos 5 años, pero sus otros seis hermanos no. En la exploración física ambos niños tienen una talla y un peso adecuados. Las lesiones cutáneas son nódulos maculopapulares de 1-3 cm, de eritematosos a pardos y con áreas de ulceración. El análisis microscópico de una de estas lesiones cutáneas muestra un carcinoma epidermoide. Los niños no refieren antecedentes de infecciones de repetición, y los padres y familiares no están afectados. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que produzca neoplasias en estos niños?

A Mutación hereditaria del gen *p53*
B Translocación cromosómica
C Incapacidad de reparación del ADN mediante la escisión de nucleótidos
D Ingesta de alimentos contaminados por *Aspergillus flavus*
E Infección por el virus del papiloma humano

45 Una mujer de 26 años se nota un bulto en la mama izquierda. En la exploración física presenta una masa irregular y firme de 2 cm en el cuadrante superointerno mamario. No se detectan adenopatías axilares. La punción-aspiración con aguja fina de la masa muestra células ductales anaplásicas. La hermana de 30 años de la paciente ha sido diagnosticada recientemente de un carcinoma de ovario, y hace 3 años una tía materna fue diagnosticada de carcinoma ductal de mama y se sometió a una mastectomía. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que esté mutado en esta familia?

A *BCL2* (gen antiapoptósico)
B *BRCA1* (gen de reparación del ADN)
C *ERBB2* (gen del receptor de factor de crecimiento)
D *HST1* (gen del factor de crecimiento fibroblástico)
E *IL2* (gen del factor de crecimiento)
F *K-RAS* (gen de la proteína de unión al GTP)

46 En un estudio sobre pacientes con linfoma no hodgkiniano de linfocitos B se encuentra que un gen nuclear se transcribe de forma activa a ARNm y se transporta al citoplasma de la célula. Este ARNm se traduce en una proteína, con regulación al alza de BCL2. En un grupo control sin linfoma, no se produce esta traducción del ARNm. ¿Cómo es más probable que suceda el silenciamiento del ARNm de este gen activo?

A Ausencia de ARNt
B Unión a miARN
C Metilación del ADN
D Mutación del ARNm
E Regulación al alza del ADNmt

47 Un estudio sobre pacientes tratados con protocolos de quimioterapia por cáncer demuestra que el 10% de ellos desarrollaron posteriormente un segundo tumor, una incidencia muy superior a la encontrada en un grupo control sin tratamiento quimioterápico. Estos protocolos de quimioterapia incluyeron el alquilante ciclofosfamida. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que produzca carcinogenia en estos pacientes oncológicos tratados?

A Activación de la proteína cinasa C
B Activación de virus endógenos
C Bloqueo de las vías de TGF-β
D Daño directo del ADN
E Inhibición de la reparación del ADN
F Inhibición de la telomerasa

48 Un hombre de 51 años trabaja en una fábrica de tubos de plástico y refiere pérdida de peso, náuseas y vómitos de 4 meses de evolución. En la exploración física se encuentran hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho del abdomen y aumento de tamaño del hígado. Los hallazgos de laboratorio son concentraciones de fosfatasa alcalina sérica de 405 U/l; de AST de 45 U/l; de ALT de 30 U/l, y de bilirrubina total de 0,9 mg/dl. La ecografía abdominal pone de manifiesto una masa de 12 cm en el lóbulo hepático derecho. Se realiza una biopsia hepática, y el estudio histológico muestra una neoplasia maligna de las células endoteliales. ¿A cuál de los siguientes agentes es más probable que se haya expuesto este paciente?

A Arsénico
B Amianto
C Benceno
D Berilio
E Níquel
F Cloruro de vinilo
G Naftaleno

49 Una mujer de 56 años refiere un sangrado vaginal de 1 semana de evolución. La última regla la tuvo hace 10 años. En la exploración física se palpa una masa en la parte inferior del abdomen. Se realiza una biopsia endometrial, que muestra un carcinoma endometrial. La TC abdominal revela una masa de 6 cm en el ovario izquierdo. Se procede a una histerectomía abdominal total, y el estudio microscópico muestra que la masa ovárica es un tumor de células de la teca granulosa, con producción de estrógenos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la que mejor describe la relación entre estas dos neoplasias?

A Susceptibilidad genética a la oncogenia
B Inactivación por mutación de un gen supresor de tumores
C Síndrome paraneoplásico
D Promoción de la carcinogenia
E Heterogeneidad tumoral

50 Una mujer de 23 años, que trabaja como secretaria para una empresa financiera en Kiev, se ha notado un nódulo palpable en la parte lateral del cuello durante los últimos 3 meses. En la exploración física se identifica un nódulo firme indoloro de 2 cm en el lóbulo tiroideo derecho. La secuenciación del ADN obtenido de dicho nódulo muestra un reordenamiento del gen *RET*. Ninguno de sus familiares está afectado por este trastorno. ¿Cuál de los siguientes datos se consideraría más importante en los antecedentes médicos de esta mujer?

A Carencia crónica de yodo en la dieta
B Abuso crónico del etanol
C Ataxia-telangiectasia congénita
D Ingesta de compuestos arsenicales
E Exposición a la radiación en la infancia



51 Un hombre de 42 años se encuentra preocupado por un lunar muy pigmentado en el dorso de la mano. La lesión ha crecido y sangrado durante el mes previo. En la exploración física se observa una lesión intensamente pigmentada y ligeramente sobreelevada de 1,2 cm en el dorso de la mano derecha. Se extirpa la lesión por completo. Su aspecto histológico se muestra en la imagen. ¿Cuál de los siguientes factores se asocia al máximo riesgo de desarrollar esta neoplasia?

A Alergia al látex
B Exposición al amianto
C Quimioterapia
D Tabaquismo
E Radiación ultravioleta

52 Una mujer de 33 años con múltiples parejas sexuales refiere sangrado y secreción vaginal desde hace 5 días. En la exploración se encuentra afebril. La exploración pélvica revela una lesión ulcerada localizada en la unión escamocilíndrica del cérvix uterino. Se realiza una biopsia cervical, cuyo estudio histológico muestra un tumor infiltrante con áreas de epitelio escamoso con formación de perlas córneas. La hibridación *in situ* demuestra presencia de ADN del virus del papiloma humano de tipo 16 (VPH-16) en las células tumorales. ¿Cuál de las siguientes alteraciones moleculares de este tumor es más probable que se relacione con la infección por el VPH-16?

A Inactivación funcional de la proteína RB
B Aumento de la expresión del receptor del factor de

crecimiento epidérmico
C Silenciamiento epigénico del gen *RB*
D Incapacidad de reparación del daño del ADN
E Atrapamiento de la proteína RAS en estado de unión al GTP



53 Una mujer de 66 años lleva toda la vida trabajando en una pequeña granja familiar en la llanura de Kantō, cerca de Tokio. No ha padecido enfermedades graves previas, pero durante este último año cada vez se encuentra más cansada y débil. En la exploración física la paciente está afebril pero pálida. Las pruebas de laboratorio muestran unas cifras de hemoglobina de 11,3 g/dl; un nivel de hematocrito del 33,8%; un recuento de plaquetas de 205.200/mm^3, y un recuento leucocítico de 64.000/mm^3. En la figura se muestra el inmunofenotipo de sus leucocitos. Si se asume que la población de células dominante es clonal, ¿cuál de los siguientes microbios es más probable que esté implicado en el proceso

patológico de la paciente?

A Virus de Epstein-Barr
B Virus de la hepatitis B
C VIH-1
D *Helicobacter pylori*
E Virus linfótropo de linfocitos T humanos de tipo 1

54 Un hombre de 40 años tiene antecedentes de adicción a drogas por vía intravenosa. La exploración física muestra trayectos de punción en la fosa antecubital izquierda. Presenta una ictericia esclerótica leve. Los estudios serológicos fueron positivos para HBsAg y para anticuerpos frente al VHC. Quince años después el paciente desarrolló un carcinoma hepatocelular. ¿Cuál de las siguientes características víricas es la que mejor explica por qué el paciente desarrolló un carcinoma hepatocelular?

A Integración del virus en zonas adyacentes a protooncogenes
B Captura por el virus de protooncogenes del ADN de las células del huésped
C Cambios inflamatorios víricos con lesiones genómicas
D Inactivación por el virus de la expresión de los genes *RB* y *p53*
E Infección por el virus de las células inflamatorias con inmunodepresión del huésped

55 Un hombre de 61 años con antecedentes de hepatitis vírica crónica refiere una pérdida de 6 kg de peso durante los últimos 5 meses. La exploración física no muestra masas ni linfoadenopatías palpables. La TC abdominal revela un hígado nodular con una masa de 10 cm en el lóbulo derecho. La prueba de sangre oculta en heces con guayacol es negativa. ¿Cuál de los siguientes parámetros es más probable que esté elevado en este paciente?

A α-fetoproteína
B CA19-9
C Calcitonina
D Antígeno carcinoembrionario
E Inmunoglobulina M

56 En un estudio clínico participan pacientes diagnosticados de carcinoma con estadio T4N1M1. La supervivencia de los pacientes a los 5 años del diagnóstico es inferior al 50% independientemente del tratamiento. ¿Cuál de las siguientes características clínicas es más probable encontrar en este grupo de pacientes?

A Caquexia
B Soplos cardíacos
C Ictericia
D Pérdida de sensibilidad
E Esplenomegalia
F Timpanismo



57 Un hombre de 49 años presenta un episodio de hemoptisis. En la exploración se observan tumefacción facial, edema en los pies e hipertensión sistólica. La radiografía de tórax identifica una masa irregular de 5 cm perihiliar en el pulmón derecho. Las pruebas de laboratorio muestran unos niveles de electrólitos séricos normales. Se realiza una biopsia transbronquial, y la figura muestra los hallazgos microscópicos. La gammagrafía ósea no revela metástasis. ¿Cuál de los siguientes marcadores es más probable que sea positivo en el estudio inmunohistoquímico de las células tumorales?

A Hormona antidiurética
B Corticotropina
C Eritropoyetina
D Insulina
E Péptido relacionado con la hormona paratiroidea

58 Un hombre de 59 años refiere presencia de sangre en la orina desde hace 1 semana. La cistoscopia muestra una masa exofítica de 4 cm que afecta a la pared vesical derecha, cerca del trígono. Se obtienen muestras de biopsia y se realiza una cistectomía radical. El estudio de la muestra de resección revela un carcinoma anaplásico, que ha invadido la pared vesical. ¿Cuál de las siguientes técnicas es más probable que permita categorizar el origen de la neoplasia si se aplica sobre sus células?

A Cariotipado cromosómico
B Frotis citológico
C Micromatriz de ADN
D Análisis de citometría de flujo
E Inmunohistoquímica

59 Un hombre de 69 años refiere tos crónica desde hace 3 meses. En la exploración física se evidencia un leve estridor inspiratorio en el pulmón derecho. La radiografía de tórax muestra una masa en el hilio del pulmón derecho de 5 cm de diámetro, y la muestra de punción-aspiración con aguja fina revela células compatibles con un carcinoma epidermoide. Si esta neoplasia se estadifica como T2N1M1, ¿cuál de los siguientes hallazgos es más probable en este paciente?

A Metástasis cerebrales
B Aumento de la concentración de corticotropina
C Infiltración de la pared torácica
D Obstrucción de un bronquio principal
E Células tumorales poco diferenciadas

60 Una mujer de 76 años refiere cambios en el calibre de sus heces desde hace 1 mes. En la exploración física no se encuentran alteraciones, pero una muestra de heces resulta positiva para sangre oculta. Se realiza una colonoscopia y se identifica una masa estenosante en la parte distal del sigma. Se somete a la paciente a una colectomía parcial. ¿Cuál de estas técnicas, durante la cirugía, ayudaría mejor al cirujano a decidir si la resección reduciría la probabilidad de recidiva?

A Microscopia electrónica
B Punción-aspiración con aguja fina
C Citometría de flujo
D Corte en congelación

E Pruebas radiológicas
F Determinación del antígeno carcinoembrionario sérico

Respuestas

1 **A** Una masa pequeña y delimitada como la descrita probablemente sea benigna. Los adenomas se originan en la superficie epitelial. Aunque sobre los adenomas de colon puede originarse un adenocarcinoma, estas lesiones malignas suelen ser más grandes e irregulares. Un coristoma es una masa benigna de tejidos que no se encuentran en el lugar donde aparece. Un hamartoma es una masa benigna poco frecuente constituida por tejidos que sí se encuentran en el lugar donde aparece. Una lesión hiperplásica de colon suele ser más pequeña y plana. Un sarcoma es una neoplasia maligna originada en tejidos mesenquimatosos, no en el epitelio.

2 **G** Un teratoma es una neoplasia derivada de células germinales totipotenciales, que se diferencian en tejidos correspondientes a las tres capas germinales: ectodermo, endodermo y mesodermo. Cuando todos los elementos están bien diferenciados, la neoplasia será «madura» (benigna). Los adenocarcinomas están constituidos por elementos glandulares de aspecto maligno. Los fibroadenomas comprenden un elemento glandular y otro estromal, ambos benignos, y son frecuentes en la mama. Los gliomas se originan en el sistema nervioso central. Los hamartomas contienen una mezcla de tipos celulares frecuentes en su lugar de origen; esta infrecuente lesión puede aparecer en los pulmones. El mesotelioma se origina en el revestimiento de las cavidades torácica y abdominal. El rabdomiosarcoma está constituido por células que se parecen poco al músculo estriado; la mayoría se originan en los tejidos blandos.

3 **B** Lo más probable es que una masa grande, irregular y ulcerada como la descrita sea maligna, y el epitelio vesical origina carcinomas. Los carcinomas uroteliales se asocian a tabaquismo. Un adenoma es una neoplasia epitelial benigna de los tejidos glandulares. Un fibroma es una neoplasia mesenquimatosa benigna. Un papiloma es una masa benigna localizada con un patrón de crecimiento exofítico. Un sarcoma deriva de células de origen mesenquimatoso; los sarcomas son

mucho menos frecuentes que los carcinomas.

4 **B** El aspecto pequeño y delimitado de esta masa, junto con su lento crecimiento, de forma que casi no ha cambiado de tamaño, sugieren que es una neoplasia benigna. El color rojizo sugiere vascularización. Un hemangioma es una lesión cutánea benigna frecuente. Los fibroadenomas se originan en la mama. Los leiomiomas, que son blanquecinos, se originan en el músculo liso y son más frecuentes en el útero. Los lipomas son tumores grasos amarillentos que pueden originarse debajo de la epidermis. Los melanomas son malignos y suelen aumentar de tamaño con rapidez; muchos de ellos tienen una pigmentación oscura. El equivalente benigno del melanoma es el nevo, una lesión bastante frecuente, pero que suele tener una coloración parda más o menos oscura.

5 **D** Una neoplasia verdadera es una proliferación monoclonal de células, mientras que la proliferación celular reactiva no es monoclonal. El análisis genético molecular, como el análisis de los tipos de alelo con marcadores de microsatélites, demuestra clonalidad. Las proliferaciones celulares reactivas y neoplásicas pueden mostrar unos patrones de tinción histoquímica e inmunohistoquímica parecidos, en función de los tipos de células y proteínas existentes. La citometría de flujo es eficaz para medir el contenido de ADN, la aneuploidía y la fracción de crecimiento, pero no valora la clonalidad.

6 **E** La figura muestra un carcinoma *in situ* del epitelio escamoso cervical, que crece exclusivamente por encima de la membrana basal. Las lesiones tisulares con reparación y regeneración pueden producir una metaplasia, que puede evolucionar a displasia, que es un cuadro premaligno. Los cánceres *in situ,* limitados al epitelio, no infiltran y la resección local consigue curar el 100% de los casos. Las lesiones *in situ* no producen metástasis y no se originan en otra zona. Esta lesión guarda relación con la infección por el virus del papiloma humano (VPH), no con el virus del herpes simple (VHS). El CA-125 suele ser marcador de cáncer de ovario.

7 **D** Una neoplasia epitelial maligna se origina en la mucosa, pero muestra tendencia a la infiltración local. Una neoplasia benigna suele ser bien delimitada y los tejidos normales comprimidos

parecen formar un límite neto. Esta lesión localizada se puede extirpar con facilidad, con márgenes adecuados. Cuando la lesión no se ha diseminado fuera del colon, es poco probable que la quimioterapia aporte beneficios. La muestra de biopsia revela una lesión maligna, que debe ser extirpada antes de que aumente de tamaño e infiltre los tejidos locales u ocasione metástasis. Si el paciente no refiere antecedentes familiares, es poco probable que se trate de un cáncer familiar con riesgo elevado de recidiva por la presencia de múltiples pólipos; la resección local es adecuada. Es poco probable que esta lesión mucosa solitaria corresponda a una metástasis.

8 **A** Las células que muestra la figura presentan un marcado pleomorfismo e hipercromatismo (anaplasia) y resulta difícil discernir cuál es la célula de origen, dado que no presentan diferenciación aparente. Se observa una mitosis tripolar aberrante. Este grado de anaplasia es compatible con una lesión maligna invasiva de alto grado, que se denomina *carcinoma anaplásico.* La apoptosis es la necrosis de células aisladas, pero las células de la imagen parecen viables y no fragmentadas. La displasia son cambios en el seno del epitelio precursores de una neoplasia. La metaplasia en la que un tipo de célula epitelial se cambia por otro puede ser precursora de una displasia y de malignidad. Las neoplasias bien diferenciadas suelen ser menos invasivas y crecer de forma más lenta, y recuerdan a la célula de origen.

9 **F** En la figura, las células epiteliales atípicas afectan de forma desordenada a todo el espesor del epitelio. Atraviesan la membrana basal subyacente e infiltran el estroma circundante formando nidos redondeados a la derecha, proceso que se denomina *infiltración.* El ectocérvix y el epitelio escamoso metaplásico del endocérvix pueden originar una displasia sobre la cual puede aparecer un carcinoma epidermoide. El carcinoma *in situ* se limita al epitelio; si se rompe la membrana basal, la lesión ya no será *in situ* sino infiltrante. Un adenocarcinoma es una neoplasia maligna originada en el epitelio glandular, como el endocérvix o el endometrio, no el ectocérvix. Un proceso displásico podría anteceder al desarrollo de un carcinoma *in situ* y de un carcinoma epidermoide; la displasia solo afecta a una

porción del espesor del epitelio. Un hamartoma es una mezcla de tipos de células frecuentes en el tejido donde se origina. La metaplasia se puede producir como respuesta a una infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH) u otros trastornos inflamatorios. La metaplasia puede ser precursora de la displasia.

10 **C** La diseminación linfática, sobre todo a ganglios regionales que drenan el origen del tumor primario, es típica del carcinoma. Un carcinoma intraductal no se ha extendido por debajo de la membrana basal, pero el carcinoma infiltrante ha adquirido la capacidad de infiltrar y metastatizar. Puede resultar difícil determinar el origen del tumor primario cuando este es pequeño o profundo y por eso es necesario realizar estudios radiológicos, como la mamografía. Un fibroadenoma es una neoplasia benigna y no tiene capacidad de infiltrar o metastatizar. La infección asociada a un absceso mamario puede extenderse a los ganglios linfáticos, pero el aumento de tamaño ganglionar observado se asocia típicamente a dolor, un signo clave de la inflamación aguda. Es raro que los sarcomas metastaticen a los ganglios linfáticos, y los leiomiosarcomas de mama son infrecuentes.

11 **D** La figura muestra la presencia de múltiples lesiones metastásicas pardas de tamaño variable en el hígado, que se deben a la extensión hematógena de un carcinoma. Los adenocarcinomas de origen abdominal, como los de colon, páncreas y estómago, son los tumores primarios más probables. La tromboembolia sugiere un estado de hipercoagulabilidad, como un síndrome paraneoplásico. Los angiosarcomas hepáticos son infrecuentes. El tumor maligno primario hepático cursa típicamente como una masa dominante y no como múltiples masas. Aunque algunos tumores benignos, como los leiomiomas uterinos, pueden ser múltiples, esto no es habitual en el hígado y los adenomas hepáticos son infrecuentes. Aunque los carcinomas hepatocelulares pueden presentar nódulos «satélite», los nódulos dispersos, como los que aparecen en la figura, son más característicos de las metástasis. Los infiltrados leucémicos no producen lesiones de tipo masa grandes, aunque algunos linfomas pueden hacerlo. La resección de metástasis

múltiples suele resultar inútil.

12 **C** Los carcinomas suelen causar metástasis por vía linfática con mayor frecuencia, en primer lugar a los ganglios regionales. Sin embargo, también pueden producir metástasis por vía hematógena, como medulares, hepáticas o al pulmón contralateral. Aproximadamente la mitad de las metástasis cerebrales en conjunto se originan en carcinomas primarios pulmonares. Las metástasis a tejidos blandos, como músculo, tejido conjuntivo y grasa, son poco frecuentes, igual que las metástasis esplénicas.

13 **B** La disminución del número de cánceres gástricos puede guardar relación con una reducción en el número de carcinógenos en la dieta o con la menor prevalencia de la infección por *Helicobacter pylori;* sin embargo, no está clara la razón exacta. Los gliomas cerebrales no son tan frecuentes como los carcinomas; una leyenda urbana los vincula con el uso del teléfono móvil, aunque los estudios epidemiológicos adecuados no han permitido confirmarlo. Los angiosarcomas hepáticos son bastante infrecuentes y epidemiológicamente se relacionan con la exposición al cloruro de vinilo. Las leucemias y los linfomas tampoco son tan frecuentes como los carcinomas. Los carcinomas de células pequeñas pulmonares se relacionan con el tabaco y su frecuencia se ha reducido en muchos países gracias a las campañas de lucha antitabáquica. Su mortalidad es típicamente elevada porque el pronóstico del cáncer pulmonar es muy malo.

14 **B** La incidencia de cáncer de pulmón aumentó de forma espectacular durante el siglo xx por la popularidad del tabaco. Cuando aumenta el número de fumadores en una población, también lo hace el número de cánceres de pulmón. Algunos cánceres de la vía urinaria, de la cavidad bucal, del esófago y del páncreas también guardan una relación causal con el tabaco. Los cánceres de mama, próstata y colon siguen siendo frecuentes en los países desarrollados, pero el número de casos no ha aumentado de forma abrupta. La citología cervicovaginal y la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) reducen de forma notable el número de cánceres de cérvix. Se ha observado un incremento de la incidencia de melanomas a

escala mundial, pero siguen produciéndose muchos menos casos de melanoma que de cáncer de pulmón. Las neoplasias hepáticas e intracraneales son mucho menos frecuentes que los cánceres de pulmón en los adultos.

15 **B** Un programa de cribado debería detectar de forma fiable los cánceres con una mayor incidencia de forma precoz. El cáncer de mama afecta hasta a 1 de cada 9 mujeres en estas regiones. La mamografía puede facilitar la detección de cánceres pequeños, que tienen mejor pronóstico. La radiografía de tórax es una técnica poco sensible para la detección de los cánceres precoces de pulmón. Dado que la citología cervicovaginal permite detectar las displasias y los carcinomas *in situ,* que se pueden tratar antes de que progresen a lesiones infiltrantes, las muertes secundarias a cánceres de cérvix se han reducido de forma constante desde que se introdujo de forma generalizada esta herramienta de cribado en la segunda mitad del siglo xx. La introducción de la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) disminuirá el número de cánceres cervicales incluso más. Los marcadores tumorales séricos no han resultado útiles como herramienta para el cribado general, aunque tienen utilidad en algunas circunstancias seleccionadas. La aplicación de la prueba de sangre oculta en heces con guayacol influye de forma mínima sobre la mortalidad del carcinoma colorrectal, pero los médicos deben ser cautelosos a la hora de indicar la realización de un «tacto rectal diferido» en el informe de la exploración física, pues podría contribuir a este problema. La citología de orina es mejor que el análisis de orina para detectar los tumores malignos uroteliales, pero su sensibilidad no es muy elevada.

16 **C** El oncogén *MYC* suele estar activado en el linfoma de Burkitt mediante una translocación t(8;14). El gen *MYC* se une al ADN y determina la activación de la transcripción de genes vinculados con el crecimiento, como el gen de la ciclina D1, lo que se traduce en la activación del ciclo celular. *EGF* (igual que *HER2* en los cánceres de mama) codifica un receptor del factor de crecimiento epitelial localizado en la superficie celular. *p53* y *APC* son genes supresores de tumores que están inactivados en muchos cánceres, incluido el de colon. El oncogén *RAS* codifica

una proteína de unión a GTP que se localiza por debajo de la membrana celular.

17 **D** Este paciente refiere los antecedentes clásicos y la translocación t(9;22) típica de la leucemia mieloide crónica. La translocación produce una actividad incontrolada de tirosina cinasas no receptoras del gen de fusión *BCR-ABL*. Estos pacientes experimentan remisión con fármacos inhibidores de la tirosina cinasa, como el imatinib. Los fármacos activadores de las caspasas pueden, teóricamente, ayudar a muchos pacientes, sobre todo cuando se bloquea la apoptosis, como sucede en tumores con sobreexpresión de *BCL2.* Los anticuerpos frente a receptores del factor de crecimiento epidérmico, como los receptores *ERBB2 (HER2)*, resultan beneficiosos para determinados tumores de mama con amplificación de este gen. Todavía no se ha demostrado que la introducción de *p53* en las células mediante vectores víricos sea útil como tratamiento del cáncer y no se emplea en la leucemia mieloide crónica. La translocación de la β-catenina al núcleo se describe en los cánceres de colon que presentan una pérdida por mutación de los genes *APC.*

18 **A** La figura corresponde a un carcinoma ductal infiltrante e intraductal. Es posible detectar mediante inmunohistoquímica e hibridación por fluorescencia *in situ* (FISH) el aumento de la expresión de *ERBB2 (HER2)* en la muestra de biopsia. Este cambio puede encontrarse en un tercio de los cánceres de mama. Esta amplificación se asocia a un peor pronóstico. La detección de un producto génico específico en el tejido sirve para determinar el tratamiento y el pronóstico. Las mutaciones de *BRCA1* y *p53,* cuando se heredan en línea germinal, pueden predisponer al paciente al desarrollo de cáncer de mama y otros tumores. En pacientes con *BRCA1* se describen antecedentes familiares de cáncer de mama, con frecuencia en edades tempranas. Las mutaciones del gen supresor de tumores *p53* predisponen a muchos tipos de cánceres. La deleción hereditaria del gen *RB* predispone al retinoblastoma. El producto de fusión *BCR-ABL,* presente en la leucemia mieloide crónica, se suele deber a t(9;22).

19 **F** Los dobles diminutos y las regiones de tinción homogénea

presentes en el cariotipo se corresponden con amplificaciones génicas. La amplificación del gen *N-MYC* se describe en el 30-40% de los neuroblastomas y este cambio se asocia a mal pronóstico. Los genes *BCL1* y *BLC2* están mutados en algunos linfomas no hodgkinianos. La mutación *IL2* puede aparecer en algunas neoplasias de linfocitos T. Las mutaciones de *K-RAS* aparecen en muchos cánceres, pero no se describen típicamente en las neoplasias infantiles. La mutación *Lyn* existe en algunas inmunodeficiencias.

20 **B** Las displasias epiteliales, sobre todo las graves, pueden ser precursoras de carcinomas. Este es el principal motivo por el que se realiza el cribado con citología cervicovaginal. La incidencia de carcinoma de cérvix disminuye cuando se realizan citologías de forma habitual. La colposcopia con biopsia está indicada para determinar la extensión de la lesión antes de proceder a su extirpación. Aunque se relacionan con la infección por el virus del papiloma humano (VPH), las displasias graves no se pueden tratar con antibióticos. Las neoplasias ováricas no se relacionan con las displasias o los carcinomas de cérvix. En general, los cánceres de cérvix no se asocian a síndromes hereditarios, y las displasias cervicales no son hereditarias. El cribado de familiares está indicado cuando existan factores de riesgo, como múltiples parejas sexuales. Es poco probable que se produzca la remisión de una displasia grave.

21 **E** Es típico que un adenocarcinoma de colon tarde años en desarrollarse, y durante este período se producen múltiples mutaciones en la mucosa, incluidas aquellas que afectan a genes como *APC* (gen de la poliposis adenomatosa del colon), *K-RAS* y *p53*. El factor más importante para el desarrollo de un carcinoma es la acumulación de mutaciones, más que su aparición en un orden específico. La activación de protooncogenes, la regeneración extensa, los defectos en los genes *TP53* y la amplificación de los genes de los receptores de los factores de crecimiento contribuyen todos al desarrollo de tumores malignos, pero no son suficientes por sí solos para producir un carcinoma a partir de un adenoma de colon. La pérdida hereditaria del gen *TP53* salvaje contribuye al desarrollo de múltiples cánceres, pero no de los adenomas esporádicos.

22 **E** Aunque las neoplasias debutan como proliferaciones monoclonales, con el tiempo se añaden más mutaciones y esto da origen a subclones de células neoplásicas con diversas propiedades invasivas. Esta presencia de subclones puede permitir las metástasis, una mayor capacidad de infiltración, la resistencia a la quimioterapia y las diferencias morfológicas entre las lesiones. Dado que los sarcomas pulmonares son infrecuentes, la masa pulmonar se corresponde estadísticamente con una metástasis. Aunque pueden aparecer segundos tumores primarios malignos, sobre todo en pacientes que ya tuvieron un tumor maligno, existe mayor probabilidad de que un paciente con este antecedente sufra metástasis. Los sarcomas no guardan relación con el tabaquismo. La herencia de un gen *RB* mutante se asocia a un riesgo aumentado de desarrollar retinoblastomas infantiles y osteosarcomas. El sarcoma de Kaposi es el que con más frecuencia se asocia a sida secundario a infección por el VIH.

23 **D** El oncogén *RAS* es el más frecuentemente implicado en el desarrollo de cánceres humanos. Las mutaciones del oncogén *RAS* reducen la actividad GTPasa y *RAS* queda atrapado en un estado activado ligado a GTP. *RAS* transmite entonces señales al núcleo a través de las cinasas citoplásmicas. El gen *APC* puede activar la vía de transmisión de señales WNT. El oncogén *MYC* es un activador de la transcripción, sobreexpresado en muchos tumores. El gen supresor de tumores *p53* codifica una proteína implicada en el control del ciclo celular. El protooncogén *RET* codifica una tirosina cinasa receptora implicada en las células neuroendocrinas del tiroides, de la médula suprarrenal y de las paratiroides. El oncogén *sis* codifica el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas β, sobreexpresado en algunos astrocitomas.

24 **E** Existen antecedentes familiares de melanoma. Los tumores familiares se suelen asociar a la herencia de una copia defectuosa de alguno de los diversos genes supresores de tumores. En el caso de los melanomas, el gen implicado se llama *p16* o *INK4a*. El producto del gen *p16* es un inhibidor de las cinasas dependientes de ciclina. Las mutaciones en línea germinal de *CDKN2A* también pueden subyacer a los

melanomas familiares. Cuando se pierde el control sobre las cinasas dependientes de la ciclina, no es posible regular el ciclo celular, lo que favorece la transformación neoplásica. *BCL2* aparece en algunas neoplasias linfoides. El gen *c-MYC* está mutado en diversos carcinomas, pero no se sabe que esté asociado de forma específica a los melanomas. La mutación de *IL2* se relaciona con algunas neoplasias de linfocitos T. En algunas inmunodeficiencias se encuentra la mutación *Lyn.* En muchos cánceres se encuentran mutaciones de *p53,* pero no de forma específica en los melanomas familiares.

25 **G** El gen *RB* es un ejemplo clásico del mecanismo de los «dos golpes» para la pérdida de supresión tumoral. Aproximadamente el 60% de estos tumores son esporádicos, mientras que el resto son familiares por la herencia de una copia mutada del gen *RB*. La pérdida de la segunda copia en los retinoblastos conduce a la aparición del retinoblastoma durante la infancia. El gen *RB* controla la transición de G_1 a S durante el ciclo celular; cuando se pierden las dos copias, se pierde este importante punto de control del ciclo celular. El gen de fusión *BCR-ABL* de la leucemia mieloide crónica es un ejemplo de sobreexpresión de un producto génico como causa de neoplasia. El gen *BCL2* es un inhibidor de la apoptosis. El gen *hMSH2* aparece en la mayor parte de los casos de cáncer de colon no poliposo hereditario e interviene en la reparación del ADN. Muchos cánceres tienen el gen *K-RAS,* que se comporta como un oncogén. El producto del gen *NF1* actúa como supresor de tumores y es un componente de la neurofibromatosis (que no suele afectar al ojo) y produce neoplasias que aparecen típicamente en edades más tardías. Muchos cánceres tienen mutaciones del gen supresor de tumores *p53,* pero esto no es típico de las neoplasias oculares infantiles.

26 **E** El TGF-β inhibe la proliferación celular mediante la activación de genes inhibidores del crecimiento, como *CDKI.* Todos los cánceres pancreáticos y el 83% de los de colon presentan al menos una mutación en la vía del TGF-β. La familia de genes *BCL2* se comporta como un regulador de la apoptosis. La vía de β-catenina vinculada con el gen *APC* está implicada en la regulación del crecimiento; la pérdida de los *loci* del gen *APC*

determina un fallo en la destrucción de la β-catenina, que se transloca al núcleo celular, donde actúa como un factor de transcripción promotor del crecimiento. El gen *MYC* es una diana de la vía de RAS activada. La proteína *p53* está implicada en la supresión tumoral.

27 **C** La mutación de *p53* que afecta a los dos alelos de tipo salvaje es una de las alteraciones genéticas más habituales en los cánceres humanos, incluidos los más frecuentes –como los de pulmón, colon y mama–. La pérdida de esta actividad supresora de tumores indica que el ciclo celular no se detiene adecuadamente a finales de la fase G_1, y cuando se ha producido un daño del ADN no es posible completar su reparación antes de que la célula prolifere. La incapacidad de hidrolizar el GTP es consecuencia de la activación del oncogén *RAS.* Los factores de crecimiento, como el EGF, son activadores del ciclo celular que fomentan el crecimiento de las células. La inestabilidad de microsatélites ocurre cuando aparecen mutaciones en genes, como *hMSH2,* responsables de la reparación de las lesiones del ADN. La activación de la transcripción es un rasgo del protooncogén *MYC*.

28 **A** El paciente refiere la historia clásica de una poliposis adenomatosa familiar con presencia de numerosos pólipos adenomatosos y malignización. El primer acontecimiento dentro de la secuencia *APC* → adenocarcinoma es la pérdida de la función del gen *APC*. Esta impide la destrucción de la β-catenina en el citoplasma, que se transloca al núcleo y coactiva la transcripción de varios genes. La secuencia *APC* → β-catenina es un componente de la vía de transmisión de señales WNT. La activación de *RAS* tiene lugar después de que la secuencia de transformación maligna sea iniciada por el gen *APC* (guardián). La pérdida de la parada del ciclo celular en G_1 tiene lugar en fases posteriores de la secuencia cuando se pierde *p53*. Las mutaciones de los genes de reparación de errores provocan el síndrome de cáncer de colon hereditario no poliposo por la pérdida de capacidad de reparar el daño del ADN. El gen *BCL2* no participa en la transición de adenoma a carcinoma.

29 **E** El gen *p53* es la diana más frecuente de las alteraciones genéticas en las neoplasias humanas. La mayoría son

mutaciones esporádicas, aunque algunas son hereditarias. La herencia de un gen supresor *p53* alterado predispone al «segundo golpe», que elimina el gen *p53* que quedaba. La pérdida homocigota de *p53* desregula la reparación del ADN dañado y predispone a los individuos al desarrollo de múltiples tumores, como sucede en este caso. El gen *APC* está mutado en los cánceres de colon esporádicos y en la poliposis cólica familiar. El gen *BCL2* lo está en algunos linfomas no hodgkinianos. El gen *HER2* es uno de los miembros de la familia de receptores de EGF que está amplificado en algunos cánceres de mama. La mutación de *EGF* existe sobre todo en los carcinomas epidermoides pulmonares. Las mutaciones de *K-RAS* se encuentran en muchos cánceres, pero no lo están típicamente en las neoplasias malignas linfoides. La mutación del gen *NF1* se describe en la neurofibromatosis de tipo 1.

30 **E** Este paciente tiene rasgos clínicos de neurofibromatosis de tipo 1. El gen *NF1* codifica una proteína activadora de GTPasa que facilita la conversión de RAS activo (ligado a GTP) a inactivo (ligado a GDP). La pérdida de *NF1* impide dicha conversión y atrapa a RAS en el estado activo de transmisión de señales, que fomenta la proliferación celular. Por tanto, el gen *NF1* de tipo salvaje se comporta como un supresor de tumores. Todos los demás mecanismos enumerados participan también en la carcinogenia, pero en distintos tipos de tumores.

31 **A** La PET se basa en la captación selectiva de un derivado de la glucosa por las células tumorales. El efecto Warburg se produce cuando las células de un cáncer cambian su metabolismo a la glucólisis aeróbica para obtener una ventaja de crecimiento selectivo en condiciones adversas. La glucólisis también produce piruvato para las demandas anabólicas causadas por el incremento de la duplicación tumoral. Los genes *p53* y *c-MYC* favorecen este cambio metabólico, mientras que *PTEN* inhibe la autofagia de las células tumorales, con lo que hace posible que crezcan. Las células tumorales están menos diferenciadas que las normales, por lo que tienen una menor capacidad de realizar muchos procesos bioquímicos complejos, de manera que prefieren una sencilla glucólisis. La gluconeogenia es una función de los hepatocitos en respuesta a una reducción de la

ingesta calórica. La derivación del monofosfato de hexosa y el ciclo de Krebs son más útiles para que las células normales mantengan su situación. Las neoplasias generan una gran cantidad de purinas por las divisiones celulares y el recambio celular que debe ser eliminado como ácido úrico, aunque las células neoplásicas no realizan esta tarea.

32 **B** Este es un ejemplo de una translocación cromosómica que coloca al *gen BCL2,* que es un gen antiapoptósico, cerca de otro (el de la cadena pesada de las inmunoglobulinas). El gen *BCL2* está sometido a una estimulación continua por el elemento promotor adyacente del gen de las inmunoglobulinas, de forma que se sobreexpresa. El gen *APC* está mutado en el cáncer de colon esporádico y en los cánceres asociados a la poliposis cólica familiar. La mutación del gen *BRCA1* se describe en algunos cánceres de mama. El gen *c-MYC* se localiza en el cromosoma 8, y la translocación t(8;14) aparece en muchos linfomas de Burkitt y conduce a la sobreexpresión de *MYC*. Puede encontrarse una mutación de *IL2* en algunas neoplasias de linfocitos T. Existen mutaciones de *K-RAS* en muchos cánceres, pero no típicamente en las neoplasias linfoides.

33 **A** El gen *BCL2* controla la producción de una proteína inhibidora de la apoptosis, y la sobreexpresión de este gen permite que se acumulen células anómalas en los tejidos linfoides. La amplificación génica suele afectar a los oncogenes *ERBB2 (HER2)* y *MYC*. El aumento de la actividad de la tirosina cinasa se produce por mutaciones que afectan al oncogén *ABL*. La pérdida de la inhibición del ciclo celular se asocia a la pérdida de genes supresores de tumores, como *p53*. En la xerodermia pigmentaria, que es un trastorno hereditario, se reduce la capacidad de reparación del ADN.

34 **E** El acortamiento de los telómeros de los cromosomas en las células humanas normales limita su capacidad de replicación y conduce a la senescencia replicativa. Esto se produce porque la mayor parte de las células somáticas no tienen la enzima telomerasa. Las células madre humanas normales expresan la telomerasa. Por el contrario, el 90% o más de las células tumorales humanas presentan una activación de la telomerasa, lo que explica el crecimiento tumoral mantenido en el

organismo y las líneas celulares «inmortalizadas» en cultivo. Todas las demás vías enunciadas no afectan al acortamiento por la telomerasa, que es el paso limitante de la velocidad en la replicación celular indefinida.

35 **C** Algunas neoplasias, incluidos algunos linfomas, tienen un elevado porcentaje de células en la reserva de replicación (es decir, presentan una elevada fracción de crecimiento). Crecen con rapidez y también responden rápidamente a fármacos que destruyen las células en división. Una mala vascularización no favorece un crecimiento rápido y muchas neoplasias elaboran factores de crecimiento que fomentan la proliferación vascular. Los tumores malignos se caracterizan por ser monoclonales más que policlonales, aunque con el tiempo pueden aparecer subclones de células neoplásicas. Las neoplasias invasivas tienen más probabilidades de producir metástasis. Existe una mayor probabilidad de que los tumores muy antigénicos sean controlados por el sistema inmunitario y no crezcan con rapidez.

36 **G** La angiogenia es un rasgo clave de las neoplasias porque el tumor en crecimiento necesita un aporte vascular, y la regulación al alza de algunos factores, como el VEGF y el FGF, ayuda a mantener el crecimiento del tumor. El VEGF puede estar regulado al alza por la activación del factor inducible por hipoxia 1 α (HIF-1-α). El gen de von Hippel-Lindau *(VHL)* se comporta como un supresor de tumores y normalmente produce una proteína que se une al HIF-1-α, de forma que se elimina. Cuando aparece una mutación de *VHL* se pierde esta proteína de unión y se activan los factores angiógenos. Los pacientes con un síndrome de VHL sufren varias neoplasias, como feocromocitomas, carcinomas de células renales y hemangioblastomas. Los demás genes enumerados generan productos que no actúan de forma directa sobre las vías angiógenas.

37 **C** Varios mecanismos patológicos intervienen en la aparición de las metástasis. En primer lugar, las células tumorales deben hacerse descohesivas y soltarse del foco primario, degradar la membrana basal y el tejido conjuntivo intersticial, y luego anclarse a otra región, donde se convierten en metástasis. La expresión reducida de moléculas de adhesión, como las E-

cadherinas, fomenta las metástasis. Las células tumorales pueden elaborar, pero no reducir, proteasas como las metaloproteinasas para fomentar esta falta de capacidad de cohesión. La expresión de receptores de estrógenos y progesterona predice la respuesta del cáncer de mama al tratamiento hormonal, y existe un anticuerpo monoclonal, el trastuzumab, frente al HER-2, una variante del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Los receptores de tirosina cinasa de las células contribuyen a la transmisión de las señales de crecimiento.

38 **E** Cada vez existen más pruebas de que la localización de las metástasis de un cáncer depende de la expresión de receptores de quimiocinas por las células tumorales y la elaboración de sus ligandos (quimiocinas) por determinados tejidos. En el caso del cáncer de mama, las células del carcinoma expresan las quimiocinas CXCR4. Es precisa la infiltración vascular, linfática o de la membrana basal para que se produzcan las metástasis, pero dichas características no definen de forma exacta la localización de estas.

39 **B** En la transformación maligna se producen muchos cambios genéticos, incluidos los que posibilitan que las células malignas invadan y produzcan metástasis. CD44 interviene en la adhesión celular y permite a las células malignas metastatizar. Los tumores sólidos pueden expresar CD44 para fomentar su extensión a los ganglios linfáticos y otros lugares metastásicos. Aunque estas propiedades pueden estar presentes en el clon de células malignas inicial, el crecimiento del tumor aumenta el número de células y el riesgo de diseminación. BCL2 interviene en la apoptosis. La expresión del receptor del factor de crecimiento puede hacer que las células malignas sean susceptibles a las influencias ambientales, como las hormonas, que controlan el crecimiento. Existen mutaciones del gen *RAS* en muchos tumores malignos y condicionan la pérdida del control del crecimiento. La vimentina es conocida especialmente por ser una proteína expresada en las neoplasias mesenquimatosas, pero también se regula al alza en la transición epitelio-mesénquima.

40 **A** Todas las células nucleadas humanas expresan antígenos

del CPH de clase I. Los linfocitos T CD8+ reconocen los péptidos presentados por los antígenos del CPH de clase I. En muchos tumores, sobre todo en los melanomas, las células tumorales producen péptidos que pueden ser presentados por moléculas del CPH de clase I. Estos péptidos específicos de tumor no son elaborados por otras células, de forma que los linfocitos T CD8+ específicos frente a estos péptidos lisan las células de melanoma, pero no los melanocitos normales o las células normales de otras estirpes.

41 **E** Varios tipos de células inmunitarias pueden reconocer y ayudar a la destrucción de las células tumorales. Los antígenos tumorales que se presentan a través de las moléculas del CPH de clase I pueden ser reconocidos por los linfocitos CD8+ citotóxicos. Las células humanas normales deberían expresar los antígenos del CPH de clase I, pero muchos cánceres no los expresan bien y, cuando esto ocurre, los linfocitos NK se activan para conseguir la lisis de esas células. Los macrófagos pueden colaborar con los linfocitos CD8+ y NK para fagocitar y destruir las células tumorales cuando son regulados al alza por el interferón γ. Los linfocitos «colaboradores» CD4+ no realizan una actividad antitumoral directa. Los neutrófilos son ineficaces frente a las células tumorales, aunque pueden verse atraídos hacia las zonas de necrosis tumoral. Las células plasmáticas pueden elaborar anticuerpos frente a los antígenos tumorales, pero dichos anticuerpos resultan ineficaces para controlar los tumores.

42 **B** Las inmunodeficiencias primarias o secundarias se asocian a un mayor riesgo de neoplasias, sobre todo linfomas. Los linfomas B cerebrales son 1.000 veces más frecuentes en los pacientes con sida secundario a infección por el VIH que en la población general. Los pacientes diabéticos pueden presentar diversas complicaciones vasculares e infecciosas, pero no neoplasias. La hipertensión puede ser causa de hemorragias en el sistema nervioso central (SNC; ictus). La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante de la sustancia blanca del SNC y no se asocia a un riesgo significativo de neoplasias. La tuberculosis es una infección crónica y, como tal, puede ser causa de amiloidosis, pero no de neoplasias.

43 **B** Los pacientes con un carcinoma de colon hereditario no poliposo (CCHNP) heredan una copia defectuosa de los genes de reparación de errores del ADN. Varios genes de este tipo participan en el desarrollo de estos CCHNP. Los defectos de reparación de errores presentan inestabilidad de microsatélites. Los microsatélites son repeticiones en tándem presentes a lo largo de todo el genoma. Normalmente, su longitud permanece constante, pero en el CCHNP estos microsatélites son inestables y su longitud aumenta o disminuye. Aunque el CCHNP solo representa el 2-4% de los cánceres de colon, se puede encontrar una inestabilidad de microsatélites aproximadamente en el 15% de todos los cánceres de colon esporádicos. Es posible detectar mutaciones en los genes de reparación de errores por la presencia de inestabilidad de microsatélites. Las demás opciones enumeradas no son típicas del CCHNP.

44 **C** Estos niños sufren un proceso autosómico recesivo denominado *xerodermia pigmentaria (XP).* Los pacientes afectados tienen una fotosensibilidad extrema, con un riesgo 2.000 veces mayor de desarrollar cánceres cutáneos. Las lesiones del ADN se inician por la exposición a la luz ultravioleta; sin embargo, la reparación mediante la escisión de nucleótidos no puede producirse de forma normal en la XP porque la herencia de uno de los distintos genes de la XP es anómala. Parece que el patrón de herencia es autosómico recesivo, dado que es poco probable que se produzcan mutaciones nuevas. La inactivación del gen supresor de tumores *p53* se encuentra en muchos cánceres humanos esporádicos y en algunos cánceres familiares, pero estos tumores no se limitan a la piel. Las translocaciones cromosómicas a menudo participan en el desarrollo de tumores malignos hematológicos, pero no se encuentran con frecuencia en los cánceres cutáneos. *Aspergillus flavus*, que se encuentra en los cacahuetes mohosos y otros alimentos, produce el potente carcinógeno para el hígado llamado aflatoxina B1. El virus del papiloma humano (VPH) es una enfermedad de transmisión sexual asociada al desarrollo de carcinomas epidermoides genitales.

45 **B** Aproximadamente el 5-10% de los cánceres de mama son familiares y el 80% de estos casos se deben a mutaciones en los

genes *BRCA1* y *BRCA2.* Estos cánceres familiares aparecen en fases más tempranas que los cánceres esporádicos. Los productos proteínicos de estos genes participan en la reparación del ADN. *BCL2* se sobreexpresa en algunas neoplasias linfoides. En algunos cánceres de mama esporádicos se encuentra una sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epitelial *ERBB2 (HER2);* se pueden encontrar otras alteraciones de EGF en los cánceres de pulmón, de vejiga, digestivos, ováricos y cerebrales. La mutación *HST1* se encuentra en algunos cánceres gástricos. La sobreexpresión de *IL2* se asocia a algunas neoplasias de linfocitos T. Muchos cánceres muestran sobreexpresión de *K-RAS,* como algunos cánceres de mama, pero la edad de aparición precoz y los antecedentes familiares en este caso sugieren mutaciones de *BRCA.*

46 **B** Los micro-ARN (miARN) se codifican aproximadamente en el 5% del genoma humano. Los miARN no codifican proteínas, sino que se unen al ARNm y lo inactivan o degradan, de forma que impiden la traducción de proteínas por el ARNm. De este modo se consigue un silenciamiento eficaz de la expresión de los genes sin afectar de forma directa al propio gen. En el citoplasma existe abundante ARN de transferencia (ARNt), que no es un paso limitante de la velocidad de la traducción. La metilación del ADN, sobre todo en los dinucleótidos CG, es una forma de suprimir directamente la expresión de los genes, igual que sucede en la impronta genómica. Las mutaciones que afectan a los genes del ADN pueden condicionar una menor producción de ARNm o la producción de una proteína anómala, pero el ARNm en sí mismo no está mutado. El ADN mitocondrial (ADNmt) codifica proteínas implicadas, fundamentalmente, en las vías metabólicas de la fosforilación oxidativa.

47 **D** Los carcinógenos químicos pueden tener grupos electrófilos altamente reactivos que pueden producir daño directo en el ADN, con la aparición de mutaciones. En el caso de los agentes de acción directa, como los fármacos quimioterápicos alquilantes, no es necesaria la conversión a un carcinógeno. Algunos agentes tóxicos ambientales, como los hidrocarburos policíclicos, deben ser convertidos metabólicamente a un

carcinógeno y se llaman agentes de acción indirecta. Los ésteres de forbol son ejemplos de promotores de la carcinogenia humana que promocionan el crecimiento del tumor mediante la activación de la proteína cinasa C. Esta enzima fosforila varios sustratos en las vías de transducción de señales, incluidas las que se activan por factores de crecimiento, y las células se dividen. La división celular forzada predispone a la acumulación de mutaciones en las células que previamente estaban lesionadas por la exposición a un agente mutágeno (iniciador). Las vías de TGF-β funcionan mediante la inhibición del crecimiento. Proteínas como p53 que intervienen en las vías de reparación del ADN pueden dejar de ser funcionales mediante mutaciones. Las infecciones víricas, como las hepatitis B y C, tienden a promocionar el crecimiento mediante la unión a p53 y la inactivación de su función protectora. La actividad de las telomerasas no se ve afectada por los carcinógenos.

48 **F** El cloruro de vinilo es una causa poco frecuente de cáncer hepático. Fue muy sencillo demostrar esta relación causal, porque el angiosarcoma hepático es una neoplasia poco frecuente. El arsénico es un factor de riesgo del cáncer de piel. La exposición al amianto se relaciona con el mesotelioma maligno pleural y con el carcinoma broncógeno en fumadores. La exposición al benceno se vincula con las leucemias. La exposición al berilio puede ocasionar neumopatías intersticiales y cáncer de pulmón. La exposición al níquel aumenta el riesgo de cánceres de la vía respiratoria. La exposición a derivados del naftaleno es un factor de riesgo para desarrollar cánceres de la vía urinaria.

49 **D** Los estrógenos, al igual que muchas otras hormonas y fármacos, no son carcinógenos por sí mismos, sino que son responsables de la estimulación del crecimiento endometrial (hiperplasia), lo que tiene un efecto promotor cuando se producen mutaciones celulares para originar un carcinoma. Nunca se puede descartar por completo la susceptibilidad hereditaria cuando un paciente desarrolla dos tumores; esto sucede en personas con mutaciones hereditarias del gen *p53*. En este caso, sin embargo, existe una clara base hormonal del segundo tumor. Los genes supresores de tumores defectuosos

no están implicados en la promoción hormonal de una neoplasia. Los síndromes paraneoplásicos se deben a la secreción ectópica de una hormona por un tumor (p. ej., las células de un cáncer pulmonar elaboran corticotropina). La heterogeneidad tumoral no alude a la presencia de dos tipos distintos de neoplasia sino a la heterogeneidad de un tumor determinado o una metástasis.

50 **E** La radiación es oncógena, y el riesgo aumenta al hacerlo las dosis. Los cánceres de tiroides y óseos, además de las leucemias, pueden aparecer años después de la exposición a la radiación ambiental. Se controlan con cuidado las dosis de radiación terapéutica, pero el riesgo de desarrollar un tumor maligno con posterioridad está aumentado. La catástrofe del reactor de la central nuclear de Chernóbil que afectó a los habitantes de Bielorrusia y Ucrania ha sido un aviso sobre los riesgos de la exposición ambiental a la radiación. Los traumatismos no son un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer, aunque con frecuencia los pacientes recuerdan episodios traumáticos y los asocian de forma irracional con los problemas de salud que aparecen. La falta de yoduro condiciona la aparición de bocio pero no de neoplasias tiroideas. Los carcinomas hepatocelulares pueden aparecer sobre la cirrosis causada por un alcoholismo crónico. La ataxia-telangiectasia es un síndrome hereditario que se asocia a un aumento del riesgo de leucemias y linfomas. La exposición al arsénico, que es poco frecuente, es causante de cánceres de piel y pulmón.

51 **E** A escala mundial se producen cada vez más casos de cáncer de piel secundarios a la exposición solar. La luz ultravioleta causa daños en la piel y lesiones en el ADN celular, con la consiguiente aparición de mutaciones que pueden escapar de los mecanismos de reparación celular. Las reacciones alérgicas no fomentan el cáncer. La exposición al amianto aumenta el riesgo de carcinoma pulmonar en fumadores y puede producir los infrecuentes mesoteliomas pleurales. Los quimioterápicos tienen potencial carcinógeno, sobre todo los fármacos alquilantes, como la ciclofosfamida, pero en general aparecen leucemias y linfomas. El tabaquismo se relaciona con muchos cánceres, pero los carcinomas de piel no suelen asociarse a este

factor de riesgo.

52 **A** El potencial oncógeno del virus del papiloma humano (VPH), que es un agente de transmisión sexual, guarda relación con productos de dos genes víricos precoces: *E6* y *E7*. La proteína E7 se une a la proteína RB y desplaza los factores de transcripción que en condiciones normales se encuentran secuestrados, anulando de este modo la actividad supresora de tumores de la proteína RB. La proteína E6 se liga al producto del gen *p53* y lo inactiva. El aumento de la expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico es un rasgo presente en muchos carcinomas escamosos pulmonares y el receptor de *ERBB2 (HER2)* relacionado se encuentra en algunos carcinomas de mama. Las modificaciones epigénicas, incluidas la metilación del ADN y los cambios de las histonas, pueden, según su naturaleza, fomentar o inhibir la expresión génica. La incapacidad de reparar los daños del ADN puede estar implicada en algunos cánceres de piel y colon. Puede producirse un atrapamiento de la proteína RAS ligada a GTP en muchos tumores, pero no guarda relación con la infección por el VPH.

53 **E** La población celular más abundante de la figura, que es clonal, se marca con CD4. Este paciente tiene una leucemia de linfocitos T, que aparece aproximadamente en el 1% de los pacientes infectados por el virus linfótropo humano de los linfocitos T de tipo 1. La infección por el virus de Epstein-Barr se asocia a diversos cánceres, como el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo. La infección por el virus de la hepatitis B puede producir una cirrosis hepática, sobre la cual puede originarse un carcinoma hepatocelular. La infección por el VIH-1 causa el sida, con una reducción del recuento de linfocitos CD4+. *H. pylori* fomenta la gastritis crónica con un aumento del riesgo de adenocarcinomas gástricos y linfomas de linfocitos B.

54 **C** Aunque los genomas de los virus de la hepatitis B (VHB) y C (VHC) no codifican ninguna de las proteínas transformantes, los hepatocitos regenerativos tienen más riesgo de desarrollar mutaciones, como la inactivación de *p53*. El VHB no se integra en un sitio constante del núcleo del hepatocito y no contiene oncogenes víricos. Muchos virus ADN, como los virus del papiloma humanos (VPH), inactivan los genes supresores de

tumores, pero no se dispone de pruebas convincentes de que los VHC o VHB se puedan unir a las proteínas p53 o RB. Además, el elemento regulador codificado por el VHB, llamado *HBx,* interrumpe el crecimiento normal de los hepatocitos infectados. Ni el VHC ni el VHB pueden infectar las células inmunitarias.

55 **A** Algunas infecciones crónicas por virus de las hepatitis B y C evolucionan a carcinoma hepatocelular y/o colangiocarcinoma. La α-fetoproteína (α-FP) es una proteína oncofetal considerada marcador tumoral para los carcinomas hepatocelulares y algunos carcinomas de testículo. La α-FP aparece normalmente en la vida fetal pero no en adultos. La concentración de inmunoglobulinas séricas con electroforesis de proteínas permite el diagnóstico de mieloma. Los adenocarcinomas del tubo digestivo, incluidos los originados en el estómago, el colon y el páncreas, y algunos carcinomas pulmonares pueden asociarse a incrementos de la concentración de antígeno carcinoembrionario sérica. El CA19-9 es un marcador tumoral de los carcinomas de colon y páncreas. Algunos carcinomas de tiroides elaboran calcitonina. Por desgracia, la sensibilidad y la especificidad de los marcadores tumorales para la detección de cánceres no son altas cuando los tumores son pequeños.

56 **A** La caquexia es un hallazgo frecuente en los cánceres avanzados, y una pérdida de peso no intencionada en un adulto es considerada un dato de alerta de malignidad. La causa exacta de este proceso se desconoce, pero puede participar el aumento de factores circulantes, como el factor de necrosis tumoral (TNF). Pueden producirse soplos cardíacos cuando se desarrolla una endocarditis trombótica no bacteriana, un rasgo de los cuadros de hipercoagulabilidad que pueden asociarse a los tumores malignos avanzados. La ictericia es más probable cuando la vía biliar resulta obstruida por una masa (p. ej., en el cáncer de páncreas), aunque es poco probable que esta obstrucción sea ocasionada por una metástasis. Pueden aparecer trastornos neurológicos por la compresión de los nervios locales por el crecimiento del tumor, pero un dolor constante y sordo es la característica más frecuente de la invasión neural por una neoplasia maligna. Las metástasis esplénicas son poco frecuentes. El timpanismo es raro en el cáncer, dado que la

obstrucción por una masa suele ser incompleta y se desarrolla a lo largo de mucho tiempo. (*Consejo:* El sonido timpánico es similar al que se produce al percutir un barril de cerveza.)

57 **B** Las células pequeñas tienen escaso citoplasma, pero presentan un marcado hipercromatismo, compatible con un carcinoma anaplásico de células pequeñas. Este paciente presenta un síndrome de Cushing secundario a la producción ectópica de corticotropina por el tumor, un tipo de síndrome paraneoplásico frecuente en los carcinomas de células pequeñas pulmonares. Estos son de origen neuroendocrino. También es frecuente encontrar un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) en los carcinomas de célula pequeña, que produce hiponatremia y edema. La producción de eritropoyetina con policitemia se suele asociar a un carcinoma de células renales. La producción de insulina y gastrina es más frecuente en los tumores de células de los islotes pancreáticos. La hipercalcemia secundaria a la producción del péptido relacionado con la hormona paratiroidea (PTHrP) se suele asociar a carcinoma epidermoide pulmonar.

58 **E** En cortes histológicos de las neoplasias malignas, es frecuente valorar un panel de inmunotinciones para detectar las características antigénicas, como la expresión de proteínas, que permiten caracterizar la célula de origen y aportar información de cara a la selección de los protocolos terapéuticos. En este caso, posiblemente las inmunotinciones muestren que esta neoplasia es un carcinoma urotelial de alto grado. La citología muestra hallazgos microscópicos útiles para descartar malignidad, pero con frecuencia no es suficiente para diagnosticar el tipo celular específico. Las otras técnicas enumeradas son mejores para determinar el tratamiento y el pronóstico.

59 **A** El término M1 indica que existen metástasis a distancia. N1 denota que los ganglios linfáticos locales son positivos para carcinoma. Unas concentraciones altas de corticotropina son indicativas de secreción de una hormona ectópica, que puede provocar un síndrome paraneoplásico, pero no participa en la estadificación. El término T2 señala que el tamaño global del tumor no es grande; estos tumores siguen limitados al

parénquima pulmonar y no alcanzan los márgenes del pulmón. El sistema TNM se emplea para la estadificación pero no para la gradación microscópica de la diferenciación celular.

60 **D** El corte en congelación de los márgenes de resección ayuda a decidir si se ha resecado suficiente cantidad de colon. Se tarda al menos 1 día en realizar una microscopia electrónica y esta ayuda a determinar el tipo celular, pero ha sido sustituida, en gran parte, por la inmunohistoquímica. La punción-aspiración con aguja fina se emplea para realizar el diagnóstico preoperatorio con objeto de identificar un tumor maligno. La citometría de flujo tarda en llevarse a cabo unas horas, pero resulta útil para obtener información pronóstica y no es una técnica «inmediata». Los estudios radiológicos ayudan al diagnóstico preoperatorio y a la valoración de posibles metástasis. Los marcadores tumorales séricos pueden facilitar el diagnóstico preoperatorio o el seguimiento postoperatorio de las neoplasias.

CAPÍTULO 8

Enfermedades infecciosas

PEF9 Capítulo 8: Enfermedades infecciosas

PH9 Capítulo 8: Patología general de las enfermedades infecciosas

1 Una mujer bangladeshí de 45 años con gastritis atrófica padece diarrea líquida profusa intensa de aparición repentina. En los 3 días siguientes sufre deshidratación grave. En la exploración física se encuentra afebril, aunque la turgencia de su piel es mala. Las pruebas de laboratorio del líquido diarreico muestran restos de moco, sin sangre y con escasos leucocitos. Un hemocultivo resulta negativo. La mujer es hospitalizada y recibe fluidoterapia durante 1 semana. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Amebiasis
B Aspergilosis
C Cólera
D Filariasis
E Hidatidosis
F Fiebre tifoidea

2 Un niño de 5 años ha padecido diarrea durante 1 semana, con un promedio de seis deposiciones diarias de escaso volumen, con aspecto mucoide y, en ocasiones, con sangre. En la exploración física, su temperatura es de 37,4 °C. Presenta leve dolor a la palpación abdominal, aunque sin masas. Un coprocultivo resulta positivo para *Shigella sonnei.* ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que se detecte en el colon del niño?

A Alteración epitelial con exudado de neutrófilos subyacente
B Cicatrización extensa de la lámina propia con formación de estenosis
C Inclusiones intranucleares en unos enterocitos intestinales

pequeños
D Múltiples granulomas en la pared del colon
E Leve incremento del número de linfocitos y células plasmáticas en la lámina propia

3 Un lactante de 6 meses presenta un repentino episodio de vómitos, seguido de diarrea líquida profusa. En la exploración física el lactante presenta una temperatura de 38,3 °C. El desarrollo es normal para su edad, y el único hallazgo anómalo es la escasa turgencia de la piel. Las pruebas analíticas muestran valores séricos de Na^+ de 153 mmol/l; de K^+ de 4,4 mmol/l; de Cl^- de 113 mmol/l; de CO_2 de 28 mmol/l, y de glucosa de 70 mg/dl. En la exploración de una muestra de heces se observa moco, pero no eritrocitos ni leucocitos. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que sea el responsable de la diarrea?
A Menor absorción de sodio y agua
B Disminución de la descomposición de la lactosa en glucosa y galactosa
C Aumento de la secreción de potasio y agua
D Mutación en el gen *CFTR*
E Presencia de plásmido de virulencia Yop



4 Un hombre de 60 años ha presentado diarrea sanguinolenta persistente, cólicos y fiebre en la última semana. En la exploración

física su temperatura es de 38,1 °C. Padece dolor abdominal difuso. Una muestra de heces es positiva para sangre oculta. La colonoscopia identifica un eritema mucoso significativo, con úlceras focales del recto al colon ascendente. Las úlceras no penetran en la capa muscular propia. Se efectúa una biopsia; en la figura se presenta el aspecto microscópico de la muestra. ¿Cuál de los siguientes microorganismos infecciosos es más probable que produzca estos signos?

A *Bacillus cereus*
B *Entamoeba histolytica*
C *Giardia lamblia*
D *Salmonella enterica*
E *Shigella flexneri*
F *Vibrio cholerae*

5 En un estudio epidemiológico de personas muertas en una pandemia mundial después de la Primera Guerra Mundial se constató que muchas de ellas habían contraído una forma virulenta de neumonía relacionada con la gripe. A comienzos del siglo xxi, un brote epidémico similar es aún posible, debido a una cepa de la gripe para la que no existe una vacuna disponible de inmediato. Los análisis moleculares de muestras de tejido pusieron de manifiesto cambios en el virus responsable de estas formas virulentas de gripe. ¿Cuál de los siguientes cambios es más probable que ocurra en este virus para que aumente su virulencia?

A Cambio de la capacidad para elaborar exotoxinas
B Adquisición de genes de resistencia a antibióticos
C Incremento de la unión al receptor de la molécula de adhesión intercelular 1 (ICAM-1)
D Mutaciones en el ADN que codifica las proteínas de cubierta
E Recombinación con segmentos de ARN de virus animales

6 Se realiza un estudio epidemiológico en niños de edades comprendidas entre 1 y 5 años infectados por el VIH-1. La mayoría de ellos presentan recuentos de linfocitos CD4+ superiores a 500/mm^3 y niveles de ARN del VIH-1 indetectables. En la exploración física no presentan hallazgos anómalos. ¿Cuál es la vía de transmisión más probable de la infección en estos niños?

A Lactancia materna
B Inhalación de núcleos de gotículas infecciosas

C Contacto fecal-oral
D Transmisión a través de la placenta
E Abuso sexual

7 En un experimento se estudia la fagocitosis de las bacterias por los neutrófilos. Las bacterias se introducen en plasma que contiene neutrófilos. Se observa que la fagocitosis de *Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae* y *Neisseria meningitidis* es reducida en comparación con la de las enterobacterias. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de invasión inmunitaria de estas tres especies de bacterias explica mejor este dato?

A Unión a péptidos antimicrobianos
B Formación de cápsulas de hidratos de carbono
C Producción homóloga de interferón
D Regulación a la baja de la proteína del CPH
E Cambio de antígenos de superficie

8 Un hombre de 26 años es consumidor de drogas por vía parenteral y ha desarrollado fiebre en las últimas 24 h. En la exploración se le detecta un soplo cardíaco. Un hemocultivo es positivo para *Staphylococcus aureus* y en el antibiograma se observa resistencia a meticilina por presencia del gen *mecA* en estos microorganismos. ¿Cuál de las siguientes adaptaciones es más probable que explique que estas bacterias adquieran resistencia a la meticilina?

A Formación de biopelícula
B Liberación de exotoxinas
C Transferencia de islotes de patogenicidad
D Estimulación de superantígenos
E Expresión de adhesina de superficie

9 Se realiza un estudio sobre infecciones nosocomiales asociadas a las sondas urinarias. El estudio demuestra que cuanto más tiempo se mantiene colocada una sonda permanente, mayor es la tasa de infecciones urinarias (IU) sintomáticas. La mayoría de dichas infecciones son bacterianas. ¿Cuál de las siguientes propiedades de las bacterias aumenta el riesgo de IU nosocomial?

A Formación de biopelícula
B Elaboración de enzimas
C Liberación de exotoxinas
D Percepción de quórum

E Estimulación de superantígenos

10 Una mujer de 91 años es hospitalizada con sepsis. En la exploración se observan fiebre e hipotensión. Las pruebas analíticas muestran hemocultivos positivos. La paciente presenta una coagulación intravascular diseminada y lesión alveolar difusa pulmonar con dificultad respiratoria. Los hallazgos analíticos microbiológicos indican que los microorganismos cultivados son bacilos gramnegativos. ¿Cuál de las siguientes sustancias elaboradas por estos microorganismos es más probable que cause este conjunto de hallazgos clínicos?

A Endotoxina
B Exotoxina
C Ácido micólico
D ARN polimerasa
E Superantígeno
F Factor de necrosis tumoral

11 Una niña de 6 años presenta un exantema moteado pardo-rojizo en la cara, el tronco y las extremidades proximales desarrollado en los últimos 3 días. En la exploración física se observan lesiones ulceradas de 0,2 a 0,5 cm en la mucosa de la cavidad bucal y adenopatías dolorosas generalizadas. Durante los 3 días siguientes hay un empeoramiento gradual de la tos, con mínima producción de esputo. ¿Cuál de los siguientes virus es más probable que produzca estos hallazgos?

A Epstein-Barr
B Parotiditis
C Rubéola
D Sarampión
E Varicela-zóster

12 Una niña de 8 años ha desarrollado una enfermedad febril leve con dolor de garganta a lo largo de los últimos 2 días. En la exploración física su temperatura es de 38,4 °C y padece faringitis leve. Los síntomas remiten sin tratamiento después de 1 semana. Durante los 2 meses siguientes la niña padece parálisis facial del lado derecho con incapacidad para cerrar el ojo de ese lado. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que cause estos síntomas?

A *Cryptococcus neoformans*

B Citomegalovirus
C *Listeria monocytogenes*
D Poliovirus
E *Toxoplasma gondii*

13 Una niña de 6 años que vive en la península de Yucatán ha desarrollado fiebre alta en los últimos 3 días. En la exploración física su temperatura es de 39,6 °C y presenta dolor a la palpación significativo en todos los músculos. Las pruebas de laboratorio muestran un recuento de leucocitos de 2.950/mm^3, con un 12% de neutrófilos segmentados, un 4% de cayados, un 66% de linfocitos y un 18% de monocitos. A lo largo de 1 semana su estado se hace más letárgico, con disminución del nivel de consciencia, y desarrollo de petequias y púrpura en la piel. Ulteriores pruebas de laboratorio muestran trombocitopenia, con tiempos de protrombina y tromboplastina parcial significativamente prolongados. La TC cerebral muestra hemorragia en el lóbulo parietal derecho. ¿Cuál de los siguientes vectores es más probable que haya contribuido a la transmisión del microorganismo causante de la infección en esta paciente?

A Piojo
B Mosquito
C Cerdo
D Caracol
E Garrapata
F Mosca tsé-tsé



14 Una mujer de 22 años ha padecido lesiones vesiculares recurrentes en los labios mayores y el periné durante 5 años. En la exploración física se mantiene afebril. En los labios mayores presenta agregados de vesículas transparentes de 0,2 a 0,5 cm, con algo de eritema circundante. La figura muestra el aspecto microscópico de una de las lesiones a bajo aumento. ¿Cuál de los siguientes cambios celulares es más probable que se observe en una imagen microscópica a mayor aumento de la lesión?

A Células epiteliales displásicas que contienen secuencias del virus del papiloma humano
B Infiltrados mononucleares que contienen protozoos
C Células multinucleadas (sincitiales) que contienen inclusiones intranucleares rosas a violáceas
D Neutrófilos que contienen diplococos gramnegativos ingeridos
E Infiltrado linfoplasmocítico perivascular que rodea las arteriolas, con proliferación endotelial

15 Un niño de 6 años desarrolló un exantema en el tórax que comenzó con máculas rojizas de 0,5 cm. En 2 días, las máculas se convirtieron en vesículas. A los 3 días las vesículas se rompieron y formaron costras. Durante las 2 semanas siguientes aparecen brotes de lesiones, que se extienden a la cara y las extremidades. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas de esta infección es más probable que aparezca décadas más tarde?

A Artritis crónica
B Insuficiencia cardíaca congestiva
C Infertilidad
D Parálisis
E Herpes zóster



16 Un hombre de 31 años con VIH ha presentado dificultad respiratoria progresiva en los últimos 2 días. En la exploración física se auscultan crepitantes en todos los campos pulmonares. Una radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales bilaterales. Las pruebas de laboratorio ponen de manifiesto 26.800 copias de ARN del VIH-1/ml. Se realiza una biopsia transbronquial. El aspecto microscópico de la muestra se reproduce en la figura ¿Cuál de los siguientes virus es más probable que haya producido esta enfermedad pulmonar?
A Adenovirus
B Citomegalovirus
C Virus de Epstein-Barr
D Virus del herpes zóster
E Virus respiratorio sincitial

17 Un muchacho de 14 años presenta fiebre, dolor de garganta y adenopatías cervicales. A continuación desarrolla hepatomegalia y esplenomegalia, que duran 2 meses. El frotis de sangre periférica

muestra leucocitosis con linfocitos «atípicos». ¿Cuál de los siguientes tipos celulares es más probable que elimine las células con infección vírica?

A Linfocitos CD8 citotóxicos
B Macrófagos epitelioides
C Linfocitos CD4+ colaboradores
D Células plasmáticas secretoras de IgG
E Neutrófilos polimorfonucleares

18 Una mujer de 75 años padece una infección de una herida postoperatoria que responde mal a la antibioterapia. Durante los 3 días siguientes desarrolla un estado de confusión, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos y mialgias. En la exploración se mantiene febril; la herida está eritematosa, con exudado necrótico purulento. Las pruebas de laboratorio muestran neutrofilia con desviación a la izquierda. En la tinción de Gram del exudado de la herida se aprecian agregados de cocos grampositivos. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que sea elaborada por los microorganismos infecciosos?

A Lactoferrina
B Lipopolisacárido
C Toxina A-B codificada por fagos
D Proteínas de fimbrias
E Superantígeno



19 Una mujer de 46 años ha padecido fiebre alta, con inflamación, calor y dolor a la palpación en la pierna derecha durante los últimos 3 días. En la exploración física su temperatura es de 39,4 °C y su aspecto facial es el mostrado en la figura. Es tratada con antibióticos macrólidos, con los que se recupera. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que cause estos síntomas?

A *Clostridium botulinum*
B *Escherichia coli*
C *Neisseria gonorrhoeae*
D *Staphylococcus epidermidis*
E *Streptococcus pyogenes*

20 Un hombre de 52 años presenta fiebre y tos productiva de esputo denso y gelatinoso, que empeora a lo largo de 4 días. En la exploración física la temperatura es de 38,2 °C. En la auscultación torácica se aprecian crepitantes difusos en la base pulmonar derecha. Las pruebas de laboratorio muestran recuento de leucocitos de 13.240/mm^3, con un 71% de neutrófilos segmentados, un 8% de cayados, un 15% de linfocitos y un 6% de monocitos. La tinción de Gram del esputo revela bacilos gramnegativos con cápsulas mucoides. El estado del paciente mejora con un ciclo de gentamicina. ¿Cuál de las siguientes complicaciones de la

infección es más probable que se desarrolle?

A Formación de abscesos
B Adenocarcinoma
C Enfisema bulloso
D Granulomas cavitarios
E Gangrena gaseosa

21 Una mujer de 20 años ha sufrido un cuadro de delirio progresivo a lo largo de los últimos 2 días y es hospitalizada. En la exploración física se detecta una faringitis con una membrana mucosa subyacente, dura y de color blanco grisáceo. En las extremidades la paciente padece parestesias, con disminución de la sensibilidad vibratoria. En la auscultación se detecta ritmo cardíaco irregular. Una radiografía de tórax revela cardiomegalia. En una tinción de Gram de la membrana faríngea, se observan numerosos bacilos grampositivos pequeños en un exudado fibrinopurulento. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de desarrollo de enfermedad cardíaca es más probable en esta paciente?

A Lesión celular inducida por exotoxinas
B Inflamación granulomatosa
C Hipotensión mediada por lipopolisacáridos
D Formación de microabscesos
E Vasculitis con trombosis

22 Una mujer de 33 años primigrávida desarrolla a las 18 semanas de la gestación náuseas y vómitos durante 3 días y, a continuación, cefalea intensa y rigidez de cuello. En la exploración física, su temperatura es de 38,2 °C. No presenta edema de papila. Se efectúa una punción lumbar y la tinción de Gram del LCR obtenido muestra numerosos bacilos gramnegativos cortos; en la preparación en fresco, los microorganismos se mueven a trompicones. En cultivo, estos microorganismos se desarrollan a 25 °C. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de adquisición de la enfermedad es el más probable?

A Ingestión de alimentos contaminados
B Inhalación de núcleos de gotículas
C Inoculación a través de un corte en la piel
D Agujas infectadas compartidas
E Uso de un cepillo de dientes de algún amigo

23 Cuando el faraón no atendió la solicitud de Moisés para que dejara marchar al pueblo hebreo, una serie de plagas asolaron Egipto. En la quinta de estas plagas, los animales domésticos, incluidos el ganado vacuno, los caballos y las ovejas, murieron. A esta le siguió otra plaga, en la que los egipcios desarrollaron úlceras cutáneas que, probablemente, aparecerían como áreas de 1 a 5 cm de eritema con necrosis central, formando una escara. Algunos de los afectados pudieron sufrir también tos leve no productiva, asociada a fatiga, mialgias y febrícula durante 72 h seguidas de rápidos ataques de disnea, con diaforesis y cianosis. Sus constantes vitales podrían ser una temperatura de 39,5 °C, una frecuencia cardíaca de 105 latidos/min una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones/min y una presión arterial de 85/45 mmHg. Si se hubiera sometido a los afectados a auscultación torácica, se habrían escuchado crepitantes en las bases de los pulmones y una hipotética radiografía hubiera mostrado ensanchamiento del mediastino y pequeños derrames pleurales. Los posibles datos analíticos hubieran incluido un hemograma completo con recuento de leucocitos de 13.130/mm^3; hemoglobina de 13,7 g/dl; hematocrito del 41,2%; VCM de 91 µm^3, y recuento plaquetario de 244.000/mm^3. Aunque hubieran sido tratados con ciprofloxacino y doxiciclina, muchos de los afectados hubieran muerto. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que generara tales hallazgos?

A *Bacillus anthracis*
B Virus del herpes simple
C *Mycobacterium leprae*
D *Staphylococcus aureus*
E Variante *Variola major* del virus de la viruela
F *Yersinia pestis*

24 Un hombre de 42 años con VIH ha presentado fiebre y tos a lo largo del mes pasado. En la exploración física su temperatura es de 37,5 °C. En la auscultación del tórax se percibe disminución del murmullo vesicular en el pulmón posterior derecho. Una radiografía de tórax muestra una extensa área de consolidación, con nivel hidroaéreo central que afecta al lóbulo medio derecho. Una muestra de biopsia transbronquial contiene microorganismos filamentosos grampositivos débilmente acidorresistentes. La

evolución del paciente se ve complicada por un empiema y por cefalea de inicio agudo. La TC craneal muestra una lesión aislada de 4 cm en el hemisferio derecho con realce en anillo. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que cause la enfermedad?

A *Aspergillus fumigatus*
B *Mucor circinelloides*
C Complejo *Mycobacterium avium*
D *Nocardia asteroides*
E *Staphylococcus aureus*

25 Un hombre de 50 años con una enfermedad neurodegenerativa ha padecido fiebre y tos productiva de esputo amarillo durante los últimos 3 días. En la exploración física hay matidez a la percusión en la base del pulmón izquierdo. Una radiografía de tórax muestra áreas de consolidación en el lóbulo inferior izquierdo. A pesar del tratamiento antibiótico, la evolución de la enfermedad se ve complicada por la formación de un absceso y el paciente muere. En la autopsia se detecta una fístula broncopleural rodeada de una pronunciada reacción fibroblástica. En el área de formación del absceso, son visibles a simple vista pequeños «gránulos de azufre» amarillos, de 1-2 mm. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que produzca estos hallazgos?

A *Actinomyces israelii*
B *Blastomyces dermatitidis*
C *Chlamydophila pneumoniae*
D *Klebsiella pneumoniae*
E *Mycobacterium kansasii*

26 Un hombre de 22 años ha sufrido más de seis episodios de uretritis en los últimos 4 años, desde que inició su actividad sexual. En cada uno de ellos se identificaron cocos gramnegativos en el exudado neutrófilo. ¿Cuál de los siguientes componentes de estos microorganismos sufre cambios que impiden el desarrollo de una inmunidad protectora duradera?

A Quitina
B Cubierta
C Lipopolisacárido
D Peptidoglucano
E Fimbrias

F Ácido teicoico

27 Una mujer de 25 años ha presentado dolor pélvico, fiebre y secreción vaginal durante 3 semanas. En la exploración física se aprecian sensibilidad a la palpación de los anejos en la parte inferior del abdomen e inflamación y dolor en la rodilla izquierda. Las pruebas de laboratorio muestran un recuento de leucocitos de 11.875/mm^3, con un 68% de neutrófilos segmentados, un 8% de cayados, un 18% de linfocitos y un 6% de monocitos. La paciente es tratada con ceftriaxona, aunque no cumple el tratamiento adecuadamente. Se somete a un estudio diagnóstico de infertilidad 5 años después. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que genere estos datos?

A *Candida albicans*
B *Gardnerella vaginalis*
C Virus del herpes simple 2
D *Neisseria gonorrhoeae*
E *Treponema pallidum*
F *Trichomonas vaginalis*

28 Una niña de 4 años presenta rinorrea y tos. Después de que la tos persista durante 2 semanas, llega a sufrir episodios de tos paroxística que le causan cianosis. En la exploración física su temperatura es de 37,4 °C. La exploración de la boca y la garganta no detecta eritema ni inflamación. En la auscultación del tórax, los pulmones muestran crepitantes bilaterales. Padece tos espasmódica, con golpes de tos en una única respiración, que producen tapones de moco, seguidos de inspiración forzada. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que esté alterado en relación con la patogenia de su enfermedad?

A Movimiento ciliar
B Lisis del complemento
C Secreción de inmunoglobulinas
D Activación de linfocitos NK
E Formación de fagolisosomas

29 Un hombre de 66 años sufre quemaduras térmicas extensas en la piel y es sometido a implantación de injertos cutáneos en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos. A las 2 semanas experimenta dificultad respiratoria creciente. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de hemoglobina de 13,1

g/dl; un nivel de hematocrito del 39,2%; un recuento plaquetario de 222.200/mm^3 y un recuento de leucocitos de 4.520/mm^3, con un 15% de neutrófilos segmentados, un 3% de cayados, un 67% de linfocitos y un 15% de monocitos. Una radiografía de tórax muestra infiltrados bilaterales extensos con áreas de consolidación parcheadas. Se realiza una broncoscopia y el examen microscópico de la muestra de biopsia transbronquial pone de manifiesto vasculitis pulmonar y áreas circundantes de necrosis, con exudado inflamatorio disperso. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que produzca estos hallazgos?

A Adenovirus
B *Histoplasma capsulatum*
C *Mycobacterium tuberculosis*
D *Pseudomonas aeruginosa*
E *Pneumocystis jiroveci*
F *Streptococcus pneumoniae*

30 En octubre de 1347, un barco mercante genovés que regresaba del mar Negro atracó en el puerto de Messina, en Sicilia. La tripulación había sido diezmada por una enfermedad caracterizada por una evolución breve desde la aparición de un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos inguinales, con ulceración de la piel subyacente, estado de postración y muerte. Algunos de los marineros presentaban pústulas ulceradas rodeadas de exantema rosado en las extremidades inferiores. En pocos días, más de la mitad de la población de la ciudad portuaria murió. ¿Cuál de los siguientes insectos vectores fue el responsable más probable de la rápida diseminación de la enfermedad?

A Pulgas
B Mosquitos
C Redúvidos
D Mosquitos flebótomos
E Garrapatas

31 Un estudio de las infecciones de transmisión sexual identifica un microorganismo habitualmente presente en regiones tropicales y subtropicales. Dicho microorganismo se asocia a pápulas genitales ulceradas dolorosas en personas infectadas por el VIH. El examen microscópico del exudado lesional con tinción de plata muestra cocobacilos. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es

más probable que genere estos hallazgos?

A *Chlamydia trachomatis*
B *Haemophilus ducreyi*
C *Klebsiella granulomatis*
D *Neisseria gonorrhoeae*
E *Treponema pallidum*

32 Un hombre de 23 años originario de Irian Jaya, Indonesia, presenta una lesión en el pene que ha aumentado de tamaño en los últimos 4 meses. En la exploración física se aprecia una lesión papulosa indolora de 2 cm en el dorso del pene que ha evolucionado hasta formar una úlcera expansiva carnosa roja, que sangra con facilidad. No hay adenopatías inguinales. Se obtiene una biopsia de la lesión, en cuyo examen microscópico se aprecian hiperplasia seudoepiteliomatosa e infiltrado inflamatorio mixto. La tinción de Giemsa revela presencia de cocobacilos en vacuolas dentro de macrófagos. En la anamnesis social el paciente informa de que ha mantenido relaciones con múltiples parejas sexuales. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Balanopostitis
B Chancroide
C Granuloma inguinal
D Linfogranuloma venéreo
E Sífilis secundaria



33 Un hombre de 31 años ha padecido tos con fiebre baja y pérdida de 4 kg de peso en los últimos 3 meses. En la exploración física su temperatura es de 37,5 °C. Las pruebas de laboratorio muestran anemia de trastornos crónicos. Se obtiene una biopsia de médula ósea, cuyo aspecto microscópico se representa en la figura. La tinción acidorresistente de este tejido es positiva. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que destruya el agente infeccioso causante de esta enfermedad?

A Lisis mediada por el complemento
B Elaboración de óxido nítrico por parte de los macrófagos
C Generación de radicales libres de oxígeno dependientes de NADPH
D Fagocitosis por parte de los eosinófilos
E Formación de superóxido en los fagolisosomas

34 Un niño de 5 años sufre exposición a *Mycobacterium tuberculosis* y, 1 mes más tarde, se le realiza una prueba cutánea de la tuberculina, que resulta positiva. El niño desarrolla fiebre, estridor inspiratorio y tos no productiva. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que esté presente en la radiografía de tórax?

A Adenopatías hiliares
B Nódulos pulmonares miliares
C Consolidación neumónica
D Cavitación en el lóbulo superior
E Lesiones líticas vertebrales

35 Un hombre de 41 años ha experimentado un empeoramiento de la fiebre, la tos y la disnea en las últimas 2 semanas. En la exploración se detectan estertores y disminución del murmullo vesicular en la auscultación torácica. Una radiografía de tórax muestra infiltrados diseminados en ambos pulmones. La prueba de la tuberculina da lugar a 6 mm de induración. Una muestra de esputo es negativa, aunque el lavado broncoalveolar es positivo para bacilos acidorresistentes. El recuento leucocítico es de 4.600/mm^3, con un recuento diferencial de un 80% de neutrófilos, un 10% de linfocitos y un 10% de monocitos. ¿Cuál de los siguientes es el factor de riesgo más probable para el desarrollo de esta enfermedad?

A Consumo excesivo de alcohol
B Diabetes mellitus

C Infección por el VIH
D Escorbuto
E Consumo de tabaco



36 Un hombre de 32 años presenta lesiones cutáneas maculopapulares y nodulares, que afectan principalmente a la cara, los codos, las muñecas y las rodillas. Las lesiones nodulares han ido aumentando de tamaño en los últimos 10 años y comienzan a producir deformidad. Las lesiones no son dolorosas, aunque en las áreas en las que aparecen el paciente presenta hipoestesia o anestesia. La figura es una imagen microscópica de la tinción acidorresistente de una muestra de biopsia de una lesión cutánea nodular. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Carbunco
B Enfermedad de Chagas
C Enfermedad de Hansen
D Leishmaniosis
E Enfermedad de Lyme
F Oncocercosis

37 Un hombre de 20 años con múltiples parejas sexuales y que no utiliza dispositivos de protección de barrera presenta una úlcera indolora en el pene, desarrollada en la última semana. En la

exploración física, la lesión, de 0,6 cm, presenta una base firme eritematosa y bordes muy bien delimitados. Se procede a raspado de la misma y la exploración microscópica en campo oscuro es positiva para espiroquetas móviles. ¿Cuál de los siguientes procesos inflamatorios es más probable que acompañe a esta infección?

A Inflamación aguda con formación de abscesos
B Inflamación granulomatosa con caseificación
C Inflamación gomosa con necrosis
D Inflamación perivascular con células plasmáticas

38 Se realiza un estudio longitudinal en hombres y mujeres que han desarrollado dilatación de la raíz aórtica e insuficiencia aórtica en la edad adulta. Los participantes tienen antecedentes de relaciones sexuales sin protección con múltiples parejas. ¿Cuál de las siguientes pruebas analíticas es más probable que tenga un resultado positivo en estas personas?

A Hemocultivo
B Microscopia en campo oscuro de ganglios linfáticos
C Adsorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes (FTA)
D Reagina plasmática rápida (RPR)
E Prueba serológica para la sífilis (VDRL)

39 Un lactante nacido a término de una mujer de 33 años está gravemente hidrópico. En la exploración física se observa exantema difuso con esfacelación de la piel de las palmas de las manos y las plantas de los pies. A los 2 días, el lactante fallece por dificultad respiratoria. En la autopsia se observa hepatoesplenomegalia significativa. El examen microscópico del fémur y de las vértebras muestra periostitis y osteocondritis. Los pulmones presentan masas nodulares con necrosis central, rodeadas de leucocitos mononucleares, macrófagos en empalizada y fibroblastos. ¿Cuál de las siguientes pruebas serológicas es más probable que sea positiva en la madre del lactante?

A Citomegalovirus
B Herpes simple de tipo 2
C VIH
D Sífilis
E *Toxoplasma gondii*

40 Una mujer de 44 años nota una pápula eritematosa en la parte

inferior de la pierna izquierda que se desarrolla hasta formar un exantema anular que remite a las 3 semanas. Durante los 5 meses siguientes, la paciente experimenta dolor articular y muscular migratorio, dolor torácico subesternal y ritmo cardíaco irregular. Estos problemas remiten pero, 2 años después de la aparición del exantema inicial, desarrolla artritis crónica que afecta a caderas, rodillas y hombros. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Enfermedad de Chagas
B Dengue
C Leishmaniosis
D Lepra
E Enfermedad de Lyme
F Sífilis

41 Un grupo terrorista encarga a sus científicos que desarrollen un agente de bioterrorismo de categoría A. Pretenden obtener un agente que paralice a las víctimas en unas horas y que pueda enmascararse en el contenido de unas inofensivas latas de guisantes. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos se adapta mejor a esas condiciones?

A *Chlamydia psittaci*
B *Clostridium botulinum*
C Virus del Ébola
D Hantavirus
E *Yersinia pestis*

42 Un soldado de 25 años sufre múltiples heridas cutáneas que se infectan y producen una lesión tisular extensa en un solo día. El cultivo de tejido necrótico obtenido de una capa profunda de una de las heridas permite identificar bacilos grampositivos anaerobios formadores de esporas. ¿Cuál de las siguientes reacciones patológicas microscópicas es más probable que sea producida por las toxinas originadas por estos microorganismos?

A Formación de abscesos
B Efectos citopáticos con apoptosis
C Cicatrización fibrosa
D Necrosis gangrenosa
E Inflamación granulomatosa
F Infiltrados linfocíticos

43 Un hombre de 43 años sufre un corte en la espinilla mientras reparaba una cerca en su granja. La herida cicatriza sin complicaciones. Transcurridos 4 días, experimenta espasmos musculares en la cara y las extremidades. Estos espasmos empeoran hasta convertirse en contracciones intensas. ¿Cuál de las siguientes acciones de las toxinas microbianas es más probable que sea responsable de las características clínicas de este caso?

- A Escisión de la sinaptobrevina en las vesículas sinápticas de las neuronas
- B Degradación de las membranas de las células musculares por la fosfolipasa C
- C Inhibición de la liberación de acetilcolina en las uniones neuromusculares
- D Liberación de citocinas por los linfocitos T
- E Estimulación de la producción de adenilato ciclasa en las miofibrillas



44 Un hombre de 27 años se vio implicado en un accidente de circulación con vuelco del vehículo, en que él salió despedido del mismo. Padece una fractura compuesta del húmero derecho, por la que es sometido a reducción abierta con fijación interna de la misma. A los 3 días presenta inflamación intensa y crepitación palpable en el brazo derecho. La tinción de Gram del exudado

necrótico tomado de la herida tiene el aspecto que se observa en la figura. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que participe en la aparición de la extensa necrosis tisular asociada a esta infección?

A Elaboración de lipopolisacáridos
B Inhibición de la función celular fagocítica
C Resistencia a múltiples antibióticos
D Sobreinfección con *Candida albicans*
E Degradación de lecitina mediada por toxinas

45 Un hombre de 24 años sexualmente activo con múltiples parejas sexuales ha padecido dolor durante la micción durante los últimos 4 días. En la exploración física no se aprecian lesiones en el pene. El paciente está afebril. El análisis de orina no detecta la presencia de sangre, cetonas, proteínas o glucosa. El examen microscópico de la orina revela escasos leucocitos y ausencia de cilindros o cristales. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que genere estos hallazgos?

A *Candida albicans*
B *Chlamydia trachomatis*
C Virus del herpes simple
D *Mycobacterium tuberculosis*
E *Treponema pallidum*

46 Una mujer de 50 años que vive en Puerto Príncipe, Haití, ha notado una pequeña vesícula en el labio mayor derecho de la vulva hace 4 días. Es sexualmente activa. En la exploración física, se aprecia que la vesícula, de 0,5 cm, está llena de exudado purulento. Se perciben ganglios linfáticos dolorosos a la palpación. La paciente fue diagnosticada de linfoma no hodgkiniano hace 10 años. Se obtiene una biopsia de uno de los ganglios linfáticos, cuyo examen microscópico muestra múltiples abscesos con necrosis central rodeada de histiocitos en empalizada. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que cause estos hallazgos clínicos y patológicos?

A Vaginitis por *Candida albicans*
B Cervicitis por *Chlamydia trachomatis*
C Vaginosis por *Gardnerella vaginalis*
D Infección por el virus del herpes simple del periné
E Infección por *Treponema pallidum* de los genitales externos

47 Un muchacho de 15 años ha desarrollado una pequeña escara en el antebrazo izquierdo en el lugar en el que sufrió la mordedura de una garrapata hace 6 días. A lo largo de los 3 días siguientes se desarrolló un exantema hemorrágico que afectaba al tronco, a las extremidades, a las palmas de las manos y a las plantas de los pies. El día anterior a la exploración se desarrollaron pequeños focos, de 0,2 a 0,4 cm, de necrosis cutánea en los dedos de las manos y los pies. La temperatura del paciente es de 39 °C. Es tratado con doxiciclina y mejora durante las 2 semanas siguientes. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que genere estos hallazgos?

A *Borrelia burgdorferi*
B *Leishmania braziliensis*
C *Mycobacterium leprae*
D *Rickettsia rickettsii*
E *Yersinia pestis*



48 Una niña de 10 años con leucemia es sometida a un trasplante de células madre hematopoyéticas. Presenta escasa aceptación del tejido injertado y, 1 mes más tarde, desarrolla fiebre y disnea. En la exploración física su temperatura es de 39 °C. En la auscultación torácica se perciben sibilancias y crepitantes en ambos pulmones. Una TC de tórax revela lesiones nodulares acompañadas de

cavitación, hemorragia e infarto. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de hemoglobina de 8,8 g/dl; un nivel de hematocrito del 26,5%; un recuento de plaquetas de 91.540/mm^3, y un recuento leucocítico de 1.910/mm^3, con un 10% de neutrófilos segmentados, un 2% de cayados, un 74% de linfocitos y un 14% de monocitos. Se obtiene un lavado broncoalveolar. El líquido se tiñe con tinción de plata metenamina de Gomori y se procede a su análisis microscópico, según se muestra en la figura. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que genere estos hallazgos?

A *Aspergillus fumigatus*
B *Coccidioides immitis*
C *Corynebacterium diphtheriae*
D *Histoplasma capsulatum*
E *Mycobacterium tuberculosis*
F *Pneumocystis jiroveci*



49 Una mujer de 24 años ha percibido una intensificación del dolor que padecía en la parte derecha de la cara en las últimas 24 h. En la exploración se observan una significativa sensibilidad dolorosa a la palpación e inflamación del arco cigomático inferior y lateral al pliegue nasolabial a la derecha. Las pruebas de laboratorio muestran un recuento leucocítico de 9.900/mm^3 y concentraciones

de creatinina sérica de 2 mg/dl, de sodio de 151 mmol/l, de potasio de 5,4 mmol/l, de cloruro de 119 mmol/l, de bicarbonato de 8 mmol/l y de glucosa de 483 mg/dl. La TC craneal revela inflamación de tejidos blandos y destrucción ósea en torno al seno maxilar derecho. Se obtiene una biopsia. La figura muestra los hallazgos de su examen microscópico. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es la causa más probable de la infección de este paciente?

A *Aspergillus niger*
B *Actinomyces israelii*
C *Candida albicans*
D *Clostridium perfringens*
E *Cryptococcus neoformans*
F *Mucor circinelloides*



50 Un niño de 11 años originario de Liberia ha padecido episodios de fiebre durante 2 semanas. La semana pasada sufrió cefalea y cayó en un estado de somnolencia progresiva. En la oftalmoscopia se detectó edema de papila. Se muestra el aspecto microscópico representativo de una vena cerebral. ¿Cuál de los siguientes órganos es más probable que sirva como reservorio para la proliferación del agente infeccioso que produce esta enfermedad?

A Cerebro

B Corazón
C Hígado
D Ganglios linfáticos
E Bazo



51 Una mujer de 19 años hizo una excursión y acampó en una zona boscosa de Nueva Inglaterra, en EE. UU., en la que abundaban los insectos, pero olvidó utilizar una loción repelente de insectos. Un mes más tarde comenzó a sentir malestar general, febrícula, cefaleas y mialgias. En la exploración física se observa hepatoesplenomegalia. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de hemoglobina de 10,4 g/dl, un recuento de leucocitos de 5.820/mm^3 y un recuento plaquetario de 205.000/mm^3. En la figura se muestra el correspondiente frotis de sangre periférica. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que genere estos datos?

A *Babesia microti*
B *Borrelia burgdorferi*
C *Giardia lamblia*
D *Rickettsia rickettsii*
E *Wuchereria bancrofti*

52 Un hombre de 45 años experimenta malestar general y fatiga, que se van haciendo cada vez más patentes a lo largo de un

período de 2 meses. Regresó de unas vacaciones en la costa mediterránea, cerca de Barcelona, hace 10 meses. Actualmente sufre episodios ocasionales de diarrea y febrícula. Sus molestias abdominales empeoran en el mes siguiente. En la exploración física se registra una temperatura de 38,3 °C. Presenta esplenomegalia pronunciada, hepatomegalia y adenopatías generalizadas. Las pruebas de laboratorio muestran valores de hemoglobina de 11,8 g/dl; de hematocrito del 34,9%; de recuento plaquetario de 89.000/mm^3, y de recuento de leucocitos de 3.350/mm^3, con un 29% de neutrófilos segmentados, un 5% de cayados, un 48% de linfocitos y un 18% de monocitos. Los valores séricos son de 7,6 g/dl de proteínas totales, de 3,2 g/dl de albúmina, de 67 U/l de AST, de 51 U/l de ALT, de 190 U/l de fosfatasa alcalina y de 1,3 mg/dl de bilirrubina total. La prueba de sangre oculta en heces es negativa. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Borreliosis
B Equinococosis
C Leishmaniosis
D Enfermedad de Lyme
E Esquistosomiasis
F Tifus

53 Un soldado de 24 años que había estado destinado en Oriente Medio nota la aparición de una pápula de 0,5 cm en su antebrazo izquierdo. La lesión se transforma en un nódulo de 1 cm con una depresión central y, a continuación, se ulcera durante el mes siguiente. En la exploración física se aprecian una lesión ulcerada de 2 cm con borde indurado y tres lesiones satélite más pequeñas. No hay hepatoesplenomegalia, pero sí adenopatías axilares izquierdas. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración un nivel de hemoglobina de 14,1 g/dl; una cifra de hematocrito del 42,5%; un recuento plaquetario de 233.200/mm^3 y recuento de leucocitos de 6.270/mm^3. ¿Cuál de los siguientes microorganismos infecciosos es más probable que genere estos datos?

A *Borrelia recurrentis*
B *Brugia malayi*
C *Leishmania major*

D *Listeria monocytogenes*
E *Mycobacterium leprae*
F *Trypanosoma gambiense*



54 Un hombre de 22 años con un extenso historial de viajes sufrió la picadura de un insecto y, en la última semana, desarrolló un chancro rojo gomoso, de 1 cm, en el antebrazo derecho. A los 3 meses desarrolló esplenomegalia y adenopatías y, 2 meses después, presenta deterioro progresivo y estado mental alterado. El frotis de sangre periférica tiene el aspecto que aparece en la figura. ¿Dónde es más probable que contrajera la enfermedad?
A Centroamérica
B Polinesia
C Sudeste Asiático
D Europa meridional
E África occidental

55 Una niña de 9 años que habita en una cabaña de barro en Paraguay ha presentado una llaga persistente en la cara durante los últimos 4 días. La exploración física muestra un área endurecida con eritema e inflamación inmediatamente lateral al ojo izquierdo, acompañada de una ulterior adenopatía cervical. La niña presenta edema indoloro unilateral en un párpado y en los tejidos perioculares. Dos días más tarde tiene malestar general,

fiebre, anorexia y edema en cara y extremidades inferiores. Al realizar una nueva exploración física 1 semana más tarde se aprecian hepatoesplenomegalia y adenopatías generalizadas. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable que se desarrolle en esta paciente?

A Abscesos cerebrales
B Artritis crónica
C Miocardiopatía dilatada
D Meningitis
E Úlceras mucocutáneas
F Destrucción ósea paranasal

56 Una mujer de 28 años que vive en un área rural de Guyana, con antecedentes de artritis reumatoide, desarrolla una inflamación dolorosa de manos y pies. Es tratada con corticoesteroides. Después de 1 mes, sufre una diarrea líquida profusa, con fiebre y tos. Su temperatura en la exploración es de 37,3 °C. Las pruebas de laboratorio muestran recuento de leucocitos de 12.900/mm^3, con diferencial de un 57% de neutrófilos segmentados, un 5% de cayados, un 16% de linfocitos, un 8% de monocitos y un 14% de eosinófilos. El examen microscópico de una muestra de heces revela presencia de huevos y larvas rabditoideas. Aparecen larvas similares en una muestra de esputo. ¿Cuál de las siguientes enfermedades infecciosas es más probable que genere estos datos?

A Cisticercosis
B Oncocercosis
C Esquistosomiasis
D Estrongiloidosis
E Triquinosis

57 Un muchacho de 17 años padece dolor muscular generalizado con fiebre que persiste durante 1 semana. Los últimos 2 días ha sufrido debilidad muscular creciente y diarrea. En la exploración física su temperatura es de 38 °C. Todos sus músculos presentan sensibilidad dolorosa a la palpación, aunque su amplitud de movimientos es normal, sin disminución significativa de la fuerza muscular. Las pruebas de laboratorio comprenden una cifra de hemoglobina de 14,6 g/dl; una de hematocrito del 44,3%; VCM de 90 μm^3; un recuento de plaquetas de 275.000/mm^3, y un recuento de leucocitos de 16.700/mm^3, con diferencial de un 68% de

neutrófilos segmentados, un 6% de cayados, un 10% de linfocitos, un 4% de monocitos y un 12% de eosinófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Fiebre hemorrágica
B Gripe
C Poliomielitis
D Tifus de la maleza
E Triquinosis

58 Un hombre de 29 años ha presentado hematuria a lo largo del último mes. En la exploración física se encuentra afebril. Se aprecia dolor a la palpación abdominal inferior, aunque sin masas palpables. Una radiografía abdominal muestra una vejiga pequeña perfilada por un anillo de calcificación. Se realiza una cistoscopia y se observa que toda la mucosa vesical está eritematosa y granular. Se toman muestras de biopsia. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos es más probable que se vea en dichas muestras?

A Bacilos acidorresistentes del complejo *Mycobacterium avium*
B Huevos de *Schistosoma haematobium*
C Larvas de *Trichinella spiralis*
D *Ascaris lumbricoides* migratorio
E Quistes de *Taenia solium*

59 En un estudio realizado en personas que viven en una región subtropical en la que se ha concluido la realización de un proyecto de irrigación de cultivos, se observa que los agricultores sufren mayores tasas de infección que antes de que se iniciara dicho proyecto. Los investigadores determinan que las infecciones se contraen por medio de cercarias que penetran en la piel. Estas son larvas de nematodos que parasitan a los caracoles acuáticos que viven en los canales de riego. Las personas infectadas desarrollan ascitis progresiva. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable que esté presente en estas personas debido a la infección?

A Miocardiopatía dilatada
B Elefantiasis escrotal
C Fibrosis hepática
D Úlceras mucocutáneas
E Carcinoma de vejiga urinaria



60 Un hombre de 40 años ha sufrido una progresiva hipertrofia de la pierna derecha a lo largo de los últimos 6 años, hasta tener el aspecto que aparece en la figura. En la exploración física el paciente está afebril y presenta adenopatías inguinales y edema escrotal. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable en este hombre?

A *Echinococcus granulosus*
B *Leishmania tropica*
C *Schistosoma mansoni*
D *Trichinella spiralis*
E *Wuchereria bancrofti*

61 Se somete a estudio a personas que habitan en regiones de África meridional en las que son comunes las moscas negras y que desarrollan ceguera, con objeto de identificar las potenciales causas infecciosas. Se observó que estas personas padecían una dermatitis crónica que antecedía a la ceguera. Las lesiones cutáneas son pruriginosas, descamativas e hipopigmentadas. Entre las lesiones oculares se cuentan queratitis punteada, y opacidades corneales focales, queratitis esclerosante, iridociclitis con glaucoma y retinitis. ¿Cuál de las siguientes formas morfológicas del agente infeccioso es más probable que se encuentre en las biopsias cutáneas de estas personas?

A Bacilos acidorresistentes
B Cuerpos elementales
C Diplococos intracelulares
D Inclusiones intranucleares
E Microfilarias

62 En un mismo día, acuden a un servicio de urgencias 20 personas, todas las cuales trabajan en el mismo edificio. El día anterior habían experimentado un brote brusco de fiebre alta, cefalea, lumbalgia y malestar general. En la exploración se encontraban febriles. No tenían linfoadenopatías o hepatoesplenomegalia. Durante los 2 días siguientes desarrollaron un exantema maculopapular en la cara, los antebrazos y las mucosas de la bucofaringe. A pesar del tratamiento sintomático, un tercio de los pacientes murieron. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es la causa más probable?

A *Chlamydia psittaci*
B *Francisella tularensis*
C Hantavirus
D *Mycobacterium kansasii*
E *Rickettsia typhi*
F Variante *Variola major* del virus de la viruela

Respuestas

1 **C** La falta de ácido en el estómago de esta mujer la predispone a las infecciones entéricas. Los microorganismos *Vibrio cholerae* son no invasivos. Sin embargo, causan diarrea grave por elaboración de una enterotoxina llamada *toxina del cólera*, que

actúa sobre las células de la mucosa intestinal y causa activación persistente de la adenilato ciclasa y altas concentraciones de AMP cíclico intracelular, que inducen una pérdida masiva de sodio, cloro y agua. La pérdida de líquidos es potencialmente mortal, debido a la deshidratación. La amebiasis tiende a producir disentería, con diarrea sanguinolenta, puesto que los microorganismos pueden invadir la mucosa. La aspergilosis se observa en pacientes inmunodeprimidos, particularmente si presentan neutropenia, y es causa infrecuente de enfermedad diarreica. La filariasis afecta a los linfáticos y provoca elefantiasis. La hidatidosis causada por *Echinococcus* produce masas quísticas en las vísceras. La fiebre tifoidea ocasiona diarrea y los microorganismos que la provocan pueden invadir la mucosa, diseminarse y producir numerosos síntomas sistémicos.

2 **A** La shigelosis da lugar a disentería sanguinolenta, ya que *Shigella* es un microorganismo altamente virulento y resistente a los ácidos gástricos, y puede invadir y destruir la mucosa del colon. Es característico el infiltrado mononuclear que se extiende a la lámina propia, con exudado neutrófilo que cubre las áreas ulceradas. La formación de estenosis sucede en ocasiones a la tuberculosis intestinal. Las inclusiones intranucleares en los enterocitos apuntan a una posible infección por un virus ADN, como los virus del herpes, incluido el citomegalovirus. La inflamación granulomatosa se puede encontrar en la colitis granulomatosa (enfermedad de Crohn) y la tuberculosis intestinal (infrecuente). El incremento del número de células inflamatorias se registra a veces en formas leves de enterocolitis, inducidas por virus, *Giardia* y especies de *Salmonella*.

3 **A** Los rotavirus, virus ARN encapsulados, son causa destacada de diarrea en lactantes. La destrucción con atrofia de las vellosidades del intestino delgado disminuye la absorción de sodio y agua. El desarrollo de anticuerpos IgA, a partir de la inmunidad secretora intestinal, contra los antígenos de superficie del rotavirus, proporciona a los niños mayores y a los adultos una resistencia relativa a la infección por estos virus. Tales anticuerpos están presentes en la leche materna y confieren cierto grado de resistencia a los lactantes alimentados

mediante lactancia natural. Las infecciones por rotavirus se producen en todo el mundo y, a la edad de 3 años, prácticamente todas las personas han sufrido una al menos una vez. La mayoría de ellas son subclínicas o causan trastornos digestivos leves que no requieren hospitalización. La primera infección es la que tiene mayor probabilidad de ser sintomática. Las siguientes son leves o asintomáticas. Numerosos enterovirus causan también diarrea, inhibiendo la absorción intestinal de sodio y agua intraluminales, aunque no suelen ser graves. Las mutaciones en el gen *CFTR* dan lugar a la formación de tapones de moco, que producen íleo meconial en lactantes. En la carencia de disacaridasa disminuye la degradación de la lactosa y provoca diarrea osmótica. El cólera es consecuencia de la secreción de una endotoxina, producida por *Vibrio cholerae,* que potencia la producción en células epiteliales de adenilato ciclasa e induce diarrea secretora con pérdida de cloruro sódico y agua. El plásmido Yop favorece la infectividad de *Yersinia*.

4 **B** La amebiasis es causa frecuente de disentería en los países en vías de desarrollo. La figura muestra dos protozoos unicelulares que invaden tejidos con células inflamatorias. Los microorganismos *Entamoeba histolytica* son resistentes a los ácidos gástricos y pueden invadir la submucosa del colon por citólisis dependiente del contacto. Las amebas no solo producen necrosis local, con úlceras y hemorragia, sino que también acceden a las vénulas del sistema porta, que drenan al hígado. El absceso hepático amebiano es una complicación infrecuente de la amebiasis. Es característico que las lesiones del colon ya hayan desaparecido cuando aparecen las hepáticas. En ciertos casos hay afectación mucosa extensa, con típicas úlceras en forma de matraz (similar a la de un matraz de Erlenmeyer), semejantes a las observadas en otras enfermedades inflamatorias intestinales. *Bacillus cereus* es causa de intoxicación alimentaria (habitualmente por contaminación del arroz frito recalentado) y tiene un período de incubación breve. La giardiasis tiende a afectar al intestino delgado e induce un grado variable de inflamación pero no formación de úlceras. La salmonelosis afecta también típicamente al intestino delgado y, en la mayoría de los casos, provoca una enteritis que remite espontáneamente,

si bien la infección por *Salmonella typhi* ocasiona una enfermedad más grave, con diseminación a otros órganos. La shigelosis induce disentería sanguinolenta con ulceración superficial de la mucosa del colon, aunque es característico que la invasión del microorganismo causal no vaya más allá de la lámina propia. El cólera se caracteriza por una diarrea secretora masiva, sin invasión de la mucosa intestinal ni necrosis.

5 **E** La pandemia de gripe de 1918 se debió a un cambio antigénico en el virus de la gripe de tipo A. Este tipo de cambios se produce cuando hay recombinación de las secuencias de ARN de los virus de la gripe en animales como el cerdo («gripe porcina») o las aves («gripe aviar»). En el caso de la pandemia de 1918 fue identificada una cepa de gripe porcina. La cepa H5N1 de la gripe se halló en poblaciones de aves en época moderna. La epidemia se debió, en este caso, a mutaciones en los genes de la hemaglutinina (H) y en la neuraminidasa (N) de la cubierta de los virus. Tales mutaciones permiten que el virus eluda los anticuerpos del huésped. Los virus de la gripe no se unen a receptores de la molécula de adhesión intercelular 1 (ICAM-1), algo que sí hacen los rinovirus. El genoma de los virus de la gripe está integrado por ARN, no por ADN. Los virus no elaboran endotoxinas y no adquieren resistencia a los antibióticos, como les sucede a las bacterias.

6 **D** La infección congénita por el VIH es un ejemplo de transmisión vertical y se ha demostrado que el tratamiento antirretrovírico para embarazadas es eficaz en la reducción de la transmisión materno-fetal del virus. La lactancia materna es un potencial modo de transmisión del VIH, aunque menos frecuente que la transmisión placentaria. Las infecciones respiratorias se diseminan por núcleos de gotículas, mientras que el VIH no se contagia por este medio. La vía de transmisión fecal-oral es característica de los enterovirus y del virus de la hepatitis A, pero no del VIH. Aunque, desgraciadamente, el abuso sexual se da en niños, no es una forma frecuente de transmisión de infecciones.

7 **B** Las bacterias que producen cápsulas son más resistentes a la fagocitosis, y dichas cápsulas les sirven para eludir la respuesta inmunitaria innata inicial mediada por neutrófilos. De este

modo pueden establecer la infección (de las vías respiratorias, con posible diseminación a las meninges) y hacerse más virulentas. Los péptidos antimicrobianos producidos por las células epiteliales pueden unirse a las bacterias y formar poros en las paredes celulares para destruirlas por lisis osmótica. Los interferones son generados contra virus, no contra bacterias. Ciertos virus, por ejemplo, los virus del herpes, alteran en ocasiones la expresión de las moléculas de las proteínas CPH de clase I, por lo que los antígenos víricos no son expuestos eficazmente a la acción de los linfocitos CD4+ y CD8+. El cambio de antígenos de superficie también ayuda a microorganismos como los tripanosomas a eludir la respuesta inmunitaria adaptativa.

8 **C** Las bacterias cuentan con múltiples mecanismos para intercambiar el material genético, lo que aporta ventajas de crecimiento selectivo. Los islotes de patogenicidad son elementos cromosómicos bacterianos portadores de genes de virulencia, como los implicados en la resistencia a antibióticos. La presencia del gen *mecA* aporta resistencia a la meticilina (*Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina [SARM]) y a otros antibióticos β-lactámicos. Mecanismos de transferencia genética bacteriana adicionales son los plásmidos, los transposones y los integrones. Los microbios de las superficies tisulares forman biopelículas sobre los residuos pegajosos de polisacáridos para aislarse del ataque inmunitario. Por su parte, las exotoxinas aportan virulencia para promover la lesión tisular. Microorganismos como *S. aureus* pueden expresar superantígenos que estimulan de manera no selectiva numerosos clones de linfocitos T, lo que da lugar a una liberación de citocinas no regulada y a shock tóxico. Las adhesinas facilitan la unión de los microbios a las células del huésped.

9 **A** Los microbios forman biopelículas de residuos pegajosos de polisacáridos que se adhieren particularmente bien a superficies artificiales, como las de los catéteres. La biopelícula ayuda a aislar a los microorganismos de las células inflamatorias y limita la penetración de los antibióticos. Algunas enzimas bacterianas, como las hialuronidasas y las estreptocinasas de los

estreptococos, favorecen su diseminación por los tejidos. Las exotoxinas de los microorganismos grampositivos generan virulencia y aumentan la afectación tisular. Las bacterias cuentan con múltiples mecanismos para intercambiar el material genético, lo que les aporta ventajas de crecimiento selectivo. Cuando el número de bacterias aumenta, estas lo perciben (percepción de quórum) y activan sus genes de virulencia. Microorganismos como *Staphylococcus aureus* pueden expresar superantígenos que estimulen de manera no selectiva numerosos clones de linfocitos T y den lugar a una liberación de citocinas no regulada y a shock tóxico.

10 **A** La sepsis por gramnegativos es mediada de manera característica por endotoxinas, en particular por el componente lipopolisacarídico de la pared celular externa. En la sepsis por grampositivos hay liberación de exotoxinas, como la tetanoespasmina producida por *Clostridium tetani.* Los ácidos micólicos presentes en la pared lipídica de las micobacterias contribuyen a la resistencia de estos microorganismos a la degradación mediante las respuestas inflamatorias agudas, lo que determina que se asocien a inflamación granulomatosa. La ARN polimerasa se encuentra en virus ARN de sentido negativo y produce un ARN mensajero (ARNm) de sentido positivo, que hace que la célula huésped produzca componentes víricos. Los superantígenos generan signos similares a los registrados en el shock séptico inducido por lipopolisacáridos. El más conocido es la toxina del shock tóxico, elaborada por algunos estafilococos. El factor de necrosis tumoral (TNF) es originado por las células inflamatorias humanas, no por los microorganismos, aunque la liberación de TNF por acción de las endotoxinas sobre los macrófagos puede a veces simular una sepsis por gramnegativos.

11 **D** El exantema y las manchas de Koplik en la mucosa de la cavidad bucal son hallazgos característicos del sarampión, una infección infantil de la que solo se registran casos esporádicos en áreas en las que la vacuna contra la enfermedad se ha administrado a una parte importante de la población. Su gravedad es variable, y su curso puede presentar complicaciones como la neumonía sarampionosa, que en ocasiones es mortal. La

mononucleosis, causada por infección por el virus de Epstein-Barr (VEB), es más común en la adolescencia. La orquitis es una complicación de la parotiditis. La infección por el virus de la varicela-zóster se manifiesta en niños solo como varicela. La rubéola, también conocida como *sarampión alemán,* es más leve que el sarampión.

12 **D** La poliomielitis es causada por un enterovirus transmitido mediante contaminación fecal-oral. Es frecuente que el virus infecte en primer lugar la bucofaringe. A continuación se extiende a los núcleos bulbares y/o a las neuronas motoras inferiores en el asta anterior de la médula espinal, con lo que se genera la parálisis típica de la polio. En lugares en los que la vacunación se aplica de manera rutinaria, esta enfermedad es infrecuente. La criptococosis es una enfermedad fúngica que la mayoría de las veces afecta a pulmones y meninges. La infección por citomegalovirus puede ser congénita; en adultos inmunodeprimidos, puede afectar a numerosos órganos, sobre todo los del tubo digestivo, el cerebro y los pulmones. La listeriosis se contrae habitualmente por alimentos o aguas contaminados; en la mayor parte de los adultos provoca diarrea leve, si bien en algunos casos de adultos o niños y en fetos es causa de meningitis o diseminación con formación de microabscesos (microgranulomas). La toxoplasmosis puede ser congénita. En adultos inmunodeprimidos causa inflamación de múltiples tejidos, si bien lo más común es la inflamación crónica con abscesos en el cerebro.

13 **B** El dengue, una forma de fiebre hemorrágica, es causado por un arbovirus del grupo de los flavivirus. Este virus puede tener efectos devastadores, ya que provoca supresión de médula ósea y cualquiera de los anticuerpos generados contra el virus potencia la captación celular del mismo. Su vector es el mosquito *Aedes aegypti.* Entre las infecciones transmitidas por piojos se cuentan las enfermedades asociadas a rickettsias. El cerdo está implicado en el ciclo vital de *Taenia solium* y *Trichinella spiralis.* Este último puede provocar dolor muscular intenso, pero no coagulopatía intravascular diseminada. Algunos caracoles sirven como huéspedes intermediarios de microorganismos *Schistosoma.* Las garrapatas transmiten el tifus y la enfermedad de Lyme. Por

último, la mosca tsé-tsé es el vector de la enfermedad del sueño, endémica de África.

14 **C** La figura muestra una vesícula originada por una infección por el virus del herpes simple (VHS). La mayoría de las infecciones genitales son causadas por el VHS-2, mientras que el VHS-1 es responsable de la mayor parte de las gingivoestomatitis herpéticas. El efecto citopático vírico da lugar a la formación de inclusiones intranucleares y de células multinucleadas, así como a la lisis celular con formación de vesículas en el epitelio. Las displasias cervicales no provocan lesiones vesiculares y son inducidas por otra enfermedad de transmisión sexual: la infección por el virus del papiloma humano. Las infecciones protozoarias con tricomoniasis, que suelen afectar a la vagina, producen en ocasiones pequeñas ampollas o pápulas que suelen remitir espontáneamente y no son, en general, recidivantes. Los diplococos gramnegativos son característicos de la infección por *Neisseria gonorrhoeae,* otra enfermedad de transmisión sexual. Los infiltrados linfoplasmocíticos pueden hallarse en los chancros causados por *Treponema pallidum,* causante de la sífilis.

15 **E** La varicela, una infección infantil común causada por el virus de la varicela-zóster, presenta lesiones cutáneas características. La infección puede permanecer latente durante años en los ganglios de la raíz dorsal, pues se reactiva solo cuando se produce una caída de las defensas inmunitarias. El virus, hoy día conocido como del herpes zóster (o de la varicela-zóster), se extiende desde los ganglios a la piel siguiendo la distribución en dermatomas del nervio sensitivo correspondiente y causa lesiones vesiculares que provocan un dolor urente crónico, difícil de controlar. La artritis crónica puede darse en la enfermedad de Lyme tras una infección por *Borrelia burgdorferi*. La cardiopatía reumática aparece en infecciones por estreptococos β-hemolíticos del grupo A. La infertilidad es una complicación de la orquitis por parotiditis. La parálisis es una posible complicación de la infección por poliovirus.

16 **B** Este paciente presenta una elevada concentración de ARN del VIH-1, compatible con el diagnóstico de sida. Aunque los

pacientes con sida son sensibles a numerosos microbios, las infecciones por citomegalovirus son particularmente habituales en ellos. La muestra de biopsia pone de manifiesto una célula aumentada de tamaño que contiene una gran inclusión intranuclear definida e inclusiones citoplásmicas oscuras poco definidas, características de la infección por citomegalovirus. El adenovirus es un patógeno vírico tanto en adultos inmunodeprimidos como en inmunocompetentes que puede originar una neumonía clínicamente significativa y que induce inclusiones intranucleares, aunque las células no son grandes y no contienen inclusiones citoplásmicas. En pacientes con infección por el VIH, es frecuente la infección concomitante por el virus de Epstein-Barr, aunque no hay lesiones pulmonares diferenciadas asociadas a este último. Las infecciones por el virus del herpes zóster más probablemente afecten al sistema nervioso periférico, rara vez se diseminan a los pulmones en pacientes inmunodeprimidos y dan lugar a un aspecto diferente del mostrado. Las infecciones por el virus respiratorio sincitial se dan en niños, pero rara vez en adultos.

17 **A** Las características descritas se ajustan a las de la mononucleosis infecciosa. La infección por el virus de Epstein-Barr (VEB) afecta a los linfocitos B, que se activan para elaborar diversas citocinas que favorecen la proliferación vírica y reducen la respuesta inmunitaria. La IL-10 normalmente secretada por los fagocitos activa los linfocitos T (linfocitos «atípicos»), pero no sus homólogos inducidos víricamente. En general, las infecciones víricas son intracelulares y, en ellas, se precisa una respuesta de linfocitos T CD8 citotóxicos para erradicar los virus eliminando las células infectadas. Los macrófagos epitelioides son más importantes en las respuestas inflamatorias que controlan las infecciones micobacterianas y fúngicas. Los linfocitos T cooperadores pueden ser infectados por el VEB pero no lo erradican. Las respuestas de las inmunoglobulinas son esenciales para eliminar patógenos extracelulares como las bacterias. Los neutrófilos son importantes como parte de la respuesta inmunitaria innata frente a microorganismos extracelulares, como las bacterias.

18 **E** El síndrome de shock tóxico (SST) estafilocócico se debe a la

estimulación de superantígenos que estimulan hasta el 20% de los linfocitos T y originan una significativa liberación de citocinas y una amplia respuesta inflamatoria. De modo creciente, los estafilococos han adquirido el gen *mecA,* que confiere resistencia a varias penicilinas (meticilina) y cefalosporinas, y que se ha asociado a *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (SARM). La mayoría de los casos de SST se dan en mujeres, por su relación con la vaginitis. La lactoferrina es una sustancia secretada por células humanas que se une al hierro que necesitan las bacterias, por lo que forma parte de la inmunidad innata. Los lipopolisacáridos son elaborados por microorganismos gramnegativos y producen shock endotóxico. La toxina A-B codificada por fagos es elaborada por *Corynebacterium diptheriae.* Las proteínas de las fimbrias son características de *Neisseria gonorrhoeae* y proporcionan fijación a las células diana en el aparato genital.

19 **E** El exantema y el edema son manifestaciones de las erisipelas estreptocócicas, habitualmente originadas por estreptococos de los grupos A y C. Las estreptolisinas elaboradas por estos microorganismos ayudan a extender la infección por los tejidos subcutáneos. Hace más de 900 años, la orden de san Antonio fue fundada para tratar a las personas afectadas por esta enfermedad, posteriormente conocida como *fuego de san Antonio. Clostridium botulinum* elabora una exotoxina que, cuando es ingerida, produce parálisis. *Escherichia coli* es causante de diversas infecciones, aunque las cutáneas son infrecuentes. *Neisseria gonorrhoeae* se conoce esencialmente como causa de una enfermedad de transmisión sexual y puede producir exantema, aunque no suele generar edema pronunciado. *Staphylococcus epidermidis* se considera un contaminante frecuente de los cultivos microbianos.

20 **A** Las infecciones bacterianas con respuesta predominantemente neutrófila se caracterizan por inflamación supurativa y, en microorganismos virulentos como *Klebsiella,* en ocasiones inducen destrucción tisular con formación de abscesos. Los carcinomas no son secuelas de las infecciones bacterianas. Las infecciones pulmonares no producen enfisema, aunque, cuando existe, pueden complicarlo. La inflamación

granulomatosa es característica de las infecciones micobacterianas o fúngicas. Las bacterias formadoras de gas, como las anaerobias *Clostridium*, son causas infrecuentes de infección respiratoria.

21 **A** Esta mujer padece difteria. *Corynebacterium diphtheriae* prolifera en la membrana inflamatoria que cubre la faringe y las amígdalas. Estos microorganismos grampositivos elaboran una exotoxina circulante que causa miocarditis y neuropatía. No se diseminan para producir inflamación, abscesos o vasculitis en otras partes del cuerpo. La inflamación granulomatosa es más característica de las infecciones micobacterianas o fúngicas. Endotoxinas como los lipopolisacáridos tienden a ser elaboradas por las bacterias gramnegativas.

22 **A** Los resultados de la tinción de Gram y el cultivo son diagnósticos de infección por *Listeria monocytogenes*, un microorganismo que es más probable que provoque enfermedad diseminada en inmunodeprimidos o embarazadas y que es un potencial causante de infección congénita. Dado que se desarrolla fácilmente a temperatura ambiente, contamina con facilidad los alimentos y las aguas. Es frecuente la de productos lácteos no pasteurizados. No se conocen casos de listeriosis contraída por vía parenteral ni por las otras vías citadas.

23 **A** Los rasgos corresponden al carbunco cutáneo y respiratorio. *Bacillus anthracis* forma esporas que resisten la degradación medioambiental. Tales esporas se transmiten por aerosoles, por lo que este microorganismo cumple las características adecuadas para ser empleado como arma bioterrorista. Igual que numerosos grampositivos, *B. anthracis* genera enfermedad por exotoxinas, que presentan una subunidad A activa y una subunidad B de unión. Ninguna de las otras opciones produce brotes en animales domésticos. Las infecciones herpéticas forman vesículas transparentes que pueden romperse y dar lugar a úlceras superficiales. *Mycobacterium leprae* induce un exantema difuso en la fase inicial de su evolución, aunque la afectación de los nervios periféricos con pérdida de sensibilidad predispone a traumatismos repetidos y deformidad. *Staphylococcus aureus* puede causar impétigo, generalmente en la cara y las manos. La variante *Variola major* del virus de la viruela

es la causante de esta enfermedad, caracterizada por pústulas cutáneas y en la que la causa más probable de muerte es la neumonía. *Yersinia pestis* causa peste, enfermedad que puede tener una forma bubónica y otra neumónica, caracterizada por ulceración de los ganglios linfáticos rodeados de un exantema rosado.

24 **D** Aunque la nocardiosis suele iniciarse en los pulmones, a menudo se disemina, particularmente al sistema nervioso central. Este tipo de infecciones son más comunes en inmunodeprimidos. La aspergilosis también se asocia a inmunodepresión, en especial a neutropenia, aunque las hifas fúngicas son fáciles de distinguir en las tinciones de hematoxilina y eosina. Los hongos del género *Mucor* presentan hifas anchas, no tabicadas, y se encuentran sobre todo en pacientes con cetoacidosis diabética o quemaduras. Las infecciones por el complejo *Mycobacterium avium* afectan a personas con sida y se caracterizan por la presencia de bacilos acidorresistentes cortos generadores de granulomas poco definidos. Las neumonías bacterianas también se consideran en pacientes inmunodeprimidos, en los que pueden complicarse con septicemia. *Staphylococcus aureus* forma agregados de cocos grampositivos.

25 **A** Entre los actinomicetos que pueden inducir neumonía con formación de abscesos, particularmente en inmunodeprimidos, se cuentan *Actinomyces israelii* y *Nocardia asteroides.* Las personas con enfermedades neurodegenerativas están expuestas a riesgo de aspiración de secreciones bucofaríngeas que pueden contener estos microbios. Los gránulos de azufre, formados a partir de masas de los microorganismos filamentosos ramificados, son más probables en *Actinomyces.* Las infecciones por *Blastomyces dermatitidis* tienden a generar un proceso inflamatorio granulomatoso. Las infecciones por clamidias producen un patrón intersticial semejante al de la mayoría de los virus. Las infecciones por *Klebsiella,* similares a otras bacterianas, causan a veces formación de abscesos, aunque sin gránulos de azufre diferenciados. Las infecciones por *Mycobacterium kansasii* son similares a las originadas por *Mycobacterium tuberculosis,* ya que en ambas es prominente la inflamación granulomatosa.

26 **E** Las fimbrias, o *pili,* son estructuras de la pared celular de las bacterias gramnegativas, como *Neisseria gonorrhoeae,* en este caso, que facilitan la fijación a las células huésped. Las proteínas de las fimbrias son alteradas por recombinación genética y forman una «diana móvil» para la inmunidad del huésped, por lo que puede producirse reinfección. La quitina es un componente destacado de la pared celular de los hongos. Las cubiertas contribuyen a que los virus se unan a las células huésped. El lipopolisacárido presente en la pared celular bacteriana actúa como endotoxina. Los peptidoglucanos forman parte de la pared celular bacteriana y buena parte de ellos confieren tinción grampositiva. El ácido teicoico es un componente destacado de las paredes celulares de las bacterias grampositivas.

27 **D** Esta paciente padece una enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), que puede deberse a la infección por *Neisseria gonorrhoeae* o *Chlamydia trachomatis.* Ambos microorganismos causas enfermedades de transmisión sexual y la inflamación crónica puede culminar en una EIP. Entre sus complicaciones se cuentan peritonitis, adherencias con obstrucción intestinal y sepsis con endocarditis, meningitis, artritis e infertilidad. Por lo que respecta a los restantes microorganismos enumerados, *Candida* produce vaginitis con secreción caseosa, pero no suele asociarse a EIP. *Gardnerella* genera una secreción blanquecina que tiene olor a «pescado» en el cuadro llamado vaginosis bacteriana, que tiende a mantenerse localizada. El virus del herpes simple 2 (VHS-2), el causante más común del herpes genital, puede dar lugar a vesículas dolorosas, habitualmente en los genitales externos, y a menudo es recidivante. *Treponema pallidum,* causante de la sífilis, induce la formación de un chancro duro en la piel y las mucosas. La tricomoniasis causa a veces infertilidad; el protozoo que la produce no se trata con cefalosporinas y no suele dar lugar a una enfermedad diseminada.

28 **A** *Bordetella pertussis* es el agente causal de la tos ferina, enfermedad poco frecuente cuando la vacunación infantil frente a ella es generalizada. Se trata de un cocobacilo de difícil cultivo, por lo que la manera más rápida y fiable de diagnosticar su infección es la prueba de anticuerpos mediante fluorescencia

directa (AFD). Los aspirados y exudados nasofaríngeos son las mejores muestras, ya que los microorganismos se unen al epitelio respiratorio ciliado. La toxina paraliza los cilios. La lisis del complemento es más útil frente a los microorganismos infecciosos circulantes. Las inmunoglobulinas circulantes se pueden unir a los microorganismos, aunque la secreción es una respuesta inmunitaria adaptativa que tarda días o semanas en manifestarse. Los linfocitos NK atacan a las células huésped y la transmisión de señales del CPH es inhibida por agentes infecciosos intracelulares, por ejemplo, virus. Las micobacterias inhiben la formación de fagolisosomas con objeto de reducir su destrucción intracelular en los macrófagos.

29 **D** *Pseudomonas aeruginosa* puede infectar la piel que ha sufrido quemaduras y extenderse a los pulmones. Estos microorganismos secretan diversos factores de virulencia, entre ellos exotoxina A, que inhibe la síntesis de proteínas; exoenzima S, que afecta al crecimiento de la célula huésped; fosfolipasa C, que degrada el surfactante pulmonar, y compuestos que contienen hierro, tóxicos para las células endoteliales. Estos factores dan lugar a una vasculitis extensa, con necrosis. El riesgo es mayor en pacientes neutropénicos. Las levaduras de la especie *Histoplasma capsulatum* causan a veces una enfermedad pulmonar similar a la inducida por *Mycobacterium tuberculosis,* con inflamación granulomatosa. La neumonía por *Pneumocystis* es más probable en pacientes con inmunidad celular débil. Las infecciones neumocócicas producen exudados alveolares sin afectación vascular significativa.

30 **A** Este hecho dio inicio a la peste negra en Europa, una epidemia que persistió durante los siglos XIV y XV. La peste se extendió a través de Italia a todo el continente europeo y en la primavera del año siguiente, en su avance hacia el norte, llegó a Inglaterra; en 5 años murieron 25 millones de personas por este motivo, un tercio de la población de Europa. Los roedores son el reservorio de la infección (y los gatos no eran por entonces tan populares como deberían haberlo sido). Las picaduras de pulga y los aerosoles transmiten de una forma muy eficiente la enfermedad. El microorganismo causal de la misma, *Yersinia pestis,* secreta un activador del plasminógeno que favorece su

diseminación. La peste era endémica de Asia oriental y, a comienzos del siglo xx, llegó a través del Pacífico hasta San Francisco. Intentando evitar el pánico, que hubiera sido perjudicial para los negocios y para el turismo, el gobernador de California de la época no decretó la cuarentena. Como consecuencia de ello, la peste se hizo endémica del oeste de EE. UU. con afectación de roedores silvestres, aunque solo se producen ocasionales infecciones esporádicas en humanos. Los mosquitos son más conocidos por ser vectores del paludismo, los flebótomos lo son de la leishmaniosis, los redúvidos (triatominos) de la enfermedad de Chagas y las garrapatas de la enfermedad de Lyme.

31 **B** El microorganismo causante del chancroide es *Haemophilus ducreyi,* de difícil cultivo y a menudo enmascarado por otras sobreinfecciones en las lesiones ulceradas. El chancroide, más común en África y el Sudeste Asiático, es cofactor para la transmisión del VIH, y sus rasgos se solapan con los del granuloma inguinal, aunque con frecuencia hay afectación de los ganglios linfáticos en el primero y ausencia de cuerpos de Donovan en los macrófagos. El linfogranuloma venéreo es causado por *Chlamydia trachomatis,* que no se visualiza en la tinción de Gram. *Klebsiella granulomatis* (anteriormente *Calymmatobacterium granulomatis*) es también frecuente en regiones tropicales y subtropicales. Causa granuloma inguinal y su infección puede provocar cicatrices, con obstrucción uretral y linfática. La gonorrea tiende a inducir uretritis en hombres y cervicitis en mujeres, en ambos casos de forma aguda, sin formación de úlceras genitales. La sífilis se caracteriza por presencia de un chancro en su fase inicial y por la de exantema maculopapular en palmas de las manos y plantas de los pies en la secundaria, con prominente infiltrado linfoplasmocítico; el microorganismo causal es *Treponema pallidum,* espiroqueta que no se identifica en la tinción de Gram.

32 **C** El microorganismo causante es *Klebsiella granulomatis* (antes llamado *Calymmatobacterium granulomatis*); la enfermedad es más común en regiones tropicales y subtropicales, y puede causar cicatrices, con obstrucción uretral y linfática. La balanopostitis es una inflamación localizada en el

glande del pene y el prepucio, típicamente originada por *Candida, Gardnerella* o especies de *Staphylococcus.* El chancroide, producido por *Haemophilus ducreyi,* presenta rasgos que se solapan con los del granuloma inguinal, aunque con frecuencia hay afectación de los ganglios linfáticos en el primero y ausencia de cuerpos de Donovan en los macrófagos. El linfogranuloma venéreo es causado por *Chlamydia trachomatis,* que no se visualiza en la tinción de Gram. La sífilis secundaria se caracteriza por exantema maculopapular en palmas de las manos y plantas de los pies, con prominente infiltrado linfoplasmocítico; el agente causal es *Treponema pallidum,* espiroqueta que no se identifica en la tinción de Gram.

33 **B** La figura muestra un granuloma. Los macrófagos activados son el componente celular clave en los granulomas que se forman para controlar microorganismos persistentes, como *Mycobacterium tuberculosis.* Como parte de la hipersensibilidad tardía con respuesta inmunitaria por T_H1, los linfocitos CD4+ secretan interferón γ, que activa los macrófagos con objeto de destruir los microorganismos mediante los productos intermedios del nitrógeno reactivo. La lisis mediada por el complemento no está implicada en la destrucción de bacterias intracelulares, como *M. tuberculosis.* La activación del complemento sobre la superficie de *M. tuberculosis* puede opsonizar, no obstante, las bacterias, a fin de que sean captadas por los macrófagos. Los eosinófilos no son un componente importante de la mayoría de los granulomas y no destruyen las micobacterias. Las especies reactivas del oxígeno dependientes de NADPH son importantes en la lisis de bacterias por los neutrófilos. *M. tuberculosis* reside en los fagosomas, que no son acidificados para formar fagolisosomas.

34 **A** El niño padece una tuberculosis primaria. La mayoría de las personas que la sufren presentan una afectación subclínica y una minoría de ellas desarrollan manifestaciones clínicas; la mayor parte de estas padecen afectación pulmonar limitada sin diseminación. La tuberculosis primaria se caracteriza por el complejo de Ghon, un pequeño granuloma subpleural en el pulmón medio, junto con prominentes ganglios linfáticos hiliares. Estos ganglios pueden comprimir las vías respiratorias

centrales. Cuando la respuesta inmunitaria celular es escasa, es posible que haya numerosos granulomas dispersos en los pulmones o diseminados a otros órganos, según un patrón miliar (granulomas del tamaño de una semilla de mijo). La tuberculosis primaria progresiva da lugar a una afectación pulmonar más extensa, con infiltrados neumónicos. La cavitación en el lóbulo superior es característica de la tuberculosis secundaria (por reactivación o reinfección), en personas que han experimentado previamente una respuesta inmunitaria. Uno de los patrones de la tuberculosis diseminada es la enfermedad de Pott en la columna vertebral, que a veces es un hallazgo aislado.

35 **C** La anergia (menos de 10 mm de induración previstos en una prueba de tuberculina negativa), el esputo negativo a pesar de la afectación pulmonar extensa y de la evidencia radiográfica de infiltrados similares a una consolidación neumónica bacteriana son hallazgos que apuntan a una escasa respuesta inmunitaria celular. La infección por el VIH reduce la cifra de linfocitos CD4+ (lo que explica la linfopenia), esenciales para el desarrollo de la respuesta inmunitaria T_H1 necesaria para contener la infección por micobacterias. Es más probable que el debilitamiento que acompaña al consumo excesivo de alcohol culmine en una tuberculosis secundaria típica aunque más florida. La diabetes mellitus predispone a sufrir infecciones bacterianas, aunque la afectación pulmonar no se cuenta entre las complicaciones diabéticas típicas. El escorbuto afecta a los tejidos conjuntivos, pero no específicamente al pulmón. El consumo de tabaco reduce las defensas inmunitarias innatas, sobre todo frente a los patógenos bacterianos.

36 **C** La enfermedad de Hansen (lepra) es causada por el microorganismo acidorresistente *Mycobacterium leprae,* que infecta de forma crónica los nervios y la piel. No puede cultivarse en medios artificiales. El diagnóstico se establece por biopsia de una lesión cutánea. Hay dos formas extremas de lepra. En la forma tuberculoide, una reacción de hipersensibilidad tardía, con respuesta inmunitaria por T_H1 estimulada por las citocinas interferón γ e interleucina 2 (IL-2), genera lesiones granulomatosas similares a las de la

tuberculosis; en ellas son infrecuentes los bacilos acidorresistentes. En cambio, en la forma lepromatosa, mostrada en la figura, la inmunidad por linfocitos T está significativamente deprimida, se produce una respuesta inmunitaria T_H2 estimulada por IL-4 e IL-10 y los granulomas están escasamente formados. Por contra, hay grandes agregados de macrófagos llenos de lípidos y bacilos acidorresistentes. La lepra no se transmite fácilmente por aerosoles (ni por contacto directo); es probable que se asocie a cierta predisposición genética, por ejemplo, relacionada con variaciones genéticas en los receptores de IL-10 y en los de tipo señuelo *(toll),* y, como muchas otras enfermedades a lo largo de la historia, está vinculada a la pobreza. El carbunco cutáneo, causado por *Bacillus anthracis,* provoca una lesión cutánea necrótica con una escara en el punto de inoculación. Los insectos redúvidos (triatominos) son vectores del *Trypanosoma cruzi,* causante de la enfermedad de Chagas. Su picadura produce un área localizada de eritema cutáneo e inflamación. Suelen aparecer úlceras mucocutáneas en la infección por *Leishmania braziliensis,* transmitida por mosquitos flebótomos. En el área de la picadura, en la que se introducen espiroquetas de la especie *Borrelia burgdorferi,* causantes de la enfermedad de Lyme, puede aparecer un eritema crónico migratorio. La oncocercosis se debe a la infección por la filaria (nematodo) *Onchocerca volvulus,* que induce la formación de un nódulo subcutáneo.

37 **D** La infección por *Treponema pallidum* puede generar chancros sifilíticos en la fase primaria de la sífilis. Los chancros se caracterizan por infiltrados linfoplasmocíticos y endoarteritis obliterante. Pueden encontrarse lesiones mucocutáneas similares en la sífilis secundaria. La inflamación aguda con formación de abscesos es característica de las infecciones bacterianas, como la gonorrea. La inflamación granulomatosa con caseificación es más característica de las infecciones tuberculosas o fúngicas. La inflamación gomosa es propia de los adultos con sífilis terciaria o de la sífilis congénita.

38 **C** La infección por *Treponema pallidum* no tratada puede conducir a una sífilis terciaria años más tarde. Sus manifestaciones más comunes son aortitis (habitualmente en la

porción torácica), neurosífilis y necrosis gomosa en piel, tejidos blandos, huesos y articulaciones (articulación de Charcot). Este microorganismo no puede cultivarse. Las espiroquetas se identifican mejor mediante microscopia en campo oscuro en exudados de chancros primarios, aunque en la fase terciaria de la enfermedad son difíciles de localizar incluso así. Las pruebas serológicas son útiles para el cribado y la confirmación de la sífilis. Las pruebas no treponémicas (RPR, VDRL) son sensibles a la cardiolipina hallada en las espiroquetas durante la fase inicial de la enfermedad. Sin embargo, las pruebas son específicas, ya que la presencia de cardiolipina en tejidos humanos se asocia a otras enfermedades, con el consiguiente riesgo de falsos positivos. La prueba FTA tiene especificidad para *T. pallidum.*

39 **D** Se trata de hallazgos propios de la sífilis congénita con nódulos de necrosis gomosa. Dado que las espiroquetas atraviesan la placenta en el tercer trimestre de la gestación, no son habituales las muertes fetales prematuras. Los lactantes que sobreviven presentan características similares a las de la sífilis secundaria en adultos, con exantema. Las complicaciones tardías de la periostitis y la pericondritis comprenden deformidades óseas y dentales (p. ej., tibias en sable). Las infecciones por el virus del herpes en el recién nacido no suelen ser patentes inicialmente, ya que la mayoría de ellas se contraen al pasar por el canal del parto. La mayor parte de los lactantes nacidos con infección por el VIH no presentan hallazgos patológicos iniciales, ni macro- ni microscópicos. La toxoplasmosis y la infección por citomegalovirus congénitas causan una afectación cerebral grave.

40 **E** La fase aguda de la enfermedad de Lyme se caracteriza por aparición de eritema crónico migratorio en la piel. A medida que *Borrelia burgdorferi* prolifera y se disemina, se presentan manifestaciones sistémicas de carditis, meningitis, y artralgias y mialgias migratorias. La artritis en grandes articulaciones se produce 2-3 años después de la infección inicial. La artritis reumatoide puede asemejarse a la enfermedad de Lyme, aunque no va precedida de las lesiones cutáneas indicadas. La enfermedad de Chagas se asocia, en ocasiones, a miocarditis

aguda y crónica, y da lugar a insuficiencia cardíaca; algunos pacientes presentan afectación esofágica, pero la artritis y el exantema no son propios de esta enfermedad. La fiebre hemorrágica por dengue, causada por un arbovirus, produce miositis y depresión medular. *Leishmania braziliensis* causa úlceras mucocutáneas. La lepra, o enfermedad de Hansen, se relaciona con anestesia cutánea y formación de granulomas, con deformidades nodulares en la piel. En la sífilis primaria es posible que aparezca un chancro duro en el sitio de inoculación (generalmente los genitales externos; con menos frecuencia la cavidad bucal o la región anorrectal). En la sífilis secundaria puede presentarse un exantema maculopapular.

41 **B** Las esporas de *Clostridium botulinum* sobreviven al proceso de enlatado en alimentos no ácidos, como los guisantes, si estos no se calientan lo suficiente, por lo que estos microorganismos crecen y elaboran una neurotoxina. Sin embargo, el plan fallaría si todo el mundo optara por comer comida basura en vez de verduras. Tal vez los terroristas deberían promover el consumo de grasas *trans* que, combinadas con falta de ejercicio, aumentan la morbilidad y la mortalidad por aterogenia en mucha mayor medida que cualquier agente infeccioso. *Chlamydia psittaci* es un agente de categoría B, es decir, que se transmite por el aire y causa neumonía. El virus del Ébola provoca fiebre hemorrágica. El hantavirus, diseminado por aerosolización de secreciones de ratón ciervo y otros roedores, produce neumonía y sepsis. *Yersinia pestis* es el causante de la peste, en la que se desarrollan linfoadenitis, neumonía y sepsis. Su vector es la pulga de la rata.

42 **D** Los clostridios, como *Clostridium perfringens*, son un grupo de bacterias bacilares grampositivas que generan potentes exotoxinas, causantes de necrosis tisular extensa a tal velocidad que no da tiempo a que se produzca una respuesta inflamatoria aguda. Se forman abscesos por los neutrófilos que responden al agente inflamatorio, a menudo un microorganismo bacteriano, si bien la necrosis por licuefacción es inducida, fundamentalmente, por enzimas liberadas por los neutrófilos. La cicatrización fibrosa puede, ciertamente, formar parte de la fase de curación de las respuestas inflamatorias, aunque es menos significativa en las infecciones bacterianas que con los

agentes que producen más inflamación crónica. La inflamación granulomatosa suele desarrollarse en semanas o meses desde la infección persistente por agentes como las micobacterias. Los infiltrados linfocíticos son más característicos de las infecciones crónicas y víricas, y la necrosis tiende a ser mínima.

43 **A** Este hombre padece tétanos. La contaminación de una herida con *Clostridium tetani* puede inducir la formación de una potente neurotoxina. Se trata de una proteasa que escinde la sinaptobrevina, importante proteína de las vesículas sinápticas en las neuronas inhibidoras. *Clostridium perfringens* elabora diversas toxinas, una de las cuales (α) es una fosfolipasa causante de mionecrosis. La inhibición de la liberación de acetilcolina no es propia de la infección. La toxina de *Staphylococcus aureus* es una enterotoxina que actúa como superantígeno y estimula la liberación de citocinas por los linfocitos T. El cólera se desarrolla cuando una toxina elaborada por *Vibrio cholerae* estimula la adenilato ciclasa de las células epiteliales.

44 **E** Los grandes bacilos grampositivos observados en la figura son característicos de *Clostridium perfringens,* potencial contaminante de heridas abiertas y productor de gangrena gaseosa. Los clostridios elaboran múltiples toxinas. La α-toxina de *C. perfringens* actúa como una fosfolipasa C y degrada la lecitina en las membranas celulares. Los lipopolisacáridos se encuentran en los microorganismos gramnegativos. La inhibición de los fagocitos es propia de microorganismos como *Mycobacterium tuberculosis.* La resistencia a antibióticos es un fenómeno creciente, pero no es el principal mecanismo implicado en la virulencia de los clostridios. Aunque los tejidos desvitalizados pueden sufrir infecciones polimicrobianas, *Candida* no es el más virulento de los agentes causantes de sobreinfección.

45 **B** La causa más frecuente de uretritis no gonocócica en hombres es la infección por *Chlamydia trachomatis.* Se trata de un trastorno molesto, aunque no deja secuelas. No obstante, la continuidad del comportamiento que haya favorecido la infección puede hacer que el paciente tenga riesgo de padecer otras enfermedades de transmisión sexual. Las infecciones por

Candida suelen afectar a personas inmunodeprimidas o que reciben tratamiento antibiótico a largo plazo. El virus del herpes simple genera vesículas dolorosas en la piel. La tuberculosis de las vías urinarias es infrecuente. Un chancro sifilítico en el pene, no presente en este caso, es indicativo de infección por *Treponema pallidum.*

46 **B** La infección por *Chlamydia trachomatis* es una enfermedad de transmisión sexual frecuente. La mayor parte de los casos dan lugar solo a uretritis y cervicitis; sin embargo, ciertas cepas de *C. trachomatis* producen linfogranuloma venéreo, enfermedad ulcerosa crónica endémica de Asia, África y el Caribe. En esta enfermedad, se registra una reacción inflamatoria neutrófila mixta, como la observada en este paciente. Por el contrario, el virus del herpes simple genera vesículas mucocutáneas transparentes sin exudados y con escasa probabilidad de afectación de los ganglios linfáticos. La candidiasis produce inflamación superficial con exudado, aunque rara vez es invasiva o diseminada en personas no inmunodeprimidas. La vaginosis bacteriana por *Gardnerella* produce una secreción blanquecina con olor a «pescado». *Treponema pallidum,* el agente causal de la sífilis, da lugar a la formación de un chancro en la piel y en superficies mucosas.

47 **D** Este paciente padece fiebre exantemática de las Montañas Rocosas, enfermedad esporádica en EE. UU., sobre todo en otras cordilleras distintas de la que le da su nombre. Las rickettsiosis generan signos y síntomas de lesión del endotelio vascular y el músculo liso similares a los de la vasculitis. El vector más frecuente es la garrapata de la madera *Dermacentor andersoni.* La trombosis de los vasos sanguíneos afectados es responsable de los focos de necrosis cutánea. La cefalea y el dolor abdominal son a menudo importantes. La enfermedad de Lyme, causada por *Borrelia burgdorferi,* produce eritema crónico migratorio en la piel de la localización de la mordedura de la garrapata. La leishmaniosis mucocutánea afecta, fundamentalmente, a las regiones nasal y oral. La enfermedad de Hansen (lepra), inducida por *Mycobacterium leprae,* provoca anestesia cutánea y predispone a la recidiva de las lesiones. La peste, producida por *Yersinia pestis,* provoca necrosis cutánea focal en el área de la

picadura de la pulga vector y úlceras en los ganglios linfáticos (bubones).

48 **A** Las infecciones por *Aspergillus, Candida* y *Mucor* pueden diseminarse en pacientes con neutropenia. La invasión vascular se produce en infecciones fúngicas, particularmente por *Aspergillus* y *Mucor.* Las hifas tabicadas ramificadas se muestran en la figura, proyectándose a partir de un cuerpo fructífero de *Aspergillus.* Una vez que estos microorganismos obtienen un punto de apoyo (para sostén de las hifas) en los tejidos, son muy difíciles de erradicar. *Coccidioides immitis* e *Histoplasma capsulatum* son hongos que provocan enfermedades pulmonares similares a la originada por *Mycobacterium tuberculosis,* con inflamación granulomatosa. No muestran tendencia a la invasión vascular. *Corynebacterium diphtheriae* afecta a las vías respiratorias altas, sobre todo en niños no vacunados contra el este microorganismo. La neumonía por *Pneumocystis* no suele provocar cambios vasculares.

49 **F** Este paciente presenta cetoacidosis diabética, que implica un alto riesgo de mucormicosis. En la figura se observan hifas anchas no tabicadas, más visibles con tinción de H-E que con tinciones especiales, a diferencia de lo que sucede con otros hongos. En cambio, *Aspergillus* presenta hifas más finas, con ramificaciones y tabicaciones en ángulo agudo. *Actinomyces* son bacilos grampositivos alargados y filamentosos. Las infecciones por *Candida* suelen ser superficiales y presentan células en gemación con seudohifas. Los bacilos grandes grampositivos son característicos de *Clostridium perfringens,* contaminante de heridas abiertas y causante de gangrena gaseosa.

50 **C** Este niño padece paludismo cerebral, la más grave de las formas de esta enfermedad. Tras la picadura del mosquito transmisor, los esporozoítos de *Plasmodium falciparum* invaden las células hepáticas y se reproducen asexualmente. Cuando los hepatocitos son destruidos, liberan miles de merozoítos que infectan los eritrocitos. Por la circulación, estos pueden unirse al endotelio en el cerebro. Los pequeños vasos cerebrales quedan taponados por estos eritrocitos, con lo que se genera isquemia. Las demás opciones enumeradas también pueden verse implicadas de manera secundaria en la trombosis vascular del

paludismo, pero no son localizaciones de reproducción asexual fuera de los eritrocitos.

51 **A** Los antecedentes de viajes de este paciente apuntan a una posible enfermedad transmitida por insectos. La figura muestra las características formas cuadrangulares y anulares de *Babesia microti,* en el interior de los eritrocitos. La babesiosis es una enfermedad protozoaria poco común similar al paludismo, endémica del nordeste de EE. UU. Su vector es la garrapata de los ciervos, como en la enfermedad de Lyme por *Borrelia burgdorferi,* que es una espiroqueta. En la giardiasis suele haber diarrea acuosa autolimitada. *Rickettsia rickettsii* produce la fiebre exantemática de las Montañas Rocosas, esporádica en EE. UU. fuera de esa área geográfica y que genera signos y síntomas de lesión del endotelio vascular y del músculo liso similares a los de la vasculitis. *Wuchereria bancrofti* es el microorganismo causal de una forma de filariasis que da lugar a la elefantiasis, debida a obstrucción linfática por una reacción inflamatoria ante las filarias adultas.

52 **C** La leishmaniosis visceral *(kala-azar)* es causada por protozoos del complejo *Leishmania donovani.* De sus subespecies, solo *L. donovani infantum* es endémica del sur de Europa y del área mediterránea. Se transmite a los humanos por la picadura de mosquitos flebótomos *(Phlebotomus).* La pancitopenia implica afectación de la médula ósea, posiblemente favorecida por la esplenomegalia, y las anomalías de la función hepática indican afectación del hígado. La borreliosis da lugar a fiebre recidivante y se transmite a través de los piojos del cuerpo. La equinococosis es causada por ingestión de huevos de tenia equinococo y provoca formación de quistes en órganos viscerales. La infección por *Borrelia burgdorferi* se transmite por garrapatas y es la causante de la enfermedad de Lyme, caracterizada por eritema crónico migratorio, meningoencefalitis y artritis crónica. La esquistosomiasis, transmitida por caracoles, produce cirrosis hepática *(Schistosoma mansoni* o *Schistosoma japonicum)* o enfermedad vesical *(Schistosoma haematobium).* El tifus es una rickettsiosis transmitida por piojos, con exantema cutáneo que puede evolucionar a necrosis.

53 **C** Este paciente padece una leishmaniosis cutánea, y la pápula original se situaba en el punto de picadura del mosquito flebótomo vector. La leishmaniosis es endémica de Oriente Medio, del Sudeste Asiático, de África y de Latinoamérica. Los microorganismos proliferan en los macrófagos del sistema mononuclear fagocítico y pueden causar adenopatías regionales. En la forma cutánea no hay afectación de médula ósea ni esplenomegalia, por lo que no hay pancitopenia. La borreliosis da lugar a fiebre recidivante y se transmite a través de piojos del cuerpo. *Brugia malayi* es un nematodo transmitido por mosquitos que induce filariasis en los ganglios linfáticos y que progresa a elefantiasis. *Leishmania donovani* es transmitida por flebótomos e induce infección de los macrófagos, causante de hepatoesplenomegalia, adenopatías y afectación de la médula ósea, con pancitopenia. La listeriosis habitualmente se contrae por alimentos o aguas contaminados. En la mayor parte de los adultos provoca diarrea leve, si bien en algunos casos de adultos o niños y en fetos es causa de meningitis o diseminación con formación de microabscesos (microgranulomas). *Mycobacterium leprae* causa la enfermedad de Hansen (lepra), en la que hay infección de nervios periféricos y piel. En personas con respuesta inmunitaria extensa, la forma tuberculoide de esta enfermedad provoca formación de granulomas; si la respuesta inmunitaria es débil, se padece la forma lepromatosa, caracterizada por gran número de macrófagos llenos de bacilos acidorresistentes, cortos y delgados. La tripanosomiasis africana es la enfermedad del sueño.

54 **E** Los hallazgos son compatibles con tripanosomiasis africana (enfermedad del sueño). La erradicación de sus vectores, las moscas tsé-tsé, ha constituido una prioridad durante décadas en muchos países africanos. Los nematodos del grupo de las filarias, endémicos de ciertas partes de Centroamérica, del Sudeste Asiático y de Polinesia, también aparecen en la sangre, pero son de menor tamaño y no causan consunción crónica. La filariasis no es endémica de Europa.

55 **C** Esta niña está infectada por *Trypanosoma cruzi,* el microorganismo causal de la enfermedad de Chagas, endémica de Centroamérica y Sudamérica. Sus vectores son hemípteros de

la familia redúvidos (triatominos). Los microorganismos dañan el corazón por infección directa o generando una respuesta autoinmunitaria que induce afectación cardíaca por existencia de un antígeno con reactividad cruzada. La miocarditis aguda es infrecuente, aunque la mayoría de las muertes por enfermedad de Chagas aguda se deben a insuficiencia cardíaca. En el 20% de los infectados dicha insuficiencia aparece entre 5 y 15 años después de la infección inicial. El corazón afectado aumenta de tamaño, con dilatación de las cuatro cavidades. El absceso cerebral o la meningitis aguda son complicaciones típicas de la infección bacteriana con septicemia. La artritis crónica se registra en la enfermedad de Lyme, transmitida por las garrapatas de los ciervos. *Leishmania braziliensis* causa úlceras mucocutáneas y es transmitida por flebótomos. La infección de los senos paranasales puede deberse a *Mucor circinelloides.*

56 **D** Las larvas rabditoideas de *Strongyloides stercoralis* pueden convertirse en formas filariformes invasivas por autoinfección en huéspedes inmunodeprimidos, en la llamada hiperinfección con afectación de múltiples órganos. Los huéspedes sin inmunodepresión solo suelen presentar diarrea. Los parásitos, particularmente los helmintos, al desplazarse por los tejidos inducen una pronunciada eosinofilia. La cisticercosis, contraída por ingesta de carne de cerdo poco cocinada, puede causar liberación de larvas, que penetran en el intestino y se diseminan por vía hematógena, asentándose a menudo en la sustancia gris o blanca del cerebro, donde, al desarrollarse, forman quistes. La oncocercosis es la infección por la filaria *Onchocerca volvulus,* que da lugar a la formación de un nódulo subcutáneo. En las infecciones por *Schistosoma mansoni* o *Schistosoma japonicum,* en el sistema venoso porta hay formas que afectan a mujeres adultas que liberan huevos potencialmente causantes de fibrosis hepática; los gusanos de la especie *Schistosoma haematobium* se localizan en las venas próximas a la vejiga y liberan huevos que producen hematuria. Comer carne infectada, especialmente de cerdo poco cocinada, puede ser causa de triquinosis. *Trichinella* se enquista en el músculo estriado y produce fiebre y mialgias.

57 **E** El dolor muscular agudo con fiebre y eosinofilia es indicativo de infestación parasitaria de los músculos

esqueléticos, probablemente por triquinosis. Esta se debe a ingestión de carne de cerdo poco cocinada infestada por larvas de *Trichinella spiralis.* La fiebre hemorrágica es leve, solo cursa con mialgias, aunque también puede ser grave, con lesión endotelial vascular extensa. La gripe A y B en ocasiones induce miositis en niños, con síntomas iniciales focales más graves y tardíos que las mialgias difusas propias de la gripe convencional. La poliomielitis puede provocar debilidad muscular, por atrofia neurógena y pérdida de neuronas motoras. El tifus de la maleza, causado por *Orientia tsutsugamushi,* produce mialgias, con escaras y linfoadenopatías en el área de la picadura del ácaro vector.

58 **B** *Schistosoma haematobium* produce una infección parasitaria propia de África, particularmente del valle del Nilo, en zonas en la irrigación ha ampliado el área de distribución de los caracoles acuáticos, huéspedes intermediarios. Los gusanos adultos se localizan en las venas adyacentes a la vejiga y ponen huevos que presentan una espina afilada, con la que se abren paso a través de la pared vesical y, al hacerlo, causan inflamación granulomatosa, fibrosis y calcificación graves. Las infecciones micobacterianas urinarias son infrecuentes y no producen fibrosis vesical. *Trichinella spiralis* infecta el músculo estriado. La ascariosis afecta al tubo digestivo inferior y los gusanos se localizan en la luz de este. La cisticercosis, causada por la tenia del cerdo, *Taenia solium,* puede tener una distribución amplia, aunque el cerebro suele ser el órgano más afectado.

59 **C** Estos agricultores sufren infección por *Schistosoma mansoni* o *Schistosoma japonicum.* Las hembras de los gusanos residen en el sistema nervioso porta y ponen huevos, que se abren paso hacia el hígado y, al hacerlo, ocasionan una reacción inflamatoria granulomatosa. Con el tiempo, los granulomas sufren fibrosis, por lo que comprimen las venas portas. Ello genera hipertensión portal grave, esplenomegalia y ascitis. La miocardiopatía dilatada puede presentarse en la enfermedad de Chagas, en la que microorganismos *Trypanosoma cruzi* son transmitidos por hemípteros redúvidos (triatominos). La elefantiasis es una complicación de la filariasis, que se transmite por mosquitos. *Leishmania braziliensis* causa úlceras mucocutáneas y es

transmitida por flebótomos. En la infección crónica por *Schistosoma haematobium* es posible el desarrollo de un carcinoma epidermoide en la vejiga.

60 **E** La hipertrofia y la deformidad pronunciadas de los tejidos blandos se denomina *elefantiasis* y es consecuencia de la obstrucción linfática en presencia de una reacción inflamatoria a las filarias de la especie *Wuchereria bancrofti. Echinococcus* produce hidatidosis en hígado, pulmones o huesos. *Leishmania tropica* puede afectar a la piel y causar úlceras e hipertrofia de órganos parenquimatosos. La esquistosomiasis por *Schistosoma mansoni* induce afectación hepática grave. Las larvas de *Trichinella* ingeridas con la carne de cerdo poco cocinada se enquistan en el músculo estriado.

61 **E** La oncocercosis es causada por *Onchocerca volvulus* y cursa con inflamación inducida por las microfilarias de esta especie. Las campañas de erradicación de insectos y de tratamiento de las poblaciones afectadas con ivermectina han contribuido a disminuir la prevalencia de la enfermedad. Aunque la ivermectina mata a las microfilarias, no ataca a los gusanos adultos, en tanto que el tratamiento con doxiciclina elimina el gusano que las bacterias simbióticas del género *Wolbachia* necesitan para la reproducción. Los microorganismos acidorresistentes *Mycobacterium leprae* pueden estar presentes en las lesiones cutáneas de la lepra lepromatosa, pero el ojo no se ve afectado. Los cuerpos elementales se identifican en ocasiones en el raspado conjuntival en caso de infección por *Chlamydia trachomatis,* si bien no se ven implicados componentes oculares adicionales y no hay lesiones cutáneas. Los diplococos intracelulares de *Neisseria gonorrhoeae* pueden causar ceguera neonatal. Es posible que aparezcan inclusiones intranucleares en la queratitis por el virus del herpes simple, lo que puede ser motivo de perforación de las úlceras de la córnea.

62 **B** Los Centers for Disease Control and Prevention de EE. UU. han clasificado los microbios en varias categorías, en función del peligro que plantean en lo que respecta a su uso bioterrorista, atendiendo a la facilidad de producción y diseminación, y a la gravedad de la enfermedad que provocan. La variante *Variola major* del virus de la viruela, inductora de esta enfermedad,

registra una mortalidad del 30%. *Francisella tularensis* es muy infecciosa; apenas entre 10 y 50 microorganismos pueden provocar enfermedad. Como potencial arma, la bacteria se transmite por el aire y se puede quedar expuesto a ella por inhalación. Los infectados sufren una neumonía potencialmente mortal. *Chlamydia psittaci* induce psitacosis, también causante de neumonía, aunque de curso más variable. El hantavirus origina una neumonía grave, si bien sus pródromos son más prolongados; su vector es el ratón ciervo. *Mycobacterium kansasii* provoca síntomas similares a los de *Mycobacterium tuberculosis. Rickettsia typhi* es el agente causal del tifus murino, que origina cefaleas y exantema.

CAPÍTULO 9

Enfermedades ambientales y nutricionales

PEF9 Capítulo 9: Enfermedades ambientales y nutricionales

PH9 Capítulo 7: Enfermedades medioambientales y nutricionales

1 En un experimento, se estudian los efectos de la activación xenobiótica del compuesto benzo[a]pireno, carcinógeno químico presente en el humo de los cigarrillos, en varios tejidos. Los investigadores determinan que la formación de un segundo metabolito, que se une de forma covalente al ADN, aumenta la frecuencia del cáncer pulmonar. En personas afectadas por dicho aumento de la frecuencia se hallan polimorfismos genéticos. ¿Cuál de las siguientes vías metabólicas es más probable que genere este xenobiótico?

A Biometilación
B Citocromo P-450
C Monooxigenasa que contiene flavina
D Glucuronidación
E Reducción del glutatión
F Cooxidación dependiente de la peroxidasa

2 Un estudio ambiental muestra que un gas existente en la naturaleza está presente en concentraciones elevadas en la contaminación de las ciudades. Por encima de la atmósfera este gas bloquea la radiación ultravioleta nociva y sobre el suelo genera radicales libres en las vías respiratorias bajas. ¿Cuál es ese gas?

A Argón
B Dióxido de carbono

C Dióxido de nitrógeno
D Ozono
E Dióxido de azufre

3 Un investigador, al sumergirse hasta las rodillas en el agua del mar, observa que la marea sube cada vez más en la zona costera próxima a su casa y que el fenómeno es cada vez más frecuente. Deduce que, por ello, las poblaciones que habitan estas zonas costeras están expuestas a un creciente riesgo de padecer enfermedades infecciosas. ¿Cuál de los siguientes sistemas es más probable que se vea afectado por enfermedad en esas poblaciones?

A Aparato cardiovascular
B Sistema nervioso central
C Tubo digestivo
D Sistema hematopoyético
E Vías respiratorias
F Vías urinarias

4 Un hombre de 75 años que vive solo en una vivienda mal ventilada y sin calefacción central utiliza una estufa de queroseno portátil sin salida de humos para calentar su casa durante los meses de invierno. Una mañana, un vecino lo encuentra en estado de obnubilación. En la exploración física aparece cianótico. La medición de gases ambientales arroja valores de Po_2 de 90 mmHg, Pco_2 de 35 mmHg y pH de 7,3. La pulsioximetría muestra baja saturación de oxígeno. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que haya causado la enfermedad?

A Berilio
B Monóxido de carbono
C Compuestos de óxido nitroso
D Oxígeno
E Ozono
F Dióxido de azufre

5 Una niña de 8 años presenta letargo y somnolencia con mareo y debilidad tras un viaje en autobús de 6 h en el que regresaba de un campamento de verano. En la exploración física su temperatura es de 37 °C, su frecuencia cardíaca, de 107 latidos/min su frecuencia respiratoria, de 28 respiraciones/min y su presión arterial, de 130/85 mmHg. El murmullo vesicular es audible en todos los campos pulmonares, sin sibilancias ni crepitantes. La gasometría

arterial muestra los siguientes valores: pH, 7,35; Po_2, 95 mmHg; Pco_2, 37 mmHg, y HCO_3^-, 20 mEq/l. En la pulsioximetría, la saturación de oxígeno es del 90%, aunque la saturación de oxihemoglobina medida espectrofotométricamente es del 60%. El ácido láctico sanguíneo es de 8 mmol/l, y la creatina cinasa total, de 445 U/l. Se le administra oxígeno al 100% en una cámara hiperbárica y mejora en 20 min. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que sea la causa de la intoxicación?

A Ácido acetilsalicílico
B Monóxido de carbono
C Sulfato de hierro
D Plomo
E Metanol
F Insecticida organofosforado

6 Varios niños de entre 3 y 6 años son ingresados en un hospital local por presentar una crisis encefalopática. Han vivido en la misma comunidad durante toda su vida. Todos mostraron anteriormente retraso del desarrollo psicomotor. En la exploración física presentan dolor abdominal, náuseas y vómitos. Las TC craneales muestran edema cerebral significativo. Las pruebas de laboratorio evidencian anemia microcítica. Un investigador es enviado a la comunidad de viviendas en las que los niños habitan, y allí encuentra un complejo de apartamentos en franco deterioro, con humedades, mal estado de las conducciones de agua y mala ventilación. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que haya provocado estos hallazgos?

A Etilenglicol
B Queroseno
C Plomo
D Metanol
E Hipoclorito sódico

7 Un trabajador agrícola previamente sano, de 27 años, desarrolla náuseas, vómitos, cólicos abdominales, tos con sibilancias y disnea, salivación y lagrimeo 1 h después de acabar su trabajo en el campo. En la exploración está afebril, con frecuencia respiratoria de 50 respiraciones/min y presión arterial de 90/55 mmHg. Las pruebas de laboratorio muestran una actividad de colinesterasa plasmática equivalente a menos del 50% de lo normal. Se

administra atropina intravenosa y el paciente mejora. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que haya provocado esta situación?

A Aflatoxina
B Ciclodieno
C Dioxina
D Alcaloides del cornezuelo de centeno
E Organofosforados
F Piretrina

8 Un estudio epidemiológico realizado en una comunidad registra un aumento de la incidencia de carcinoma basocelular y epidermoide entre adultos. Las lesiones se localizan predominantemente en las palmas de las manos y las plantas de los pies. El análisis del agua para beber bombeada de pozos detecta elevadas concentraciones de metales pesados utilizados en el tratamiento a presión de maderas (que producen una leve coloración verdosa), insecticidas y pesticidas. ¿Cuál de los siguientes metales es más probable que esté implicado?

A Arsénico
B Berilio
C Cadmio
D Plomo
E Mercurio

9 Un hombre de 36 años es propietario de una tienda de reparación de radiadores, donde trabaja limpiando, cortando, puliendo y soldando metales. A lo largo de 6 meses, desarrolla un creciente malestar, con cefaleas y dolores abdominales, y tiene dificultad para manejar sus herramientas. El hemograma completo indica anemia microcítica y en el frotis de sangre periférica se aprecia punteado basófilo de los eritrocitos. ¿Cuál de las siguientes determinaciones es más útil para especificar la exposición tóxica causante de la enfermedad?

A Alanina aminotransferasa
B Calcio
C Creatina cinasa
D Selenio
E Protoporfirina de cinc

10 Un número creciente de niños de menos de 5 años sometidos a

observación en una población costera presentan parálisis cerebral, sordera, ceguera y retraso mental. Hace 5 años se construyó en las inmediaciones una central térmica de carbón. Las familias afectadas consumen mucho pescado. ¿Cuál de los siguientes compuestos ingeridos durante el embarazo por las madres de estos niños es más probable que sea responsable de sus trastornos?

A Bisfenol A
B Cadmio
C Metilmercurio
D Organoclorados
E Cloruro de vinilo

11 Un hombre de 72 años experimentó un aumento de la disnea el pasado año. En la auscultación se percibe una atenuación del murmullo vesicular en el lado derecho del tórax. Una radiografía de tórax muestra una gran masa pleural que casi cubre el pulmón derecho. ¿Cuál de los siguientes metales es más probable que se asocie a estos datos?

A Arsénico
B Amianto
C Berilio
D Cromo
E Níquel

12 Una mujer de 61 años que vive en una ciudad con una pésima calidad del aire ha desarrollado una tos que ha ido empeorando en los últimos 7 meses. Tiene antecedentes de tabaquismo de 80 cajetillas-año. Hace 1 semana sufrió un episodio de hemoptisis. Una radiografía de tórax muestra una masa perihiliar infiltrante de 7 cm en el pulmón derecho. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que se asocie a estos hallazgos?

A Monóxido de carbono
B Nicotina
C Compuestos de óxido nitroso
D Ozono
E Hidrocarburos aromáticos policíclicos
F Polvo de sílice
G Dióxido de azufre

13 En una fiesta, un estudiante universitario de 19 años bebió, en

un plazo de 30 min, 2 l de una mezcla de bebidas alcohólicas que contenía un 50% de etanol en volumen. Generalmente no suele tomar mucho alcohol. El fármaco que más consume es paracetamol, para las cefaleas. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que sea mortal en las primeras 12 h?

A Pancreatitis aguda
B Depresión del tronco del encéfalo
C Cirrosis hepática
D Hemorragia varicosa
E Enfermedad de Wernicke

14 Se observa que el etanol ingerido es metabolizado por la alcohol deshidrogenasa a un compuesto intermedio que, en el metabolismo ulterior, disminuye el dinucleótido de adenina nicotinamida (NAD^+) reducido en el citoplasma de los hepatocitos. Esto determina una reducción posterior de la oxidación de los ácidos grasos. Los estudios poblacionales muestran que algunas personas presentan carencias en la actividad enzimática de metabolización de este compuesto intermedio. ¿Cuál es el compuesto intermedio?

A Acetaldehído
B α-tocoferol
C Ácido fórmico
D Glutatión
E Peróxido de hidrógeno

15 Un estudio de casos y controles intenta identificar los efectos a largo plazo del tratamiento hormonal sustitutivo (THS) en mujeres posmenopáusicas que reciben estrógenos exógenos asociados a progestágenos, en comparación con un grupo control que no recibe el tratamiento. Las historias clínicas de las mujeres participantes en el estudio se revisaron después de 20 años. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que se observe en las mujeres que recibieron THS?

A Carcinoma de cuello uterino
B Colitis ulcerosa crónica
C Cirrosis hepática
D Enfisema pulmonar
E Tromboembolia

16 Una mujer de 36 años ha estado tomando anticonceptivos orales con dosis bajas de estrógenos durante los últimos 20 años. Ha fumado una cajetilla diaria durante los últimos 18 años. Es G2, P2 y ambos embarazos concluyeron con parto de sendos lactantes nacidos a término, con bajo peso al nacer pero sin malformaciones. En la exploración física no se observaron hallazgos anómalos. Su IMC es de 24. ¿De cuál de las siguientes lesiones el riesgo de presentarla es mayor?

A Carcinoma de mama
B Colecistitis
C Demencia con cuerpos de Lewy
D Carcinoma de endometrio
E Infarto de miocardio
F Carcinoma de ovario

17 Un jugador de fútbol americano de 22 años experimenta un súbito colapso durante un partido y sufre una parada cardíaca, y no puede ser reanimado. El médico forense que investiga esta muerte súbita detecta, en la autopsia, detecta ateroesclerosis coronaria significativa y evidencia histológica de hipertensión en los vasos renales. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que provoque estos hallazgos?

A Anfetaminas
B Barbitúricos
C Benzodiacepinas
D Cocaína
E Etanol
F Heroína
G Marihuana

18 Una mujer de 26 años con antecedentes de 6 meses de depresión acompañada de ideas suicidas activas ingiere 35 g de paracetamol. De inmediato experimenta náuseas y vómitos. En el plazo de 1 día entra progresivamente en un estado de obnubilación. En la exploración física su temperatura es de 36,9 °C; su frecuencia cardíaca, de 75 latidos/min su frecuencia respiratoria, de 15 respiraciones/min, y la presión arterial, de 100/65 mmHg. Es tratada con N-acetilcisteína. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que acentúe sus lesiones orgánicas cuando disminuye su concentración?

A Glutatión (GSH)
B Amilasa
C Creatina cinasa
D Cuerpos cetónicos
E Potasio

19 Un hombre de 27 años previamente sano sufre un colapso en una fiesta en la que se estaban consumiendo drogas, tanto legales como ilegales. De camino al hospital requiere reanimación con desfibrilación para restablecer un ritmo cardíaco normal. En la exploración física la temperatura es de 40 °C, con una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones/min, una frecuencia cardíaca de 110 latidos/min y una presión arterial de 175/90 mmHg. Presenta pupilas dilatadas, tabique nasal perforado y un callo prominente en el pulgar derecho. La TC craneal muestra hemorragia aguda en el lóbulo frontal derecho. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que ocasione estos hallazgos?

A Anfetaminas
B Barbitúricos
C Cocaína
D Etanol
E Heroína
F Marihuana
G Fenciclidina

20 Un hombre de 63 años con antecedentes de artritis crónica ha experimentado acúfenos pronunciados y episodios de mareo a lo largo de los últimos 6 meses. Los últimos 2 días ha padecido cefaleas y náuseas. En la exploración física está afebril, aunque con frecuencia respiratoria de 35 respiraciones/min y frecuencia cardíaca de 100 latidos/min. Presenta petequias diseminadas en la piel de las extremidades superiores. No hay pérdida aparente de conducción ósea ni de función del nervio auditivo. La prueba de sangre oculta en heces con guayacol es positiva. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de lactato sérico de 6 mmol/l. La gasometría arterial registra los siguientes valores: pH, 7,25; P_{O_2}, 95 mmHg; P_{CO_2}, 35 mmHg, y HCO_3^-, 15 mEq/l. ¿Cuál de los siguientes fármacos explica mejor estos hallazgos por su toxicidad aguda y crónica?

A Paracetamol

B Ácido acetilsalicílico
C Clorpromacina
D Hierro
E Morfina
F Quinidina
G Tetraciclina

21 Un joven de 20 años es llevado al servicio de urgencias hospitalarias por un amigo, que lo encontró inconsciente después de que hubiera intentando ponerse en contacto con él durante 3 días. Al llegar, el paciente se encuentra en estado de depresión respiratoria. Experimenta convulsiones durante 2 min, tras lo cual entra en parada cardíaca. Se le aplican medidas de soporte vital avanzado y es estabilizado e intubado. En la exploración física se aprecian marcas de pinchazos de aguja en la fosa antecubital izquierda, miosis y un soplo cardíaco diastólico intenso. Su temperatura es de 39,2 °C. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que provoque tales hallazgos?

A Cocaína
B Etanol
C Fluracepam
D Heroína
E Petidina
F Fenciclidina
G Ácido lisérgico

22 Un ensayo clínico incluye a pacientes diagnosticados de cáncer que tienen náuseas resistentes al tratamiento como consecuencia de la quimioterapia. Se dividen en dos grupos; los del grupo tratado con el medicamento presentan reducción de las náuseas autorreferidas y menor pérdida de peso que los del grupo placebo. Los primeros no parecen registrar efectos secundarios importantes. ¿Cuál de las siguientes sustancias, clasificadas como estupefacientes en la mayoría de los países, es más probable que ejerza los efectos positivos registrados en el estudio?

A Barbitúricos
B Cocaína
C Heroína
D Marihuana
E Metilfenidato

F Metanfetamina
G Fenciclidina

23 Un niño de 7 años sufre una caída de la bicicleta cuando iba a una velocidad de 5 km/h. La piel de la pantorrilla y el brazo derechos rozan con el suelo y se produce un despegamiento de la capa superior de la epidermis. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor este tipo de lesión?

A Abrasión
B Quemadura
C Contusión
D Incisión
E Laceración

24 Durante un partido de clasificación para la Copa del Mundo, un portero recibe en el tórax el impacto de un balón lanzado desde una distancia de unos 10 m. Continúa jugando. ¿Cuál de los siguientes patrones de lesión es más probable que sufra el portero en el tórax?

A Abrasión
B Contusión
C Incisión
D Laceración
E Punción



25 Un muchacho de 14 años es llevado al servicio de urgencias de un hospital local, en el que fallece 2 h después. El principal hallazgo de la exploración se muestra en la figura. Las pruebas de laboratorio indican que el nivel de hematocrito era del 17%. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor la lesión?

A Lesión por explosión
B Lesión por electrocución
C Herida por arma de fuego
D Herida incisa
E Laceración

26 Un hombre de 33 años sufre quemaduras térmicas en el 40% de su superficie corporal en un incendio producido mientras reparaba un depósito de combustible. En la exploración física, la piel del tronco, del cuello y de la cara aparece rosada, con ampollas y dolor a la palpación. La piel de los brazos está blanca y anestesiada. Se necesita un injerto en los brazos pero no en las demás partes del cuerpo. ¿Cuál de los siguientes componentes tisulares obliga a realizar un injerto de piel cuando falta?

A Fibras de colágeno
B Anejos cutáneos
C Estrato espinoso epidérmico

D Queratina
E Macrófagos
F Terminaciones nerviosas



27 Un niño de 5 años es llevado a consulta para que lo examinen. Se producen sospechas de maltrato infantil. En la exploración física la piel del niño presenta el aspecto mostrado en la figura. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor esta lesión?

A Abrasión
B Contusión
C Hipotermia
D *Kwashiorkor*
E Laceración
F Quemadura térmica

28 Mientras visita el Palacio Imperial de Kioto, una turista de 75 años sufre un súbito desvanecimiento. Se mantiene consciente, pero se siente débil y mareada. En la exploración física, la enfermera registra una temperatura de 35,2 °C, una frecuencia cardíaca de 93 latidos/min, una frecuencia respiratoria de 17 respiraciones/min y una presión arterial de 95/50 mmHg. La temperatura ambiente era de 34 °C a la sombra, con un 90% de humedad. Una hora después de haber tomado un té verde frío la

mujer se recupera y regresa a su hotel. ¿Cuál de los siguientes términos se ajusta mejor a estos datos?

A Calambres por calor
B Agotamiento por calor
C Golpe de calor
D Hipertermia maligna
E Lesión térmica por inhalación

29 Un hombre de 20 años intenta reparar un viejo aparato eléctrico en su garaje. Mientras comprueba su funcionamiento, su mano derecha entra en contacto con un cable pelado que conduce una corriente alterna de 120 V, 10 A. ¿Cuál de las siguientes opciones es más probable que se presente como consecuencia de esta lesión eléctrica?

A Broncoconstricción
B Trombosis de la arteria cerebral
C Golpe de calor
D Hemorragia gástrica
E Fibrilación ventricular

30 Una mujer de 30 años es hallada muerta en la habitación de su hotel 3 h después de que los bomberos extinguieran un incendio en la planta inferior. En la investigación del caso no se observaron signos de fuego en su habitación, y el médico que examinó su cadáver no apreció signos físicos externos. ¿Cuál de las siguientes opciones explica mejor la muerte de la mujer?

A Infarto agudo de miocardio
B Hemorragia cerebral
C Hipertermia maligna
D Septicemia por *Pseudomonas aeruginosa*
E Edema pulmonar

31 «Hacía un frío terrible en el anochecer de la última noche del año y la nieve caía con fuerza. En medio del frío y la oscuridad, una pobre niña, con la cabeza descubierta y los pies descalzos, vagaba por las calles. Sus pies estaban enrojecidos y azules por el frío. Tiritando de frío y desfallecida por el hambre, la niña se arrastraba a duras penas». ¿Cuál de los siguientes signos patológicos en los tejidos blandos sería más probable hallar en esta niña?

A Inflamación aguda
B Apoptosis

C Edema
D Hemorragia
E Cariorrexis nuclear

32 Un hombre de 76 años presenta un nódulo en el párpado inferior izquierdo que ha ido aumentando de tamaño gradualmente a lo largo de 3 años. En la exploración física, el nódulo umbilicado, de 0,8 cm, aparece firme y con una pequeña úlcera central. Se procede a su escisión y a la reparación plástica del párpado. ¿Cuál de las siguientes formas de radiación es más probable que haya estado implicada en el desarrollo de esta lesión?

A Rayos γ
B Rayos infrarrojos
C Rayos ultravioleta
D Radiación visible
E Rayos X

33 A un hombre de 56 años con antecedentes de consumo de 60 cajetillas de tabaco-año le es diagnosticado un carcinoma epidermoide de laringe. Recibe radioterapia, en dosis divididas de 40 Sv (4.000 cGy). Después de 1 año, la endoscopia no revela evidencias de carcinoma residual. ¿Cuál de los siguientes efectos adversos es más probable que se presente debido a la radioterapia?

A Azoospermia
B Atrofia cerebral
C Úlcera de colon
D Aplasia medular
E Fibrosis vascular

34 Los bomberos que combatieron inicialmente los incendios producidos tras el accidente nuclear de Chernóbil se expusieron a altos niveles de radiación. Algunos recibieron dosis superiores a los 50 Sv (5.000 cGy). A las pocas horas, muchos de ellos cayeron gravemente enfermos. ¿Cuál de los siguientes órganos es más probable que haya sufrido lesiones en esta situación?

A Médula ósea
B Encéfalo
C Corazón
D Pulmones

E Intestino delgado

35 Un niño de 3 años ha sufrido una serie de infecciones respiratorias en los últimos 6 meses. En la exploración física el niño presenta rasgos de enfermedad crónica, apatía y retraso del crecimiento. Su peso es del 50% con respecto al ideal y presenta emaciación muscular pronunciada. Los hallazgos de laboratorio son: hemoglobina, 9,4 g/dl; hematocrito, 27,9%; VCM, 75 μm^3; recuento de plaquetas, 182.000/mm^3; recuento de eritrocitos, 6.730/mm^3; albúmina sérica, 4,1 g/dl; proteínas totales, 6,8 g/dl; glucosa, 52 mg/dl, y creatinina, 0,3 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que explique estos datos?

A Bulimia
B Carencia de folato
C *Kwashiorkor*
D Intoxicación por plomo
E Marasmo

36 Una mujer de 26 años ha presentado amenorrea a lo largo de los últimos 8 años. Hace 1 año se fracturó la muñeca como consecuencia de una caída. En la exploración física, su talla es de 175 cm, y su peso, de 52 kg (IMC, 17). Presenta caracteres sexuales secundarios normales. No se registran hallazgos anómalos. La densidad ósea medida por absorciometría de rayos X de doble energía está 1,5 desviaciones estándar por debajo del intervalo de referencia para adultos jóvenes. Los hallazgos de laboratorio muestran anemia e hipoalbuminemia. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Anorexia nerviosa
B Bulimia
C *Kwashiorkor*
D Raquitismo
E Escorbuto

37 Un niño de 5 años ha sufrido infecciones de repetición de las vías respiratorias altas en los últimos 2 meses. Está en el percentil 55 de altura y en el 38 de peso. La exploración física muestra edema generalizado, ascitis, emaciación muscular y zonas de descamación cutánea en el tronco y las extremidades. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable en las pruebas de laboratorio?

A Abetalipoproteinemia
B Hipoalbuminemia
C Hipocalcemia
D Hiperglucemia
E Anemia megaloblástica

38 Un estudio epidemiológico registra un número creciente de infecciones respiratorias en niños que viven en una comunidad en la que la mayoría de las familias viven en condiciones de pobreza. Entre los microorganismos infecciosos se cuentan *Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae* y *Klebsiella pneumoniae.* La mayoría de ellos han padecido neumonía y sarampión. El estudio documenta casos de queratomalacia, cálculos urinarios y dermatosis papular generalizada cuando los niños alcanzan la edad adulta. ¿Cuál de las siguientes vitaminas es más probable que sea deficitaria en estos niños?

A Vitamina A
B Vitamina B_1
C Vitamina E
D Vitamina D
E Vitamina K



39 Un niño de 3 años no parece desarrollarse con normalidad. En la exploración física presenta el aspecto que aparece en la figura. Los resultados de las pruebas de visión son normales. No hay petequias, ni áreas de púrpura en la piel ni abdomen hipertrofiado. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

A Beriberi
B *Kwashiorkor*

C Raquitismo
D Pelagra
E Escorbuto

40 Un niño de 3 años presenta erosión en una superficie corneal rugosa causada por xeroftalmía. La queratomalacia da lugar a cicatrización corneal, que puede derivar en ceguera en un plazo de 4 años. Esta lesión ocular es actualmente menos frecuente gracias a la iniciativa de las Naciones Unidas de tratar la carencia dietética de un determinado nutriente. ¿De cuál?

A Hierro
B Niacina
C Proteínas
D Vitamina A
E Vitamina K

41 En un estudio sobre la influencia del estilo de vida sobre la salud, los investigadores observan que hacer que los niños jueguen al aire libre, en vez de permanecer sentados durante horas frente al televisor, tiene beneficios a largo plazo. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que se beneficie de este cambio al llegar a la mediana edad?

A Fracturas óseas
B Cataratas
C Cálculos urinarios
D Enfisema pulmonar
E Cánceres cutáneos

42 Una mujer de 48 años sufre una lesión en la muñeca derecha al caerse por las escaleras. En la exploración física presenta dolor intenso a la palpación de la muñeca y se niega a mover la mano. Una radiografía de la mano y el brazo derechos muestra osteopenia significativa y fractura de la cabeza del radio. ¿Cuál de las siguientes enfermedades subyacentes es más probable que contribuya al riesgo de fractura en la paciente?

A Gastritis atrófica
B Leucemia linfocítica crónica
C Ateroesclerosis coronaria
D Cirrosis biliar primaria
E Enfisema pulmonar

43 Una mujer de 75 años vive sola y come frugalmente, debido a lo

reducido de su pensión. En las últimas 2 semanas ha venido sintiendo dolor en la pierna derecha. En la exploración física se aprecian dolor intenso a la palpación en la cara lateral de la espinilla derecha, un corte mal cicatrizado en la mano derecha y exantema cutáneo hiperqueratósico difuso. Una radiografía muestra un hematoma subperióstico diafisario tibial. En las pruebas de laboratorio, la concentración de hemoglobina es de 11,3 g/dl. ¿Cuál de los siguientes nutrientes es más probable que explique tales hallazgos cuando existe una carencia del mismo?

A Ácido ascórbico
B Folato
C Niacina
D Riboflavina
E Vitamina A
F Vitamina K

44 Una mujer de 55 años ha experimentado en el último año un empeoramiento de su capacidad de memoria y de realizar las actividades de la vida diaria. Durante los últimos 3 meses ha sufrido episodios de diarrea líquida. En la exploración física se observa piel descamada rojiza en áreas expuestas al sol. Los reflejos tendinosos profundos son normales, y la sensibilidad está intacta. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que padezca?

A Beriberi
B Queilosis
C Hipotiroidismo
D Marasmo
E Pelagra

45 Un lactante de 9 meses, prematuro y con bajo peso al nacer, presenta retraso del desarrollo. Padece una enfermedad hepatobiliar colestásica crónica. Actualmente está en el percentil 40 de talla y en el 25 de peso. En la exploración, los reflejos tendinosos profundos están ausentes y presenta sensibilidad reducida a la vibración y al dolor, debilidad muscular y movimientos oculares anómalos. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 9,2 g/dl; de hematocrito del 27,6%; de VCM de 86 μm^3; de recuento de plaquetas de 208.000/mm^3; recuento de eritrocitos de 6.080/mm^3; de proteínas

totales de 6,4 g/dl; de albúmina de 3,4 g/dl; de glucosa de 70 mg/dl, y de creatinina de 0,3 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes vitaminas es más probable que se asocie a estos datos cuando existe una carencia de la misma?

A Vitamina A
B Vitamina B_1
C Vitamina B_3
D Vitamina B_{12}
E Vitamina C
F Vitamina E
G Vitamina K

46 Una mujer de 52 años con un largo historial de alcoholismo ha padecido una insuficiencia cardíaca congestiva progresiva en el último año. Desde hace 1 mes presenta cada vez más confusión, desorientación y dificultad ambulatoria. La exploración física muestra nistagmo, ataxia de la marcha y disminución de la sensibilidad en ambas extremidades. Las pruebas de laboratorio muestras cifras de hemoglobina de 13,1 g/dl; de hematocrito del 39,3%; de VCM de 90 μm^3; de recuento de plaquetas de 269.300/mm^3, y de recuento de eritrocitos de 7.120/mm^3. ¿Cuál de los siguientes nutrientes es más probable que se asocie a esta clínica por su carencia prolongada en la dieta?

A Folato
B Niacina
C Piridoxina
D Riboflavina
E Tiamina

47 Una mujer de 41 años refería tos crónica de 7 meses de evolución. Presentaba una prueba cutánea de tuberculina positiva. Una radiografía de tórax mostraba múltiples lesiones cavitarias en los lóbulos superiores de ambos pulmones. Se le administraron isoniacida, rifampicina, piracinamida y etambutol. A los 6 meses, en la exploración se detectó una neuropatía periférica. ¿La administración de cuál de los siguientes nutrientes es más probable que hubiera evitado la neuropatía?

A Ácido ascórbico
B Calciferol
C Calcio

D Cobalamina (vitamina B_{12})
E Niacina
F Piridoxina
G Riboflavina

48 Un lactante nacido a término presenta índices de Apgar de 8 y 9 a 1 y 5 min. El lactante parece sano, pero 3 días después de nacer sufre una hemorragia en el muñón del cordón umbilical y se observa equimosis en las nalgas. Poco después aparecen convulsiones. ¿Cuál de los siguientes nutrientes es más probable que sea deficitario en este lactante?

A Ácido fólico
B Yodo
C Hierro
D Vitamina E
E Vitamina K

49 Sir Robert Falcon Scott alcanzó el Polo Sur el 17 de enero de 1912, apenas 1 mes después de que Roald Amundsen consiguiera ser el primero en lograrlo, con un equipo expedicionario más experimentado y preparado. Su abatido equipo tuvo entonces que emprender el largo regreso a su base, pero estaban muy debilitados y faltos de víveres y el tiempo, además, era especialmente frío, incluso para la Antártida. Finalmente, las tormentas de nieve impidieron que pudieran continuar su avance. Meses más tarde, un equipo de rescate halló los cuerpos congelados de Scott y sus compañeros. Todos presentaban un exantema papular hiperqueratósico, equimosis e inflamación gingival hemorrágica. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que contribuyera a la muerte de los expedicionarios?

A Beriberi
B *Kwashiorkor*
C Pelagra
D Anemia perniciosa
E Raquitismo
F Escorbuto

50 Una mujer de 18 años embarazada no recibe asistencia prenatal, toma una dieta consistente predominantemente en hidratos de carbono y grasas, y no toma vitaminas con hierro. Durante el tercer trimestre de gestación se siente cada vez más fatigada y débil. El

niño nace a las 35 semanas de gestación y se muestra apático durante la primera semana de vida. Las pruebas de laboratorio muestran concentraciones de ferritina sérica significativamente reducidas, tanto en el lactante como en la madre. ¿Cuáles de los siguientes indicios de carencia nutricional es más probable hallar en el lactante y en la madre?

A Dermatitis
B Bocio difuso
C Anemia microcítica
D Neuropatía periférica
E Deformidades esqueléticas
F Hemorragias en tejidos blandos

51 Un estudio epidemiológico evalúa la incidencia de la caries dental y los abscesos dentales en niños que habitan en comunidades de un área metropolitana. Los investigadores determinaron que la tasa es elevada en niños que viven en comunidades de clase media alta, y baja en los que viven en comunidades que se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Se midieron las concentraciones de oligoelementos en el abastecimiento de aguas de tales comunidades. ¿Cuál de los siguientes minerales en concentraciones elevadas es más probable que se asocie a una menor tasa de caries entre los niños de comunidades más pobres?

A Cobre
B Fluoruro
C Yodo
D Selenio
E Cinc

52 Se realiza un estudio epidemiológico con escasa financiación, cuyos resultados aparecen en publicaciones de difusión general disponibles en supermercados y centros comerciales. El estudio analiza la dieta de autores de libros de texto. ¿La carencia de cuál de las siguientes sustancias es más probable que se encuentre en la dieta de esta población?

A Calcio
B Chocolate
C Folato
D Hierro

E Vitamina C

53 Una mujer de 55 años ha ido ganando peso gradualmente a lo largo de los últimos 30 años. Hace 5 años fue sometida a una colecistectomía por colelitiasis. No es fumadora. Actualmente mide 164 cm y pesa 126 kg (IMC, 47). En la exploración física presenta limitación de la amplitud de movimiento y dolor al mover las rodillas. En las pruebas de laboratorio la concentración de glucosa es de 176 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes neoplasias malignas es más probable que desarrolle la paciente?

A Adenocarcinoma de colon
B Carcinoma endometrial
C Carcinoma hepatocelular
D Adenocarcinoma pulmonar
E Carcinoma de células renales

54 En un estudio epidemiológico de personas con IMC superior a 35, se obtienen datos sobre estilo de vida y patrones de enfermedad. Los investigadores observan que un subgrupo de personas obesas registran sistemáticamente una elevada ingesta calórica por carecer de sensación de saciedad cuando comen. ¿Cuál de las siguientes moléculas es más probable que tenga una menor capacidad de respuesta a nivel del receptor hipotalámico en estos pacientes?

A Adenosina
B Glucagón
C Glucosa
D Insulina
E Leptina

55 A la una de la madrugada, una esforzada estudiante de segundo año de Medicina está terminando de estudiar patología cuando nota que pierde capacidad de concentración, porque hace 7 h que ha cenado y siente hambre. Al concluir el capítulo dedicado a la cardiopatía isquémica, opta por ser prudente y abstenerse de comer sus galletas de chocolate favoritas y por tomar dos manzanas con un vaso de leche desnatada. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que aumentara rápidamente cuando sintió hambre y disminuyera de inmediato tras tomar su saludable tentempié?

A α-MSH

B Factor liberador de corticotropina (CRF)
C Grelina
D Leptina
E Hormona liberadora de tirotropina (TRH)

56 Se realiza un estudio clínico desarrollado en adultos con un IMC de al menos 30. En torno al 8% de los participantes no presentan hiperfagia, sino que registran concentraciones normales de leptina y grelina, además de un metabolismo basal reducido. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que esté mutado en estas personas?

A *OB-R*
B *MC4R*
C *OB*
D *POMC*
E *PPAR*γ

57 Un estudio de casos y controles realizado en hombres y mujeres adultos determina la relación entre obesidad y cáncer. Los datos indican un aumento del riesgo de cáncer de esófago y riñón en personas con IMC superior a 25. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que contribuya al desarrollo de cáncer en estas personas?

A Adiponectina
B Aflatoxina
C Factor de crecimiento parecido a la insulina 1 (IGF-1)
D Leptina
E Selenio
F Grasas *trans*

58 Un hombre de 45 años, cuyos madre, padre, hermano y tío refieren antecedentes de cardiopatía, consulta a su médico sobre el modo de reducir el riesgo de desarrollar enfermedad arterial coronaria. El paciente mide 171 cm, pesa 91 kg y tiene una presión arterial de 125/80 mmHg. Su concentración de glucosa en sangre es de 181 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes consejos dietéticos es mejor para este paciente?

A Evitar la sal en la comida
B Beber más agua
C Aumentar la ingesta de fibra en la dieta
D Reducir la ingesta de grasas saturadas

E Tomar suplementos de vitamina A

59 Un hombre de 40 años tiene antecedentes familiares de carcinoma de colon. Consulta al médico sobre la mejor manera de reducir el riesgo de desarrollo de este tipo de cáncer. ¿Cuál de las siguientes prácticas dietéticas es más aconsejable que siga a diario?

A Tomar más carne de vacuno
B Beber un vaso de vino tinto
C Comer más verduras
D Tomar un tazón de helado
E Reducir el consumo de chocolate

Respuestas

1 **B** El sistema de la monooxigenasa dependiente del citocromo P-450, una oxidasa de función mixta, se halla en el retículo endoplásmico liso, particularmente de los hepatocitos, y normalmente actúa para depurar las hormonas endógenas. También sirve para convertir los xenobióticos en carcinógenos. La biometilación por microorganismos ambientales del mercurio inorgánico que contamina los organismos acuáticos puede dar lugar a acumulación de metilmercurio tóxico, que en ocasiones pasa a la cadena alimentaria humana. La monooxigenasa que contiene flavina, presente en el retículo endoplásmico, puede oxidar la nicotina. La glucuronidación convierte la naftilamina en un carcinógeno causante de cáncer de vías urinarias. El glutatión reducido ayuda a descomponer los radicales libres producidos por sistemas de oxigenasa como el citocromo P-450; el metabolismo xenobiótico reduce el glutatión y facilita la lesión celular por radicales libres. La vía de cooxidación dependiente de la peroxidasa metaboliza la 2-naftilamina y la transforma en un carcinógeno causante de cáncer urinario.

2 **D** Los contaminantes del aire conforman una combinación de compuestos químicos que afecta a la función pulmonar. Generalmente son tolerados por las personas sanas, pero disminuyen la calidad de vida de las que padecen trastornos respiratorios preexistentes. La disminución de las concentraciones de ozono en los niveles superiores de la

atmósfera se ha asociado a la liberación de fluorocarbono (de los refrigerantes) y a un aumento del riesgo de sufrir cáncer de piel. Las emisiones de los vehículos a motor son la principal fuente de dióxido de nitrógeno y de ozono que reaccionan para formar *smog.* El argón es un gas noble no reactivo que compone el 1% de la atmósfera terrestre. El dióxido de carbono es un gas implicado en el efecto invernadero que contribuye cada vez más al cambio climático global, pero se elimina más con la espiración del que existe en la atmósfera. El dióxido de azufre derivado de los procesos industriales y la combustión del carbón forman la lluvia ácida y contribuyen al desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

3 **C** El cambio climático plantea importantes retos en el ámbito de la salud pública. En las regiones costeras, los mayores índices de inundación aumentan el riesgo de contaminación de las aguas y las infecciones digestivas. El agua salada mata a los mosquitos, una de las ventajas de las mareas altas, por lo que las infecciones por arbovirus son menos probables. La elevación de la temperatura no es suficiente para afectar significativamente al aparato cardiovascular, excepto en las cada vez más comunes olas de calor. Las otras opciones enumeradas no se ven afectadas.

4 **B** Los dispositivos de calefacción basados en la combustión de hidrocarburos, como los derivados del petróleo, generan monóxido de carbono, que puede acumularse hasta niveles peligrosos en viviendas sin ventilación o mal ventiladas. La intoxicación crónica por monóxido de carbono causa daño en el sistema nervioso central. El monóxido se une más firmemente a la hemoglobina de lo que lo hace el oxígeno, con la consiguiente hipoxia. La disfunción mental suele iniciarse con concentraciones de carboxihemoglobina superiores al 20% y cuando estas llegan al 60% hay riesgo de muerte. Las clásicas livideces de color «rojo cereza» son más propias de la intoxicación aguda grave. La exposición aguda al berilio causa neumonitis y la crónica provoca enfermedad pulmonar de tipo sarcoidosis. Los compuestos de óxido nitroso y ozono están presentes en el *smog* y generan molestias en la respiración y disfunción respiratoria en personas muy jóvenes, ancianos y

enfermos con alteraciones respiratorias subyacentes, aunque la exposición a ellos no es de riesgo vital inmediato. En concentraciones muy altas, el oxígeno puede ser tóxico para los pulmones y producir daño alveolar difuso. Las emisiones de dióxido de azufre son un componente del *smog* y de la lluvia ácida; aumentan el riesgo de bronquitis crónica.

5 **B** El culpable es el autobús. El monóxido de carbono (CO) se une a la hemoglobina con una potencia 200 veces mayor que la del oxígeno, reduciendo la saturación de este. Además, se une a la mioglobina cardíaca incluso con mayor avidez que a la hemoglobina. La hipoxia tisular produce acidosis láctica. El músculo cardíaco y esquelético comienza a descomponerse y libera creatina cinasa. El encéfalo necesita elevados niveles de aporte de oxígeno y a ello se debe que los signos neurológicos sean a menudo los primeros indicios de intoxicación por CO. La toxicidad del CO aumenta con el ejercicio. Las otras opciones enumeradas no son responsables de la menor saturación de oxígeno. La intoxicación por ácido acetilsalicílico provoca en ocasiones acidosis metabólica. La toxicidad por hierro induce náuseas y dolor abdominal, con pérdida de líquido e hipovolemia, acidosis metabólica e hiperglucemia. La intoxicación por plomo suele ser crónica y da lugar a encefalopatía, anemia y dolor abdominal. El metanol es metabolizado a ácido fórmico y formaldehído, y causa acidosis metabólica y afectación del sistema nervioso central y de los ojos. Los organofosforados son inhibidores irreversibles de la colinesterasa y provocan neurotoxicidad aguda.

6 **C** Los restos de pintura vieja con plomo tienen un sabor dulzón que puede hacer que los niños los ingieran. El mayor riesgo de la ingestión de plomo es el daño neurológico. Las concentraciones de plomo en sangre venosa han de ser normalmente inferiores a 10 µg/dl. El etilenglicol está presente en el líquido anticongelante y en ocasiones causa necrosis tubular renal aguda. El queroseno, un hidrocarburo utilizado en ciertos dispositivos domésticos de calefacción, genera emanaciones de monóxido de carbono si la ventilación no es idónea y provoca toxicidad respiratoria si se ingiere. La ingestión de metanol produce depresión del sistema nervioso central, acidosis y

ceguera. La lejía doméstica (hipoclorito sódico) es un irritante local y no es probable que esté implicada dadas las condiciones en las que estos niños viven.

7 **E** Los efectos muscarínicos de la intoxicación aguda por organofosforados son contrarrestados por la atropina. Los organofosforados son potentes pesticidas neurotóxicos para los humanos. En cambio, los ciclodienos, como el DDT, registran menor toxicidad en humanos, pero se acumulan en el medioambiente y pueden incorporarse a la cadena alimentaria. Las dioxinas son defoliantes potencialmente inmunodepresoras, carcinógenas y teratógenas. Las piretrinas (obtenidas de las flores del crisantemo) son pesticidas de baja toxicidad y se utilizan en los aviones antes del aterrizaje para eliminar posibles especies de insectos que hayan penetrado en ellos en el lugar de partida, para evitar su diseminación sin dañar a los pasajeros. Las aflatoxinas y los alcaloides del cornezuelo de centeno son toxinas naturales; la primera, presente en cereales parasitados por hongos, implica riesgo de carcinoma hepatocelular, y los segundos, también propios de cereales con hongos, pueden producir convulsiones.

8 **A** La exposición crónica a compuestos de arsénico aumenta el riesgo de cánceres cutáneos distintos del melanoma con una distribución diferente de la asociada a la causa más común: la exposición a luz ultravioleta. El berilio inhalado en forma de gas produce toxicidad respiratoria aguda; la exposición crónica puede causar granulomas de tipo sarcoide. La toxicidad por cadmio puede ocasionar necrosis tubular renal, osteopenia y enfermedad pulmonar crónica. La toxicidad aguda por plomo genera lesiones renales y digestivas, y la crónica provoca anemia, neuropatía y encefalopatía. La intoxicación por mercurio daña el sistema nervioso central.

9 **E** Este hombre ha sufrido exposición profesional al plomo y muestra síntomas y signos de toxicidad por él. La concentración de protoporfirina de cinc es alta en la intoxicación crónica por plomo, la anemia por enfermedad crónica y la anemia ferropénica. El plomo interfiere en la biosíntesis del hemo e inhibe la incorporación del hierro a este; por ello, se utiliza el cinc en su lugar. La lesión del hígado con elevación de las

enzimas hepáticas ALT y AST no es característica de la intoxicación por plomo, mientras que la elevación aguda de las mismas puede darse en la intoxicación por paracetamol. La enzima muscular creatina cinasa no está elevada, porque el músculo no es dañado directamente por el plomo, aunque es posible la neuropatía. El plomo daña los túbulos renales y provoca insuficiencia renal, aunque las alteraciones electrolíticas con disminución de calcio no son específicas de la insuficiencia inducida por plomo. El selenio es un micronutriente.

10 **C** El metilmercurio es tóxico para el desarrollo cerebral. Se incorpora a compuestos orgánicos en el interior de bacterias y pasa a la cadena alimentaria humana. La intoxicación por cadmio genera complicaciones renales y pulmonares. El bisfenol A se emplea en la fabricación de resinas epoxi, presentes en casi todas las botellas y envases de plástico: es un interruptor endocrino. Los organoclorados, como el DDT, también entran en la cadena alimentaria y alteran principalmente el metabolismo endocrino. Entre los organoclorados no pesticidas se cuentan los bifenilos policlorados (BPC), causantes de cloracné y que fueron el primer objetivo del movimiento ecologista creado por el cantante Pete Seeger durante la navegación del velero *Clearwater* por aguas del río Hudson. El cloruro de vinilo, empleado en la fabricación de plásticos de cloruro de polivinilo, se ha asociado a angiosarcomas hepáticos.

11 **B** Las fibras de amianto pueden provocar fibrosis intersticial pulmonar con neumopatía restrictiva y aumentan el riesgo de neoplasia maligna. Los fumadores que sufren exposición al amianto registran un notable incremento de la incidencia del carcinoma broncógeno. El mesotelioma es infrecuente, aun con la exposición al amianto, si bien casi todos los casos de mesotelioma maligno guardan relación con dicha exposición. La exposición a arsénico implica riesgo de cáncer cutáneo. La exposición crónica al berilio puede dar lugar a la formación de granulomas de tipo sarcoide. La exposición al cromo incrementa el riesgo de carcinoma de las vías respiratorias altas y los pulmones. La exposición al níquel se vincula a cánceres respiratorios.

12 **E** La masa perihiliar infiltrante es indicativa de cáncer

pulmonar. Los hidrocarburos policíclicos y las nitrosaminas, presentes en el humo del tabaco, son fundamentales en el desarrollo de cáncer de pulmón. Las concentraciones de monóxido de carbono en fumadores están elevadas, aunque ello favorece la hipoxia, no el cáncer. La nicotina de los cigarrillos ejerce un efecto estimulante en el sistema nervioso central, aunque no participa de forma destacada en el desarrollo oncológico. El óxido nitroso y el ozono están presentes en el *smog,* aunque tampoco se asocian estrechamente al riesgo de cáncer. La exposición al polvo de sílice aumenta algo el riesgo de cáncer pulmonar, generalmente con exposición pulmonar prolongada. Las emisiones de dióxido de azufre pasan al *smog,* favorecen la lluvia ácida y elevan el riesgo de bronquitis crónica.

13 **B** Una cantidad importante de etanol ingerida en poco tiempo eleva a niveles tóxicos la concentración del mismo e induce depresión del SNC, ya que la alcohol deshidrogenasa del hígado metaboliza el etanol con cinética de orden 0. La combinación de paracetamol y etanol incrementa la probabilidad de toxicidad, necrosis e insuficiencia hepática aguda. La pancreatitis es una potencial complicación del consumo excesivo crónico de alcohol. La cirrosis es una complicación a largo plazo del alcoholismo. La hematemesis por gastritis y úlcera gástrica es más habitual en casos de alcoholismo crónico, y la hemorragia varicosa complica la cirrosis hepática. La enfermedad de Wernicke es infrecuente, incluso en alcohólicos y probablemente se deba a una carencia crónica de tiamina concomitante.

14 **A** El acetaldehído contribuye a la toxicidad aguda del etanol. En ciertas poblaciones, como entre los asiáticos, hay una variante del acetaldehído deshidrogenasa menos eficaz en la metabolización de acetaldehído a ácido acético. El α-tocoferol es la vitamina E, antioxidante que protege del daño celular. El ácido fórmico es uno de los metabolitos tóxicos, junto con el formaldehído, producidos cuando el metanol es metabolizado por la alcohol deshidrogenasa. El glutatión es también antioxidante y protege a las células de las lesiones por radicales libres. El peróxido de hidrógeno se metaboliza a agua en los peroxisomas, mientras que el etanol es convertido en acetaldehído por la alcohol deshidrogenasa.

15 **E** El tratamiento hormonal sustitutivo (THS) incrementa el riesgo de enfermedad tromboembólica, como sucede en los tratamientos con anticonceptivos orales. Durante mucho tiempo se consideró que el THS ejercía un efecto de protección cardiovascular, ya que los estrógenos exógenos elevan las HDL y reducen las LDL. No obstante, esto no sucede en todas las mujeres y los progestágenos tienden a ejercer la acción opuesta. El riesgo de carcinoma de cuello uterino se relaciona estrechamente con un estilo de vida que aumente la probabilidad de infección por el virus del papiloma humano. La enfermedad inflamatoria intestinal no se asocia al THS. La cirrosis hepática en hombres puede disminuir la degradación de los estrógenos circulantes y generar atrofia testicular. El enfisema pulmonar suele asociarse a tabaquismo, no al THS.

16 **E** Los anticonceptivos orales bajos en estrógenos actualmente en uso no aumentan el riesgo de ateroesclerosis coronaria o infarto de miocardio en mujeres no fumadoras de menos de 45 años, pero sí lo elevan, en cambio, en fumadoras mayores de 35. El consumo de tabaco durante el embarazo aumenta la probabilidad de alumbrar un lactante con bajo peso al nacer. Los anticonceptivos orales no incrementan el riesgo de cáncer de mama y reducen el de cáncer de ovario o endometrio; el riesgo de estos dos últimos aumenta con el tratamiento hormonal sustitutivo (THS) posmenopáusico, que también incrementa el de colecistitis. Ni los anticonceptivos orales ni el THS aumentan la probabilidad de demencia.

17 **D** La cocaína es un potente vasoconstrictor y entre las complicaciones cardíacas de su consumo se cuenta la vasoconstricción arterial con lesión isquémica y arritmias. El consumo crónico genera ateroesclerosis, que afecta a pequeñas ramas periféricas de las arterias coronarias. Las anfetaminas también inducen arritmias cardíacas. Los barbitúricos son depresores y pueden causar insuficiencia respiratoria, al igual que las benzodiacepinas. La intoxicación aguda por etanol induce depresión del sistema nervioso central y coma. Las sobredosis de heroína van acompañadas en ocasiones de edema pulmonar e insuficiencia respiratoria. La marihuana es un tranquilizante menor a cuyo consumo no se asocian efectos

fisiológicos importantes.

18 **A** La toxicidad por paracetamol produce necrosis hepática, indicada por elevación de las concentraciones de ALT y AST. Si la muerte no es inmediata, en ocasiones se produce hiperbilirrubinemia. La N-acetilcisteína aumenta el glutatión aportando un grupo sulfhidrilo para que se una a los metabolitos tóxicos. La amilasa sérica elevada se observa en la pancreatitis, mientras que la elevación de la creatina cinasa sérica se da en la lesión de los músculos esquelético y cardíaco. La cetonuria es característica de la carencia de insulina absoluta en la diabetes mellitus y la inanición. La hipopotasemia se asocia a enfermedades renales y a carencia de glucocorticoides.

19 **C** La cocaína es un potente vasoconstrictor y tiene varios efectos vasculares, como lesión isquémica del tabique nasal por la vía de consumo, en este caso la inhalación. Los efectos cardiovasculares inducen numerosas complicaciones, como vasoconstricción arterial con lesión isquémica del corazón, arritmias y hemorragias en el sistema nervioso central (SNC). Otra complicación en algunos casos de intoxicación por cocaína es la hipertermia con «delirio excitado». El callo es causado por el roce debido al uso de un encendedor para encender la pipa en que se consume la forma de cocaína conocida como *crack*. Las anfetaminas son estimulantes del SNC y los barbitúricos son depresores del mismo. El alcoholismo agudo puede inducir depresión del SNC, pero no tiene efectos cardíacos inmediatos. Los opiáceos deprimen el SNC y la función respiratoria, y la heroína puede provocar edema pulmonar agudo. La marihuana (cuyo ingrediente activo es el Δ-9-tetrahidrocannabinol) no tiene efectos tóxicos agudos graves. La fenciclidina (PCP) produce toxicidad aguda similar a la psicosis.

20 **B** La toxicidad crónica por ácido acetilsalicílico (< 3 g/día) genera diversos problemas neurológicos. El ácido acetilsalicílico también inhibe la función plaquetaria reduciendo la producción de tromboxano A_2, lo que favorece la hemorragia. La toxicidad aguda por ácido acetilsalicílico causa acidosis metabólica con compensación respiratoria. Inicialmente, esta toxicidad aguda produce alcalosis respiratoria pura, por estimulación de los centros respiratorios bulbares. El aumento de la absorción de

ácido estimula la acidosis metabólica, intensificada después por la intoxicación de la fosforilación oxidativa mitocondrial que da lugar a glucólisis anaeróbica y a acidosis láctica. La toxicidad por paracetamol ataca principalmente al hígado, la clorpromacina causa ictericia colestásica y la toxicidad por hierro suele tener un componente de gastroenteritis con pérdida de líquidos e hipovolemia. La morfina y otros opiáceos tienden a inducir depresión y acidosis respiratoria. El tratamiento con quinidina provoca, en ocasiones, anemia hemolítica. La tetraciclina induce cambios de color en los dientes en niños y generar fototoxicidad cuando hay quemaduras solares.

21 **D** La heroína es un narcótico opioide derivado de la morfina. Este grupo de compuestos es depresor del sistema nervioso central (SNC) y su sobredosis va acompañada de depresiones, convulsiones y parada cardíaca. La vía de administración característica es la inyección. Una infección, por ejemplo, una endocarditis, explica el soplo cardíaco y, a menudo, se debe al uso de una técnica de inyección no estéril. La cocaína suele consumirse por inhalación, no inyectada, y origina de forma aguda un estado de delirio excitado. El etanol se ingiere y, en exceso, causa coma y muerte. El fluracepam también se toma por vía oral y su consumo excesivo provoca depresión respiratoria. La meperidina es un analgésico que produce depresión respiratoria y bradicardia en caso de sobredosis. La fenciclidina (PCP) es un esquizofrenomimético que se consume por vía oral e induce comportamiento errático. El ácido lisérgico (LSD) es un alucinógeno.

22 **D** Entre los usos médicos de la marihuana se cuentan el tratamiento de las náuseas resistentes y del glaucoma. La marihuana, por su sustancia activa, el tetrahidrocannabinol (THC), induce sedación del sistema nervioso central. Los barbitúricos son sedantes, pero no afectan a las náuseas intensas. La cocaína, el metilfenidato y la metanfetamina son estimulantes. La heroína es un opioide, y el sulfato de morfina, derivado también de un opioide, se aplica a pacientes oncológicos con dolor resistente al tratamiento. La fenciclidina tiene efectos esquizofrenomiméticos.

23 **A** Una lesión por fricción produce una abrasión, que no llega a

romper por completo la piel. Las quemaduras producen necrosis coagulativa sin rotura mecánica. Una contusión es un hematoma con extravasación de sangre a los tejidos, y las laceraciones inducen destrucción de la piel u otros órganos con patrón desorganizado. Una incisión se produce con un instrumento cortante, como un cuchillo, y deja bordes limpios.

24 **B** Un impacto con un objeto romo produce hemorragia en el tejido blando sin discontinuidad de la piel. En la abrasión se ve afectada la capa superficial de la epidermis. Una laceración es un desgarro irregular de la piel u otro órgano. Una incisión se produce con un objeto punzante y es más larga que una punción, que suele ser de sección redondeada y más profunda que ancha.

25 **C** La figura muestra el punto de entrada de una herida producida por un disparo a corta distancia. Hay discontinuidad de la piel netamente perfilada con restos de pólvora no quemada en los bordes. Una lesión por explosión puede dar lugar a diversos hallazgos, dependiendo del nivel de impacto con el cuerpo, pero el punto de penetración focal que se observa en la figura es muy improbable en ese caso. La lesión por electrocución suele producir signos externos mínimos; a menudo el punto de entrada de la corriente es muy pequeño. Una herida incisa se provoca con un instrumento cortante y tiene bordes limpios, mientras que una laceración origina una discontinuidad irregular, con bordes desgarrados.

26 **B** El paciente sufre quemaduras de espesor completo en los brazos y de espesor parcial en el resto de las zonas afectadas. En una quemadura de espesor completo se pierden todas las estructuras a partir de las cuales puede producirse la reepitelización, incluidos anejos cutáneos tales como las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos. La pérdida solo de la capa basal epidérmica no impide la reepitelización a partir de los anejos. Los fibroblastos pueden producir más colágeno, aunque las fibras elásticas no se regeneran. Esa es la razón por la que la piel quemada tiende a perder elasticidad y hace que sean precisos injertos adicionales en los niños en desarrollo. La capa superficial de queratina sirve como protección. Su afectación en las quemaduras incrementa la pérdida de líquidos y electrólitos,

que se corrige con la reepitelización. Los monocitos sanguíneos pueden migrar a los tejidos para convertirse en macrófagos, que ayudan a remodelar los tejidos dañados. La pérdida de terminaciones nerviosas en las quemaduras de espesor completo causa la disminución de sensibilidad registrada en la exploración de este paciente, aunque ello no influye en la reepitelización.

27 **A** La figura muestra desgarros superficiales en la epidermis, con hemorragia dérmica superficial subyacente, típica de las abrasiones por rozadura. Una contusión es un hematoma caracterizado por rotura de pequeños vasos dérmicos y hemorragia. La hipotermia (por exposición al frío) no presenta un aspecto característico. El *kwashiorkor,* debido a falta de proteínas en la dieta, puede producir descamación y pigmentación irregular de la piel. Una laceración es un corte con bordes desgarrados. Las quemaduras térmicas producen eritema, formación de ampollas y agrietamiento de la piel, pero sin aspecto de rozadura.

28 **B** El agotamiento por calor se debe a la incapacidad del aparato cardiovascular de compensar la hipovolemia inducida por pérdida de agua corporal. Es fácilmente reversible reponiendo el volumen intravascular perdido. El ejercicio intenso con pérdida de electrólitos genera los calambres musculares llamados calambres por calor. El golpe de calor se asocia a lesión orgánica y disminución de la temperatura central por debajo de 36 °C. La hipertermia maligna se registra en alteraciones metabólicas como la tormenta tiroidea o tras la administración de ciertos fármacos, como el suxametonio; también puede deberse al delirio excitado asociado al consumo de cocaína. La lesión por inhalación se produce cuando se registra un incendio en un espacio cerrado y se inhalan gases tóxicos a temperatura elevada.

29 **E** La corriente eléctrica, en especial la alterna, afecta a la conducción nerviosa y a los impulsos eléctricos, sobre todo en el corazón y el cerebro. La función cardíaca puede alterarse cuando la corriente pasa a través del cuerpo hacia tierra. Ello induce arritmias graves, sobre todo fibrilación ventricular. Estos son efectos inmediatos. La magnitud de las lesiones tisulares

originadas por la corriente doméstica estándar (en EE. UU.) no suele ser grande; generalmente solo se registra una pequeña lesión térmica en el punto de entrada o salida de la corriente por la piel. Las otras opciones enumeradas no son consecuencia de lesiones eléctricas.

30 **E** Los fuegos en espacios cerrados generan gases tóxicos a temperatura elevada. Su inhalación puede causar la muerte por edema pulmonar, incluso si no hay lesión producida por las llamas. Hay posibilidad de infarto de miocardio, poco probable, sin embargo, en una mujer de esta edad. La hemorragia cerebral es más probable que se deba a traumatismos, por caídas o golpes en la cabeza. La hipertermia maligna, que se da cuando la temperatura corporal central es superior a 40 °C, se debe a trastornos metabólicos como el hipertiroidismo y al consumo de fármacos o drogas como el suxametonio o la cocaína. Las infecciones se producen días o semanas después de una quemadura, por pérdida de la barrera epitelial que protege de los agentes infecciosos.

31 **C** El cuento de Hans Christian Andersen «La pequeña cerillera» ofrece una descripción de la hipotermia. La exposición continua y prolongada al frío provoca una vasoconstricción periférica, además de edema provocado por aumento de la permeabilidad vascular. Cuando la temperatura corporal de la cerillera cayó por debajo de 32,2 °C, presentó temblores involuntarios y creyó ver a su adorada abuela, justo antes de perder el conocimiento y experimentar una bradicardia. Puede sobrevenir la muerte antes de que aparezca una respuesta inflamatoria a la lesión celular. La apoptosis es la necrosis de células individuales, y la hipotermia descrita en el cuento afectaría a extensas regiones del cuerpo. Aunque hay permeabilidad vascular, la integridad de los vasos evita la hemorragia. Los tejidos blandos con bajo índice metabólico son resistentes a la isquemia y al infarto, por lo que son improbables los signos agudos de necrosis coagulativa, como la fragmentación nuclear.

32 **C** La exposición a la luz es un factor de riesgo de desarrollo de neoplasias malignas cutáneas (carcinoma basocelular, carcinoma escamoso y melanoma). Los rayos ultravioleta (UV),

especialmente su componente UVB, son los principales causantes de estas neoplasias. La radiación infrarroja provoca sobre todo lesiones térmicas. Los efectos de la radiación visible son mínimos. La radiación X ambiental y los rayos γ que se filtran a través de la atmósfera terrestre no tienen efectos de alcance sobre la salud. La radiación X radiológica es ciertamente un problema cuando se aplica de manera repetida, aunque las dosis acumulativas en general son bajas.

33 **E** Las dosis terapéuticas de radiación pueden producir lesión vascular aguda, manifestada por afectación endotelial y reacción inflamatoria. Con el tiempo, estos vasos desarrollan fibrosis y estenosis luminal significativa. Hay isquemia de los tejidos circundantes y formación de cicatriz. La radiación utilizada en dosis terapéuticas se administra cuidadosamente en un campo limitado, con objeto de atacar lo más posible el tejido tumoral y proteger el tejido circundante. La radiación de todo el cuerpo afecta a la médula ósea, a las gónadas, al tubo digestivo y al cerebro, mientras que la radiación terapéutica se dirige con precisión hacia la neoplasia, a fin de evitar el daño tisular generalizado.

34 **B** Estos bomberos deben ser considerados como auténticos héroes, pues su acción abnegada evitó una catástrofe aún mayor. El síndrome cerebral se produce a las pocas horas de que una persona sea expuesta a una dosis masiva de radiación sobre todo el cuerpo. Dosis > 2 Sv (> 200 cGy) pueden ser mortales, por afectación de la médula y del tubo digestivo radiosensibles, pero la muerte sobreviene tras días o semanas, no en unas horas. El tejido muscular cardíaco y esquelético es relativamente resistente. Los primeros hallazgos en lesiones pulmonares inducidas por radiación comprenden edema y fibrosis intersticial; esta última la desarrollan los supervivientes años después de la exposición.

35 **E** Un peso corporal inferior al 60% de lo normal con emaciación muscular es compatible con el diagnóstico de marasmo, una forma de malnutrición proteínico-calórica debida a disminución significativa de la ingesta calórica total. En el *kwashiorkor,* la ingesta de proteínas se reduce más que la calórica y el peso suele ser de entre el 60 y el 80% del normal. La

hipoalbuminemia es un hallazgo de laboratorio clave. Las neoplasias malignas pueden inducir emaciación, pero no hasta ese punto. Los problemas de este niño van más allá de una simple carencia vitamínica. La falta de folato puede ser la causa de la anemia, pero no de la emaciación. La bulimia es un trastorno alimentario de adolescentes y adultos caracterizado por atracones de comida y vómitos autoinducidos. La intoxicación por plomo produce anemia y encefalopatía, pero no emaciación grave.

36 **A** La reducción de la ingesta alimentaria autoimpuesta al hacer dieta puede hacer que una mujer experimente carencias hormonales (p. ej., de folitropina, hormona luteinizante o tiroxina), con la consiguiente disminución de la síntesis de estrógenos, que favorece la osteoporosis como en la posmenopausia. La bulimia, con atracones y vómitos autoinducidos, va acompañada a veces de trastornos electrolíticos y el peso tiende a mantenerse en la mayoría de los casos. El *kwashiorkor* es una enfermedad propia de niños con escasa ingesta de proteínas. El raquitismo es una carencia específica de vitamina D causante de deformidades esqueléticas en niños. El escorbuto, provocado por carencia de vitamina C, no afecta a la función hormonal.

37 **B** Los datos son compatibles con *kwashiorkor*, trastorno nutricional fundamentalmente causado por aporte insuficiente de proteínas en la dieta. La hipoalbuminemia es característica de este proceso. La abetalipoproteinemia es un trastorno infrecuente que provoca una carencia de vitamina E. La hipercalcemia se asocia en ocasiones a carencia de vitamina D. La hiperglucemia se da en la diabetes mellitus; la consunción asociada a esta enfermedad afecta al tejido adiposo y muscular, sin edema. La anemia megaloblástica se relaciona con carencias de vitamina B_{12} o folato.

38 **A** La vitamina A es importante en el mantenimiento de las superficies epiteliales. Su carencia provoca metaplasia escamosa del epitelio respiratorio, con lo que predispone a la infección. El aumento de la acumulación de queratina produce tapones foliculares y dermatosis papular. Los residuos de queratina descamados en las vías urinarias conforman la base para la

formación de cálculos. Las complicaciones oculares de la carencia de vitamina A comprenden xeroftalmía y cicatrización corneal, potenciales causas de ceguera. La carencia de vitamina B_1 (tiamina) induce alteraciones como enfermedad de Wernicke, neuropatía y miocardiopatía. La carencia de vitamina D en niños es causa de raquitismo, caracterizado por deformidades óseas. La de vitamina E es infrecuente y origina síntomas neurológicos relacionados con la degeneración de los axones en las columnas posteriores de la médula espinal. La carencia de vitamina K produce diátesis hemorrágica.

39 **C** El raquitismo, originado por carencia de vitamina D, se caracteriza por deformidades esqueléticas como el arqueamiento de piernas observado en este niño. La falta de mineralización ósea (osteopenia) provoca esa deformidad. El beriberi, secundario a la carencia de tiamina, induce insuficiencia cardíaca y edema periférico Una dieta con carencia de proteínas causa a veces *kwashiorkor,* con típicas áreas de descamación y despigmentación en la piel. La pelagra, debida a carencia de niacina, da lugar a dermatitis en áreas expuestas al sol. El escorbuto, originado por carencia de vitamina C, causa a veces deformidades óseas, sobre todo en las epífisis, por alteración de la matriz ósea, no por calcificación anómala. Sin embargo, la ausencia de hemorragias hace que el escorbuto sea improbable en este niño.

40 **D** La vitamina A es esencial para el mantenimiento de los epitelios. Su carencia afecta a la función de las glándulas lagrimales o del epitelio conjuntival y favorece la queratomalacia. La investigación del Dr. Alfred Sommer convenció a Unicef de que el coste de la erradicación de esta carencia en 250 millones de niños en el mundo sería proporcionalmente mínimo. El hierro es esencial para la producción de hemo, necesario para la elaboración de hemoglobina en los eritrocitos. La niacina está implicada, junto a la nicotinamida, en numerosas vías metabólicas y su insuficiencia produce diarrea, dermatitis y demencia. Las proteínas en la dieta son esenciales para la conformación de los tejidos, particularmente el muscular, aunque no tiene efectos específicos sobre las estructuras oculares. La vitamina K es

beneficiosa para la síntesis de factores de coagulación en el hígado, a fin de evitar problemas hemorrágicos.

41 **A** La vitamina D puede sintetizarse de forma endógena en la piel con exposición a luz ultravioleta (UV). Conjuntamente, la vitamina D y el calcio ayudan a la formación y al mantenimiento del hueso. El ejercicio ayuda a reforzar la masa ósea, lo que protege frente a la osteoporosis en fases posteriores de la vida, sobre todo en mujeres. La función renal no se ve muy afectada por el entorno. La exposición a la radiación UV de los rayos solares ejerce algunos efectos perjudiciales para los ojos (cataratas) y la piel (cáncer, elastosis). La creciente contaminación en numerosas ciudades ha hecho que aumente la incidencia de enfermedades pulmonares, y los niños se encuentran especialmente en situación de riesgo.

42 **D** La osteopenia en este paciente puede deberse a una osteomalacia, la forma adulta de la carencia de vitamina D. Esta es una vitamina liposoluble que precisa de absorción de las grasas y que se ve afectada por la hepatopatía colestásica crónica y la enfermedad de vías biliares o del páncreas. La gastritis atrófica afecta a la absorción de vitamina B_{12}. Las leucemias no tienden a erosionar el hueso. La cardiopatía por ateroesclerosis no afecta a la densidad ósea. El enfisema puede ocasionar osteoartropatía hipertrófica, pero no osteopenia.

43 **A** Los signos y síntomas del escorbuto son a veces sutiles. La dieta debe contener un aporte constante de vitamina C (ácido ascórbico), que no se produce de forma endógena. Las personas de edad avanzada que siguen una dieta inadecuada presentan mayor riesgo que las jóvenes. La carencia de folatos produce anemia, pero no causa fragilidad capilar con formación de hematomas ni exantema cutáneo. La de niacina produce un exantema cutáneo eritematoso en áreas expuestas al sol, pero no anemia. La carencia de riboflavina provoca glositis, queilosis y neuropatía. La carencia de vitamina A produce exantema cutáneo, pero no anemia. La vitamina K es importante en el mantenimiento de una coagulación adecuada, pero su carencia no se asocia a anemia ni exantema.

44 **E** La pelagra se debe a carencia de niacina. La presentación clásica incluye las «tres *D*»: diarrea, dermatitis y demencia. El

beriberi, causado por carencia de tiamina (vitamina B_1), induce insuficiencia cardíaca, neuropatía y enfermedad de Wernicke. La queilosis es la aparición de fisuras en las comisuras de los labios que acompaña a la carencia de riboflavina (vitamina B_2). En el hipotiroidismo, que puede ser debido a carencia de yodo, la piel tiende a aparecer áspera y seca. El marasmo es un estado de emaciación grave propio de dietas con carencia de múltiples nutrientes.

45 **F** La carencia de vitamina E es infrecuente, aunque puede registrarse en lactantes con bajo peso al nacer, disfunción hepática y malabsorción de grasas. Las manifestaciones neurológicas son similares a las de la carencia de vitamina B_{12}. Los niños afectados pueden presentar anemia, aunque no de tipo megaloblástico. La carencia de vitamina A en lactantes y niños produce, en ocasiones, ceguera por queratomalacia. Es la causa más común de ceguera evitable en esta población. La carencia de vitamina B_1 (tiamina) provoca beriberi, y la de vitamina B_3 (niacina), pelagra. La carencia de vitamina C da lugar a escorbuto, a veces acompañado de anemia por hemorragia y menor absorción de hierro. La carencia de vitamina K causa trastornos hemorrágicos.

46 **E** Las personas con antecedentes de alcoholismo crónico a menudo presentan carencia de tiamina y otros nutrientes (el etanol aporta calorías vacías). La carencia de tiamina induce en ocasiones neuropatía, miocardiopatía y enfermedad de Wernicke. Los alcohólicos presentan con frecuencia carencia de folato, con la consiguiente anemia macrocítica, aunque ello no se da en este caso. La carencia de niacina produce pelagra. Las carencias de piridoxina y de riboflavina inducen neuropatía, pero no signos cerebrales.

47 **F** La isoniacida es antagonista de la piridoxina (vitamina B_6). Las personas que la reciben como tratamiento de la tuberculosis requieren a veces suplementos que eviten la carencia de vitamina B_6. El ácido ascórbico (vitamina C) es antiescorbútico, y el calciferol (vitamina D) mantiene los niveles de calcio. La ingesta de calcio ayuda a conservar la masa ósea y la concentración sérica de calcio. La hipocalcemia genera

excitabilidad neural con contracciones musculares. La carencia de cobalamina (vitamina B_{12}) produce anemia macrocítica y neuropatía periférica, pero no es consecuencia del tratamiento con isoniacida. La carencia de niacina causa pelagra (diarrea, dermatitis, demencia), y la de riboflavina puede inducir neuropatía, glositis y queilosis.

48 **E** Los factores de coagulación II, VII, IX y X sintetizados por el hígado necesitan vitamina K para ser producidos. La enfermedad hemorrágica del recién nacido puede presentarse en lactantes con una flora intestinal insuficiente para originar este nutriente. La lactancia materna potencia transitoriamente este efecto, ya que *Lactobacillus* de la leche materna no sintetiza vitamina K. La inyección intramuscular de rutina de vitamina K poco después del nacimiento evita esta complicación. La carencia de hierro produce anemia, no hemorragia. La vitamina E es un antioxidante y raramente es insuficiente hasta el punto de generar alteraciones graves. El ácido fólico ayuda a evitar la anemia macrocítica. El yodo es necesario en pequeñas cantidades para la síntesis de hormonas tiroideas.

49 **F** Los humanos no producen vitamina C de manera endógena, por lo que esta ha de aportarse continuamente en la dieta. La falta de frutas y verduras que contienen vitamina C causa el escorbuto, enfermedad propia de marineros y exploradores en épocas pasadas. El beriberi induce insuficiencia cardíaca y se debe a carencia de tiamina. El *kwashiorkor* se asocia a carencia de proteínas y la pelagra, caracterizada por las «tres *D*», diarrea, dermatitis y demencia, se da en la carencia de niacina. La anemia perniciosa por carencia de vitamina B_{12} puede complicarse por deterioro neurológico en casos graves. El raquitismo es propio de niños con carencia de vitamina D.

50 **C** La carencia de hierro, inductora de anemia microcítica, es frecuente en mujeres en edad fértil por la pérdida de sangre en la menstruación y en niños con dieta inadecuada. Durante el embarazo aumentan las necesidades de hierro, cuya carencia es indicada por la ferritina sérica baja. La dermatitis se registra en la pelagra (carencia de niacina). El bocio se debe a carencia de yodo, aunque es infrecuente en la actualidad por las pruebas que se realizan a los recién nacidos y por la amplia disponibilidad de

alimentos con yodo. La neuropatía periférica es más propia del beriberi (carencia de tiamina) y de la insuficiencia de riboflavina (vitamina B_2) y piridoxina (vitamina B_6). El arqueamiento de los huesos largos y el ensanchamiento epifisario son propios del raquitismo (carencia de vitamina D). En el escorbuto (carencia de vitamina C) se registran hemorragias en los tejidos blandos.

51 **B** En zonas en las que el agua contiene fluoruro de manera natural los problemas dentales en niños son menores, puesto que en ellos se ve reforzado el esmalte dental. El fluoruro puede añadirse al agua de abastecimiento, aunque la oposición a esta práctica, por temor o por ignorancia, es común. La carencia de cobre produce efectos neurológicos y la de yodo predispone al bocio tiroideo. El selenio es un oligoelemento componente de la glutatión peroxidasa, y su carencia se asocia a miopatía y cardiopatía. Las enfermedades graves por carencias de oligoelementos son infrecuentes. El cinc es otro oligoelemento y participa en la cicatrización de heridas. Su carencia produce retraso del crecimiento en niños y exantema eritematoso vesiculoso.

52 **B** Se trata de una publicación del mismo nivel que otras que aparecen en los medios de comunicación, por lo que conviene no prestar demasiada atención a los eslóganes y aplicar los principios de la medicina basada en la evidencia. Algunos pensarán que nunca se toma suficiente chocolate, pero la mayor parte de la población mundial debe arreglárselas sin él. Sin embargo, los países en los que se consume más chocolate ¡son los que han tenido más premios Nobel! Los especialistas en dietética más serios probablemente escogerían la opción A (carencia de hierro), más frecuente en mujeres durante la menstruación, en gestantes y en niños. El calcio es el más importante en los niños en desarrollo. La carencia de folato da lugar a anemia macrocítica y es más probable en adultos con dieta inadecuada, como los alcohólicos crónicos. La carencia de vitamina C se da en personas que no toman suficientes frutas y verduras frescas.

53 **B** La paciente presenta obesidad mórbida. El exceso de peso produce una sobrecarga en las articulaciones, particularmente en las rodillas, con lo que aumenta el riesgo de artrosis. Aunque

el riesgo global de cáncer es mayor con la obesidad, la relación entre carcinoma endometrial y obesidad está sólidamente contrastada. En torno al 80% de las personas con diabetes de tipo 2 son obesas. La relación entre dieta y obesidad y cáncer de colon no está tan establecida. A escala mundial, la mayoría de los carcinomas hepatocelulares se producen en personas infectadas por el virus de la hepatitis B; el alcoholismo crónico también es un factor de riesgo. El adenocarcinoma pulmonar es el cáncer broncógeno con menor probabilidad de asociación con el consumo de tabaco, con el que sí se relacionan ciertos carcinomas de células renales.

54 **E** Las señales de la leptina procedente de los adipocitos que han absorbido una cantidad adecuada de ácidos grasos generalmente se dirigen hacia el hipotálamo, que disminuye la síntesis de neuropéptido Y. Este neurotransmisor actúa como estimulante del apetito y una reducción de su síntesis provoca saciedad. La adenosina es un nucleósido utilizado para tratar las arritmias cardíacas. El glucagón se opone a la insulina incrementando las reservas de glucógeno hepático. El aumento de la concentración de glucosa en sangre incrementa, a su vez, la liberación de insulina para favorecer la captación de glucosa por los tejidos conjuntivos y adiposos, y en los músculos.

55 **C** El apetito y la saciedad son controlados por un complejo sistema de acción breve y prolongada. Las concentraciones de grelina producida en el estómago aumentan con rapidez antes de cada comida y disminuyen de inmediato cuando el estómago está lleno. La leptina liberada por los adipocitos ejerce un control a largo plazo activando los circuitos catabólicos e inhibiendo los anabólicos. El α-MSH es un intermediario en la señalización de la leptina. La TRH y el CRF se cuentan entre los mediadores eferentes de la señalización de la leptina y aumentan el consumo de energía.

56 **B** Hay genes de la «obesidad» que pueden desempeñar alguna función en las vías metabólicas. Entre el 5 y el 8% de los adultos obesos presentan una mutación en el gen *MC4R* y la incapacidad de este para regular el consumo de energía, incluso en el caso de que haya reservas de grasas abundantes y niveles elevados de leptina, da lugar a ganancia de peso. La leptina es producto del

gen *ob,* cuyas mutaciones, poco frecuentes, reducen las concentraciones de la leptina, que transmite las señales de saciedad. Las mutaciones en el *OB-R*, que codifica el receptor de la leptina, están presentes en el 3% de los casos de obesidad de desarrollo temprano en niños. El gen *POMC* se encuentra en una vía catabólica estimulada por la leptina, sus mutaciones son infrecuentes y quienes las presentan padecen obesidad temprana con hiperfagia. El receptor γ de peroxisomas activado por proliferadores de tipo γ *(PPARγ)* es estimulado por las tiazolidinedionas e induce reducción de ácidos grasos libres y de la resistina, así como una disminución de la resistencia a la insulina.

57 **C** El IGF-1 aumenta en respuesta a la hiperinsulinemia de las personas obesas, que presentan mayor probabilidad de padecer síndrome metabólico y diabetes de tipo 2. El IGF-1 favorece el crecimiento celular y el aumento de la síntesis de estrógenos y andrógenos, lo que fomenta la transformación neoplásica de las células. La adiponectina elaborada por los adipocitos actúa como sustancia sensibilizadora frente a la insulina y evita la hiperinsulinemia. La aflatoxina, desarrollada a partir del crecimiento de *Aspergillus* en alimentos como los cereales, actúa como carcinógeno por mutación del gen *TP53.* La leptina normalmente disminuye cuando las reservas de grasa son altas, y las alteraciones en su receptor pueden relacionarse con ciertas formas de obesidad. El selenio es un oligoelemento del que se cree que presenta propiedades antioxidantes y antineoplásicas. Las grasas *trans* derivan de la hidrogenación de las grasas de la dieta y son aterógenas, al aumentar el colesterol de LDL y reducir el de HDL.

58 **D** Estos datos son diagnósticos de diabetes mellitus. El paciente es obeso y probablemente padezca una diabetes mellitus de tipo 2. La diabetes mellitus de tipos 1 y 2 aumenta sensiblemente el riesgo de ateroesclerosis precoz y acelerada. Disminuir la ingesta calórica total, particularmente de grasas saturadas, ayuda a reducir el riesgo de enfermedad arterial coronaria. Los aceites vegetales y de pescado son preferibles a las grasas animales como fuentes de lípidos en la dieta a fin de prevenir la ateroesclerosis. La reducción del sodio dietético

disminuye la presión arterial. La mayor ingesta de líquidos mejora la función renal. La fibra en la dieta aminora la incidencia de la diverticulosis. La vitamina A carece de efectos significativos sobre la aterogenia.

59 **C** Para prevenir el cáncer de colon se recomienda tomar más frutas y verduras. Las vitaminas C y E ejercen efectos antioxidantes y antimutágenos. El vino tinto tomado con moderación puede tener efectos antiaterógenos beneficiosos. En ocasiones el helado incluye grasas animales cancerígenas, equiparables a las grasas de la carne de vacuno. El chocolate contiene grasas vegetales, menos nocivas que las animales, y mejora el rendimiento de las personas que lo consumen.

CAPÍTULO

10

Enfermedades de la lactancia y la infancia

PEF9 Capítulo 10: Enfermedades de la lactancia y la infancia

PH9 Capítulo 6: Enfermedades genéticas y pediátricas



1 Una mujer de 31 años de edad, G3, P2, ha tenido un embarazo sin incidencias, salvo por la ausencia de movimiento fetal. Tiene un aborto espontáneo a las 20 semanas de gestación y pare un mortinato. En la exploración, el feto presenta un defecto de la pared abdominal lateral a la inserción de un cordón umbilical corto, significativa escoliosis vertebral y una banda fibrosa delgada que constriñe la extremidad superior derecha. La figura muestra una radiografía. Ninguno de los otros embarazos de la mujer, que

concluyeron con nacimientos a término, fueron afectados de manera similar. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que explique este desenlace?

A Infección congénita por citomegalovirus
B Rotura precoz del amnios
C Oligohidramnios
D Incompatibilidad del Rh materno-fetal
E Trisomía 18

2 Una primigrávida de 16 años de edad no percibe movimiento fetal en la semana 18 de gestación, por lo que se realiza una ecografía. El índice de líquido amniótico está manifiestamente reducido. Los dos riñones fetales son quísticos y uno es mayor que el otro. No hay actividad cardíaca fetal. El embarazo es interrumpido y se efectúa una autopsia fetal. Los hallazgos comprenden displasia renal multiquística, hemivértebra, atresia anal, fístula traqueoesofágica y pulmones de tamaño equivalente al de los de 14 semanas de gestación. ¿Cuál de los siguientes errores en la morfogenia es más probable que dé lugar al aspecto de los pulmones?

A Agenesia
B Aplasia
C Deformación
D Disrupción
E Malformación
F Teratogenia



3 Una mujer de 31 años, G1, P0, ha notado muy pocos movimientos fetales durante su embarazo. A las 36 semanas de gestación nace un lactante con los rasgos faciales y la posición de las extremidades mostrados en la figura. ¿Cuál de las siguientes alteraciones en el lactante es probable que explique mejor estos hallazgos?

A Infección congénita por rubéola

B Agenesia renal bilateral

C Diabetes mellitus materna

D Enfermedad de membranas hialinas
E Trisomía 13

4 Una profesora de instituto de 28 años, que está embarazada, presenta acné grave en la cara y teme que pueda quedar desfigurada. Antes de acudir a consulta, investiga en Internet y encuentra que un compuesto relacionado con la vitamina A se ha demostrado eficaz en el tratamiento del acné. Sin embargo, su obstetra se muestra reacio a recetárselo, porque cree que puede causar malformaciones fetales. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que se relacione con el efecto teratógeno del medicamento?

A Alteración del patrón de expresión de los genes de homeosecuencia (homeocaja)
B Mayor riesgo de infecciones maternas
C Mayor probabilidad de aneuploidía durante la división celular
D Favorecimiento del desarrollo anómalo de los vasos sanguíneos en la placenta
E Reducción en la resistencia del feto a las infecciones transplacentarias

5 Una mujer sana de 44 años, G2, P1, se somete a las 18 semanas de gestación a una ecografía de control, que no muestra malformaciones fetales. A las 32 semanas hay movimiento fetal reducido y la ecografía revela retraso del crecimiento fetal que respeta relativamente la cabeza fetal. La placenta, de pequeño tamaño, aparece en posición normal en el fondo lateral, y el índice de líquido amniótico está reducido. La presión arterial materna es normal. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que esté presente?

A Insuficiencia uteroplacentaria
B Infección congénita por *Treponema pallidum*
C Galactosemia
D Preeclampsia
E Incompatibilidad Rh
F Trisomía 21

6 Una primigrávida de 22 años da a luz un niño a las 38 semanas de gestación. En la exploración física, el lactante aparece normal, excepto por un chasquido anómalo en la cadera derecha al realizar la maniobra de Ortolani. Se percibe laxitud ligamentosa en la

cadera. La madre pregunta si es posible que en futuros embarazos los niños nazcan con una malformación similar. ¿Cuál es el riesgo de reaparición en futuros embarazos más probable?

A < 1%
B 5%
C 25%
D 50%
E 90%

7 Un lactante nacido a término presenta índices de Apgar de 8 y 10 a 1 y 5 min. En la auscultación torácica se identifica un soplo cardíaco. Se observan hepatoesplenomegalia y cataratas en el cristalino. El niño está en el percentil 30 de talla y peso. La ecografía muestra un conducto arterioso persistente. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable en este lactante?

A Infección congénita por rubéola
B Carencia de folato en la dieta
C Dispermia en la concepción
D Eritroblastosis fetal
E Uso materno de talidomida
F No disyunción meiótica paterna

8 En el año 1000 d. C., un lactante con dificultades para mamar desde el nacimiento es conducido al médico Abul Qasim al-Zahrawi (Abulcasís), que trabaja en Córdoba, al Ándalus (actual España). El niño nació tras un embarazo a término normal. En la exploración física, la única malformación es la falta de fusión de la prominencia nasal lateral y la prominencia maxilar. La hendidura es reparada. No hay antecedentes familiares de malformaciones congénitas y la madre tiene otros dos hijos sin aparentes anomalías. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que cause este cuadro clínico?

A Anomalía cromosómica
B Rotura precoz del amnios
C Malnutrición materna
D Herencia multifactorial
E Defecto monogénico
F Teratogenia

9 Un niño nacido a las 38 semanas es pequeño para su edad gestacional. La exploración física muestra microcefalia,

prominencia frontal, frente larga y estrecha, hipotelorismo, hipoplasia maxilar y mandibular, fisuras palpebrales estrechas, pliegue nasolabial alargado y fino, borde bermellón del labio superior, maloclusión dental, nariz en silla de montar, hipoplasia del esmalte dental e hipoplasia uvular. Entre los problemas oculares cabe citar microftalmía, opacificación corneal, coloboma, nistagmo, estrabismo y ptosis. En la auscultación se percibe un soplo sistólico, y la ecografía muestra una comunicación interventricular de tipo membranoso. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que origine estos hallazgos?

A Rubéola congénita
B Síndrome alcohólico fetal
C Diabetes mellitus materna
D Placenta previa
E Trisomía 21

10 Una mujer de 25 años es G5, P0, Ab4. Todos sus embarazos previos concluyeron con aborto espontáneo en el primer o el segundo trimestre. Ahora se encuentra en la semana 16 de su quinta gestación y no ha tenido problemas prenatales. Entre los hallazgos de laboratorio destacan grupo sanguíneo materno A positivo, pruebas serológicas de sífilis negativas e inmunidad a la rubéola. ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio resultaría más útil para determinar la posible causa de las muertes fetales repetidas previas en esta paciente?

A Amniocentesis con análisis cromosómico
B Análisis genético del gen *CFTR*
C Cribado de anticuerpos séricos maternos
D Determinación de la α-fetoproteína sérica materna
E Prueba serológica materna del VIH

11 Una primigrávida de 17 años de edad da a luz a las 37 semanas de gestación. Su HbA_{1c} es del 6%. El peso del niño al nacer es de 2.350 g. En la exploración física del lactante se observan diversas malformaciones congénitas, como arteria umbilical única, labio leporino y espina bífida oculta. ¿Cuál de los siguientes es el factor de riesgo más probable de estos hallazgos?

A Infección
B Diabetes gestacional
C Defecto monogénico

D Teratógeno
E Uno desconocido

12 Una primigrávida de 25 años presenta una evolución prenatal sin complicaciones. Da a luz un niño de 4.500 g de peso con índices de Apgar de 8 y 10 a 1 y 5 min. Poco después de nacer desarrolla irritabilidad con actividad convulsiva. En la exploración, el lactante presenta desarrollo normal sin malformaciones. Los pulmones son normales a la auscultación. Las pruebas de laboratorio muestran valores séricos de Na^+ de 145 mmol/l, de K^+ de 4,2 mmol/l, de Cl^- de 99 mmol/l, de CO_2 de 25 mmol/l, de nitrógeno ureico de 0,4 mg/dl, y de glucosa de 18 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes signos patológicos es más probable en el páncreas de ente lactante?

A Pancreatitis aguda
B Depósito de amiloide
C Adenocarcinoma
D Sustitución grasa
E Insulitis
F Hiperplasia de los islotes

13 Una mujer de 25 años, G3, P2, está en la semana 39 de gestación. No percibe movimientos fetales durante 1 día. El lactante nace muerto por parto vaginal al día siguiente. En la exploración física no hay malformaciones externas. El examen microscópico de la placenta detecta corioamnionitis aguda. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es el responsable más probable de este desenlace?

A Citomegalovirus
B Virus del herpes simple de tipo 2
C *Streptococcus agalactiae* (grupo B)
D *Toxoplasma gondii*
E *Treponema pallidum*

14 Una primigrávida de 17 años presenta un embarazo sin incidencias hasta la semana 25, cuando nota ausencia de movimientos fetales durante 1 día. En la exploración, su temperatura es de 37 °C, la frecuencia cardíaca, de 80 latidos/min, y la presión arterial, de 115/80 mmHg. No hay ruidos cardíacos fetales. Una exploración ecográfica no muestra malformaciones fetales aparentes. Al día siguiente se produce una rotura prematura de las membranas y 1 día después se produce el parto

de un mortinato. La exploración de la placenta indica tamaño normal para la edad gestacional, aunque el análisis microscópico muestra infiltración de neutrófilos en corion y amnios. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Fibrosis quística
B Incompatibilidad Rh
C Síndrome de muerte súbita del lactante
D Toxemia del embarazo
E Trisomía 16
F Infección por *Ureaplasma urealyticum*

15 Una mujer de 33 años en la semana 32 de gestación percibe falta de movimiento fetal durante 3 días. En la exploración física no se auscultan ruidos cardíacos fetales. El feto nace muerto. En la autopsia se observan microabscesos dispersos en el hígado, el bazo, el cerebro y la placenta. No hay malformaciones congénitas. La investigación de los Centers for Disease Control (CDC) revela que, en la misma comunidad, se han registrado pérdidas fetales durante los últimos 3 meses y se sospecha de una posible contaminación alimentaria. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que genere estos hallazgos?

A Citomegalovirus
B Estreptococos del grupo B
C Virus del herpes simple
D *Listeria monocytogenes*
E Parvovirus
F *Toxoplasma gondii*

16 Un lactante nacido a las 36 semanas de gestación presenta hidropesía fetal grave, hepatoesplenomegalia, ictericia generalizada y equimosis dispersas en la piel. Los análisis muestran concentración de hemoglobina de 9,4 g/dl y recuento plaquetario de 67.000/mm^3. La ecografía craneal detecta hipertrofia de los ventrículos. La muerte del lactante sobreviene 14 días después del nacimiento. En la autopsia se aprecia necrosis subependimaria extensa, con evidencia microscópica de encefalitis. En las áreas de necrosis hay células grandes que contienen inclusiones intranucleares. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que determine estos hallazgos por la infección congénita del niño?

A Citomegalovirus
B Virus del herpes simple
C VIH
D Parvovirus
E Virus de la rubéola

17 Una mujer de 31 años, G3, P2, está en el segundo trimestre de gestación. Sus embarazos anteriores concluyeron con partos de lactantes nacidos a término normales que están vivos. Se somete a una exploración ecográfica por falta de movimiento fetal a las 18 semanas y se observa microcefalia con leucomalacia periventricular y calcificaciones. La prueba del VIH resulta positiva y la de sífilis es negativa. Se determinan los títulos TORCH en sangre materna:

	IgG	**IgM**
CMV	1,2 (normal < 0,9)	0,7 (normal < 0,9)
VHS de tipo 1	1,2 (normal < 0,9)	0,6 (normal < 0,9)
VHS de tipo 2	0,6 (normal < 0,9)	0,5 (normal < 0,9)
Rubéola	15 (normal < 10)	0,4 (normal < 0,9)
Toxoplasma	11 (normal < 9)	3,3 (normal < 0,9)

¿Cuál de los siguientes es el factor de riesgo más probable para esta infección fetal?

A Ingestión de carne contaminada
B Inhalación de núcleos de gotículas
C Consumo de drogas por vía intravenosa
D Picadura de mosquito
E Transfusión sanguínea previa
F Coito

18 Una mujer de 20 años tiene un parto a término de un lactante de 1.900 g de peso. En la exploración física el perímetro craneal del lactante es normal, aunque la longitud coronilla-talón y la del pie están reducidas. No hay malformaciones externas. Durante la lactancia, los hitos del desarrollo están retrasados. ¿Cuál de las siguientes alteraciones durante la gestación es más probable que genere estos hallazgos?

A Infección por citomegalovirus congénita
B Síndrome de Down
C Eritroblastosis fetal

D Diabetes mellitus materna
E Hipertensión inducida por el embarazo

19 Una primigrávida sana de 21 años da a luz en la semana 36 de gestación tras la rotura de membranas. Los índices de Apgar son de 8 y 9 a 1 y 5 min. El lactante pesa 2.000 g y en la exploración no se aprecian malformaciones congénitas. El perímetro craneal es normal, pero las restantes medidas están reducidas. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo durante la gestación es más probable que genere estos hallazgos?

A Consumo de cigarrillos
B Mosaicismo placentario limitado
C Preeclampsia
D Toxoplasmosis
E Triploidía

20 Una primigrávida de 38 años presenta rotura prematura de membranas a las 36 semanas de gestación, lo que hace preciso iniciar el parto. Se observa que el lactante tiene un cordón umbilical de dos vasos, labio leporino, soplo cardíaco y espina bífida. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que aumente el riesgo de enfermedad de las membranas hialinas en el lactante?

A Corioamnionitis
B Diabetes mellitus de tipo 1
C Tratamiento materno con corticoesteroides
D Oligohidramnios
E Hipertensión inducida por el embarazo

21 Un lactante nace prematuramente a las 32 semanas de gestación de una madre de 34 años con diabetes gestacional. En la exploración física, el lactante está en el percentil 50 de talla y peso, y no hay malformaciones congénitas. El lactante necesita intubación y se le aplica ventilación con presión positiva durante 3 semanas; fallece por sepsis a los 4 meses de edad. En la autopsia, los pulmones presentan metaplasia escamosa bronquial con fibrosis peribronquial, fibrosis intersticial y dilatación de los espacios aéreos alveolares. ¿Cuál de las siguientes alteraciones explica mejor estos hallazgos?

A Fibrosis quística
B Displasia broncopulmonar

C Hipoplasia pulmonar
D Síndrome de muerte súbita del lactante
E Comunicación interventricular

22 En un estudio de la maduración pulmonar, se mide la cantidad de surfactante a diferentes edades gestacionales. Los investigadores observan que la cantidad de surfactante en los pulmones en desarrollo aumenta entre las semanas 26 y 32 de gestación, con progresión de la arquitectura pulmonar a una configuración alveolar sacular. ¿Con cuál de los siguientes episodios del desarrollo es más probable que se relacione este incremento del surfactante?

A Apoptosis en las células mesenquimatosas interlobulillares
B Desarrollo de epitelio ciliado en los espacios aéreos alveolares
C Diferenciación de alvéolos del intestino anterior embrionario
D Aumento de la densidad de los capilares pulmonares
E Maduración de las células epiteliales alveolares de tipo II



23 Una mujer de 25 años tiene un parto prematuro a las 28 semanas de gestación. La recién nacida presenta índices de Apgar de 5 y 6 a 1 y 5 min, pero después de 1 h experimenta dificultad respiratoria grave con cianosis. Una radiografía de tórax muestra un aspecto de vidrio esmerilado en los pulmones. Es tratada con ventilación asistida y soporte nutricional, y parece mejorar en las

24 h siguientes; sin embargo, la cianosis aumenta gradualmente, desarrolla convulsiones y muere a los 4 días del nacimiento. En la autopsia, los pulmones presentan el aspecto microscópico que aparece en la figura. ¿Cuál de las siguientes alteraciones inicia el desarrollo de estos hallazgos?

A Toxoplasmosis congénita
B Inmadurez de los pulmones
C Anemia fetal pronunciada
D Toxemia materna del embarazo
E Oligohidramnios

24 Una primigrávida de 17 años tiene un parto en la semana 34 de gestación del que nace un lactante con bajo peso. Se le administra surfactante exógeno y no desarrolla dificultad respiratoria. Al tercer día de vida la exploración física revela hipotensión, distensión abdominal y ausencia de borborigmos, y se observan heces sanguinolentas en el pañal. Una radiografía muestra neumatosis intestinal y aire libre abdominal. Se procede a la extirpación quirúrgica de parte del intestino. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable en este lactante?

A Atresia duodenal
B Enfermedad de Hirschsprung
C Divertículo de Meckel
D Íleo meconial
E Enterocolitis necrosante
F Estenosis pilórica

25 Una mujer de 19 años, G2, P1, se somete a una ecografía fetal de seguimiento a las 20 semanas de gestación, que no muestra anomalías. La dilatación prematura culmina con un parto vaginal a las 31 semanas. Poco después del parto, el recién nacido desarrolla dificultad respiratoria que requiere intubación y se aplica ventilación con presión positiva. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas prenatales podría haber predicho la dificultad respiratoria del lactante?

A Análisis cromosómico con cariotipado
B Prueba de Coombs en sangre del cordón
C Análisis genético para detectar el gen de la fibrosis quística
D Concentración de fosfolípidos en el líquido amniótico
E Determinación de la α-fetoproteína sérica materna

26 Una mujer de 18 años da a luz un lactante nacido a término tras un embarazo y un parto sin complicaciones. En los primeros 2 días de vida el lactante desarrolla ictericia leve. En la exploración física no hay anomalías morfológicas. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de bilirrubina de 4,9 mg/dl. La prueba de Coombs directa de los eritrocitos del lactante es positiva. Su grupo sanguíneo es A negativo, y el de la madre, 0 positivo. Según estos datos, ¿cuál de los siguientes episodios es más probable que suceda?

A Recuperación completa
B Retraso del desarrollo
C Anemia hemolítica durante la lactancia
D Querníctero
E Síndrome de dificultad respiratoria

27 Una mujer de 20 años, G3, P2, se somete a una ecografía de seguimiento a las 18 semanas de gestación, que pone de manifiesto hidropesía fetal sin malformaciones. Sus dos embarazos anteriores concluyeron a término con partos de niños vivos. El actual también termina con el parto de un lactante vivo a las 36 semanas de gestación. La exploración física muestra hidropesía significativa del recién nacido y de la placenta. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de hemoglobina en sangre del cordón umbilical de 9,2 g/dl y de bilirrubina total de 20,2 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable en este caso?

A Actividad de la glucocerebrosidasa en las células fetales disminuida
B Concentración sérica de α-fetoproteína materna
C Prueba de Coombs positiva en sangre del cordón
D Antígeno de superficie de la hepatitis B materno positivo
E Cultivo placentario positivo para *Listeria monocytogenes*

28 Una mujer de 23 años presenta movimiento fetal reducido en la semana 19 de gestación. Se efectúa una ecografía fetal, que muestra una sustancial acumulación de líquido en los tejidos blandos. La prueba de Coombs materna es negativa. Los títulos TORCH no son reseñables. ¿Cuál de los siguientes hallazgos adicionales es más probable en la ecografía?

A Neuroblastoma congénito

B Defecto en la almohadilla endocárdica
C Leucomalacia
D Placenta baja
E Esplenomegalia

29 Una mujer de 34 años, G4, P3, presenta un tamaño superior al normal en la semana 16 de gestación. La ecografía fetal muestra un gemelo mayor pletórico, con hidropesía fetal y polihidramnios, y otro menor, anémico y con oligohidramnios. La prueba de Coombs materna es negativa. ¿Cuál es la explicación más probable de tales hallazgos?

A α-talasemia mayor
B Aneuploidía cromosómica
C Eritroblastosis fetal
D Infección por el parvovirus B19
E Anastomosis vascular placentaria

30 El riesgo de acumulación fetal y neonatal de líquido de edema en tejidos blandos está aumentado en mujeres de origen maya cuyo cónyuge es de ascendencia europea. Los primogénitos se ven afectados y el riesgo aumenta en los embarazos sucesivos. La prueba de Coombs neonatal es positiva con presencia de anticuerpos tanto IgG como IgM. ¿Cuál de los siguientes grupos sanguíneos es más probable en estas mujeres mayas?

A A
B B
C D
D O
E P



31 Una primigrávida de 19 años con un embarazo hasta entonces sin complicaciones es sometida en la semana 16 a una ecografía de seguimiento que no revela anomalías. A las 18 semanas la mujer desarrolla un leve exantema en la cara. A las 33 semanas da a luz un mortinato gravemente hidrópico. En la autopsia no hay malformaciones congénitas, pero se aprecia cardiomegalia. A partir del aspecto histológico mostrado en la figura, ¿cuál de las siguientes opciones es la causa más probable de tales hallazgos?

A Anomalía cromosómica del feto

B Neuroblastoma congénito

C Herencia de dos genes *CFTR* anómalos

D Infección por el parvovirus B19

E IgG maternas que atraviesan la placenta

32 Un niño afroamericano de piel clara de 18 meses de edad presenta desarrollo retardado, caracterizado por retraso mental e incapacidad para caminar. La orina del niño tiene un característico olor a «moho». En la exploración física no hay adenopatías ni hepatoesplenomegalia. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de hemoglobina de 14 g/dl; un recuento plaquetario de 302.700/mm^3; un recuento de eritrocitos de 7.550/mm^3; una cifra de glucosa de 80 mg/dl; un nivel de proteínas totales de 7,1 g/dl; una concentración de albúmina de 5 g/dl, y de creatinina de 0,5 mg/dl. ¿En el gen que codifica cuál de las siguientes enzimas es más probable que haya una mutación?

A Adenosina desaminasa

B α_1-antitripsina
C Galactosa-1-fosfato uridiltransferasa
D Glucosa-6-fosfatasa
E Maltasa ácida lisosómica
F Fenilalanina hidroxilasa
G Esfingomielinasa

33 Una mujer de 20 años tiene una falta de un período menstrual y su prueba de embarazo es positiva. Este embarazo es planificado. Cuando ella nació, se le diagnosticó una carencia de fenilalanina hidroxilasa y siguió una dieta especial hasta los 12 años. Su desarrollo físico fue normal y la paciente consiguió licenciarse por la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuál de los siguientes planes es más adecuado para este embarazo?

A Aborto para evitar el nacimiento de un niño con retraso mental
B Infusión de enzimas al feto
C Terapia génica para el feto
D Farmacoterapia para la madre
E Dieta especial para la madre

34 Tras un embarazo sin complicaciones, nace un lactante con aspecto normal y comienza a mamar. A los 3 días padece vómitos y diarrea. Una semana después la ictericia es patente y aparece fiebre. En la exploración física hay hepatomegalia. En las pruebas de laboratorio se detectan sustancias reductoras anómalas en la orina y se identifica *Escherichia coli* en el hemocultivo. ¿De cuál de las siguientes enzimas es más probable que exista una carencia en este lactante?

A Galactosa-1-fosfato uridiltransferasa
B Glucocerebrosidasa
C Fenilalanina hidroxilasa
D Esfingomielinasa
E Uridina difosfato glucuronosiltransferasa

35 Una primigrávida de 21 años da a luz un lactante nacido a término tras un embarazo sin complicaciones. Su peso y su talla son normales, y no se observan malformaciones. El lactante no expulsa meconio. Las pruebas de laboratorio muestran una elevada concentración de cloruro en el sudor. Las pruebas genéticas indican que una proteína crítica codificada por un gen

carece de un aminoácido fenilalanina en su secuencia.

Secuencia normal:

— Ile — Ile — Phe — Gly — Val —
…T ATC ATC TTT GGT GTT…

Secuencia alterada en este niño:

— Ile — Ile — Gly — Val —
…T ATC ATT GGT GTT…

¿Cuál de los siguientes tipos de mutaciones es más probable que genere estos hallazgos?

A Desplazamiento del marco de lectura
B Sin sentido (codón de detención)
C Puntual
D Deleción de tres pares de bases
E Repetición de trinucleótidos

36 Una mujer de 29 años tiene antecedentes de esteatorrea e infecciones pulmonares de repetición desde la infancia. Sufre una fractura, y la radiografía realizada muestra osteopenia. Las pruebas de laboratorio indican concentración anómala de cloruro en el sudor. Ni sus padres ni sus hermanos padecen esta afectación. Los estudios genéticos detectan una mutación en un gen que codifica los canales iónicos de cloruro. ¿Cuál de los siguientes patrones de herencia es el más probable en esta mujer?

A Autosómico dominante
B Autosómico recesivo
C ADN mitocondrial
D Multifactorial
E Recesivo ligado al cromosoma X

37 Un niño de 11 años ha experimentado episodios cada vez más frecuentes de diarrea durante los últimos 3 años. Las heces son voluminosas y de olor fétido. El niño también tiene antecedentes de múltiples infecciones respiratorias. En la exploración física, las constantes vitales comprenden temperatura de 38,1 °C; frecuencia cardíaca de 80 latidos/min; frecuencia respiratoria de 20 respiraciones/min, y presión arterial de 90/55 mmHg. A la auscultación se perciben crepitantes difusos en ambos pulmones. Entre los hallazgos de laboratorio destaca una prueba de grasa en heces cuantitativa superior a 10 g/día. En los cultivos de esputo se detectan *Pseudomonas aeruginosa* y *Burkholderia cepacia*. ¿Cuál de las siguientes metabolopatías congénitas es más probable en este

niño?

A Producción anómala de fibrilina por los fibroblastos

B Carencia de galactosa-1-fosfato uridiltransferasa

C Alteración del transporte del ión cloruro en las células epiteliales

D Carencia de fenilalanina hidroxilasa

E Reducción de número de receptores de LDL

38 Una niña de 15 años ha padecido fiebre y tos productiva durante los últimos 4 días. Nació a término, pero desarrolló distensión abdominal en la primera semana de vida por íleo meconial. A lo largo de 8 años sufrió varios episodios de neumonía con tos productiva de esputo mucoide. En los cultivos de esputo se detectó sistemáticamente *Pseudomonas aeruginosa.* Cada nuevo brote de neumonía era más prolongado y más resistente a los antibióticos. En la exploración física su temperatura actual es de 38,2 °C. ¿Cuál de los siguientes factores es el más importante para el aumento de la frecuencia y la gravedad de las infecciones por *Pseudomonas*?

A Plegamiento anómalo de la proteína CFTR

B Mutaciones coexistentes en el gen *TGFβ1*

C Defecto de la acción ciliar por disfunción del brazo de dineína

D Formación de biopelículas en el epitelio respiratorio

E Pérdida de secreción de bicarbonato a los bronquíolos

39 Se realiza un estudio clínico en hombres con infertilidad. En algunos se aprecia que presentan agenesia del conducto deferente y antecedentes de infecciones respiratorias de repetición, esteatorrea y cirrosis biliar. Las pruebas genéticas revelan polimorfismos en los genes de la lectina de unión a la manosa 2 *(MBL2)* y del factor de crecimiento transformante β1 *(TGFβ1).* ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio es más probable que se encuentre alterada en esos hombres infértiles?

A Hemoglobina A_{1c} sanguínea

B Aminoácidos urinarios

C Fenilalanina sérica

D Cloruro en el sudor

E Ácido vainillilmandélico (VMA) en orina

40 Un niño de 5 meses muere de forma súbita e inesperada. En la investigación se observa que el lactante estaba en decúbito prono, sin obstrucción de las vías respiratorias ni evidencia de

traumatismos. Los exámenes macroscópico y microscópico en la autopsia solo revelan petequias en las superficies mesoteliales. ¿Cuál de los siguientes neurotransmisores, relacionados con la señalización de los centros bulbares del despertar en el tronco del encéfalo, es más probable que esté implicado en la patogenia del trastorno que provocó la muerte del lactante?

A Acetilcolina
B Dopamina
C Ácido γ-aminobutírico
D Noradrenalina
E Serotonina

41 Un niño afroamericano de 4 meses es encontrado muerto en su cuna una mañana. Los desconsolados padres, ambos trabajadores de una fábrica, son interrogados por una médica forense e indican que el niño no había estado enfermo. No se aprecian anomalías macroscópicas ni microscópicas en la autopsia y los resultados de todas las pruebas toxicológicas son negativos. La médica forense les dice a los padres que cree que la causa de la muerte es el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que le permita llegar a esta conclusión?

A La edad del niño
B El sexo del niño
C La raza del niño
D El nivel socioeconómico de los padres
E La ausencia de anomalías en la autopsia

42 La madre de un niño de 3 años indica que una extensa mancha en vino de Oporto en el lado izquierdo de la cara del niño no ha disminuido de tamaño desde su nacimiento. Esta mancha irregular, de color rojo azulado y levemente elevada no es dolorosa pero sí desfigura mucho el rostro del niño. ¿Cuál de los siguientes componentes tisulares es más probable que prolifere en esta lesión?

A Capilares
B Fibroblastos
C Vasos linfáticos
D Linfoblastos
E Neuroblastos

43 Se efectúa un estudio longitudinal sobre neoplasias malignas pediátricas. Se identifican y se someten a seguimiento lactantes nacidos a término sin anomalías y sin antecedentes familiares de neoplasia maligna. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que se diagnostique en el primer año de vida en esta cohorte?

A Adenocarcinoma
B Sarcoma de Ewing
C Hepatoblastoma
D Linfoma de Hodgkin
E Carcinoma epidermoide



44 Una mujer de 28 años, G1, P0, presenta un embarazo sin

complicaciones hasta la semana 28, en la que desarrolla contracciones uterinas y rotura prematura de membranas. Una ecografía detecta una lesión con el aspecto macroscópico representativo mostrado en la figura. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Hamartoma
B Hemangioma
C Linfangioma
D Neuroblastoma
E Teratoma

45 Los padres de un niño de 2 años están preocupados porque su hijo parece no tener visión en el ojo derecho. En la exploración se observan estrabismo y un aspecto blanquecino de la pupila derecha, con dolor a la palpación de la órbita. La visión en el ojo izquierdo parece intacta. Se procede a enucleación del ojo derecho, seguida de radioterapia y quimioterapia. No hay recidiva en el lado derecho pero, a los 5 años de edad, aparece una lesión similar en el ojo izquierdo. A los 12 años, el niño desarrolla un osteosarcoma en el fémur distal izquierdo. ¿Cuál de los siguientes mecanismos genéticos es más probable que genere estos hallazgos?

A Aneuploidía
B Translocación cromosómica
C Mutación de repetición de nucleótidos
D Mutación de línea germinal
E Herencia multifactorial
F Disomía uniparental
G Defecto genético ligado al cromosoma X



46 La madre de un niño de 6 meses informa de que su hijo presenta una masa abdominal palpable. En la exploración física, el lactante tiene una temperatura de 37,8 °C y está en el percentil 33 de peso. Una TC abdominal muestra una masa sólida de 5,5 cm que afecta a la glándula suprarrenal derecha. En las pruebas de laboratorio se registran niveles elevados de ácido homovainíllico (HVA) y ácido vainillilmandélico (VMA) en la orina de 24 h. La glándula suprarrenal es extirpada quirúrgicamente; el aspecto histológico de la masa se muestra en la figura. ¿Cuál de las siguientes características es más probable que se asocie a mal pronóstico?

A Edad inferior a 1 año
B Hiperdiploidía
C Malformaciones renales
D Amplificación del gen *MYCN (NMYC)*
E Presencia de numerosas células ganglionares

47 En un niño de 2 años se observan ausencia de iris bilateral, criptorquidia, hipospadias y retraso mental. Su madre ha notado que en los últimos 3 meses ha aumentado el perímetro abdominal del niño. En la exploración física hay masas abdominales palpables. Una TC abdominal muestra hipertrofia suprarrenal bilateral y aumento del tamaño del páncreas. Hay una masa sólida de 6 cm en el riñón izquierdo. ¿Cuál de los siguientes trastornos congénitos es el diagnóstico más probable?

A Síndrome de Edwards
B Síndrome de Marfan
C Síndrome de Klinefelter
D Síndrome de Patau
E Síndrome de Turner
F Síndrome WAGR

48 Un niño de 3 años se ha mostrado menos activo en los últimos 2 meses. En la exploración física se palpa una masa abdominal en el lado izquierdo. El análisis de orina muestra hematuria. Los estudios radiográficos revelan una masa de 8 cm en el espacio retroperitoneal izquierdo. La masa es extirpada y, en el examen microscópico, muestra una combinación trifásica de tipos celulares blastémicos, estromales y epiteliales. El niño se encuentra bien 10 años después. ¿Cuál de las siguientes opciones es más probable que se relacione con la patogenia de esta neoplasia?

A Epitelio anaplásico
B Células ganglionares
C Restos nefrógenos
D Seudorrosetas
E Componente sarcomatoso

Respuestas

1 **B** Este es el clásico ejemplo de disrupción embrionaria que determina la aparición de malformaciones congénitas. Las bandas fibrosas y las posibles lesiones vasculares pueden explicar estos hallazgos, comprendidos dentro del espectro de un complejo de extremidades-pared corporal que incluye el síndrome de las bandas (o bridas) amnióticas. Diversas malformaciones pueden producirse en relación con infecciones congénitas, aunque las bandas amnióticas no se cuentan entre ellas. El oligohidramnios, con reducción del líquido amniótico, produce deformaciones, no disrupciones. La incompatibilidad Rh puede causar eritroblastosis fetal, manifestada en ocasiones como hidropesía fetal. Los fetos afectados por esta presentan edema generalizado e ictericia intensa. En la trisomía 18 y otras anomalías cromosómicas, el onfalocele centrado en el ombligo es el defecto de la pared abdominal más común.

2 **C** Los pulmones son hipoplásicos (pequeños) debido a la

deformación causada por la secuencia de oligohidramnios. La malformación (anomalía) que inició la secuencia en este caso fue la displasia renal multiquística, debido a que los riñones formaban escasa orina fetal, la cual ha de pasar a la cavidad amniótica para formar el grueso del líquido amniótico. En este caso no hubo disrupción. Los teratógenos pueden generar anomalías, aunque de modo infrecuente. El espectro de hallazgos de este caso es compatible con la asociación VATER (defectos *v*ertebrales, *a*no imperforado, fístula *t*raqueo*e*sofágica y displasia *r*adial y renal).

3 **B** La cara aplanada y los pies deformados de este lactante son indicativos de oligohidramnios debido a agenesia renal. Los riñones fetales producen orina, que se transforma en líquido amniótico. La falta de dicho líquido limita el desarrollo del feto y el crecimiento pulmonar. La hipoplasia pulmonar es el paso limitante de la velocidad para la supervivencia. La rubéola congénita provoca varias malformaciones, pero no deformaciones. Los lactantes nacidos de madres diabéticas están expuestos a mayor riesgo de malformaciones congénitas sin un patrón específico. La madurez pulmonar fetal suele alcanzarse a las 34 o 35 semanas de gestación y la enfermedad de las membranas hialinas es improbable en la semana 36. La trisomía 13 va acompañada de diversas malformaciones, algunas de la cuales afectan a los riñones. No obstante, los rasgos externos son muy distintos de los de este caso y afectan a lactantes que casi siempre presentan microcefalia y defectos de la línea media, como labio leporino y paladar hendido.

4 **A** Se cree que la embriopatía por ácido retinoico, caracterizada por defectos cardíacos, neurales y craneofaciales, se debe a la capacidad de los retinoides de regular a la baja el factor de crecimiento transformante β (TGF-β) y afecta a la expresión de los genes de homeosecuencia (homeocaja; *HOX*). Estos genes son importantes en la determinación de los patrones embrionarios de extremidades, vértebras y estructuras craneofaciales. El desarrollo de los rombómeros embrionarios puede verse afectado. Las otras opciones enumeradas no afectan al ácido retinoico.

5 **A** Los hallazgos son característicos del retraso del crecimiento

fetal del último trimestre, dado que el encéfalo está relativamente respetado. Los hallazgos indican insuficiencia uteroplacentaria por una anomalía placentaria intrínseca. Una posible causa es una anomalía citogenética en el embrión en desarrollo que sucede exclusivamente en el trofoblasto y solo afecta a la placenta. La sífilis congénita se registra en el tercer trimestre, cuando las espiroquetas pueden atravesar la placenta; es característica la hidropesía placentaria y fetal. Las metabolopatías congénitas, como la galactosemia, se suelen manifestar tras el nacimiento, ya que el metabolismo materno elimina los productos intermediarios de las carencias enzimáticas fetales. La preeclampsia se caracteriza por hipertensión materna. La incompatibilidad Rh genera hidropesía fetal y placentaria, mientras que la trisomía 21 es más habitual en madres de edad avanzada, aunque en este caso no se observaron malformaciones fetales.

6 **B** Se trata de un caso de displasia del desarrollo de la cadera. La mayoría de las malformaciones congénitas, sobre todo las aisladas, no tienen causas fácilmente identificables. Se cree que la mayoría de los defectos son originados por herencia de ciertos genes y por su interacción con los factores ambientales. Su transmisión sigue pautas de herencia multifactorial. Se considera que la frecuencia de reaparición oscila entre el 2 y el 7% y que es la misma para todos los parientes de primer grado, con independencia del sexo y de la relación con el caso de referencia. Ciertas poblaciones presentan más portadores de estos genes.

7 **A** La infección por rubéola en el primer trimestre, cuando se produce la organogenia (de 3 a 9 semanas de gestación), puede causar una embriopatía con malformaciones cardíacas, oculares, cutáneas, del sistema nervioso central y hepáticas. La vacunación sistemática hace que los casos de rubéola sean infrecuentes. Es más probable que la carencia de folato se asocie a defectos del tubo neural. La dispermia es infrecuente y produce triploidía, que rara vez da lugar al nacimiento de un lactante vivo. La eritroblastosis fetal provoca anemia en el feto, con insuficiencia cardíaca congestiva e hidropesía, pero no malformaciones. En el pasado, el uso de la talidomida fue causa de malformaciones

(casi siempre deformidades manifiestas de las extremidades). La no disyunción durante la meiosis en los óvulos maternos provoca trisomías y monosomías, muchas de las cuales se relacionan con malformaciones cardíacas como la comunicación interventricular (trisomía 21). Sin embargo, este mecanismo es improbable en los espermatozoides paternos, producidos en grandes cantidades y de modo constante a lo largo de la vida.

8 **D** Este lactante presenta labio leporino, una de las malformaciones congénitas más habituales. La ausencia de otros defectos indica que se trata de una alteración aislada, que no es parte de un síndrome o de una enfermedad genética definida. La mayoría de las malformaciones congénitas, incluido el labio leporino, no son monogénicas y pueden verse condicionadas por influencias ambientales. Numerosas susceptibilidades genéticas, modificadas por condicionantes ambientales, son determinantes en el 20-25% del total de malformaciones congénitas. Lo más probable es que las restantes opciones generen defectos múltiples y aminoren el desarrollo fetal. La mayor parte de las anomalías cromosómicas no son compatibles con la vida; los pocos fetos que nacen vivos a término y que sobreviven después del parto (p. ej., los que presentan aneuploidías de los cromosomas sexuales y triploidías autosómicas, como la 13, la 18 y la 21) sufren múltiples malformaciones. La rotura precoz del amnios puede dar lugar a hendiduras, pero suelen coexistir con defectos más graves (p. ej., gastrosquisis y falta de dedos o extremidades) y la muerte fetal es la consecuencia habitual. La malnutrición materna suele asociarse a nacimiento de lactantes pequeños para la edad gestacional. Los defectos monogénicos son responsables de menos del 10% de las anomalías registradas al nacer, mientras que los teratógenos justifican menos del 1%. Abulcasís (963-1013), considerado el «padre de la cirugía», es autor de la notable compilación *Al-Tasrif*, integrada por 30 volúmenes sobre la ciencia médica, entre ellos 3 dedicados a la cirugía en los que se describen numerosas técnicas quirúrgicas. Diseñó decenas de instrumentos quirúrgicos, entre ellos la jeringa de bulbo, y fue el primero en utilizar suturas de seda.

9 **B** El alcohol es uno de los teratógenos ambientales más

comunes que afectan al feto, aunque sus efectos pueden ser sutiles. No hay un valor umbral en el que el consumo de alcohol por parte de la madre provoque síndrome alcohólico fetal; ninguna cantidad es segura. Los niños con síndrome alcohólico fetal tienden a presentar alteraciones del desarrollo a lo largo de la infancia, aunque las malformaciones físicas se hacen menos patentes a medida que el niño madura. En ocasiones hay anomalías vertebrales, como escoliosis. El hígado puede presentar metamorfosis grasa con hepatomegalia y concentraciones de transaminasas séricas elevadas. Los principales efectos de la rubéola congénita se producen durante la organogenia, en el primer trimestre, y suelen corresponder a malformaciones más importantes, como, por ejemplo, cardiopatías congénitas. La diabetes materna a menudo hace que el niño sea grande y padezca malformaciones. La placenta previa, en posición baja en el orificio cervical o cerca de él, puede inducir una importante hemorragia en el momento del parto o insuficiencia uteroplacentaria, con retraso del desarrollo, antes del parto. Las causas placentarias de retraso del crecimiento intrauterino producen un retraso asimétrico del crecimiento que respeta el encéfalo. Los hallazgos de la trisomía 21 son sutiles en al nacer y suelen incluir braquicefalia, no microcefalia.

10 **A** Los abortos de repetición en la fase inicial de la gestación son indicativos de una posible anomalía cromosómica y puede que la madre o el padre sean portadores de una translocación equilibrada. Las mutaciones en el gen *regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR)* pueden provocar fibrosis quística que, como la mayoría de las metabolopatías congénitas, se manifiesta posnatalmente. La concentración sérica materna de α-fetoproteína contribuye a identificar los defectos del tubo neural que, sin embargo, no son causa de pérdida fetal precoz. La infección materna por el VIH no es causa significativa de pérdida fetal. Dado que el grupo sanguíneo de la madre es A positivo, la pérdida por eritroblastosis fetal es improbable, aunque las incompatibilidades con otros grupos sanguíneos pueden inducir esta alteración.

11 **E** Aunque en ocasiones se identifican anomalías genéticas específicas, por ejemplo, cromosómicas o monogénicas, entre el 40 y el 60% de las malformaciones congénitas son de causa desconocida. Ello se cumple en los más comunes, como los enumerados en este caso, y cuando no se ajustan a un patrón reconocible de anomalías indicativas de un síndrome específico. Entre los factores ambientales relacionados con las malformaciones congénitas se cuentan infecciones, enfermedades maternas como la diabetes mellitus (no la gestacional), y teratógenos, responsables de hasta el 10% de estas malformaciones. Las causas multifactoriales por influencia de múltiples genes predisponentes representan la segunda causa más probable de este tipo de alteraciones, con un porcentaje del 20-25%.

12 **F** La diabetes materna puede inducir hiperplasia de los islotes fetales, debido al ambiente hiperglucémico materno. Ello sucede en caso de diabetes gestacional o si la madre ha padecido diabetes mellitus antes del embarazo. Después del nacimiento, los islotes hiperplásicos mantienen la hiperfunción, provocando hipoglucemia neonatal. Los lactantes de madres diabéticas tienden, además, a presentar macrosomía, por los efectos estimuladores del crecimiento de las concentraciones elevadas de insulina. Las otras opciones enumeradas son más propias de trastornos pancreáticos del adulto. La infiltración neutrófila con necrosis y hemorragia es característica de la pancreatitis aguda. Una masa con glándulas irregulares y rasgos nucleares anómalos puede ser un adenocarcinoma. Los depósitos de amiloide en los islotes se dan en ciertos casos de diabetes mellitus de tipo 2. La fibrosis extensa y la sustitución grasa del páncreas se aprecian en pacientes con fibrosis quística que sobreviven durante décadas. La infiltración de linfocitos T en los islotes es propia de la insulitis que presagia una diabetes mellitus de tipo 1 manifiesta.

13 **C** La inflamación aguda es indicativa de infección bacteriana, y los estreptococos del grupo B, que pueden colonizar la vagina, son causa frecuente de infección congénita a término, que en ocasiones se desarrolla con rapidez. La infección por citomegalovirus, la sífilis y la toxoplasmosis son infecciones

congénitas potencialmente causantes de muerte fetal, aunque es más probable que sean crónicas y se desarrollen antes en la gestación. Las infecciones herpéticas se adquieren más habitualmente al pasar por el canal del parto.

14 **F** La rotura prematura de membranas pretérmino está implicada en el 30-40% de los partos prematuros y la causa de aquella suele ser una infección. Si esta es ascendente, provoca corioamnionitis y funiculitis. *Ureaplasma urealyticum* se encuentra en las vías genitales de los adultos sexualmente activos. La infección intrauterina induce liberación de colagenasas y elastasas, que favorece la rotura de membranas y la producción de prostaglandinas inductoras de contracción del músculo liso y del parto. La fibrosis quística y las metabolopatías congénitas no suelen manifestarse hasta después del nacimiento. La incompatibilidad Rh, improbable en una primigrávida si no ha recibido una transfusión previa de sangre incompatible, causa hidropesía fetal. El síndrome de muerte súbita del lactante afecta a niños de entre 1 mes y 1 año de edad, y no se asocia a anomalías patológicas. La hipertensión materna y las convulsiones se relacionan con el diagnóstico de toxemia. La trisomía 16 induce abortos en el primer trimestre y no se asocia a inflamación.

15 **D** La listeriosis puede ser una infección congénita. Aunque una embarazada solo padezca diarrea leve, el microorganismo con frecuencia resulta devastador para el feto o el recién nacido. A veces se registran pequeñas epidemias de listeriosis vinculadas con alimentos contaminados, como lácteos, pollo o salchichas. La meningitis neonatal se asocia a *Listeria monocytogenes.* Es más probable que las infecciones por citomegalovirus y la toxoplasmosis produzcan afectación grave del sistema nervioso central. Las infecciones por estreptococos del grupo B suelen afectar al feto a término o en el periparto. Estos microorganismos liberan un factor que inhibe el factor C5a del complemento quimiotáctico para los neutrófilos, lo que impide una respuesta supurativa. Las infecciones herpéticas congénitas suele adquirirse durante el paso a través del canal del parto. La infección por parvovirus puede ocasionar una anemia fetal grave.

16 **A** Alrededor del 10% de los recién nacidos infectados por citomegalovirus presentan una infección extensa con inclusiones en diversos órganos. La anemia grave y la lesión miocárdica causan hidropesía y el cerebro con frecuencia resulta afectado. El epitelio tubular renal puede infectarse y, en ocasiones, se observan células grandes con inclusiones en el examen microscópico de la orina. La infección por citomegalovirus en recién nacidos se adquiere a veces por vía transplacentaria, en el nacimiento o a través de la lactancia natural. El virus del herpes simple suele adquirirse durante el paso por el canal del parto y no causa leucomalacia periventricular. La infección por el VIH intrauterina no produce una lesión orgánica significativa. La infección por parvovirus a menudo se asocia a anemia fetal grave. La rubéola congénita se manifiesta en el primer trimestre, con frecuencia con malformaciones cardíacas.

17 **A** El único título de IgM aumentado, indicativo de infección reciente, es el de *Toxoplasma*. Los hallazgos en el sistema nervioso central fetal son compatibles con toxoplasmosis congénita. Los títulos elevados de IgM frente al CMV y al VHS de tipo 1 son indicativos de una infección antigua. El título positivo de rubéola se relaciona con una vacunación anterior. El VIH congénito no tiene efectos intrauterinos significativos para el feto. La probable vía de infección reciente por *Toxoplasma* es la ingesta de carne contaminada poco cocinada que contuviera quistes de *Toxoplasma gondii*. Las otras vías de infección citadas no son características de la toxoplasmosis.

18 **E** El lactante es pequeño para su edad gestacional debido a un retraso del crecimiento intrauterino (RCIU). El desarrollo asimétrico con tamaño normal de la cabeza indica una posible causa materna o placentaria en la fase tardía de la gestación. Los problemas fetales, como anomalías cromosómicas (síndrome de Down), infecciones (citomegalovirus) y eritroblastosis, pueden ocasionar un retraso del crecimiento simétrico. La hidropesía fetal puede acompañar a infecciones congénitas y eritroblastosis, lo que aumenta artificialmente el peso fetal. Los lactantes nacidos de madres diabéticas posiblemente sean grandes (macrosomía) para su edad gestacional.

19 **A** Este lactante es pequeño para su edad gestacional (PEG).

Dada la ausencia de otros problemas en el preparto o en el posparto, el probable responsable es el consumo de cigarrillos por parte de la madre, que también aumenta el riesgo de rotura prematura de membranas pretérmino (RPMP). Las causas placentarias de retraso del crecimiento intrauterino (RCIU) tienden a respetar el cerebro del lactante. El mosaicismo genético de la placenta puede inducir muerte fetal y RCIU. La preeclampsia complica la gestación por hipertensión materna, edema y proteinuria. La toxoplasmosis es una infección congénita que tiende a provocar malformaciones cerebrales fetales, aparentes en el segundo trimestre de gestación. La triploidía y otras anomalías cromosómicas fetales generan múltiples malformaciones congénitas.

20 **B** El hiperinsulinismo en el feto de una madre diabética inhibe la producción de surfactante pulmonar. En cambio, los corticoesteroides la estimulan en los neumocitos de tipo II. La infección puede aumentar el riesgo de parto prematuro, pero no afecta sustancialmente a la producción de surfactante. El riesgo de malformaciones mayores, definido como *embriopatía diabética*, es del 6 al 10% entre lactantes nacidos de madres con diabetes mellitus, si bien no hay un patrón establecido para ellas y no se observan embriopatías similares en la diabetes gestacional. En consecuencia, las causas de tales anomalías son, en este caso, desconocidas. La macrosomía se debe a los efectos de estimulación del crecimiento que la insulina ejerce sobre el feto. El oligohidramnios induce constricción intrauterina, que culmina con hipoplasia pulmonar, no con reducción del surfactante. La hipertensión materna puede aminorar la función placentaria y agravar el retraso del crecimiento, pero no influye en la producción de surfactante.

21 **B** La oxigenoterapia prolongada en dosis elevadas y administrada con ventilación con presión positiva causa a veces lesiones en los pulmones inmaduros, lo que origina la enfermedad pulmonar crónica conocida como *displasia broncopulmonar.* Las manifestaciones pulmonares de la fibrosis quística no se observan al nacer o en la lactancia. La mortalidad por hipoplasia pulmonar es máxima en el momento del nacimiento. En el síndrome de muerte súbita del lactante no se

aprecian malformaciones anatómicas en la autopsia. Una comunicación interventricular puede provocar hipertensión pulmonar por comunicación izquierda-derecha.

22 **E** El surfactante es sintetizado por los neumocitos de tipo II que revisten los sacos alveolares. Comienzan a diferenciarse a partir de la semana 26 de gestación. Estas células se reconocen al microscopio electrónico por la presencia de cuerpos laminares llenos de fosfolípidos. La producción de surfactante se incrementa sensiblemente a partir de las 35 semanas de gestación. Otras estructuras pulmonares no sintetizan compuestos de fosfatidilcolina y fosfatidilglicerol, importantes para producir el surfactante que reduce la tensión superficial alveolar.

23 **B** La inmadurez de los pulmones fetales antes de las 35 o 36 semanas de gestación puede complicarse por la falta de suficiente surfactante como para permitir la ventilación adecuada tras el nacimiento. Ello induce, en ocasiones, la enfermedad de membranas hialinas, mostrada en la figura. Las pruebas del líquido amniótico antes del nacimiento, incluido el índice de lecitina-esfingomielina, la polarización de fluorescencia y el recuento de cuerpos laminares son útiles para predecir el grado de inmadurez pulmonar. La anemia fetal produce insuficiencia cardíaca y congestión pulmonar. La toxemia materna y las infecciones congénitas, como la toxoplasmosis, pueden provocar enfermedad de membranas hialinas, si el nacimiento tiene lugar de forma prematura por uno de estos trastornos, pero sin que afecten directamente a la madurez pulmonar. El oligohidramnios induce, en ocasiones, dificultad respiratoria a través del mecanismo de la hipoplasia pulmonar.

24 **E** La enterocolitis necrosante es una complicación de la prematuridad relacionada con diversos factores, tales como isquemia intestinal, apoptosis de los enterocitos inducida por el factor activador de plaquetas, proliferación bacteriana y alimentación con leche de fórmula. En casos graves, la pared intestinal se necrosa, se perfora y es precisa una intervención quirúrgica. La atresia duodenal es una malformación congénita infrecuente generalmente asociada a trisomía 21; produce

obstrucción de las vías digestivas altas y vómitos. La enfermedad de Hirschsprung es un trastorno congénito causado por la presencia de un segmento aganglionar en el colon distal; provoca obstrucción con distensión, pero no diarrea sanguinolenta. El divertículo de Meckel es un trastorno frecuente: afecta al 2% de las personas. Es característico que se detecte de forma accidental, aunque en etapas tardías de la vida a veces se asocia a hemorragia intestinal si existe mucosa gástrica ectópica en el divertículo. El íleo meconial sobreviene en un contexto de fibrosis quística y puede producir obstrucción; es característico que el lactante no expulse heces. La estenosis pilórica se manifiesta a las 3-6 semanas de vida, con vómitos en escopetazo.

25 **D** Lo más probable es que el recién nacido presente enfermedad de membranas hialinas, por inmadurez pulmonar fetal y falta de surfactante. El surfactante producido por los neumocitos de tipo II corresponde predominantemente a lecitina similar a los fosfolípidos, contenida en los cuerpos laminares que se liberan a los alvéolos. La idoneidad de la producción de surfactante puede calibrarse a partir del contenido de fosfolípidos en el líquido amniótico, puesto que las secreciones pulmonares fetales pasan a dicho líquido. Los análisis cromosómicos pueden ayudar a predecir los problemas tras el nacimiento o el riesgo de aborto. La prueba de Coombs ayuda a determinar la presencia de eritroblastosis fetal. La fibrosis quística no induce problemas respiratorios al nacer. La concentración de α-fetoproteína sérica materna es útil para predecir los defectos del tubo neural y las anomalías cromosómicas.

26 **A** Es más probable que esta anemia hemolítica leve se deba a incompatibilidad ABO con el grupo sanguíneo O de la madre, lo que genera anticuerpos anti-A que revisten las células fetales. La mayoría de los anticuerpos anti-A y anti-B son IgM. En el 20-25% de los embarazos hay también anticuerpos IgG, que atraviesan la placenta en cantidad suficiente como para producir anemia hemolítica, leve en la mayor parte de los casos. La concentración de bilirrubina en este lactante nacido a término no es suficiente como para causar querníctero. A diferencia de la

incompatibilidad Rh, las incompatibilidades ABO no suelen tener consecuencias importantes en embarazos sucesivos. A medida que el lactante madura, los anticuerpos maternos disminuyen, la hemólisis remite, y el lactante se desarrolla normalmente. La dificultad respiratoria es improbable a término, porque la madurez pulmonar fetal resulta adecuada.

27 **C** Este lactante tiene eritroblastosis fetal, que se desarrolla cuando una sensibilización previa a un antígeno de las células sanguíneas fetales origina aloanticuerpos en la sangre materna capaces de atravesar la placenta. Suele estar implicado el Rh sanguíneo. Los anticuerpos maternos revisten los eritrocitos fetales y causan hemólisis. La prueba de Coombs es positiva. La anemia fetal provoca insuficiencia cardíaca congestiva e hidropesía. La hemólisis eleva sensiblemente la concentración de bilirrubina. La α-fetoproteína sérica alta es indicativa de defecto del tubo neural, no asociado a hidropesía. La hepatitis vírica no es una infección perinatal. La menor actividad de la glucocerebrosidasa es la causa de la enfermedad de Gaucher, que no provoca insuficiencia hepática ni anemia perinatales. La listeriosis y otras infecciones congénitas pueden producir hidropesía y anemia, aunque no con la gravedad de este caso.

28 **B** La hidropesía fetal no inmunitaria puede deberse a insuficiencia cardíaca intrauterina, con malformaciones cardíacas que provocan una insuficiencia cardíaca congestiva de alto gasto. Las malformaciones cardíacas se asocian a otras anomalías y, en ocasiones, forman parte de aneuploidías cromosómicas (cromosomas 13, 18, 21 y XO). Una lesión de tipo masa con aumento del flujo sanguíneo, como, por ejemplo, un hemangioma, puede provocar hidropesía, mientras que es improbable que un neuroblastoma incremente significativamente el flujo o induzca un efecto paraneoplásico con anemia. Algunas lesiones cerebrales, como la leucomalacia, se relacionan con hidropesía cuando se deben a infecciones congénitas por, por ejemplo, citomegalovirus o toxoplasmosis («C» y «T», respectivamente, en el acrónimo TORCH), aunque en este caso los títulos TORCH fueron negativos. La placenta baja provoca, en ocasiones, insuficiencia uteroplacentaria con retraso del crecimiento intrauterino y predispone a placenta previa en el

nacimiento. Es más probable que la esplenomegalia acompañe a la hidropesía inmunitaria, con hematopoyesis extramedular significativa.

29 **E** El síndrome de transfusión fetal-fetal es debido a anastomosis vascular entre las dos mitades de una placenta monocoriónica. El gemelo donante suele ser más pequeño, con función orgánica reducida, incluida la renal, y menos cantidad de líquido amniótico. El gemelo receptor se torna pletórico por la hidropesía y el líquido amniótico aumentado. El donante también puede aparecer hidrópico, debido a la insuficiencia cardíaca de alto gasto, como consecuencia del mayor trabajo de bombeo de sangre a ambos gemelos. Es probable que la aneuploidía cromosómica solo afecte a uno de los gemelos dicigotos y puede causar hidropesía, sin que el otro gemelo se vea afectado. Las restantes opciones enumeradas afectan a los dos gemelos de forma similar.

30 **D** Este es un caso de hidropesía fetal inmunitaria por incompatibilidad ABO. Las poblaciones nativas de Mesoamérica y Sudamérica presentan casi exclusivamente grupo sanguíneo O. Aunque hay isohemaglutininas IgM naturales contra los antígenos de los grupos sanguíneos A y B, algunas mujeres producen también anticuerpos IgG, que atraviesan la placenta y se unen a las células fetales. Las personas de origen europeo son predominantemente de grupo sanguíneo A. En el encuentro de las poblaciones del Viejo Mundo y el Nuevo Mundo en el siglo xvi, estas últimas salieron peor paradas. La incompatibilidad Rh es más problemática, pero se produce después del primer embarazo, cuando la sangre materno-fetal puede inmunizar a la madre. Sus efectos se evitan administrando inmunoglobulina Rho(D) tras el nacimiento. El sistema de antígenos del grupo sanguíneo P puede intervenir en ciertas anemias hemolíticas.

31 **D** Los precursores eritroides presentan grandes inclusiones intranucleares rosadas, típicas de la infección por parvovirus. En adultos, dicha infección suele originar la llamada quinta enfermedad, que remite espontáneamente. Esta es una de las infecciones correspondientes a la letra O en el acrónimo TORCH, que hace referencia a un conjunto de infecciones congénitas (*t*oxoplasmosis, *o*tras infecciones, *r*ubéola,

*c*itomegalovirus y virus del *h*erpes simple o VIH). La infección fetal por parvovirus puede provocar anemia grave, con insuficiencia cardíaca e hidropesía fetal. Los resultados de la prueba de Coombs son negativos, por no verse implicados anticuerpos antieritrocíticos. Los tumores congénitos son causa infrecuente de hidropesía y tienden a inducir una lesión de tipo masa, ausente en este caso. La fibrosis quística no afecta a la eritropoyesis. Aunque varias anomalías cromosómicas (en particular la monosomía X) provocan hidropesía, sus malformaciones son características. La eritroblastosis fetal por anticuerpos IgG maternos es improbable en la primera gestación, y solo se registra expansión eritroide, pero no inclusiones eritroides.

32 **F** La fenilcetonuria (FC) se debe a ausencia de genes funcionales de la fenilalanina hidroxilasa y provoca hiperfenilalaninemia, que afecta al desarrollo cerebral y causa convulsiones. El bloqueo del metabolismo de la fenilalanina disminuye la pigmentación de la piel y del pelo. Asimismo, induce formación de compuestos intermedios, como el ácido fenilacético, que son excretados a la orina y que originan olor a «moho». Aunque la FC es infrecuente, debido a las devastadoras consecuencias de este trastorno hereditario y a que se puede tratar con una dieta libre de fenilalanina, esta es una de las enfermedades para las que se realizan pruebas sistemáticas de cribado al nacer. La carencia de adenosina desaminasa provoca inmunodeficiencia combinada grave, causante de múltiples infecciones graves de repetición desde el nacimiento. La carencia de α_1-antitripsina implica riesgo de colestasis en niños, aunque la hepatopatía crónica se desarrolla después. La insuficiencia de galactosa-1-fosfato uridiltransferasa provoca galactosemia, responsable de una hepatopatía grave y de cataratas. La carencia de glucosa-6-fosfatasa genera glucogenosis de tipo I (enfermedad de von Gierke), causante de insuficiencia hepática. La carencia de maltasa ácida lisosómica origina la enfermedad de Pompe, caracterizada por cardiomegalia e insuficiencia cardíaca, y la de esfingomielinasa provoca la enfermedad de Niemann-Pick; los lactantes que la padecen presentan hepatoesplenomegalia y deterioro neurológico

pronunciados.

33 **E** Muchas personas con fenilcetonuria (FC) clásica han sobrevivido hasta la edad adulta gracias a las pruebas neonatales y al tratamiento dietético. La insuficiencia de fenilalanina hidroxilasa genera acumulación de fenilalanina, tóxica para el sistema nervioso. Con independencia de que el feto en desarrollo presente este trastorno, las concentraciones maternas altas de fenilalanina pueden afectarlo. Así pues, antes del embarazo y durante él, está indicada para la madre una dieta especial, y se ha propuesto, además, que quienes padecen FC deben mantener esa dieta incluso después de la infancia para reducir el daño neurológico. La incidencia de FC es de 1 cada 10.000-20.000 nacidos vivos en EE. UU. Es probable que esa incidencia sea algo mayor en Argentina, donde buena parte de la población tiene ancestros que proceden de regiones del Mediterráneo, donde la mutación prevalente en el gen de la fenilalanina hidroxilasa es distinta que la más común en las poblaciones de Europa septentrional. La incidencia más alta se registra en Turquía, donde es de 1 cada 2.600. Dado que se trata de una enfermedad tratable en un embarazo planificado, el aborto no es la mejor opción. Algunas metabolopatías congénitas pueden tratarse mediante reposición enzimática tras el nacimiento, aunque se trata de un abordaje muy costoso. La terapia génica es experimental. En ciertas enzimopatías congénitas se ha recurrido al trasplante de médula ósea. La FC no tiene tratamiento farmacológico.

34 **A** Este lactante padece galactosemia, una metabolopatía congénita con patrón de herencia autosómico recesivo. La lactosa de la leche es un disacárido que se convierte en glucosa y galactosa por acción de la lactasa. Un exceso de galactosa es tóxico para el hígado, el cerebro y los ojos. Los lactantes afectados desarrollan anomalías tan pronto como empiezan a tomar leche. La carencia de glucocerebrosidasa causa la enfermedad de Gaucher y la de fenilalanina hidroxilasa induce una fenilcetonuria clásica. La carencia de esfingomielinasa causa la enfermedad de Niemann-Pick y la de UDP glucuronosiltransferasa está presente en el síndrome de Gilbert.

35 **D** En la fibrosis quística, la concentración alta de cloruro en el

sudor se relaciona con una alteración del transporte de iones cloruro a través de los epitelios. La anomalía genética más frecuente es la deleción de tres pares de bases en la posición ΔF508, que codifica la fenilalanina en el gen *regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR).* Una mutación por desplazamiento del marco de lectura afecta a uno o dos pares de bases, no a tres, y modifica el resto de la secuencia de aminoácidos en una proteína. Una mutación puntual puede cambiar un codón para que adopte la secuencia de un codón «de detención», que trunca la proteína que está siendo sintetizada, lo que habitualmente provoca su degradación. Las mutaciones puntuales son generalmente mutaciones de sentido erróneo que inducen la sustitución de un aminoácido por otro en la cadena de la proteína, generando así una conformación y una función anómalas de la misma. Una mutación en la secuencia de repetición de trinucleótidos causa la amplificación de las repeticiones de tres nucleótidos, llamadas repeticiones en tándem, lo que impide la expresión génica normal.

36 **B** La paciente padece fibrosis quística, por herencia de dos alelos anómalos del gen *regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR).* Hay mutaciones múltiples, que pueden presentar diferentes grados de gravedad. La incidencia de la enfermedad en EE. UU. es de 1 cada 2.500 nacidos vivos, con una tasa de portadores de 1 cada 25. Las mutaciones autosómicas dominantes están presentes en el 50% de los miembros de la familia y suelen afectar a las proteínas estructurales. El ADN mitocondrial es heredado por el lado materno y afecta, principalmente, a los genes asociados a la fosforilación oxidativa. La herencia multifactorial no presenta una tasa de recidiva bien definida, aunque tiende a presentarse en familias y es propia de enfermedades como la diabetes mellitus o la esquizofrenia. Los trastornos recesivos ligados al cromosoma X son más probables en hombres nacidos de mujeres portadoras.

37 **C** En la fibrosis quística, el transporte anómalo de iones cloruro genera secreciones mucosas alteradas en los conductos pancreáticos. Dichas secreciones producen tapones, atrofia

acinar y fibrosis, con la consiguiente malabsorción, particularmente de lípidos. La fibrilina anómala en los tejidos elásticos es característica del síndrome de Marfan. La carencia de galactosa-1-fosfato uridiltransferasa provoca galactosemia, inductora de lesión hepática, pero no de alteraciones pancreáticas. La fenilcetonuria se debe a carencia de fenilalanina hidroxilasa. Las anomalías del receptor de LDL en la hipercolesterolemia familiar aceleran la aterogenia.

38 **D** Con estos antecedentes clásicos de fibrosis quística (FQ), lo más probable es que las pruebas genéticas revelen homocigosidad para la mutación en ΔF508 del gen *regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR).* La formación de biopelículas en los espacios aéreos alveolares es un factor importante para la capacidad de *P. aeruginosa* de eludir la acción de anticuerpos y antibióticos. Las secreciones respiratorias mucoides crean un microambiente hipóxico en el que los microorganismos *Pseudomonas* producen alginato, una cápsula de polisacárido mucoide que permite la formación de una biopelícula que reviste los espacios aéreos y oculta las bacterias en su interior. El plegamiento anómalo de CFTR es importante en la patogenia global de la FQ y no es específico de la infección pulmonar. Las mutaciones en el gen del *factor de crecimiento transformante β1 (TGFβ1),* cuando están presentes junto con las mutaciones en *CFTR,* se asocian a fenotipos pulmonares graves, pero no se relacionan con la mayor patogenicidad de las infecciones por *Pseudomonas.* La proteína CFTR controla también el transporte de bicarbonato, particularmente en el páncreas, pero no regula su secreción en los pulmones. Los defectos ciliares primarios se producen en el síndrome de Kartagener, pero no en la FQ; en esta, los defectos ciliares son secundarios a producción de moco viscoso.

39 **D** Estas son manifestaciones de fibrosis quística (FQ) por mutaciones del gen *regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR).* La alteración del canal de cloruro en los conductos sudoríparos hace que el sodio y el cloro se concentren en el sudor. Ciertas mutaciones en *CFTR* dan lugar a una forma atenuada de FQ, en la que la azoospermia puede ser la única manifestación. El incremento de hemoglobina A_{1c} es

propio de la hiperglucemia con diabetes mellitus y, en cambio, es un hallazgo tardío en la FQ, ya que los islotes de Langerhans no están tan afectados como el páncreas exocrino. La aminoaciduria indica galactosemia, que es más probable que se manifieste como insuficiencia hepática en la lactancia. La hiperfenilalaninemia es característica de la fenilcetonuria (FC) manifestada como retraso mental. El VMA está aumentado en la orina de pacientes con neuroblastoma.

40 **E** En este caso, la causa más probable de la muerte es un síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). Se deben descartar otras posibles causas mediante exploración cuidadosa y conversaciones con los cuidadores del lactante. Por definición, no hay hallazgos macroscópicos o microscópicos de autopsia que resulten especialmente significativos en este contexto. Es poco probable que los lactantes con alteraciones o infecciones congénitas tengan un aspecto sano y parezcan bien alimentados o que ganen peso regularmente. Aunque la causa del SMSL no se conoce, las alteraciones en las vías neurales serotoninérgicas del bulbo raquídeo y en el estimulador de las vías respiratorias (favorecedoras del sueño) pueden aumentar la vulnerabilidad de los lactantes en riesgo. Las alteraciones en los centros bulbares que regulan las respuestas a estímulos nocivos, como la hipoxia, la hipercapnia o el estrés térmico, pueden dar lugar a ausencia de las respuestas cardiorrespiratorias y reflejas que normalmente mantienen la homeostasis. Los otros neurotransmisores enumerados no están implicados. La acetilcolina actúa sobre todas las neuronas parasimpáticas pre- y posganglionares y sobre las neuronas simpáticas preganglionares. Las neuronas dopaminérgicas se encuentran en la sustancia negra y las gabaérgicas ejercen una función inhibidora sobre otras neuronas del sistema nervioso central. Las neuronas noradrenérgicas se originan en el *locus cœruleus* y comprenden las simpáticas posganglionares.

41 **E** La causa del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) no se conoce, aunque ciertos factores de riesgo demográfico están firmemente contrastados. Entre ellos se cuenta la edad. El SMSL suele producirse entre 1 mes y 1 año de edad, y el 90% de los casos se dan en los primeros 6 meses de vida. Además de la

edad, otros factores aumentan el riesgo. El sexo masculino, la raza negra, el bajo nivel socioeconómico familiar y la ausencia de problemas médicos subyacentes y de anomalías anatómicas favorecen la probabilidad de SMSL. El factor esencial que en este caso aboga por el SMSL es la falta de hallazgos en la autopsia que avalen otro diagnóstico. El SMSL puede relacionarse con anomalías de las vías neurales serotoninérgicas en el bulbo raquídeo, y el estimulador de las vías respiratorias (favorecedoras del sueño) puede aumentar la vulnerabilidad de los lactantes en riesgo.

42 **A** El tumor más frecuente durante la lactancia es el hemangioma, neoplasia benigna que constituye también un alto porcentaje de los tumores de la infancia. Aunque benignos, estos tumores son extensos y desfiguradores. Las fibromatosis son proliferaciones fibromatosas de tejido blando que forman masas sólidas. El linfangioma es otro tumor infantil benigno, que aparece en el cuello, el mediastino y el retroperitoneo. No es probable que los infiltrados como parte de los infiltrados leucémicos o de los linfomas aparezcan en la piel, aunque sí pueden encontrarse masas mediastínicas. La proliferación de neuroblastos se produce en el neuroblastoma, neoplasia infantil abdominal frecuente.

43 **C** Las neoplasias pediátricas son distintas de las de los adultos y bastante menos comunes. Cuanto antes se desarrolle la neoplasia maligna, mayor es la probabilidad de que presente características de las células embrionarias primitivas (blastos). Así pues, un tumor en cuyo nombre está presente el sufijo -*blastoma* es, con toda probabilidad, congénito o desarrollado en la primera infancia. En adultos, las neoplasias son a menudo estimuladas por influencias ambientales (carcinógenos, infecciones crónicas), que actúan durante muchos años, y las más habituales afectan a los epitelios (escamoso y glandular). Los sarcomas comprenden un mayor porcentaje de casos pediátricos que de casos adultos, aunque rara vez son congénitos. Las neoplasias malignas hematológicas, como la leucemia linfoblástica aguda, pueden registrarse en la infancia.

44 **E** Los teratomas son neoplasias benignas compuestas por tejidos derivados de las tres capas germinales embrionarias

(ectodermo, mesodermo, endodermo). Aparecen en localizaciones próximas a la línea media, de las cuales la sacrococcígea, correspondiente a la imagen de la figura, es la más común. Menos habituales son los teratomas inmaduros o manifiestamente malignos, con elementos neuroblásticos. Los hamartomas son lesiones infrecuentes y corresponden a masas compuestas por tejidos normalmente encontrados en una localización particular. Los hemangiomas forman lesiones cutáneas rojizo-azuladas, irregulares, planas y extensas. Los linfangiomas infantiles se localizan habitualmente en el lateral de la cabeza y el cuello. Los neuroblastomas son tumores malignos de la infancia que suelen desarrollarse en las glándulas suprarrenales.

45 **D** Este niño presenta un gen *RB1* heredado anómalo, en el que el otro alelo se ha perdido en una fase temprana de la vida, lo que ha provocado la pérdida de la supresión tumoral y el desarrollo de un retinoblastoma. Entre el 60 y el 70% de los retinoblastomas se asocian a mutaciones de la línea germinal. La aneuploidía suele generar pérdida fetal, aunque la monosomía X y las trisomías 13, 18 y 21 pueden dar lugar a nacidos vivos. Las translocaciones cromosómicas se registran en otras neoplasias, como la leucemia mieloide crónica, la leucemia promielocítica aguda y el linfoma de Burkitt. Las repeticiones de trinucleótidos no suelen asociarse a neoplasias. La herencia multifactorial se relaciona con enfermedades complejas, tales como diabetes mellitus, hipertensión y trastorno bipolar. La disomía uniparental es un mecanismo de desequilibrio cromosómico que rara vez es neoplásico, al igual que los defectos monogénicos ligados al cromosoma X.

46 **D** La amplificación del oncogén *MYCN (NMYC)* se produce en aproximadamente el 25% de los neuroblastomas y, cuanto mayor es el número de copias, peor es el pronóstico. Esta amplificación tiende a registrarse en neuroblastomas de alto grado o con deleciones en el cromosoma 1p. La hiperdiploidía, o cuasitriploidía, se asocia a ausencia de amplificación de *MYCN*, ausencia de deleción 1p y niveles elevados de expresión del receptor del factor de crecimiento nervioso TrkA. Todos ellos se asocian a buen pronóstico. Las malformaciones renales no se

relacionan con los neuroblastomas. La presencia de células ganglionares implica una diferenciación y un pronóstico mejores. Ciertos tumores pueden diferenciarse con el tiempo y transformarse en ganglioneuromas, bajo la influencia del TrkA.

47 **F** El síndrome WAGR es un trastorno infrecuente que incrementa el riesgo de padecer tumor de Wilms, una neoplasia infantil renal. En él hay una deleción del brazo corto del cromosoma 11 y pérdida de los genes contiguos. La pérdida de un alelo del gen supresor del tumor de Wilms *(WT1)* causa trastornos genitourinarios y es el primer «paso» para el desarrollo de dicho tumor. La deleción de una copia del gen *PAX6* induce aniridia y desarrollo anómalo del sistema nervioso central, con retraso mental. Algunas alteraciones renales, como el riñón en herradura, son propias del síndrome de Edwards (trisomía 18) pero no de las neoplasias. El síndrome de Marfan no se asocia a un mayor riesgo de neoplasia maligna. El cariotipo 47,XXY del síndrome de Klinefelter no comporta mayor riesgo de tumores renales. El síndrome de Patau (trisomía 13) se asocia a numerosas malformaciones, como la polidactilia postaxial y los defectos de la línea media, entre los que se cuentan el labio leporino y el paladar hendido, la ciclopía y la holoprosencefalia. El síndrome de Turner (monosomía X) afecta a mujeres y se asocia a numerosas alteraciones, como el higroma quístico, la coartación aórtica y malformaciones renales.

48 **C** Los restos nefrógenos pueden hallarse en el parénquima renal adyacente al tumor de Wilms. Se suponen precursores de lesiones, puesto que comparten alteraciones genéticas con dicho tumor. En presencia de tales restos, es mayor el riesgo de desarrollar tumores de Wilms en el riñón contralateral. La anaplasia en el tumor de Wilms es indicativa de mal pronóstico, aunque la tasa global de curación es del 90%. Las células ganglionares y las seudorrosetas son propias del neuroblastoma. Los supervivientes a largo plazo de tumor de Wilms tienen un mayor riesgo de padecer otras neoplasias malignas, incluso un sarcoma, aunque este no forma parte del tumor original.

UNIDAD II

Enfermedades de los sistemas orgánicos

Capítulo 11: Vasos sanguíneos
Capítulo 12: Corazón
Capítulo 13: Hematopatología de los leucocitos
Capítulo 14: Hematopatología de los eritrocitos y trastornos hemorrágicos
Capítulo 15: Pulmón
Capítulo 16: Cabeza y cuello
Capítulo 17: Tubo digestivo
Capítulo 18: Hígado y vía biliar
Capítulo 19: Páncreas
Capítulo 20: Riñón
Capítulo 21: Vías urinarias bajas y aparato genital masculino
Capítulo 22: Aparato genital femenino
Capítulo 23: Mama
Capítulo 24: Sistema endocrino
Capítulo 25: Piel
Capítulo 26: Huesos, articulaciones y tumores de tejidos blandos
Capítulo 27: Nervios periféricos y músculos esqueléticos
Capítulo 28: Sistema nervioso central
Capítulo 29: Ojo
Capítulo 30: Repaso final y evaluación

CAPÍTULO

11

Vasos sanguíneos

PEF9 Capítulo 11: Vasos sanguíneos

PH9 Capítulo 9: Vasos sanguíneos

1 Se encuentra una neoplasia maligna en la cavidad craneal. Tras realizar una biopsia, el examen microscópico muestra células malignas dentro de las luces vasculares. ¿Cuál de los siguientes tipos de vasos es más probable que se encuentre invadido por este cáncer?

A Arteriolas
B Capilares
C Linfáticos
D Arterias musculares
E Venas

2 Una mujer de 44 años presenta una presión arterial de 150/100 mmHg en una exploración física rutinaria tras un ataque isquémico transitorio (AIT). Las pruebas de laboratorio muestran normalidad en las concentraciones séricas de potasio, sodio y péptido natriurético, pero un aumento de la actividad de renina plasmática. La excreción fraccionada de sodio en orina es normal. ¿Cuál de las siguientes anomalías vasculares es más probable observar en una arteriografía renal?

A Disección arterial
B Fístula arteriovenosa
C Aneurisma sacular
D Estenosis focal y dilatación
E Lesión de tipo masa vascularizada

3 Una vénula dérmica con células endoteliales en estado basal resulta activada por la liberación de aminas biógenas por parte de los mastocitos en la anafilaxia. El compartimento de líquido extravascular aumenta de tamaño. ¿Cuál de los siguientes cambios

es más probable que ocurra en esas células endoteliales activadas?

A Contracción citoplásmica
B Formación de radicales libres
C Traducción de ARNm
D Síntesis de tromboxanos
E Elaboración de VEGF

4 Un hombre sano de 73 años ha experimentado leves mareos con episodios de desvanecimiento en los últimos 10 días. En la exploración, la presión arterial pasa de 135/90 en decúbito a 100/60 mmHg en sedestación. Las pruebas de laboratorio muestran que las concentraciones séricas de electrólitos son normales. ¿Cuál de los siguientes mecanismos reguladores de la presión arterial es más probable que se encuentre alterado en este hombre?

A Liberación de aldosterona
B Gasto cardíaco
C Volumen intravascular
D Síntesis de renina
E Tono simpático
F Vasoconstricción

5 Una mujer de 55 años ha sufrido episodios de cefalea de poca intensidad durante el último año, pero por lo demás se siente bien y no ha presentado enfermedades médicas importantes ni se ha sometido a intervenciones quirúrgicas en toda su vida. En la exploración física, la temperatura es de 37 °C, la frecuencia cardíaca, de 70 latidos/min, la frecuencia respiratoria, de 14 respiraciones/min, y la presión arterial, de 166/112 mmHg. En la auscultación pulmonar no hay ruidos añadidos y la frecuencia cardíaca es regular. Una ecografía abdominal revela que el riñón izquierdo es más pequeño que el derecho. La angiografía renal muestra una estenosis focal de la arteria renal izquierda. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que se encuentre en esta paciente?

A Título de anti-ADN bicatenario de 1:512
B Título de C-ANCA de 1:256
C Aumento de las crioglobulinas sanguíneas
D Glucemia plasmática de 200 mg/dl
E Elevación marcada del ARN del VIH
F Renina plasmática de 15 mg/ml/h

6 Se realiza un estudio clínico con un grupo de personas cuya presión arterial sistémica oscila siempre entre 145/95 y 165/105 mmHg. Se encuentra que tienen un aumento del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. Las angiografías renales no revelan hallazgos anómalos, y las TC abdominales no muestran masas. Las pruebas de laboratorio ponen de manifiesto que las concentraciones séricas de creatinina y nitrógeno ureico son normales. Las personas no toman medicamentos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que esté presente en este grupo de individuos?

A Sodio urinario reducido
B Elevación de la renina plasmática
C Hipopotasemia
D Aumento de las catecolaminas urinarias
E Ausencia de enzima conversora de angiotensina

7 Una mujer de 61 años fuma dos paquetes diarios de cigarrillos desde hace 40 años. Presenta disnea progresiva en los últimos 6 años. En la exploración física, las constantes vitales son: temperatura, 37,1 °C; frecuencia cardíaca, 60 latidos/min; frecuencia respiratoria, 18 respiraciones/min, con respiración trabajosa, y presión arterial, 130/80 mmHg. En la auscultación se aprecian sibilancias espiratorias bilaterales. La frecuencia cardíaca es regular. Una radiografía de tórax muestra aumento del volumen pulmonar, con aplanamiento de los hemidiafragmas, mayor transparencia en todos los campos pulmonares, prominencia de las arterias pulmonares y un borde prominente del lado derecho del corazón. Entre las pruebas de laboratorio se realiza una gasometría, que revela una P_{O_2} de 80 mmHg, una P_{CO_2} de 50 mmHg y un pH de 7,35. ¿Cuál de los siguientes hallazgos morfológicos es más probable que esté presente en sus arterias pulmonares?

A Depósito de amiloide
B Placas ateromatosas
C Desgarros de la íntima
D Esclerosis calcificada de la media
E Vasculitis necrosante
F Flebotrombosis

8 Un estudio de salud poblacional muestra que la prevalencia de hipertensión esencial ha ido en aumento en los últimos 10 años y

actualmente está presente en la cuarta parte de la población adulta. Se adopta una estrategia para reducir la prevalencia de hipertensión a través de cambios en el estilo de vida. ¿La disminución de la ingesta dietética de cuál de las siguientes sustancias es más probable que permita conseguir el objetivo?

A Alcohol
B Proteínas de origen animal
C Café
D Huevos
E Productos lácteos
F Sal
G Azúcar



9 Un hombre de 61 años refiere cansancio progresivo en el último año. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de creatinina sérica de 4,7 mg/dl y de nitrógeno ureico de 44 mg/dl. Una ecografía abdominal revela que los riñones son simétricamente más pequeños de lo normal. La figura muestra una imagen microscópica a gran aumento representativa de los

riñones. ¿De cuál de los siguientes trastornos subyacentes es más probable que sean indicativos estos hallazgos?

A Adenocarcinoma de colon
B Sepsis por *Escherichia coli*
C Panarteritis nudosa
D Endoarteritis sifilítica
E Hipertensión sistémica

10 Un hombre de 45 años lleva 11 años con hipertensión mal controlada, que oscila entre 150/90 y 160/95 mmHg. En los últimos 3 meses la presión arterial se ha elevado a 250/125 mmHg. En la exploración física, la temperatura es de 36,9 °C. La auscultación pulmonar no revela ruidos añadidos y la frecuencia cardíaca es regular. No hay dolor abdominal a la palpación. Una radiografía de tórax muestra un borde prominente en el lado izquierdo del corazón. Las pruebas de laboratorio ponen de manifiesto que la concentración de creatinina sérica ha aumentado en este período de 1,7 a 3,8 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes lesiones vasculares es más probable que se encuentre en los riñones de este paciente?

A Displasia fibromuscular
B Arteritis granulomatosa
C Estenosis arterial renal
D Arteriolitis necrosante
E Panarteritis nudosa

11 Una mujer de 57 años refiere dolor leve intermitente en la cadera derecha tras caerse por las escaleras. La exploración física revela una contusión de 3 cm sobre esa cadera. El área es dolorosa a la palpación, pero los movimientos de la pierna derecha son normales. Una radiografía de pelvis y muslo derecho no muestra fracturas, pero revela calcificaciones en las ramas arteriales pélvicas de tamaño intermedio. ¿De qué es más probable que sea representativo este hallazgo radiológico?

A Observación incidental
B Hipertensión esencial benigna
C Mayor riesgo de necrosis gangrenosa
D Diabetes mellitus de larga evolución
E Hiperparatiroidismo no sospechado

12 Se realiza un estudio de los factores de riesgo de aterogenia en adultos. Se encuentran factores químicos asociados a una

reducción del colesterol sérico. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que reduzca la concentración de colesterol sérico?

A Proteína C reactiva
B Homocisteína
C Lipoproteína(a)
D Ácidos grasos ω-3
E Grasas *trans* insaturadas

13 Se lleva a cabo un estudio de cohortes con hombres y mujeres adultos sanos de 20 años. Se les sigue para valorar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares ateroescleróticas. Durante este estudio se realizan múltiples pruebas de laboratorio anualmente. ¿Un aumento de cuál de las siguientes sustancias es más probable que sea indicativo del máximo riesgo relativo de desarrollar una de esas enfermedades?

A Antiproteinasa 3 (PR3)
B Proteína C reactiva (CRP)
C Crioglobulina
D Velocidad de sedimentación globular (VSG)
E Recuento de plaquetas

14 Un hombre de 58 años sufrió un infarto de miocardio hace 1 año, que fue la primera enfermedad grave de su vida. Actualmente desea prevenir otro episodio coronario agudo y se le recomienda que inicie un programa de ejercicio y cambie su dieta. ¿La reducción de la concentración sérica de cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio sería más indicativa del éxito de la dieta y del régimen de ejercicio 1 año después?

A Calcio
B Colesterol
C Glucosa
D Potasio
E Renina

15 Una mujer de 35 años tiene fama de ser perfeccionista. Presenta angina de pecho durante los últimos 6 meses. En la exploración física, la presión arterial es 135/85 mmHg. Mide 168 cm y pesa 82 kg (IMC, 29). Su HbA_{1c} es del 9% y la concentración de glucosa sérica en ayunas es de 143 mg/dl. La angiografía coronaria muestra una estenosis del 75% de la rama descendente anterior de la arteria coronaria izquierda y estenosis del 70% en la arteria

coronaria derecha. Se realiza una angioplastia con colocación de endoprótesis vasculares. ¿Cuál de los siguientes es el mayor factor de riesgo en la génesis de su enfermedad?

A Edad
B Diabetes mellitus
C Obesidad
D Estilo de vida sedentario
E Personalidad de tipo A

16 Un experimento estudia el desarrollo precoz de los ateromas. Las estrías lipídicas en las paredes arteriales son examinadas microscópica y bioquímicamente para determinar sus componentes celulares y químicos y los factores promotores de su formación. Las lesiones iniciales muestran una mayor unión de monocitos al endotelio. Los monocitos migran por debajo del endotelio y se convierten en macrófagos; estos macrófagos se autotransforman en células espumosas. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que sea responsable de la transformación de los macrófagos?

A Proteína C reactiva
B Homocisteína
C Lp(a)
D LDL oxidada
E Factor de crecimiento derivado de plaquetas
F VLDL

17 Un hombre de 29 años lleva 1 año con angina. Hay antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. En la exploración, la presión arterial es de 120/80 mmHg. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de colesterol sérico total de 185 mg/dl y de glucosa de 85 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que presente una mutación génica en la familia de este hombre?

A Angiotensina
B Apolipoproteína
C Endotelina
D Factor VIII
E Factor de von Willebrand

18 Se realiza un estudio de personas con concentraciones de colesterol de LDL por encima de 160 mg/dl. Se encuentra que

tienen una mayor cantidad de LDL oxidada depositada en las arterias. Como consecuencia, la luz arterial está reducida de tamaño, especialmente en los puntos de ramificación. ¿Cuál de las siguientes alteraciones patológicas es más probable que se desarrolle inicialmente en esas áreas de estenosis arterial?

A Rotura de las células endoteliales
B Engrosamiento de la íntima
C Infiltrados de linfocitos
D Agregación plaquetaria
E Hipertrofia de músculo liso

19 Un hombre de 50 años tiene antecedentes de angina de pecho durante el ejercicio de 2 años de evolución. En la exploración física, la presión arterial es de 135/75 mmHg, y su frecuencia cardíaca, de 79 latidos/min, ligeramente irregular. La coronariografía muestra una estenosis permanente del 75% de la rama descendente anterior de la coronaria izquierda. Tiene varios factores de riesgo de ateroesclerosis: es fumador y presenta hipertensión e hipercolesterolemia. ¿Cuál de los siguientes fenómenos se deriva más precozmente de los efectos de dichos factores?

A Alteración de la regulación del tono vasomotor
B Conversión de las células de músculo liso en células espumosas
C Disfunción por lesión endotelial
D Inhibición de la oxidación de LDL
E Modificación de los receptores hepáticos de lipoproteínas



20 Un niño de 12 años falleció por las complicaciones de una leucemia linfoblástica aguda. No tenía antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares. La figura muestra la imagen macroscópica de la aorta en la autopsia. ¿Cuál de las siguientes características es más probable que se encuentre en el examen histológico de las marcas lineales pálidas?

- A Corona de células de músculo liso sobre un núcleo de restos lipídicos
- B Acumulación de células espumosas con necrosis y calcificación
- C Tejido de granulación con un núcleo lipídico y áreas de hemorragia
- D Células espumosas llenas de lípidos y un pequeño número de linfocitos T
- E Hendiduras de colesterol rodeadas de una proliferación de

células de músculo liso y espumosas

21 Un estudio de las placas ateromatosas muestra que la liberación de factores de crecimiento, como PDGF, FGF y TNF-α, provoca una mayor producción de matriz extracelular. En consecuencia, el tamaño de las placas aumenta. ¿Cuál de las siguientes células es más probable que libere estos factores de crecimiento en las placas?

A De endotelio
B Fibroblasto
C Plaqueta
D De músculo liso
E Linfocito T



22 Una mujer de 58 años lleva 1 año con dolor torácico de reposo. En la exploración física, la frecuencia cardíaca es de 80 latidos/min e irregular. La figura muestra una imagen microscópica representativa de la arteria descendente anterior izquierda. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que esté implicado en la patogenia del proceso mostrado?

A Aumento del número de plaquetas
B Colesterol de HDL bajo
C Lp(a) baja
D Homocisteína plasmática baja

E VDRL positiva

23 En un modelo experimental de ateroesclerosis, se observa que las placas cambian lenta pero constantemente de tales modos que pueden promover episodios clínicos, incluidos síndromes coronarios agudos. En algunos casos, los cambios no se asociaban significativamente a un síndrome coronario agudo. ¿Cuál de las siguientes modificaciones de las placas es más probable que conlleve esa asociación?

A Depósito de calcio
B Hemorragia en el espesor de la placa
C Agregación plaquetaria intermitente
D Adelgazamiento de la media
E Úlcera en la superficie de la placa

24 Una mujer de 59 años con diabetes mellitus de tipo 2 presenta un episodio de dolor torácico de esfuerzo. En la exploración, el IMC es de 30. La angiografía revela un estrechamiento proximal de la arteria coronaria con estenosis de hasta el 70%. ¿Cuál de los siguientes compuestos farmacológicos pautado diariamente en dosis bajas es más adecuado para reducir su riesgo de infarto de miocardio?

A Paracetamol
B Ácido acetilsalicílico
C Ibuprofeno
D Paclitaxel
E Propranolol

25 Un hombre de 84 años con antecedentes de tabaquismo de larga evolución tuvo un pequeño infarto de miocardio hace 2 años. Ahora refiere dolor torácico y en las piernas con el ejercicio. En la exploración física, las constantes vitales son: temperatura, 37,1 °C; frecuencia cardíaca, 81 latidos/min; frecuencia respiratoria, 15 respiraciones/min, y presión arterial, 165/100 mmHg. Los pulsos periféricos son malos en las extremidades inferiores. Se encuentra una masa pulsátil de 7 cm en la línea media de la parte baja del abdomen. Las pruebas de laboratorio revelan dos determinaciones de glucosa sérica en ayunas de 170 y 200 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes lesiones vasculares es más probable que tenga este paciente?

A Disección de la aorta

B Fístula arteriovenosa
C Aneurisma ateroesclerótico
D Panarteritis nudosa
E Arteritis de Takayasu
F Tromboangitis obliterante



26 Un hombre de 41 años lleva 1 semana con dolor abdominal progresivo. En la exploración física, las constantes vitales son: temperatura, 36,9 °C; frecuencia cardíaca, 77 latidos/min; frecuencia respiratoria, 16 respiraciones/min, y presión arterial, 140/90 mmHg. Una TC abdominal muestra los hallazgos de la figura. ¿Cuál de las siguientes enfermedades de base es más probable en este paciente?
A Diabetes mellitus
B Síndrome de Marfan
C Panarteritis nudosa
D Lupus eritematoso sistémico
E Sífilis

27 Un hombre de 77 años presenta demencia progresiva y ataxia de la marcha desde hace 9 años. Fallece por una bronconeumonía. La

autopsia muestra que la raíz y el cayado de la aorta torácica están dilatados, lo que confiere confiriendo la superficie de la íntima una imagen en «corteza de árbol». El examen microscópico de la aorta revela una endoarteritis obliterante de los vasos vaculares. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que esté registrado en la historia clínica de este paciente?

A Anticuerpos contra *Treponema pallidum*
B Título de ADN bicatenario positivo con 1:512
C Cetonuria de 4+
D P-ANCA positivos con 1:1.024
E Velocidad de sedimentación de 105 mm/h



28 Un hombre de 23 años refiere dolor torácico intenso y punzante de inicio brusco. En la exploración física, la temperatura es de 36,9 °C, y los pulmones no presentan ruidos sobreañadidos en la auscultación. La radiografía de tórax muestra ensanchamiento del mediastino. Un ecocardiograma transesofágico revela dilatación de la raíz y el cayado de la aorta, con un desgarro en la íntima situado 2 cm distal a los grandes vasos. La figura presenta una imagen microscópica representativa de la aorta con tinción elástica. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es la causa más probable de estos hallazgos?

A Vasculitis asociada a ANCA

B Diabetes mellitus de inicio en la edad adulta
C Síndrome de Marfan
D Esclerodermia difusa
E Hipertensión sistémica
F Arteritis de Takayasu

29 Un hombre de 59 años presenta bruscamente un dolor torácico intenso que se irradia a la espalda. En la exploración física la presión arterial es de 170/110 mmHg. Los tonos cardíacos están apagados. Se observa pulso paradójico. Se realiza una pericardiocentesis y se obtiene sangre. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que haya tenido lugar en la aorta?

A Aneurisma
B Arterioloesclerosis
C Disección
D Trombosis
E Vasculitis

30 Un hombre de 75 años lleva 2 meses sufriendo cefaleas. En la exploración física, las constantes vitales son: temperatura, 37 °C; frecuencia cardíaca, 68 latidos/min; frecuencia respiratoria, 15 respiraciones/min, y presión arterial, 130/85 mmHg. La arteria temporal derecha es prominente, palpable y dolorosa al tacto. La frecuencia cardíaca es regular y no hay soplos. Su velocidad de sedimentación globular es de 100 mm/h. Se realiza una biopsia de la arteria temporal, y el segmento de arteria resecado está engrosado a simple vista y muestra inflamación granulomatosa focal al microscopio. El paciente responde bien al tratamiento con corticoesteroides. ¿Cuál de las siguientes complicaciones de esta enfermedad es más probable que suceda en los pacientes no tratados?

A Ceguera
B Gangrena de los dedos de los pies
C Hemoptisis
D Hipertensión maligna
E Insuficiencia renal

31 Una mujer de 32 años presenta frialdad e hipoestesia de los brazos y menor visión en el ojo derecho desde hace 5 meses. En la exploración física no tiene fiebre. La presión arterial es 100/70

mmHg. Los pulsos radiales no son palpables, pero los femorales laten fuertes. Refiere menor sensibilidad en los brazos, cianóticos, sin calor ni tumefacción. Una placa de tórax muestra un borde prominente del lado derecho del corazón y prominencia de las arterias pulmonares. Las pruebas de laboratorio revelan glucosa sérica, 74 mg/dl; creatinina, 1 mg/dl; colesterol sérico total, 165 mg/dl, y resultado negativo en la prueba de ANA. La enfermedad permanece estable el año siguiente. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Disección de la aorta
B Enfermedad de Kawasaki
C Polivasculitis microscópica
D Sífilis
E Arteritis de Takayasu
F Tromboangitis obliterante

32 Un hombre de 43 años lleva 1 mes con malestar general, fiebre y pérdida de 4 kg de peso. En la exploración física, la presión arterial es de 145/90 mmHg y tiene dolor abdominal difuso, sin masas ni hepatoesplenomegalia. Las pruebas de laboratorio revelan una concentración sérica de nitrógeno ureico de 58 mg/dl y de creatinina de 6,7 mg/dl. La angiografía renal muestra trombosis en la arteria renal derecha, y la arteria renal izquierda y sus ramas presentan estenosis luminales segmentarias con dilatación aneurismática focal. En la hemodiálisis, 1 semana después, tiene dolor abdominal y diarrea, y se constata la presencia de melena. ¿Cuál de los siguientes parámetros serológicos de laboratorio es más probable que resulte positivo en este paciente?

A ANA
B C-ANCA
C VIH
D HBsAg
E Scl-70
F RPR

33 Una niña de 3 años de Osaka, Japón, presenta fiebre y exantema y tumefacción de manos y pies desde hace 2 días. En la exploración física, la temperatura es de 37,8 °C. Hay un exantema cutáneo con descamación, eritema oral, eritema de palmas y plantas, edema de manos y pies, y adenopatías cervicales. La niña mejora con un ciclo

de tratamiento a base de inmunoglobulinas intravenosas. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que complique la enfermedad de esta niña si no se trata?

A Asma
B Glomerulonefritis
C Hemorragia intracraneal
D Infarto de miocardio
E Hipertensión pulmonar

34 Un hombre de 50 años presenta tos crónica en los últimos 18 meses. La exploración física revela úlceras nasofaríngeas, y en la auscultación pulmonar se escuchan crepitantes difusos bilaterales. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de nitrógeno ureico sérico de 75 mg/dl y creatinina de 6,7 mg/dl. En el análisis de orina hay 50 eritrocitos por campo de gran aumento y cilindros eritrocíticos. El título serológico de C-ANCA (proteinasa 3) está elevado. La radiografía de tórax pone de manifiesto múltiples nódulos pulmonares bilaterales de pequeño tamaño. Una biopsia pulmonar transbronquial revela un proceso inflamatorio necrosante que afecta a las pequeñas arterias y arteriolas pulmonares periféricas. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Granulomatosis con polivasculitis
B Displasia fibromuscular
C Granuloma piógeno
D Sarcoma de Kaposi
E Panarteritis nudosa
F Arteritis de Takayasu

35 Un hombre de 50 años con dolor muscular y fiebre de 1 mes de duración observa que la orina es más oscura en las últimas 2 semanas. En la exploración física presenta lesiones purpúricas palpables en la piel. El análisis de orina revela hematuria y proteinuria. Entre los hallazgos de las pruebas de laboratorio en suero destaca una crioglobulinemia mixta con un aumento policlonal de IgG, así como un título elevado de autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, principalmente antimieloperoxidasa (MPO-ANCA o P-ANCA). Se realiza una biopsia de piel. ¿Cuál de los siguientes hallazgos anatomopatológicos es más probable observar en esta biopsia?

A Células gigantes y macrófagos
B Necrosis fibrinoide de la media
C Microabscesos
D Aneurismas micóticos
E Infiltrados eosinófilos perivasculares

36 Un hombre de 33 años fuma dos paquetes de cigarrillos al día desde la adolescencia. Presentó trombosis dolorosa de las venas superficiales de las piernas durante 1 mes y episodios en los cuales los dedos de las manos se quedan fríos y de color azulado. Al año siguiente, desarrolló úlceras crónicas en los pies que apenas cicatrizaron. Uno de los dedos del pie sufrió gangrena y fue amputado. Histológicamente, en el borde de resección, hay una vasculitis aguda y crónica en las arterias de tamaño intermedio, con afectación segmentaria. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas es el paso más apropiado que debe darse con este paciente?

A Antibióticos
B Corticoesteroides
C Hemodiálisis
D Insulina
E Abandono del hábito tabáquico

37 Un niño de 8 años lleva 10 días con dolor abdominal y orinas oscuras. La exploración física muestra lesiones cutáneas en manchas de color púrpura en el tronco y las extremidades. El análisis de orina revela hematuria y proteinuria. Las pruebas serológicas son negativas para MPO-ANCA (P-ANCA) y PR3-ANCA (C-ANCA). Una biopsia cutánea pone de manifiesto vasculitis necrosante de los pequeños vasos dérmicos. En la muestra de biopsia renal se encuentran complejos inmunitarios depositados en los glomérulos, con algunos complejos ricos en IgA. ¿Qué diagnóstico es más probable?

A Arteritis de células gigantes
B Púrpura de Henoch-Schönlein
C Panarteritis nudosa
D Arteritis de Takayasu
E Telangiectasias

38 Una mujer de 35 años con antecedentes de adicción a drogas por vía parenteral desarrolla fiebre alta el día anterior. En la

exploración, la temperatura es de 37,6 °C. Se ausculta un soplo cardíaco. Se obtiene un hemocultivo y en él se detecta el crecimiento de *Staphylococcus aureus.* La mujer desarrolla cefalea intensa. Una TC craneal muestra hemorragia intracraneal. ¿Cuál de las siguientes complicaciones vasculares es más probable que se haya producido en el encéfalo?

A Angiomatosis bacilar
B Arterioloesclerosis hiperplásica
C Linfangitis
D Aneurisma micótico
E Flebotrombosis



39 Una mañana, una mujer de 60 años observó la alteración mostrada en la figura cuando estaba conduciendo camino del trabajo. Había dolor e hipoestesia asociados. A los 20 min de estar con calor en la oficina, los problemas desaparecieron. ¿Cuál de los siguientes fenómenos patológicos es más probable que produzca esos hallazgos?

A Calcificación
B Hipertensión
C Trombosis
D Vasculitis

E Vasoconstricción

40 Una mujer sana de 21 años que está en la semana 34 de una gestación normal refiere prurito con dolor quemante en la región perianal en los últimos 4 meses. La semana anterior observó una pequeña cantidad de sangre roja brillante en el papel higiénico. ¿Cuál de los siguientes trastornos subyacentes es más probable que tenga la paciente?

A Filariasis
B Panarteritis nudosa
C Hemorroides externas
D Cirrosis micronodular
E Adenocarcinoma rectal

41 Una mujer de 69 años ha permanecido encamada en las últimas 2 semanas para recuperarse de un episodio de neumonía vírica complicada con neumonía bacteriana. La exploración física actual muestra tumefacción y dolor a la palpación de la pierna derecha, que empeoran cuando la levanta o la mueve. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor el trastorno que afecta a la pierna derecha?

A Coagulación intravascular diseminada
B Linfoedema
C Tromboangitis obliterante
D Trombosis de venas profundas
E Venas varicosas

42 Una mujer sana de 54 años ha notado que las antiestéticas venas dilatadas superficiales de ambas piernas se han ido haciendo cada vez más prominentes a lo largo de los últimos 5 años. La exploración física revela una temperatura de 37 °C, una frecuencia cardíaca 70 latidos/min, una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones/min y una presión arterial de 125/85 mmHg. No hay dolor, tumefacción ni dolor a la palpación en las piernas. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que se produzca como consecuencia del trastorno?

A Atrofia de los músculos de las piernas
B Coagulación intravascular diseminada
C Necrosis gangrenosa de las piernas
D Tromboembolia pulmonar
E Dermatitis de estasis con úlceras

43 Una mujer de 48 años ha desarrollado hinchazón y tumefacción persistentes del brazo izquierdo tras someterse a una mastectomía con disección de los ganglios axilares por cáncer de mama hace 1 año. Presentó una celulitis del brazo izquierdo hace 3 meses. La exploración física muestra piel firme en ese brazo y tejido blando subyacente «empastado». El brazo no es doloroso ni tiene un color distinto. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor esos hallazgos?

A Linfoedema
B Trombosis de la arteria subclavia
C Tromboflebitis
D Embolización tumoral
E Vasculitis

44 Un hombre de 50 años se corta el dedo índice derecho con un fragmento de metal afilado mientras estaba limpiando la puerta de un canal de riego. El corte deja de sangrar a los 3 min, pero 6 h después presenta un dolor progresivamente mayor en el brazo derecho, por lo que consulta a su médico. En la exploración física la temperatura es de 38 °C. Se extienden líneas rojas desde la mano derecha hasta el brazo, que está hinchado y doloroso a la palpación. En la axila derecha se palpan múltiples bultos dolorosos al tacto. En un hemocultivo crecen estreptococos β-hemolíticos del grupo A. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor el proceso que está teniendo lugar en el brazo derecho del paciente?

A Capilaritis
B Linfangitis
C Linfoedema
D Flebotrombosis
E Panarteritis nudosa
F Tromboflebitis
G Varices

45 Un hombre de 46 años ha notado un aumento progresivo del perímetro abdominal en los últimos 15 meses. La exploración física revela múltiples lesiones cutáneas en la zona superior del tórax, cuyo centro es pulsátil; miden 0,5-1,5 cm del centro a la periferia. Al presionar sobre el centro las arteriolas subcutáneas dispuestas radialmente, estas empalidecen. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de glucosa sérica de 112

mg/dl; de creatinina de 1,1 mg/dl; de proteínas totales de 5,8 g/dl, y de albúmina de 3,4 g/dl. ¿Cuál de las siguientes enfermedades subyacentes es más probable que tenga este paciente?

A Sida
B Diabetes mellitus
C Granulomatosis con polivasculitis
D Síndrome de Marfan
E Cirrosis micronodular

46 Una mujer de 21 años está en el tercer trimestre de una gestación que cursa sin complicaciones. Nota un nódulo en la boca, el cual ha aumentado de tamaño durante las últimas 2 semanas. En la exploración física se aprecia un nódulo rojo de 1 cm en la encía lateral izquierda por debajo del primer molar. El nódulo involuciona después del parto. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable para este nódulo?

A Angiomatosis bacilar
B Hemangioma capilar
C Linfangioma cavernoso
D Tumor glómico
E Sarcoma de Kaposi



47 Un niño de 10 años tiene una lesión circunscrita de 2 cm,

esponjosa y de color rojo mate en la zona superoexterna del brazo izquierdo. Los padres refieren que esta lesión ha estado presente desde la lactancia y su aspecto no ha variado apreciablemente. Se reseca la lesión; en la figura se muestra su imagen microscópica. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Angiosarcoma
B Hemangioma
C Sarcoma de Kaposi
D Linfangioma
E Telangiectasia

48 Un niño de 6 años previamente sano ha desarrollado un aumento progresivo del tamaño del cuello en el último año. La exploración física revela una masa blanda mal definida que deforma el lado izquierdo del cuello, sin otras anomalías. Se intenta la resección quirúrgica de la masa de 10 cm, pero los bordes de la lesión no están delimitados. El examen histológico del tejido resecado muestra espacios dilatados llenos de un líquido lechoso y rodeados por finas paredes de tejido conjuntivo. Microscópicamente, los espacios están revestidos por endotelio aplanado y rodeados de tejido colágeno y músculo liso con acumulaciones de linfocitos pequeños. ¿Cuál de las siguientes evoluciones es más probable que siga la lesión descrita en este niño?

A Metástasis a distancia
B Recidiva local
C Más neoplasias en otras zonas
D Infección oportunista
E Transformación sarcomatosa



49 Un hombre de 35 años tiene el VIH desde hace 10 años. La exploración física actual muestra múltiples lesiones cutáneas nodulares, de color púrpura rojizo, con la imagen microscópica mostrada en la figura. Estas lesiones han aumentado lentamente en el último año. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que intervenga en el desarrollo de estas lesiones cutáneas?

A Tratamiento antirretrovírico
B Infección por el virus de Epstein-Barr
C Hiperlipidemia
D Infección por el complejo *Mycobacterium avium*
E Coito

50 Una mujer de 67 años con intolerancia a la glucosa, hipertensión, hiperlipidemia y obesidad central presenta disnea progresiva por empeoramiento de su insuficiencia cardíaca congestiva. La ecocardiografía muestra una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 25%. Se realiza una angioplastia coronaria transluminal percutánea y se inserta una endoprótesis vascular con paclitaxel en la arteria descendente anterior izquierda. ¿Cuál de las siguientes complicaciones a largo plazo en la arteria coronaria es más probable que prevenga el paclitaxel?

A Angiosarcoma
B Angiomatosis bacilar
C Degeneración quística de la media

D Arteritis de células gigantes
E Reestenosis proliferativa
F Tromboangitis obliterante

51 Una mujer de 73 años con hiperhomocisteinemia refiere mala circulación en la pierna izquierda de 2 años de evolución. En la exploración, apenas se palpan los pulsos pedio y tibial posterior. La angiografía por TC revela una estenosis del 90% en la arteria ilíaca izquierda. ¿Cuál de las siguientes intervenciones sería más eficaz para tratar a esta mujer?

A Injerto de derivación arterial
B Tratamiento con clopidogrel
C Endoprótesis vascular
D Injerto sintético
E Injerto de derivación venoso

Respuestas

1 **E** Las paredes de las venas son delgadas en comparación con su diámetro, con menos capas definidas y flujo sanguíneo lento. Estas características hacen que sean más susceptibles a la compresión e invasión por neoplasias malignas. Esta es una vía para las metástasis por diseminación hematógena. De las demás opciones, la invasión linfática sería una elección excelente, pero la localización intracraneal que plantea la pregunta excluye los canales linfáticos, que son extracraneales en la cabeza. Las neoplasias pueden elaborar factores de crecimiento que promueven la proliferación endotelial y la formación de capilares para formar un soporte vascular estromal con vistas a su crecimiento mantenido. La invasión de una arteria muscular por parte de las neoplasias es un fenómeno infrecuente.

2 **D** La displasia fibromuscular (DFM) suele afectar a las arterias renales y carótidas. La estenosis de la arteria renal activa el sistema renina-angiotensina, con lo que provoca hipertensión. En la angiografía, la DFM aparece en forma de «rosario» debido a la hiperplasia focal de la media con crestas fibromusculares engrosadas adyacentes a áreas menos afectadas de la pared arterial. Esta es una causa de hipertensión corregible quirúrgicamente. La disección arterial es más frecuente en la aorta proximal con factores de riesgo de hipertensión y

degeneración quística de la media. Las fístulas arteriovenosas y los aneurismas saculares pueden ser intracraneales, romperse y sangrar. Es posible que los carcinomas de células renales estén muy vascularizados, pero es improbable que la arteria renal principal resulte obstruida por un efecto de masa focal, y no explican el AIT. La hipertensión podría provocar, en último término, ateroesclerosis con lesiones estenóticas arteriales sin dilatación focal.

3 **A** Un endotelio activado puede sufrir muchos cambios. En la situación aguda de la anafilaxia, la contracción endotelial provoca en minutos la salida de líquido intravascular al compartimento extravascular, lo que causa edema, pero esto también es rápidamente reversible, porque no se ha producido una lesión vascular permanente. La formación de radicales libres es más característica de la disfunción endotelial cuando los agresores llevan meses o años actuando, como sucede en la aterogenia. La lesión endotelial secundaria a inflamación con los días puede llevar a la regulación al alza de la síntesis proteínica y a la liberación de reguladores de trombogenia. La lesión vascular puede promover la formación de factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) pero, en la situación basal, los procoagulantes, los anticoagulantes, las citocinas y los factores de crecimiento se elaboran en escasa cuantía y en equilibrio.

4 **C** La pregunta describe una hipotensión ortostática. La reducción del volumen intravascular debido a pérdida de líquidos (sudoración, diuresis, vómitos, diarrea) o menor ingesta de líquidos conduce a la deshidratación. Las demás opciones reseñadas no son capaces de actuar con la rapidez o intensidad necesarias para compensar la falta de volumen del líquido intravascular. Los discretos cambios en el agua corporal total y la sal que intervienen en la hipertensión esencial no quedan reflejados por una alteración de los electrólitos. Los vómitos y la diarrea podrían alterar el estado acidobásico y los electrólitos, pero esto no sucede en este caso. La autorregulación por el tono simpático y la vasoconstricción arteriolar consiguen ajustar rápidamente la presión arterial y el flujo, aunque la velocidad y la magnitud de este fenómeno disminuyen con la edad. Los ajustes en la síntesis y la liberación de hormonas, como la renina

y la aldosterona, tardan días en producirse.

5 **F** Este es un ejemplo clásico de una hipertensión secundaria para la que es posible determinar una causa. En este caso, la estenosis de la arteria renal reduce el flujo sanguíneo glomerular y la presión en la arteriola aferente, lo que provoca la liberación de renina por parte de las células yuxtaglomerulares. La renina pone en marcha la vasoconstricción inducida por la angiotensina II, el aumento de la resistencia vascular periférica y el incremento de la aldosterona, que promueve la reabsorción de sodio en el riñón, con el consiguiente aumento del volumen sanguíneo. Los anti-ADN bicatenarios son un marcador específico del lupus eritematoso sistémico. Los autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) son marcadores de algunos tipos de vasculitis, como la polivasculitis microscópica o la vasculitis asociada a ANCA. Algunos pacientes con infección por hepatitis B o C desarrollan una crioglobulinemia mixta con un aumento policlonal de IgG. La afectación renal es frecuente en esos pacientes, y la vasculitis crioglobulinémica provoca hemorragias y úlceras en la piel. La hiperglucemia es un marcador de diabetes mellitus, que acelera el proceso aterógeno y puede afectar a los riñones, por lo general bilateralmente, y promover el desarrollo de hipertensión. La infección por el VIH no se relaciona con hipertensión.

6 **A** El término *hipertensión esencial* (aplicado actualmente cuando no existe una causa obvia de una hipertensión moderada) se acuñó antes de conocer el control hormonal de la presión arterial, porque se creía que la presión elevada era esencial para impulsar a la sangre a través de las arterias estrechadas. Se han postulado varias teorías para la causa de la hipertensión esencial. Una de ellas es la presencia de defectos en la homeostasis renal del sodio, que reduce la excreción renal de este ión. Los riñones retienen sodio con agua, aumentando así el volumen de líquido intravascular, lo que conduce a un incremento del gasto cardíaco. Este gasto cardíaco mayor se compensa elevando la resistencia vascular periférica, lo que causa un aumento de la presión arterial. Si no hubiera enzima conversora de angiotensina (ECA), la presión arterial disminuiría porque la angiotensina I no se convertiría en

angiotensina II (los fármacos que actúan inhibiendo la ECA son antihipertensivos). El aumento de concentración de la renina plasmática es característico de la hipertensión renovascular, que puede producirse en la estenosis de una arteria renal. Es posible, además, que los pacientes hipertensos con hipopotasemia tengan hiperaldosteronismo, causado por un adenoma suprarrenal secretor de aldosterona. Un aumento de las catecolaminas urinarias podría indicar una mayor producción de catecolaminas por parte de un feocromocitoma.

7 **B** La vasculatura pulmonar está sometida a una presión mucho menor que la circulación arterial sistémica y es menos probable que sufra lesiones endoteliales, que promueven la aterogenia. La ateroesclerosis en las arterias sistémicas es más frecuente en aquellas zonas donde el flujo sanguíneo es más turbulento, como en los puntos de ramificación arterial, por ejemplo, en los primeros centímetros de las arterias coronarias o en las ramas abdominales de la aorta. Los factores impulsores de la ateroesclerosis arterial sistémica (p. ej., hiperlipidemia, tabaquismo, diabetes mellitus e hipertensión sistémica) no operan en la vasculatura arterial pulmonar. La hipertensión pulmonar es el factor que favorece la ateroesclerosis pulmonar y tiene lugar si aumenta la resistencia vascular pulmonar, cuando el lecho vascular pulmonar disminuye por enfermedades obstructivas (p. ej., enfisema, como en esta paciente) o restrictivas (p. ej., esclerodermia con fibrosis intersticial pulmonar). El depósito de amiloide suele producirse en pequeños vasos y está causado por trastornos subyacentes como mieloma múltiple o enfermedades inflamatorias crónicas. Los desgarros de la íntima provocan disección arterial. La arterioesclerosis de Mönckeberg suele ser un hallazgo incidental en arteriolas sistémicas. La vasculitis necrosante de la vasculatura pulmonar se produce en casos de vasculitis granulomatosa asociada a autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA). La flebotrombosis afecta a venas periféricas y es un factor de riesgo de tromboembolia pulmonar.

8 **F** Es muy difícil mantener la ingesta dietética de sodio por debajo de 2 g/día porque los alimentos procesados y envasados tienen una cantidad considerable de sal como conservante y

saborizante. Solo 30 g de patatas fritas de bolsa tienen más de 150 mg de sodio. ¡Incluso una lata de sopa «saludable» puede contener 0,5 g de sodio! Es posible que una reducción de la excreción renal de sodio inicie la hipertensión esencial. El descenso de la excreción de sodio conduciría secuencialmente a un aumento del volumen de líquido, a un mayor gasto cardíaco y a vasoconstricción periférica, elevándose así la presión arterial. Una ingesta de sal aumentada potencia la hipertensión. Aunque el consumo de alcohol tal vez reduzca la aterogenia, hay mayor riesgo tanto de miocardiopatía como de hepatopatía. La reducción de la ingesta de proteínas sería útil para pacientes con insuficiencia renal crónica. La cafeína del café tiene efectos neuroendocrinos, pero son la leche y el azúcar añadidos los que resultarían más perniciosos. Los huevos contienen colesterol. La leche es una buena fuente de calcio, pero tiene, además, grasas saturadas y colesterol, y, por tanto, aumenta el riesgo de aterogenia. En cuanto al azúcar (sacarosa y fructosa), dado su alto índice glucémico, es más probable que conduzca al aumento de peso.

9 **E** La figura muestra una arteriola con engrosamiento hialino marcado de la pared, indicativo de arterioloesclerosis hialina. La diabetes mellitus también puede provocar este hallazgo, observado con más frecuencia en los riñones. La sepsis puede producir coagulación intravascular diseminada con trombos hialinos en las arteriolas. El debilitamiento que acompaña al cáncer tiende a disminuir las alteraciones vasculares causadas por la ateroesclerosis. La sífilis causa una vasculitis que afecta a los vasos vasculares de la aorta. La panarteritis puede afectar a arterias de tamaño intermedio y grande en muchos órganos, incluidos los riñones; los vasos afectados muestran necrosis fibrinoide e inflamación de la pared (vasculitis).

10 **D** La hipertensión maligna puede complicar súbitamente y superponerse a una hipertensión esencial benigna menos grave. Las arteriolas sufren un proceso de engrosamiento concéntrico y estrechamiento de la luz con la hipertensión maligna, denominado arterioloesclerosis hiperplásica, y la necrosis fibrinoide es una característica destacada. La displasia fibromuscular puede afectar a las arterias renales principales,

con hiperplasia de la media, que produce obstrucción arterial focal. Este proceso provoca hipertensión, pero habitualmente no es maligna. La arteritis granulomatosa es más característica de las vasculitis granulomatosas asociadas a autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), que a menudo afectan al riñón, pero que característicamente alteran el pulmón y otros órganos. La arterioloesclerosis hialina se observa en la hipertensión esencial crónica de gravedad moderada. Estas lesiones dan lugar a la nefroesclerosis benigna. Los riñones afectados disminuyen simétricamente de tamaño y se vuelven granulares por la pérdida progresiva de parénquima renal y las cicatrices delgadas consiguientes. La panarteritis nudosa produce una vasculitis que puede afectar al riñón.

11 **A** Los ancianos con arterias calcificadas evidenciadas radiográficamente suelen tener arterioesclerosis de Mönckeberg, de comienzo en la lámina elástica interna. Se trata de un proceso benigno que constituye una forma de arterioesclerosis, a menudo sin secuelas graves. La zona distal de las extremidades, la pelvis, la región tiroidea y las mamas son las localizaciones más frecuentes. Es muy poco probable que esas calcificaciones arteriales periféricas focales sean una consecuencia de la ateroesclerosis, con diabetes mellitus o con hipercalcemia. Es más probable que la hipertensión afecte a las pequeñas arterias renales, con arterioloesclerosis hialina o hiperplásica, y las calcificaciones no son una característica importante, aunque la hipertensión también es un factor de riesgo de ateroesclerosis.

12 **D** Piense en una dieta con peces teleósteos, que contienen grasas posiblemente asociadas a menos colesterol y, por tanto, tal vez sean protectores frente a la aterogenia. Las demás opciones reseñadas se asocian a riesgo de ateroesclerosis. La proteína C reactiva (CRP) es un reactante de fase aguda que aumenta en respuesta a las citocinas inflamatorias, incluidas las liberadas por células de las placas ateromatosas. La hiperhomocisteinemia es un factor de riesgo de la formación de ateromas independientemente de los lípidos. La lipoproteína(a) es una pequeña partícula lipídica de tipo LDL que forma una tumefacción líquida dentro de las paredes arteriales, con lo que inicia la aterogenia. Las grasas *trans* alteradas químicamente

mediante hidrogenación hacen que los lípidos tengan fechas de caducidad más tardías y mejor sabor, pero son malas para la salud porque incrementan el cociente entre el colesterol de LDL y el de HDL.

13 **B** La CRP es un reactante de fase aguda que aumenta en respuesta a la inflamación. Causa activación de las células endoteliales, promueve la trombosis e incrementa la adhesión de los leucocitos en el desarrollo de ateromas. Como la aterogenia es, en parte, un proceso inflamatorio, la CRP resulta un factor predictivo independiente de riesgo cardiovascular. El PR3 es uno de los autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) asociados a algunas vasculitis, como la polivasculitis microscópica. Las crioglobulinas se encuentran en algunas formas de vasculitis mediada por complejos inmunitarios. La velocidad de sedimentación globular (VSG) es un indicador inespecífico de inflamación y, por tanto, el parámetro menos valorado por el internista; es bien sabido que está notablemente elevada en la arteritis de células gigantes. Aunque las plaquetas participan en la formación de ateromas, su cifra real no es predictiva de aterogenia.

14 **B** La reducción del colesterol, especialmente del ligado a LDL, con la misma concentración o mayor de colesterol de HDL, indica un riesgo reducido de complicaciones ateroescleróticas. La ateroesclerosis es multifactorial, pero un cambio de dieta (es decir, una reducción de la grasa dietética total y del colesterol) con un aumento del ejercicio es el mejor método de reducir el riesgo en la mayoría de las personas. Las placas ateromatosas ya formadas pueden disminuir de tamaño, bien es cierto que en meses o años, pero la regresión de las placas consigue un resultado mejor que el tratamiento farmacológico o quirúrgico. La glucosa es una medida del control de la diabetes mellitus. Las concentraciones de potasio, calcio y renina pueden estar alteradas en algunas formas de hipertensión, uno de los distintos factores de riesgo de la ateroesclerosis.

15 **B** La diabetes mellitus, que en la pregunta la hace sospechar la presencia de hiperglucemia, es un factor de riesgo significativo de ateroesclerosis precoz, acelerada y avanzada. Si una mujer premenopáusica o un hombre joven tienen ateroesclerosis

coronaria grave, hay que sospechar diabetes mellitus o algún otro trastorno metabólico, como, por ejemplo, hiperlipidemia, como factor predisponente. Los factores de riesgo «menores» que resultan menos importantes en el desarrollo de ateroesclerosis son obesidad, estrés y falta de ejercicio.

16 **D** La LDL oxidada puede ser captada por una vía especial «de recogida» en los macrófagos; también promueve la quimiotaxia y adhesión de monocitos. Los macrófagos que captan lípidos se convierten en células espumosas que comienzan a formar la estría grasa. El tabaquismo, la hipertensión y la diabetes mellitus promueven la formación de radicales libres, y estos aumentan la degradación de LDL a su forma oxidada. Cerca de un tercio de la cantidad de LDL se degrada a la forma oxidada; una concentración mayor de LDL aumenta la cantidad de LDL oxidada disponible para ser captada por los macrófagos. La proteína C reactiva es un marcador de inflamación, que puede aumentar en caso de formación más activa de ateromas y trombos, y predice una probabilidad mayor de síndromes coronarios agudos. Las concentraciones de homocisteína elevadas promueven la aterogenia a través de la disfunción endotelial. La Lp(a), una variante de LDL que contiene la porción apo B-100 de la LDL unida a apo A, promueve la acumulación de lípidos y la proliferación de las células de músculo liso. El factor de crecimiento derivado de plaquetas facilita la proliferación de células de músculo liso. La VLDL se produce en el hígado y se transforma en LDL en el tejido adiposo y muscular.

17 **B** La lipoproteína(a) es una forma modificada de colesterol de LDL que contiene la porción de apolipoproteína B-100 de la LDL unida a la apolipoproteína A, y un aumento de Lp(a) conlleva una asociación independiente con riesgo de disfunción endotelial y aterogenia. La apolipoproteína E promueve el metabolismo y la eliminación de LDL. Los fármacos, como las estatinas que afectan a la actividad del receptor de LDL, no modifican la concentración de Lp(a). En etapas precoces del proceso de formación del ateroma, la angiotensina y su receptor podrían participar en el desarrollo de hipertensión, que entonces se convierte en un factor de riesgo de ateroesclerosis. La endotelina es un vasoconstrictor sin implicación conocida en

la aterogenia. La disminución del factor VIII se traduce en hemorragias anómalas. El factor de von Willebrand es necesario para la adhesión normal de las plaquetas al colágeno, y su ausencia provoca hemorragias.

18 **B** La respuesta inicial de una pared arterial a la lesión es el engrosamiento de la íntima con proliferación en la neoíntima de células de músculo liso y mayor producción de matriz extracelular en esta capa. Hay que tener en cuenta que la «lesión» puede estar causada por inflamación, reacciones inmunitarias y toxinas, además de por el traumatismo físico local secundario a hipertensión y flujo anómalo. El traumatismo no produce una lesión inmediata con alteración de las células endoteliales, sino una respuesta de disfunción endotelial que señaliza la migración de células de músculo liso. Este proceso tarda años en mostrar los cambios del estrechamiento vascular. Conforme la placa ateromatosa avanza, se produce la participación de linfocitos mediante la generación de citocinas y de monocitos que se transforman en macrófagos, que a su vez acumulan lípidos y pasan a ser células espumosas. En último término, la rotura de la placa podría inducir la agregación plaquetaria.

19 **C** Se cree que la ateroesclerosis es consecuencia de una lesión endotelial inicial y de la consiguiente inflamación crónica de la íntima arterial y su reparación. Todos los factores de riesgo, como tabaquismo, hiperlipidemia e hipertensión, causan lesiones bioquímicas o mecánicas sobre el endotelio, y la disfunción resultante desencadena la migración y proliferación de músculo liso, así como infiltrados de linfocitos y monocitos-macrófagos. La formación de células espumosas tiene lugar después de la lesión endotelial inicial. El tono vasomotor no es un factor importante en la aterogenia. La inhibición de la oxidación de LDL debería reducir la formación de ateromas. Aunque es posible que algunos trastornos hereditarios cursen con alteraciones de los receptores de lipoproteínas, estos solo representan una fracción de los casos de ateroesclerosis, y otras condiciones del estilo de vida no afectan a su acción.

20 **D** Las lesiones pálidas ligeramente abultadas que muestra la figura se denominan *estrías grasas* y aparecen en la aorta de casi

todos los niños mayores de 10 años. Se cree que son precursoras de las placas ateromatosas. Los linfocitos T están presentes en etapas precoces de la patogenia de las lesiones ateroescleróticas, y se piensa que activan monocitos, células endoteliales y de músculo liso mediante la secreción de citocinas. Los linfocitos T se adhieren a VCAM-1 sobre las células endoteliales activadas y migran a la pared del vaso. Estos linfocitos T, activados por algún mecanismo desconocido, secretan varias moléculas proinflamatorias que reclutan y activan monocitos y células de músculo liso, y perpetúan la inflamación crónica de la pared vascular. Las estrías grasas no causan alteraciones del flujo sanguíneo y se descubren accidentalmente en autopsias. Todas las demás lesiones descritas se observan en placas ateromatosas totalmente desarrolladas. Las características histológicas de esas placas son un núcleo central de restos lipídicos que pueden tener hendiduras de colesterol y estar calcificados. Por lo general, hay una corona suprayacente de células de músculo liso. La hemorragia es una complicación observada en la ateroesclerosis avanzada. Las células espumosas, derivadas de células de músculo liso o macrófagos que han captado lípidos, aparecen en todas las fases de la aterogenia.

21 **D** La liberación de factores de crecimiento por parte de las plaquetas activadas, los macrófagos y las células de la pared vascular induce el reclutamiento de células de músculo liso, la migración de músculo liso de la media a la íntima, donde proliferan y sintetizan matriz extracelular (MEC) de un modo muy parecido a como los fibroblastos llenan una herida. La lesión de las células endoteliales inicia la aterogenia, pero las células endoteliales no forman una parte significativa del ateroma. Las plaquetas no sintetizan MEC. Los linfocitos T secretan citocinas inflamatorias que activan los macrófagos, las células endoteliales y las células de músculo liso.

22 **B** La figura muestra una luz arterial notablemente estrechada por una placa ateromatosa calcificada. La hipercolesterolemia con aumento de las concentraciones de LDL y reducción de HDL es un factor de riesgo clave para la aterogenia. Aunque las plaquetas participan en la formación de las placas ateromatosas, su número no tiene una importancia capital. La trombocitosis

puede causar trombosis o hemorragia. Las concentraciones de Lp(a) y homocisteína, cuando están elevadas, aumentan el riesgo de ateroesclerosis. La sífilis (resultado positivo en la prueba VDRL) produce una endoarteritis obliterante de los vasos vasculares aórticos, que debilita la pared y predispone a la formación de aneurismas en la aorta.

23 **D** Las placas ateromatosas pueden complicarse con varias alteraciones patológicas, como hemorragia, ulceración, trombosis y calcificación. Es posible que estos procesos provoquen un aumento del tamaño de la placa y un estrechamiento de la luz arterial residual. Aunque la ateroesclerosis es un trastorno de la íntima, en la enfermedad avanzada, la placa en expansión comprime la media. Esto causa su adelgazamiento, lo que debilita la pared y la predispone a desarrollar aneurismas.

24 **B** El ácido acetilsalicílico inhibe la vía de la ciclooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico y las plaquetas que participan en la trombogenia. Cuando las placas ateromatosas han progresado hasta el punto de producir oclusión sintomática y la angina consiguiente, es probable que se trate de placas inestables que pueden romperse, ulcerarse o erosionarse, promoviendo así la trombosis. La formulación «infantil» del ácido acetilsalicílico, que contiene 80 mg (325 mg en el comprimido para «adultos»), tomada una vez al día podría reducir este riesgo trombótico, así como prevenir el riesgo significativamente mayor de hemorragia que se asocia a dosis más altas. El paracetamol es básicamente un analgésico. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) y, como tal, carece de efectos significativos sobre la progresión del ateroma. El paclitaxel es uno de los fármacos (inicialmente usado como antineoplásico) usado en las endoprótesis intravasculares liberadoras de fármacos en las arterias coronarias con la angioplastia para impedir la reestenosis. El propranolol es un β-bloqueante pautado como antihipertensivo.

25 **C** Los aneurismas de la aorta abdominal casi siempre están relacionados con ateroesclerosis aórtica subyacente. Este paciente tiene múltiples factores de riesgo de ateroesclerosis, como diabetes mellitus, hipertensión y tabaquismo. Cuando el

aneurisma alcanza este tamaño, el riesgo de rotura es significativo. Una disección aórtica habitualmente es un acontecimiento súbito y potencialmente mortal, con disección de sangre por fuera de la luz en la aorta ascendente, normalmente en el tórax, sin una masa abdominal pulsátil. Los factores de riesgo de ateroesclerosis e hipertensión también subyacen a la disección aórtica. Las fístulas arteriovenosas pueden producir un soplo audible en la auscultación. La panarteritis nudosa (PAN) clásica provoca microaneurismas minúsculos en las pequeñas arterias, con más frecuencia en las renales y en las mesentéricas. La arteritis de Takayasu afecta, característicamente, al cayado aórtico y a sus ramas en niños. La tromboangitis obliterante (enfermedad de Buerger) es un trastorno infrecuente de fumadores en el que las arterias musculares de las extremidades inferiores se ocluyen.

26 **A** Su TC abdominal muestra un aumento de 6 cm del tamaño de la aorta abdominal, lo que corresponde a un aneurisma ateroesclerótico de la aorta abdominal. Hay que sospechar diabetes mellitus, un factor de riesgo importante de ateroesclerosis, si un hombre más joven o una mujer premenopáusica tienen una ateroesclerosis grave. El síndrome de Marfan conlleva el riesgo de disección de aorta que comienza en una aorta ascendente dilatada. La panarteritis nudosa no suele afectar a la aorta. La obesidad, un factor de riesgo «menor» de ateroesclerosis, también contribuye a la diabetes mellitus de tipo 2; sin embargo, el alcance de la enfermedad ateroesclerótica en este paciente sugiere una diabetes mellitus de comienzo precoz, que es con más frecuencia de tipo 1. El lupus eritematoso sistémico produce una vasculitis de pequeñas arteriolas. La aortitis sifilítica, una manifestación de la sífilis primaria, afecta con más frecuencia a la aorta torácica, pero es infrecuente, y hoy día la mayoría de los aneurismas de la aorta torácica probablemente estén causados por ateroesclerosis.

27 **A** Esta descripción apunta sobremanera a una aortitis sifilítica, complicación de la sífilis terciaria, con la afectación característica de la aorta torácica. La historia clínica también es indicativa de tabes dorsal y neurosífilis. La endoarteritis obliterante no es una característica de otros tipos de vasculitis.

Un título elevado de anticuerpos anti-ADN bicatenario es diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, y los P-ANCA (anticuerpos dirigidos principalmente contra la mieloperoxidasa) son positivos en distintas vasculitis, incluida la polivasculitis microscópica. Las personas con cetoacidosis diabética pueden presentar cetonuria. La velocidad de sedimentación elevada es un marcador inespecífico de enfermedades inflamatorias.

28 **C** La figura muestra rotura de las fibras elásticas de la media, típica de la degeneración quística de la media, que debilita esta capa de la aorta y predispone a la disección aórtica. En un paciente joven hay que establecer una sospecha sólida de un trastorno hereditario del tejido conjuntivo, como el síndrome de Marfan. La esclerodermia y las vasculitis (granulomatosis con polivasculitis) asociadas a autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) habitualmente no afectan a la aorta. La ateroesclerosis asociada a diabetes mellitus e hipertensión es un factor de riesgo de disección aórtica, aunque este se observa con más frecuencia en edades avanzadas. La arteritis de Takayasu aparece principalmente en niños, afecta a la aorta (especialmente el cayado) y a sus ramas, como las arterias coronarias y renales, y causa inflamación granulomatosa, formación de aneurismas y disección.

29 **C** Un desgarro súbito en la íntima de la aorta proximal permite que la sangre penetre en el espacio presente entre las capas de la pared aórtica. Esta sangre puede atravesar la pared, alrededor de los grandes vasos, y llegar a la cavidad pericárdica, como en este caso de taponamiento cardíaco. Si entra en la cavidad torácica causará hemotórax. La hipertensión es el factor de riesgo más frecuente de disección aórtica. Por el contrario, el aneurisma falso se caracteriza por la formación de un hematoma por la sangre extravasada, pero se comunica con la luz vascular; los verdaderos aneurismas afectan a las tres capas de la pared arterial. La arterioloesclerosis puede asociarse a hipertensión, pero afecta a las arteriolas, habitualmente en los riñones, no a la aorta. Es posible la trombosis de la sangre extravasada en una disección, pero esta no es la lesión primaria. Las vasculitis no suelen afectar a la aorta, pero la arteritis de células gigantes y la

de Takayasu sí pueden hacerlo, aunque no es probable que debiliten la pared hasta tal punto que se rompa.

30 **A** La arteritis de células gigantes (temporal) suele afectar a las ramas de tamaño intermedio y grande de la arteria carótida en la cabeza (especialmente a las arterias temporales) pero también a las arterias vertebrales y oftálmicas. La afectación de estas últimas altera la visión. Como es mucho menos habitual que resulten implicados los riñones, los pulmones y las arterias periféricas de las extremidades, la insuficiencia renal, la hemoptisis y la gangrena de dedos del pie son complicaciones infrecuentes de la arteritis de células gigantes. No hay asociación entre hipertensión y arteritis de células gigantes, pero algunos pacientes pueden presentar polimialgia reumática.

31 **E** La arteritis de Takayasu provoca la «enfermedad sin pulso» por la afectación de la aorta (especialmente el cayado) y de ramas tales como las arterias coronarias, carótidas y renales, que provocan inflamación granulomatosa, con formación de aneurismas y disección. La fibrosis es un hallazgo tardío, y las arterias pulmonares también pueden verse alteradas. La disección aórtica es un problema agudo que, en ancianos, es secundario a hipertensión y ateroesclerosis, aunque esta paciente se encuentra en el intervalo de edad propio de las complicaciones del síndrome de Marfan, que causa degeneración quística de la media aórtica. La enfermedad de Kawasaki se presenta en niños y se caracteriza por enfermedad febril aguda, arteritis coronaria con formación de aneurismas y trombosis, exantema cutáneo y adenopatías. La polivasculitis microscópica afecta a arteriolas, capilares y vénulas con una vasculitis leucocitoclástica que aparece en una fase similar en múltiples zonas de órganos (a diferencia de la panarteritis nudosa clásica, que causa lesiones agudas, crónicas y fibrosantes en distintos estadios en las arterias de tamaño intermedio y pequeño). La sífilis terciaria produce endoaortitis con dilatación de la aorta proximal. La tromboangitis obliterante (enfermedad de Buerger) afecta a arterias de tamaño pequeño e intermedio de las extremidades y está muy asociada al tabaquismo.

32 **D** La panarteritis nudosa (PAN) clásica cursa con afectación segmentaria de las arterias de tamaño intermedio y dilataciones

aneurismáticas en los lechos vasculares renal y mesentérico (p. ej., dolor abdominal, melena). La PAN puede afectar a muchos órganos en distintos momentos. Aunque su causa es desconocida, cerca del 30% de los pacientes tienen antígeno de superficie de la hepatitis B, que presumiblemente forma complejos inmunitarios que lesionan las paredes vasculares. A diferencia de la polivasculitis microscópica, la PAN se asocia menos a los autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA). Una enfermedad del tejido conjuntivo con títulos de ANA positivos, como el lupus eritematoso sistémico, puede producir vasculitis, pero no con el patrón descrito en la pregunta: los vasos afectados son más pequeños. La vasculitis es infrecuente en la infección por el VIH. Los autoanticuerpos Scl-70 son indicativos de esclerodermia, que puede producir insuficiencia renal. La reagina plasmática rápida (RPR) es una prueba serológica para detectar sífilis; en esta infección puede producirse una endoaortitis de los vasos vasculares.

33 **D** El síndrome mucocutáneo de ganglios linfáticos, o enfermedad de Kawasaki, afecta a las arterias de tamaño grande, intermedio y pequeño. En el 20% de los casos se producen complicaciones cardiovasculares, consistentes en trombosis, estasis y formación de aneurismas en las arterias coronarias. El asma puede asociarse a vasculitis de Churg-Strauss. La glomerulonefritis es una característica de las vasculitis granulomatosas asociadas a autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) y ciertas enfermedades autoinmunitarias, como lupus eritematoso sistémico. Es posible que los pacientes presenten una hemorragia intracraneal cuando se producen émbolos sépticos en las arterias cerebrales periféricas y que ello dé lugar a aneurismas micóticos que pueden romperse. La hipertensión pulmonar es otra complicación de la arteritis de Takayasu, pero no es tan mortal como la enfermedad arterial coronaria.

34 **A** La vasculitis (granulomatosis con polivasculitis) asociada a autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) es un tipo de reacción de hipersensibilidad a un antígeno desconocido caracterizada por una inflamación granulomatosa necrosante que suele afectar a los vasos de tamaño intermedio y pequeño,

aunque pueden alterarse muchos órganos. La afectación pulmonar y renal a veces resulta mortal. En más del 90% de los casos hay C-ANCA (anticuerpos dirigidos fundamentalmente contra la proteinasa 3 de neutrófilos). La displasia fibromuscular es un trastorno hiperplásico de la media, que habitualmente afecta a las arterias renales y carótidas; en la angiografía, aparece como un «rosario» causado por crestas fibromusculares engrosadas y adyacentes a áreas menos afectadas de la pared arterial. El granuloma piógeno es una respuesta inflamatoria que puede provocar una masa nodular, a menudo en las encías o la piel. El sarcoma de Kaposi produce masas de tipo placa o nodulares compuestas por espacios vasculares irregulares revestidos por células endoteliales de aspecto atípico; lo más frecuente es la afectación cutánea, pero también pueden estar implicados órganos viscerales. La panarteritis nudosa afecta con más frecuencia a arterias musculares pequeñas y, en ocasiones, a venas. Causa necrosis y formación de microaneurismas, seguidas de cicatrización y oclusión vascular, principalmente en el riñón, el tubo digestivo y la piel en la edad adulta hasta la mediana edad. La arteritis de Takayasu aparece principalmente en niños y afecta a la aorta (en especial, el cayado) y a sus ramas, tales como las arterias coronarias y renales, con inflamación granulomatosa, formación de aneurismas y disección.

35 **B** La polivasculitis microscópica afecta a vasos pequeños, normalmente capilares. Con frecuencia los riñones y los pulmones resultan afectados, pero también pueden estarlo muchos órganos. Es posible que exista una enfermedad inmunitaria, una infección crónica o una reacción farmacológica subyacente. La arteritis de células gigantes suele afectar a las ramas arteriales de la carótida externa, con más frecuencia a la arteria temporal. Los microabscesos son posibles en los procesos infecciosos y la tromboangitis obliterante (enfermedad de Buerger), que, característicamente, afecta a las extremidades inferiores. Los aneurismas micóticos tienen lugar cuando un foco infeccioso, por lo general debido a un émbolo séptico, debilita una pared arterial de tal modo que protruye hacia el exterior. En el síndrome de Churg-Strauss, que suele cursar con afectación pulmonar, es posible observar infiltrados eosinófilos

perivasculares.

36 **E** La tromboangitis obliterante (enfermedad de Buerger), que afecta a arterias de tamaño intermedio y pequeño de las extremidades, está muy asociada al tabaquismo. Esta enfermedad puede afectar en, último término, a las venas y los nervios periféricos adyacentes. La sífilis se trata con antibióticos, pero produce principalmente aortitis. El tratamiento inmunodepresor no es muy eficaz. Los riñones no resultan afectados. Aunque la enfermedad vascular periférica con ateroesclerosis es un hallazgo típico en la diabetes mellitus, la vasculitis no lo es.

37 **B** En los niños, la púrpura de Henoch-Schönlein es el homólogo multisistémico de la nefropatía por IgA observada en adultos. Los complejos inmunitarios formados con IgA producen la vasculitis que afecta, fundamentalmente, a arteriolas, capilares y vénulas de la piel, del tubo digestivo y del riñón. En los ancianos, la arteritis de células gigantes aparece en las ramas de la carótida externa, principalmente en la arteria temporal de un solo lado. La panarteritis nudosa se observa con más frecuencia en arterias musculares pequeñas y a veces en venas, con necrosis y formación de microaneurismas, seguidas de cicatrización y oclusión vascular. Esto se produce, fundamentalmente, en el riñón, el tubo digestivo y la piel en la edad adulta hasta la mediana edad. La arteritis de Takayasu aparece sobre todo en niños y afecta a la aorta (especialmente al cayado) y a sus ramas, como las arterias coronarias y renales, con inflamación granulomatosa, formación de aneurismas y disección. Las telangiectasias son pequeñas arborizaciones vasculares en la piel o en las superficies mucosas.

38 **D** Esta mujer probablemente tenga una endocarditis infecciosa, y con frecuencia se desprenden trozos de las vegetaciones y se embolizan. Estos son émbolos sépticos con microorganismos capaces de iniciar su crecimiento y producir destrucción local de la arteria allí donde se hayan desplazado. La destrucción de una pared vascular por un proceso infeccioso es infrecuente, pero puede producirse por la extensión de una infección local o mediante embolia. Los aneurismas micóticos están causados por cualquier agente infeccioso que debilite una

pared arterial hasta tal punto que protruya: se forma una dilatación aneurismática. La angiomatosis bacilar produce proliferación vascular focal, típicamente en la piel de personas inmunodeprimidas infectadas por especies de *Bartonella.* La arterioloesclerosis hiperplásica aparece con más frecuencia en los riñones de individuos con hipertensión maligna: algunos de ellos pueden tener esclerosis sistémica subyacente. El encéfalo carece de canales linfáticos. La flebotrombosis aparece característicamente en grandes venas de piernas y pelvis, por lo general después de una inmovilización prolongada.

39 **E** Los cambios «rojo, blanco y azul» mostrados representan el fenómeno de Raynaud, que puede ser una vasoconstricción exagerada primaria sin otros trastornos causales. En personas ancianas hay que buscar un proceso subyacente, como enfermedades autoinmunitarias. Es posible que se deba a hiperviscosidad. En personas más jóvenes es «primario» y probablemente se trate de hiperreactividad vasomotora. La calcificación con esclerosis calcificante de la media suele afectar a arterias pequeñas y musculares, pero más grandes que las de manos y pies; con frecuencia es un hallazgo incidental en una radiografía. La hipertensión puede provocar ateroesclerosis, pero no vasoconstricción marcada. Es improbable que la trombosis se desarrolle y ceda tan rápido. Del mismo modo, la vasculitis no es un fenómeno evanescente.

40 **C** Las venas hemorroidales pueden dilatarse por congestión venosa. Derivan del ectodermo, están recubiertas por epitelio escamoso, y están inervadas por nervios sensitivos somáticos. Las hemorroides externas son más frecuentes en pacientes con estreñimiento crónico, pero un útero gestante presiona las venas pélvicas y produce una congestión similar, que promueve la dilatación de las venas hemorroidales. La filariasis puede infectar los vasos linfáticos, incluidos los de la región inguinal, y producir linfoedema. La panarteritis no afecta a las venas. Es más probable que una hipertensión portal por cirrosis dilate las venas esofágicas de la submucosa, pero en ocasiones resultan afectadas las venas hemorroidales internas. La cirrosis sería excepcional a la edad de esta paciente. Los carcinomas también son infrecuentes a esta edad y no es probable que obstruyan el

flujo venoso.

41 **D** La flebotrombosis (que suele denominarse tromboflebitis) es un problema frecuente resultante de la estasis venosa por inmovilización prolongada. Es posible que flebotrombosis sea un término más adecuado (pero menos usado) porque apenas hay inflamación, pero el uso del término antiguo está muy extendido. La coagulación intravascular diseminada provoca con más frecuencia hemorragias, y el edema no es una manifestación prominente. El linfoedema tarda más de 2 semanas en desarrollarse y no es secundario únicamente al encamamiento del paciente. La tromboangitis obliterante es un tipo infrecuente de arteritis que provoca dolor y ulceración de las extremidades. Las varices son venas superficiales dilatadas y tortuosas que pueden resultar trombosadas, pero no están relacionadas con el encamamiento ni predisponen a la tromboembolia pulmonar como sí lo hace la trombosis de venas más grandes y profundas.

42 **E** La estasis venosa periférica crónica provoca depósito de hemosiderina y fibrosis dérmica con un color pardo y piel rugosa. Es posible que se produzcan úlceras focales sobre las varices, pero no aparece una gangrena extensa similar a la observada en la ateroesclerosis arterial. Hipócrates describió las varices en torno al año 370 a. C. y recomendó la compresión para las úlceras. En 1896, el cirujano australiano Jerry Moore describió la ligadura de la vena safena mayor, técnica que sigue utilizándose. Las varices solo afectan al grupo de venas superficiales, que pueden resultar trombosadas, pero no dan origen a tromboembolias, a diferencia de las venas más grandes y profundas de las piernas. Las varices no afectan al músculo; sin embargo, un menor soporte muscular de las venas que «ordeñe» la sangre para el retorno venoso predispone a la formación de varices. Las trombosis de las venas superficiales de las piernas no provocan coagulación intravascular diseminada, porque no hay lesiones vasculares agudas que promuevan la coagulopatía mantenida. Los infartos venosos son infrecuentes, gracias a las venas profundas colaterales y superficiales implicadas en el retorno venoso.

43 **A** Una mastectomía con disección de los ganglios linfáticos axilares provoca la alteración y obstrucción de los canales

linfáticos de la axila. Esa obstrucción al flujo de linfa da lugar al linfoedema, trastorno que puede complicarse con celulitis. La trombosis arterial produce isquemia distal a la obstrucción. La tromboflebitis por estasis venosa es una complicación observada con más frecuencia en las extremidades inferiores. Una trombosis arterial puede provocar que la extremidad esté fría, dolorosa y de color azul. Los émbolos tumorales suelen ser pequeños pero infrecuentes. La vasculitis no es una complicación quirúrgica.

44 **B** Las líneas rojas representan canales linfáticos a través de los cuales la infección aguda está drenando a los ganglios linfáticos axilares, que, a su vez, drenan al conducto linfático derecho y a la vena subclavia derecha (los canales linfáticos de la parte inferior del cuerpo y los de la superior izquierda desembocan en el conducto torácico). La capilaritis es más frecuente en inflamaciones que afectan al pulmón. El linfoedema se produce por bloqueo del drenaje linfático y tarda más tiempo en desarrollarse, sin inflamación aguda significativa. Los términos flebotrombosis y tromboflebitis describen la trombosis en venas con estasis y mínima inflamación, normalmente en la pelvis y en las extremidades inferiores. La panarteritis nudosa (PAN) clásica afecta a arterias musculares de tamaño intermedio y pequeño, habitualmente a ramas renales y mesentéricas. Las varices son venas dilatadas por obstrucción del drenaje venoso.

45 **E** Las telangiectasias aracniformes son características de la cirrosis micronodular, habitualmente secundaria a abuso crónico de alcohol. Se cree que están causadas por hiperestrogenismo (exceso de estrógenos) secundario al daño hepático con eliminación reducida de los esteroides circulantes. La lesión vascular cutánea más frecuente en pacientes con sida es el sarcoma de Kaposi, neoplasia que se manifiesta por una o más máculas, placas o nódulos irregulares de color rojo violáceo. La diabetes mellitus, con su ateroesclerosis acelerada, es más probable que curse con isquemia o gangrena. La vasculitis no suele producir telangiectasias cutáneas. La afectación vascular del síndrome de Marfan tiene lugar principalmente en el cayado de la aorta, con degeneración quística de la media.

46 **B** La pregunta describe el granuloma piógeno. La mitad de los

casos están relacionados con traumatismos y representan una reacción de reparación exuberante con tejido de granulación. Pueden ulcerarse y sangrar. La angiomatosis bacilar es una proliferación vascular que aparece en pacientes inmunodeprimidos infectados por *Bartonella.* Los linfangiomas cavernosos adoptan la forma de lesiones deformantes de tipo masa en la región del cuello en niños y, aunque técnicamente son benignos, no muestran bordes bien definidos y resulta difícil resecarlos. El tumor glómico se presenta típicamente como un nódulo doloroso bajo la uña de un dedo. Hay varios tipos de sarcoma de Kaposi (clásico, endémico, relacionado con el sida), pero todos ellos aparecen en forma de máculas, placas o nódulos de color púrpura rojizo en la piel y están asociados al virus del herpes del sarcoma de Kaposi (VHSK), también llamado *virus del herpes humano 8 (HVH8).*

47 **B** La figura muestra espacios dilatados revestidos por endotelio y ocupados por eritrocitos. Los límites bien definidos de esta lesión y su larga evolución sin cambios apuntan a una naturaleza benigna. Los espacios vasculares de un hemangioma pueden ser pequeños, parecidos a capilares, o bien grandes y cavernosos. Los angiosarcomas son neoplasias malignas de gran tamaño y crecimiento rápido en adultos. El sarcoma de Kaposi es infrecuente en su forma endémica de la infancia y resulta más prevalente como complicación neoplásica asociada a la infección por el VIH. Los linfangiomas, observados con más frecuencia en niños, suelen ser más difusos y no están llenos de sangre. Una telangiectasia consiste en arterias o arteriolas dilatadas dispuestas radialmente alrededor de un núcleo central que puede ser pulsátil.

48 **B** La lesión es un linfangioma cavernoso. Aunque histológicamente es benigno, esas lesiones tienden a crecer mucho y extenderse alrededor de estructuras adyacentes, lo que complica su resección. Es improbable que los linfangiomas estén asociados a síndromes de neoplasias múltiples y no se relacionan con las infecciones. El higroma quístico del síndrome de Turner tiene un aspecto similar, pero es bilateral y no progresivo, y podría explicar el «cuello alado».

49 **E** La infección por el HVH8, también llamado *virus del herpes*

del sarcoma de Kaposi (VHSK) se asocia a sarcoma de Kaposi (SK) y puede contagiarse como enfermedad de transmisión sexual. El SK es una complicación del sida. Las personas con infección por el VIH se pueden infectar por distintos virus, como citomegalovirus (CMV) y virus de Epstein-Barr (VEB), pero estos no tienen asociación etiológica con el SK. El VEB es un factor implicado en el desarrollo de linfomas no hodgkinianos y el CMV causa neumonitis y retinitis o bien infecciones diseminadas. La hiperlipidemia es una complicación posible del tratamiento antirretrovírico, pero no produce nódulos cutáneos. La infección por el complejo *Mycobacterium avium* también aparece en pacientes infectados por el VIH, pero produce granulomas pequeños, fundamentalmente en tejidos del sistema mononuclear fagocítico.

50 **E** Tiene síndrome metabólico, un factor de riesgo de ateroesclerosis coronaria. Tras una angioplastia, a menudo se produce un engrosamiento de la íntima que causa reestenosis. La endoprótesis vascular metálica mantiene abierta la luz y el paclitaxel limita la hiperplasia de músculo liso. La ateroesclerosis no es un factor de riesgo de neoplasias. La angiomatosis bacilar está causada por microorganismos *Bartonella* (enfermedad por arañazo de gato) y produce, sobre todo, un nódulo rojo en la piel. La degeneración quística de la media es una característica del síndrome de Marfan con disección aórtica. La arteritis de células gigantes afecta con más frecuencia a las ramas de la carótida externa, como las arterias temporales; no está relacionada con ateroesclerosis. La tromboangitis obliterante es una vasculitis infrecuente de las extremidades inferiores en fumadores.

51 **C** La inserción de endoprótesis vasculares puede hacerse sin cirugía mayor, porque es posible colocar el implante por vía percutánea. El injerto de derivación arterial más usado es el de la arteria mamaria (torácica) interna izquierda a la coronaria descendente anterior izquierda, o bien el realizado resecando una porción de arteria radial para circunvalar una arteria coronaria estenosada. El clopidogrel es un antiagregante plaquetario que ayuda a prevenir trombosis, y los pacientes con este riesgo, incluidos aquellos con ateroesclerosis grave o los

tratados quirúrgicamente mediante endoprótesis o injertos vasculares, pueden recibir este fármaco. Los injertos de derivación de vena safena suelen usarse en los injertos de derivación de arterias coronarias. Todos estos injertos pueden complicarse con trombosis, reestenosis, o ambas.

CAPÍTULO

12

Corazón

PEF9 Capítulo 12: Corazón

PH9 Capítulo 10: Corazón

1 Una mujer de 82 años presenta cansancio progresivo en los últimos 2 años. Durante este período, ha sufrido mareos y síncopes paroxísticos. En la exploración física no tiene fiebre. La frecuencia cardíaca es de 44 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 16 respiraciones/min, y la presión arterial, de 100/65 mmHg. En la auscultación, los pulmones están limpios y no se escuchan soplos. Un ecocardiograma muestra que el corazón tiene un tamaño normal, movimientos normales de las válvulas y fracción de eyección estimada del 50%. Tras la estimulación parasimpática (vagal), la frecuencia cardíaca disminuye y pasa a ser irregular. ¿Cuál de las siguientes estructuras es más probable que presente una anomalía en esta paciente?

A Nódulo auriculoventricular
B Haz de His
C Rama izquierda
D Ganglio parasimpático
E Rama derecha
F Nódulo sinoauricular
G Ganglio simpático

2 Un neonato que está desarrollándose con normalidad es evaluado en una consulta del recién nacido. En la exploración física hay un soplo sistólico. La ecocardiografía revela un defecto muscular del tabique interventricular. En una consulta rutinaria 30 años después no se detectan soplos ni alteraciones del flujo entre los ventrículos. ¿Cuál de las siguientes células es más probable que proliferara y condujera a la desaparición del defecto?

A Adipocitos

B Células de conducción
C Células endoteliales
D Fibroblastos
E Células mesoteliales
F Células madre

3 Un hombre de 66 años presenta tos y disnea progresiva de 3 años de evolución. En la exploración, hay matidez en la percusión de ambas bases pulmonares y murmullo vesicular escasamente audible. En la exploración física, la frecuencia cardíaca es de 77 latidos/min, y la presión arterial, de 110/80 mmHg. No tiene dolor anginoso. El reborde hepático está aumentado a 14 cm. Tiene edemas con fóvea hasta las rodillas. Se aprecia distensión de la vena yugular hasta el ángulo de la mandíbula con 45° de elevación de la cabeza en decúbito. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que esté causando su cardiopatía?

A Mixoma auricular
B Hipertensión esencial
C Hiperlipidemia
D Fiebre reumática
E Tabaquismo

4 Una mujer de 62 años lleva 2 años con disnea progresiva. En el momento actual se despierta por la noche con sensación de ahogo y tos productiva con esputos espumosos. En la exploración se auscultan estertores en todos los campos pulmonares. El punto de impulso máximo es fuerte y se encuentra desplazado lateralmente. El ecocardiograma revela una disminución de la fracción de eyección al 30% con aumento concéntrico del tamaño de la pared del ventrículo izquierdo. Las válvulas tienen un aspecto normal. ¿Cuál de las siguientes enfermedades de base es más probable que padezca?

A Amiloidosis
B Miocardiopatía
C Hipertensión
D Miocarditis
E Pericarditis

5 Una mujer de 41 años se despierta por la noche con «hambre de oxígeno» desde hace 1 año. Observa que duerme mejor sentada en la cama. El péptido natriurético de tipo B sérico es > 400 pg/ml

(muy alto). ¿Cuál de las siguientes cardiopatías explica mejor su estado?

A Mixoma auricular
B Pericarditis fibrinosa
C Miocarditis de células gigantes
D Endocarditis de Libman-Sacks
E Valvulitis reumática

6 Un hombre de 50 años presenta molestias abdominales y tumefacción de las piernas progresivas desde hace 2 años. Lleva 35 años fumando cigarrillos. En la exploración física tiene distensión de las venas yugulares, incluso en sedestación. El hígado está aumentado de tamaño, es doloroso a la palpación y se palpa 10 cm por debajo del reborde costal derecho. Las extremidades inferiores muestran edema con fóvea. Una radiografía de tórax revela aplanamiento bilateral del diafragma, derrame pleural y campos pulmonares más radiotransparentes. Una toracocentesis derecha obtiene 500 ml de líquido transparente con pocas células. ¿Cuál de las siguientes enfermedades de base es más probable que tenga este paciente?

A Infarto agudo de miocardio
B Bronquitis crónica
C Hipertensión pulmonar primaria
D Estenosis de la válvula pulmonar
E Estenosis de la válvula tricúspide

7 Un lactante nacido a término presenta cianosis en la primera semana de vida. En la exploración se ausculta un soplo cardíaco. Los hallazgos anómalos en la ecocardiografía son cabalgamiento de aorta, defecto del tabique ventricular, engrosamiento del ventrículo derecho y estenosis pulmonar en el corazón fetal. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que esté mutado de forma hereditaria en este neonato?

A *Cadena pesada de la β-miosina (β-MHC)*
B *Fibrilina 1 (FBN1)*
C *KCNQ1*
D *NOTCH2*
E *Transtiretina (TTR)*

8 Tras una gestación sin complicaciones, un recién nacido a término parece normal al nacer, pero en su primer día de vida

desarrolla dificultad respiratoria. En la exploración física tiene taquipnea, taquicardia y cianosis. Hay un chasquido de eyección S1 y S2 dividido con tono P prominente. La radiografía muestra un corazón de tamaño normal y marcas vasculares hiliares prominentes. La ecocardiografía revela una aurícula izquierda pequeña, una aurícula derecha grande, unos ventrículos de tamaño normal, un agujero oval muy abierto, y una aorta y un tronco pulmonar en posición normal. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas es más probable que tenga el neonato?

A Comunicación interauricular
B Coartación de la aorta de tipo preductal
C Persistencia del agujero oval
D Tetralogía de Fallot
E Conexión venosa pulmonar anómala total

9 Una mujer de 77 años sufrió una caída y se fracturó el tobillo. En los últimos 16 días ha pasado la mayor parte del tiempo en la cama. Bruscamente, presenta dolor torácico, disnea y sudoración. En la exploración hay tumefacción y dolor a la palpación en el muslo izquierdo. Una TC torácica revela áreas de atenuación reducida en las arterias pulmonares derecha e izquierda. Un día después tiene problemas para hablar. La angiografía por RM pone de manifiesto una oclusión focal de una rama de la arteria cerebral media izquierda. ¿Cuál de las siguientes anomalías cardíacas es más probable que tenga?

A Mixoma auricular
B Endocarditis infecciosa
C Endocarditis trombótica no bacteriana
D Persistencia del agujero oval
E Aneurisma ventricular



10 Un niño de 5 años no es tan activo como otros niños de su edad. En los últimos 8 meses ha tenido múltiples episodios de dificultad respiratoria tras el esfuerzo. En la exploración física, la temperatura es de 37 °C; la frecuencia cardíaca, de 81 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 19 respiraciones/min, y la presión arterial, de 95/60 mmHg. En la auscultación se escucha un soplo holosistólico fuerte. Hay crepitantes difusos en ambos pulmones, con percusión mate en las bases. La radiografía de tórax muestra un borde cardíaco izquierdo prominente, infiltrados intersticiales pulmonares y aplanamiento de los fondos de saco costodiafragmáticos. La figura presenta una imagen macroscópica representativa del corazón del niño. ¿Cuál de los siguientes trastornos adicionales es más probable que aparezca en este niño?

A Insuficiencia aórtica
B Ateroesclerosis coronaria
C Endocarditis trombótica no bacteriana
D Hipertensión pulmonar
E Miocardiopatía restrictiva

11 Un niño de 3 años tiene un desarrollo normal. La exploración física revela un soplo cardíaco de tono grave. El ecocardiograma muestra un defecto del tipo *ostium secundum* de 1 cm. ¿Cuál de las siguientes anomalías es más probable que se encuentre en este niño?

A Cianosis en reposo

B Cortocircuito de izquierda a derecha
C Trombosis mural
D Derrame pericárdico
E Hipertensión pulmonar

12 Un niño de 2 años tuvo una enfermedad hace 1 año caracterizada por fiebre alta. Se cultivó *Staphylococcus epidermidis* en la sangre. El niño recibió antibióticos y se recuperó. Actualmente, en la exploración física, la auscultación del tórax superior pone de manifiesto un soplo estridente y variable de tipo maquinaria. La radiografía de tórax revela arterias pulmonares prominentes. El ecocardiograma muestra que todas las válvulas cardíacas tienen una configuración normal. Las pruebas de laboratorio indican una saturación arterial de oxígeno normal. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas es más probable que explique estos hallazgos?

A Atresia de la aorta
B Coartación de la aorta
C Comunicación interauricular
D Conducto arterioso persistente
E Tetralogía de Fallot
F Retorno venoso pulmonar anómalo total

13 Una niña de 5 años que está por debajo del percentil 5 de talla y peso correspondiente a su edad muestra fatigabilidad fácil desde la lactancia. En la exploración física, está cianótica. La temperatura es de 37 °C; la frecuencia cardíaca, de 82 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 16 respiraciones/min, y la presión arterial, de 105/65 mmHg. La pulsioximetría revela una saturación de oxígeno reducida. Un mes después, tiene fiebre y está obnubilada. La TC cerebral pone de manifiesto una lesión de 3 cm parietal derecha que capta contraste en anillo. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas es el diagnóstico más probable?

A Comunicación interauricular
B Válvula aórtica bicúspide
C Coartación de la aorta
D Conducto arterioso persistente
E Tronco arterioso
F Comunicación interventricular

14 En un estudio clínico de la tetralogía de Fallot, se evalúa a los

pacientes antes de la cirugía para determinar factores predictivos observados en la ecocardiografía que se correlacionen con la gravedad de la enfermedad y la necesidad de controles más exhaustivos. Se encuentra que un subgrupo de pacientes tienen insuficiencia cardíaca congestiva más grave, mala tolerancia al ejercicio y descenso de la saturación arterial de oxígeno. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que tenga valor predictivo de una peor evolución clínica en estos pacientes?

A Grado de estenosis pulmonar
B Diámetro de la válvula tricúspide
C Presencia de una comunicación interauricular
D Tamaño de la comunicación interventricular
E Espesor del ventrículo izquierdo



15 Una mujer de 27 años da a luz un recién nacido a término tras una gestación y un parto sin complicaciones. El neonato está cianótico al nacer. A los 2 meses, la exploración física muestra que el lactante está en el percentil 37 de talla y peso. La figura presenta una imagen macroscópica representativa de su corazón. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Estenosis aórtica
B Estenosis pulmonar
C Tetralogía de Fallot
D Transposición de grandes vasos
E Tronco arterioso

16 Un adolescente de 15 años refiere sentir dolor en las piernas cuando corre más de 300 m. La exploración física revela una temperatura de 36,8 °C; frecuencia cardíaca de 76 latidos/min; frecuencia respiratoria de 22 respiraciones/min, y presión arterial de 165/90 mmHg. Los pulsos radiales son 4+, y los pedios, 1+. La gasometría arterial muestra una saturación de oxígeno normal. ¿Cuál de las siguientes malformaciones cardiovasculares congénitas es más probable que tenga este paciente?

A Estenosis de la válvula aórtica
B Coartación de la aorta
C Conducto arterioso persistente
D Transposición de grandes arterias
E Atresia de la válvula tricúspide

17 Una primigrávida de 21 años da a luz un recién nacido a término que pesa 2.800 g, sin anomalías externas aparentes. Al día siguiente, el neonato desarrolla dificultad respiratoria creciente y cianosis. La ecocardiografía revela una cavidad ventricular izquierda de tipo rendija, una aurícula izquierda pequeña y atresia de las válvulas aórtica y mitral. ¿Cuál de las siguientes estructuras es más probable que permita a la sangre de los pulmones alcanzar la circulación sistémica en este recién nacido?

A Retorno venoso anómalo
B Agujero oval
C Conducto arterioso persistente
D Cuarto arco aórtico derecho
E Tronco arterioso
F Comunicación interventricular

18 Un hombre de 60 años lleva 6 años con angina de esfuerzo. Una coronariografía realizada hace 2 años mostró una estenosis del 75% de la arteria coronaria circunfleja izquierda y del 50% de la arteria coronaria derecha. En las últimas 3 semanas han aumentado la frecuencia y la gravedad de sus episodios de angina, y a veces aparece dolor cuando está tumbado en la cama. En la exploración física, la presión arterial es de 110/80 mmHg, y la frecuencia cardíaca, de 85 latidos/min con latidos irregulares. Un ECG muestra elevación del segmento ST. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de glucosa sérica de 188 mg/dl, de creatinina de 1,2 mg/dl y de troponina I de 1,5 ng/ml. ¿Cuál de los

siguientes trastornos es más probable que explique estos hallazgos?

A Fisura de una placa ateromatosa con trombosis
B Pericarditis constrictiva con calcificación
C Fibrosis endomiocárdica
D Hipertrofia extensa de las fibras miocárdicas
E Trombosis mural del ventrículo izquierdo
F Prolapso de la válvula mitral con insuficiencia



19 Una mujer de 37 años presenta dolor torácico de inicio brusco. En la exploración no tiene fiebre, pero está taquicárdica e hipotensa. Un ECG muestra elevación del segmento ST y ondas Q patológicas. La figura presenta una imagen microscópica representativa de la arteria circunfleja izquierda. ¿Cuál de las siguientes enfermedades subyacentes es más probable que tenga la paciente?

A Leucemia mieloide aguda
B Alcoholismo crónico
C Diabetes mellitus
D Síndrome de Marfan
E Panarteritis nudosa

20 Un hombre de 56 años presenta episodios de dolor torácico

subesternal grave cada vez que realiza una tarea que requiera un esfuerzo moderado. Los episodios han aumentado en frecuencia y gravedad en el último año, pero mejoran con nitroglicerina sublingual. En la exploración física, no tiene fiebre, la frecuencia cardíaca es de 78 latidos/min y regular, y no hay soplos ni galopes. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de creatinina de 1,1 mg/dl, de glucosa de 130 mg/dl y de colesterol sérico total de 223 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes lesiones cardíacas es más probable que presente este hombre?

A Estenosis aórtica calcificada
B Ateroesclerosis coronaria
C Miocardiopatía restrictiva
D Estenosis mitral reumática
E Pericarditis serosa
F Miocarditis vírica

21 Se realiza un estudio retrospectivo sobre infarto de miocardio para analizar los patrones de lesión cardíaca. Un patrón de lesión afecta a la zona posterior de la pared y al tabique del ventrículo izquierdo. ¿Cuál de las siguientes anomalías patológicas es más probable que provoque este patrón?

A Disección de la aorta ascendente
B Rotura de placa en la arteria descendente anterior izquierda
C Vasculitis de la arteria circunfleja izquierda
D Embolización del seno coronario derecho
E Trombosis de la arteria descendente posterior derecha



22 Una mujer de 48 años presenta disnea progresiva de 2 días de evolución. Sufre una parada cardíaca súbita. La figura muestra una imagen de microscopia óptica representativa de la pared libre del ventrículo izquierdo. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Miocarditis reumática aguda
B Miocardiopatía
C Infarto de miocardio
D Embolización séptica
E Miocarditis vírica

23 Un estudio sobre cardiopatía isquémica analiza casos de personas ingresadas con dolor torácico agudo en los que se documentó infarto de miocardio en la autopsia. Las imágenes macroscópicas y microscópicas de los corazones se correlacionan con el grado de ateroesclerosis coronaria y sus complicaciones, síntomas clínicos y tratamientos administrados antes del fallecimiento. ¿En cuál de las siguientes situaciones es más probable observar hemorragia y bandas de contracción en fibras miocárdicas necróticas?

A Vasculitis coronaria aguda
B Uso de fármacos antiarrítmicos
C Angioplastia con colocación de endoprótesis vasculares
D Embolización séptica
E Tratamiento trombolítico

24 Un hombre de 50 años con hipertensión y diabetes mellitus estuvo 12 h con dolor en el hombro y el brazo izquierdos. En las 6 h siguientes, desarrolló disnea, que persistió 2 días. Al tercer día consulta al médico. En la exploración física, la temperatura es de 37,1 °C; la frecuencia cardíaca, de 82 latidos/min; la frecuencia respiratoria, 18 respiraciones/min, y la presión arterial, de 160/100 mmHg. Las pruebas de laboratorio muestran que la concentración de creatina cinasa (CK) total está dentro del intervalo de referencia, pero la de troponina I está elevada. Sigue con disnea los 3 días siguientes. Pasados 7 días desde el inicio del dolor en el hombro, sufre una parada cardíaca y es reanimado. El estudio cardíaco de diagnóstico por la imagen muestra, entonces, una gran acumulación de líquido alrededor del corazón. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que haya desarrollado?

A Perforación de la válvula aórtica
B Hemopericardio
C Aneurisma del ventrículo izquierdo
D Rotura de un músculo papilar
E Pericarditis

25 Un hombre de 45 años nota un dolor torácico subesternal muy intenso al llegar al trabajo una mañana. En las 4 h siguientes el dolor persiste y comienza a irradiarse al brazo izquierdo. Está sudoroso y disneico, pero espera hasta el final de su jornada de 8 h para ir al hospital. ¿Una elevación del valor sérico de cuál de los siguientes parámetros de laboratorio es más probable que sirva para el diagnóstico de este paciente en el momento del ingreso?

A ALT
B AST
C Fracción CK-MB
D Proteína C reactiva
E LDH-1
F Lipasa

26 Un joven de 19 años se desvanece bruscamente y lo llevan al servicio de urgencias. Las constantes vitales son: temperatura, 37,1 °C; frecuencia cardíaca, 84 latidos/min; frecuencia respiratoria, 18 respiraciones/min, y presión arterial, 80/40 mmHg. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de hemoglobina de 13,5 g/dl; de plaquetas de 252.000/mm^3; de leucocitos de 7.230/mm^3; de glucosa

sérica de 73 mg/dl, y de creatinina de 1,2 mg/dl. La concentración de creatina cinasa (CK) total está elevada, con una fracción de CK-MB del 10%. ¿Cuál de las siguientes enfermedades subyacentes es más probable que sufra este paciente?

A Síndrome de DiGeorge
B Síndrome de Down
C Hipercolesterolemia familiar
D Hemocromatosis hereditaria
E Síndrome de Marfan



27 Un hombre de 69 años con síndrome metabólico tuvo dolor torácico y aumento de la concentración de troponina I hace 1 año. Estuvo 1 semana ingresado en el hospital y recibió tratamiento con antiarrítmicos. Un ecocardiograma mostraba que la fracción de eyección era del 28%. Actualmente su tolerancia al esfuerzo es muy reducida. En la exploración física, la temperatura es de 37 °C; la frecuencia cardíaca, de 68 latidos/min; la frecuencia respiratoria,

de 17 respiraciones/min, y la presión arterial, de 130/80 mmHg. En la auscultación pulmonar se aprecian crepitantes difusos. La figura muestra una imagen macroscópica representativa del corazón. ¿Cuál de las siguientes complicaciones de esta enfermedad es más probable que desarrolle el paciente?

A Mixoma auricular
B Taponamiento cardíaco
C Pericarditis constrictiva
D Miocardiopatía hipertrófica
E Endocarditis infecciosa
F Tromboembolia sistémica

28 Un hombre de 72 años con diabetes mellitus mal controlada lleva 5 años con tolerancia al esfuerzo progresivamente menor. En el último año ha sufrido dolor torácico con mínimos esfuerzos. En la exploración física tiene estertores pulmonares bilaterales y edema con fóvea en las piernas. La frecuencia cardíaca es irregular. Una radiografía de tórax muestra prominencia de los bordes cardíacos izquierdo y derecho. La ecocardiografía revela una reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (25%) con menor movimiento de la pared. Las pruebas de laboratorio arrojan una concentración de péptido natriurético de tipo B sérico elevada. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable presente este paciente?

A Estenosis coronaria crítica
B Trombo mural de la aurícula izquierda
C Miocardiopatía hipertrófica
D Engrosamiento de las válvulas mitral y tricúspide
E Exudado fibrohemorrágico pericárdico

29 Una mujer de 68 años presenta disnea y ortopnea progresivas en el último año. No refiere dolor torácico. En la exploración, la temperatura es de 37 °C; la frecuencia cardíaca, de 77 latidos/min, la frecuencia respiratoria, de 20 respiraciones/min; y la presión arterial, de 140/90 mmHg. En la auscultación del tórax se aprecian crepitantes difusos en todos los campos pulmonares. No hay soplos ni galopes y la frecuencia cardíaca es regular. La radiografía de tórax revela prominencia de los bordes cardíacos izquierdo y derecho. La coronariografía pone de manifiesto una oclusión del 90% de la arteria descendente anterior izquierda. El

ecocardiograma no muestra anomalías valvulares, pero el movimiento de la pared del ventrículo izquierdo está reducido y la fracción de eyección es del 32%. Las pruebas de laboratorio revelan una concentración de glucosa sérica de 81 mg/dl; de creatinina de 1,6 mg/dl; de colesterol total de 280 mg/dl; de triglicéridos de 169 mg/ml, y de troponina I de 1 ng/ml. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más probable que resulte útil en el tratamiento de esta paciente?

A Amiodarona
B Alteplasa
C Gliburida
D Nitroglicerina
E Propranolol
F Simvastatina

30 Un hombre de 50 años presenta bruscamente dolor torácico subesternal intenso que se irradia al cuello. En la exploración física, no tiene fiebre, pero sí taquicardia, hiperventilación e hipotensión. En la auscultación no se aprecian soplos cardíacos. Una coronariografía urgente pone de manifiesto una oclusión trombótica de la arteria circunfleja izquierda y áreas de estenosis del 50-70% en la circunfleja proximal y descendente anterior. ¿Cuál de las siguientes complicaciones de esta enfermedad es más probable que se produzca en la hora siguiente a estos síntomas?

A Rotura del miocardio
B Pericarditis
C Insuficiencia valvular
D Fibrilación ventricular
E Tromboembolia

31 Se realiza un estudio sobre personas atendidas en los servicios de urgencia. Se observa que sobreviven el 5% de los individuos con parada cardíaca súbita que reciben reanimación cardiopulmonar. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de la parada cardíaca es más probable en los supervivientes?

A Arritmia
B Infarto
C Inflamación
D Insuficiencia valvular
E Rotura del ventrículo



32 Un hombre de 59 años lleva 18 meses con cansancio crónico. En la exploración física está afebril. Una radiografía de tórax revela edema de pulmón bilateral y borde cardíaco izquierdo prominente. La figura muestra una imagen macroscópica representativa del corazón. Las pruebas de laboratorio arrojan los siguientes resultados: glucosa, 74 mg/dl; colesterol total, 189 mg/dl; proteínas totales, 7,1 g/dl; albúmina, 5,2 g/dl; creatinina, 6,1 mg/dl, y nitrógeno ureico, 58 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Alcoholismo crónico
B Diabetes mellitus
C Hemocromatosis
D Neumoconiosis
E Hipertensión sistémica



33 Un hombre de 56 años presenta tos y ortopnea progresivas de 2 años de evolución. En la exploración física, hay matidez en la percusión de ambas bases pulmonares y crepitantes difusos en los campos pulmonares superiores. No tiene fiebre. La ecocardiografía revela una hipertrofia marcada del ventrículo izquierdo y estenosis aórtica grave. La figura muestra una imagen macroscópica representativa del corazón seccionado. Una coronariografía no pone de manifiesto estenosis significativas de las arterias coronarias. ¿Cuál de los siguientes trastornos subyacentes explica mejor estos hallazgos?

A Anomalía congénita
B Diabetes mellitus
C Endocarditis infecciosa
D Síndrome de Marfan
E Hipertensión sistémica

34 Una mujer de 73 años presentó hace 1 semana un episodio de desorientación, dificultades para hablar y debilidad persistente en el lado derecho del cuerpo. En la exploración física, actualmente está afebril con frecuencia cardíaca de 68 latidos/min, frecuencia respiratoria de 15 respiraciones/min y presión arterial de 130/85 mmHg. En la auscultación, los pulmones están limpios, la frecuencia cardíaca es irregular y hay un chasquido mesosistólico. Una TC torácica muestra un foco de atenuación brillante en el corazón. El ecocardiograma revela que una valva valvular parece

dirigirse hacia arriba. La fracción de eyección estimada es del 55%. Las pruebas de laboratorio ponen de manifiesto una concentración de creatina cinasa (CK) sérica de 100 U/l; de glucosa de 77 mg/dl; de creatinina de 0,8 mg/dl; de calcio de 8,1 mg/dl, y de fósforo de 3,5 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Cardiopatía carcinoide
B Hiperparatiroidismo
C Endocarditis infecciosa
D Calcificación anular mitral
E Cardiopatía reumática
F Estenosis calcificada senil



35 Una mujer de 77 años ha presentado episodios de síncopes con el esfuerzo durante el último mes. En la exploración física está afebril. La frecuencia cardíaca es de 66 latidos/min, la frecuencia respiratoria, de 14 respiraciones/min; y la presión arterial, de 125/85 mmHg. En la auscultación se escucha un soplo de eyección sistólico. Hay algunos crepitantes en las bases pulmonares posteriores. De acuerdo con la imagen macroscópica representativa de la aorta abierta mostrada en la figura, ¿cuál de los siguientes factores es más probable que haya contribuido al

desarrollo de esta lesión?

A Envejecimiento
B Ateroesclerosis
C Aneuploidía cromosómica
D Hipercalcemia de las neoplasias malignas
E Lupus eritematoso sistémico
F Sífilis terciaria

36 Una mujer sana de 65 años acude a una consulta rutinaria de salud y el único hallazgo es un chasquido mesosistólico en la auscultación cardíaca. En los 5 años siguientes desarrolla una disnea progresiva. La ecocardiografía revela, entonces, insuficiencia mitral por el prolapso de una valva. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que presente esa valva?

A Vegetaciones destructivas
B Calcificación distrófica
C Necrosis fibrinoide
D Degeneración mixomatosa
E Fibrosis reumática

37 Una mujer de 35 años ha presentado palpitaciones, cansancio y dolor torácico progresivos en el último año. En la exploración física, no tiene fiebre. La frecuencia cardíaca es de 75 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 15 respiraciones/min, y la presión arterial, de 110/70 mmHg. La auscultación del tórax revela un chasquido mesosistólico con soplo telesistólico. La revisión por sistemas indica que la paciente tiene una o dos crisis de ansiedad al mes. ¿Qué hallazgo es más probable que se identifique en el ecocardiograma?

A Vegetaciones valvulares aórticas
B Prolapso de la válvula mitral
C Conducto arterioso persistente
D Estenosis pulmonar
E Insuficiencia de la válvula tricúspide

38 Un niño de 11 años tuvo faringitis sin tos, con exudados amigdalinos y fiebre de 38,3 °C hace 3 semanas, y en un cultivo faríngeo se detectó el crecimiento de *Streptococcus* β-hemolítico del grupo A. En la exploración de seguimiento, el niño no tiene fiebre. La frecuencia cardíaca es de 85 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 18 respiraciones/min, y la presión arterial, de 90/50

mmHg. En la auscultación es audible un soplo mitral diastólico y hay estertores difusos en ambos pulmones. A lo largo de los 2 días siguientes presenta varios episodios de fibrilación auricular acompañados de signos de insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo. ¿Cuál de las siguientes alteraciones que se están produciendo en el corazón de este niño es más probable que sea la causa de la insuficiencia del ventrículo izquierdo?

A Amiloidosis
B Pericarditis fibrinosa
C Fibrosis de la válvula mitral
D Miocarditis
E Taponamiento
F Endocarditis verrugosa



39 Una niña de 14 años tiene fiebre y dolor torácico 2 semanas después de una infección leve de las vías respiratorias altas. En la exploración física, la temperatura es de 37 °C; la frecuencia cardíaca, de 90 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 20 respiraciones/min, y la presión arterial, de 85/45 mmHg. La auscultación del tórax revela un roce de fricción. La radiografía de tórax muestra edema de pulmón. Un ecocardiograma pone de manifiesto pequeñas vegetaciones en la línea de cierre de las válvulas mitral y aórtica. La biopsia endomiocárdica muestra

agregados intersticiales focales de células mononucleares que rodean áreas de necrosis fibrinoide. La enfermedad mejora a lo largo del mes siguiente. La figura ilustra una imagen macroscópica representativa del corazón afectado. ¿Cuál de las siguientes anomalías cardíacas es más probable que tenga esta paciente?

A Pericarditis constrictiva
B Miocardiopatía dilatada
C Aneurisma del ventrículo izquierdo
D Mixoma
E Estenosis valvular

40 Una niña de 10 años desarrolla nódulos subcutáneos en los brazos y tronco 3 semanas después de una faringitis aguda. Presenta movimientos coreicos, y comienza a quejarse de dolor en las caderas y las rodillas, especialmente con el movimiento. En la auscultación del tórax se escucha un roce. ¿Cuál de los siguientes parámetros de laboratorio es más probable que esté alterado de forma característica en esta enfermedad?

A Título de anticuerpos antiestreptolisina O
B Título de anticuerpos antinucleares
C Concentración de creatinina
D Prueba de reagina plasmática rápida
E Concentración de troponina I



41 Un hombre de 25 años fue encontrado muerto en su domicilio

por el responsable del edificio de apartamentos donde residía, con quien se había puesto en contacto el jefe del fallecido al no acudir este al trabajo en los 3 días previos. Un examen externo realizado por el médico mostró hemorragias en astilla bajo las uñas de las manos y ausencia de señales de traumatismos. La figura muestra una imagen macroscópica del corazón en la autopsia. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que aporte indicios de la causa de su enfermedad?

A Título elevado de antiestreptolisina O
B ANCA positivos
C Aumento de la fracción MB de creatina cinasa (CK-MB)
D Título alto de autoanticuerpos anti-ADN bicatenario
E Hemocultivo positivo para *Staphylococcus aureus*

42 Un hombre de 22 años previamente sano se somete a una extracción dental y 4 días después desarrolla fiebre. En la exploración física la temperatura es de 37,6 °C. La auscultación revela un soplo sistólico de tono agudo. Se establece un diagnóstico de presunción de cardiopatía congénita. ¿Cuál de las siguientes localizaciones es más probable que se encuentre alterada de forma congénita en este hombre?

A Aorta ascendente
B Orejuela auricular
C Cuerdas tendinosas
D Cúspides de las válvulas
E Tabique muscular

43 Una mujer de 26 años lleva 5 días con fiebre. En la exploración física, la temperatura es de 38,2 °C; la frecuencia cardíaca, de 100 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 19 respiraciones/min, y la presión arterial, de 90/60 mmHg. La auscultación revela un soplo cardíaco. El nivel de consciencia está reducido pero no hay déficits neurológicos focales. Los hallazgos de laboratorio son hemoglobina, 13,1 g/dl; plaquetas, 233.300/mm^3, y leucocitos, 19.200/mm^3. Los hemocultivos resultan positivos para bacterias grampositivas. El análisis de orina revela hematuria. Un ecocardiograma pone de manifiesto una vegetación de 1,5 cm sobre la válvula mitral. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que desarrolle esta paciente?

A Aneurisma micótico de la arteria cerebral

B Miocardiopatía dilatada
C Degeneración mixomatosa de la válvula mitral
D Derrame pericárdico con taponamiento
E Absceso pulmonar

44 Un joven de 19 años lleva 3 semanas con fiebre de escasa entidad. En la exploración física, la temperatura es de 38,3 °C; la frecuencia cardíaca, de 104 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 28 respiraciones/min, y la presión arterial, de 95/60 mmHg. La punta del bazo es palpable y dolorosa al tacto. Hay hemorragias en astillas bajo las uñas de las manos y nódulos hemorrágicos dolorosos en palmas y plantas de los pies. La auscultación revela un soplo cardíaco. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que se cultive en la sangre de este paciente?

A Virus de Coxsackie B
B *Mycobacterium tuberculosis*
C *Pseudomonas aeruginosa*
D *Streptococcus viridans*
E *Trypanosoma cruzi*

45 Una mujer de 71 años ha perdido 10 kg de peso en los últimos 8 meses, junto con náuseas intensas y vómitos de sangre. En la exploración física no tiene fiebre. Las pruebas de laboratorio muestran una hemoglobina de 8,4 g/dl; plaquetas, 227.100/mm^3, y leucocitos, 6.180/mm^3. Las muestras de biopsia obtenida mediante endoscopia digestiva alta ponen de manifiesto un adenocarcinoma gástrico. La TC abdominal muestra múltiples masas hepáticas. Una TC craneal revela un área quística en el lóbulo frontal derecho. Permanece estable hasta 2 semanas después, cuando desarrolla disnea grave. Una TC torácica presenta áreas de menor atenuación arterial pulmonar. ¿Cuál de las siguientes lesiones cardíacas es más probable que esté presente en esta mujer?

A Estenosis calcificada de la válvula aórtica
B Pericarditis constrictiva
C Carcinoma metastásico epicárdico
D Trombosis mural del ventrículo izquierdo
E Endocarditis trombótica no bacteriana

46 Una mujer de 41 años presenta disnea progresiva en la última semana. En la exploración física, la temperatura es de 37,3 °C; la frecuencia cardíaca, de 85 latidos/min; la frecuencia respiratoria,

de 20 respiraciones/min, y la presión arterial, de 150/95 mmHg. Hay matidez en la percusión de las bases pulmonares. La radiografía de tórax revela un gran derrame pleural bilateral y que el tamaño del corazón es normal. Entre los hallazgos de laboratorio destacan una concentración de creatinina sérica de 3,1 mg/dl; de nitrógeno ureico de 29 mg/dl; de troponina I de 0,1 ng/ml; leucocitos de 3.760/mm^3; de hemoglobina de 11,7 g/dl, y ANA y anticuerpos anti-ADN bicatenario positivos. ¿Cuál de las siguientes lesiones cardíacas es más probable que tenga esta paciente?

A Estenosis aórtica calcificada
B Pericarditis hemorrágica
C Endocarditis trombótica no bacteriana
D Endocarditis de Libman-Sacks
E Trombosis mural
F Endocarditis verrugosa reumática

47 Una mujer de 44 años con estenosis aórtica por cardiopatía reumática se somete a un recambio valvular con una bioprótesis. Permanece estable durante los 8 años siguientes y después desarrolla una tolerancia reducida al esfuerzo. ¿Cuál de las siguientes complicaciones relacionadas con la bioprótesis es más probable que se haya producido?

A Embolización
B Hemólisis
C Infarto de miocardio
D Extravasación paravalvular
E Estenosis

48 Un hombre de 50 años con antecedentes de endocarditis infecciosa presenta cansancio progresivo. Se le implanta una prótesis valvular mitral mecánica bivalva con disco oscilante. Tras la cirugía está estable y el ecocardiograma no muestra anomalías de la función valvular ni ventricular. ¿Cuál de los siguientes fármacos debería recibir regularmente tras esta intervención quirúrgica?

A Ácido acetilsalicílico
B Ciprofloxacino
C Ciclosporina
D Digoxina

E Propranolol
F Warfarina

49 Un hombre de 44 años previamente sano presenta tolerancia al esfuerzo progresivamente menor junto con disnea marcada en los últimos 6 meses. En la exploración física, las constantes vitales son normales. Se aprecian estertores difusos en todos los campos pulmonares y edema con fóvea hasta las rodillas. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de sodio sérico de 130 mmol/l; de potasio de 4 mmol/l; de cloro de 102 mmol/l; de CO_2 de 25 mmol/l; de creatinina de 2 mg/dl, y glucosa de 120 mg/dl. Se recoge una muestra de orina de 100 ml, que contiene 1,3 mmol de sodio y 40 mg de creatinina. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia y edema de pulmón con derrame pleural. Un ecocardiograma revela aumento de tamaño de las cuatro cavidades cardíacas, así como insuficiencia mitral y tricuspídea, con una fracción de eyección del 30%. La coronariografía pone de manifiesto estenosis inferiores al 10% en las arterias coronarias principales. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Amiloidosis
B Hipercolesterolemia
C Miocardiopatía familiar
D Cardiopatía reumática
E Infección por *Trypanosoma cruzi*

50 Un hombre de 56 años ha presentado cansancio progresivo y menor tolerancia al esfuerzo en los últimos 2 años. La exploración física revela temperatura de 37 °C, frecuencia cardíaca de 75 latidos/min; frecuencia respiratoria de 17 respiraciones/min, y presión arterial de 115/75 mmHg. En la auscultación se aprecian crepitantes difusos. El abdomen está distendido con oleada ascítica y hay edemas bilaterales con fóvea hasta las rodillas. La radiografía de tórax muestra edema de pulmón, derrame pleural y cardiomegalia marcada. Un ecocardiograma pone de manifiesto insuficiencia tricuspídea y mitral leves, y reducción del movimiento de la pared de los ventrículos izquierdo y derecho, con una fracción de eyección del 30%. En el año siguiente sufre infartos cerebrales, renales y esplénicos. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que haya producido estos hallazgos tras un consumo crónico?

A Paracetamol
B Cocaína
C Etanol
D Lisinopril
E Nicotina
F Propranolol

51 Un hombre de 25 años sufre una parada cardíaca súbita. Es reanimado. En la exploración, las constantes vitales son normales. El ecocardiograma muestra un ventrículo izquierdo normal pero también un notable adelgazamiento con dilatación del ventrículo derecho. La RM torácica revela una extensa sustitución fibrograsa del miocardio, sin inflamación. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que explique estos hallazgos?

A Miocardiopatía
B Enfermedad de Chagas
C Hipertensión
D Síndrome del QT largo
E Radioterapia

52 Una niña de 10 años con desarrollo normal tiene intolerancia crónica progresiva al esfuerzo. En la exploración física, la temperatura es de 37,1 °C; la frecuencia cardíaca, de 70 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 14 respiraciones/min, y la presión arterial, de 100/60 mmHg. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia y edema de pulmón leve. Un ecocardiograma revela hipertrofia grave del ventrículo izquierdo y tabique interventricular prominente. El ventrículo derecho está ligeramente engrosado. Durante la sístole, la valva anterior de la válvula mitral se desplaza hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La fracción de eyección está anómalamente elevada, y el volumen ventricular y el gasto cardíaco son bajos. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que justifique las anomalías cardíacas en esta paciente?

A Autoinmunidad contra fibras miocárdicas
B Mutación en el gen de la cadena pesada de la β-miosina
C Depósito de fibrillas de amiloide
D Acumulación excesiva de hierro
E Infección latente por enterovirus

53 Una adolescente de 17 años salta para bloquear en el tercer

partido de un torneo de voleibol y cae al suelo inconsciente. Requiere reanimación cardiopulmonar. Un mes después sufre un episodio similar. Siempre había estado sana y únicamente refería episodios limitados de dolor torácico durante los partidos en el curso académico actual. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos del corazón es más probable que esté presente en esta paciente?

A Depósito extenso de hemosiderina en el miocardio

B Miocitos septales hipertrofiados dispuestos desordenadamente

C Vegetaciones grandes y frágiles con destrucción de las cúspides de la válvula aórtica

D Estenosis mitral con aumento del tamaño de la aurícula izquierda

E Taquizoítos en focos de necrosis e inflamación del miocardio

54 Un hombre de 86 años presenta disnea progresiva y menor tolerancia al esfuerzo en los últimos 7 años. En la exploración física no tiene fiebre y su presión arterial es de 135/85 mmHg. La auscultación del tórax revela una frecuencia cardíaca de 76 latidos/min de promedio, irregularmente irregular. En las bases pulmonares hay crepitantes. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia discreta y edema de pulmón leve. La ecocardiografía pone de manifiesto un ligero engrosamiento de la pared de los ventrículos izquierdo y derecho con menor movimiento de las paredes ventriculares derecha e izquierda, reducción del llenado ventricular izquierdo y fracción de eyección estimada del 25%. Una biopsia endomiocárdica muestra depósitos amorfos de color rosado entre las fibras miocárdicas, sin inflamación ni necrosis. ¿Cuál de las siguientes alteraciones funcionales cardíacas es más probable que revele el ecocardiograma?

A Obstrucción dinámica al flujo de salida ventricular

B Alteración del llenado diastólico ventricular

C Aumento del volumen telesistólico

D Insuficiencia valvular mitral y tricuspídea

E Fracción de eyección reducida

55 Una mujer de 33 años procedente de Victoria, Columbia Británica, consulta al médico por disnea, ortopnea y tumefacción de las piernas progresivamente más intensas en las últimas 2

semanas. Carece de antecedentes médicos y quirúrgicos. En la exploración física, la temperatura es de 37,8 °C; la frecuencia cardíaca, de 83 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 20 respiraciones/min, y la presión arterial, de 100/60 mmHg. Un ECG muestra episodios de taquicardia ventricular. El ecocardiograma revela dilatación de los ventrículos izquierdo y derecho sin deformidades valvulares. Una biopsia endomiocárdica pone de manifiesto necrosis focal de miocitos e infiltrados linfocíticos. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que haya causado la infección?

A Virus de Coxsackie A
B *Mycobacterium kansasii*
C Estreptococos del grupo viridans
D *Staphylococcus aureus*
E *Toxoplasma gondii*
F *Trypanosoma cruzi*



56 Un hombre de 68 años presenta debilidad y letargo progresivos desde hace 7 meses. En la exploración física, la temperatura es de 36,9 °C; la frecuencia cardíaca, de 70 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 15 respiraciones/min, y la presión arterial, de

160/105 mmHg. La auscultación del tórax revela un roce. No hay otros hallazgos de interés. La figura muestra una imagen macroscópica representativa del corazón. ¿Cuál de los siguientes resultados de laboratorio es más probable obtener en este paciente?

A Título elevado de antiestreptolisina O sérica
B Aumento de la concentración de renina plasmática
C Concentración de nitrógeno ureico sanguíneo alta
D Aumento de la concentración de CK-MB sérica
E Títulos de ANA positivos con patrón «en anillo»
F Serología vírica positiva

57 Una mujer de 52 años presenta tos crónica de 2 años de evolución acompañada de esputo blanquecino de escasa cuantía, en ocasiones con vetas de sangre. En la exploración física la temperatura es de 37,9 °C; la frecuencia cardíaca, de 72 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 22 respiraciones/min, y la presión arterial, de 125/80 mmHg. Los tonos cardíacos son débiles y hay una caída inspiratoria de 15 mmHg en la presión arterial sistólica. La radiografía de tórax muestra bordes cardíacos prominentes con una configuración en «botella de agua». La pericardiocentesis obtiene 200 ml de líquido sanguinolento. ¿La infección por cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que provoque estos hallazgos?

A *Candida albicans*
B Virus de Coxsackie B
C Estreptococo del grupo A
D *Mycobacterium tuberculosis*
E *Staphylococcus aureus*



58 Un hombre de 31 años presentó dolor torácico y disnea y náuseas progresivas; perdió el conocimiento múltiples veces. A los 7 días de la aparición de estos síntomas fue encontrado muerto en la cama. El examen externo del cuerpo por parte del forense no muestra indicios de traumatismos. La talla era de 166 cm, y el peso, de 75 kg (IMC, 27). La figura muestra una imagen macroscópica de la cavidad torácica en la autopsia, con el saco pericárdico abierto. ¿Cuál es la causa subyacente más probable de

la muerte?

A Ateroesclerosis coronaria
B Miocardiopatía dilatada
C Tuberculosis diseminada
D Esclerosis sistémica
E Melanoma
F Síndrome de Marfan
G Arteritis de Takayasu

59 Una mujer de 73 años ha presentado episodios de dolor torácico en la última semana. No tiene fiebre. La frecuencia cardíaca es de 80 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 16 respiraciones/min, y la presión arterial, de 110/70 mmHg. En la auscultación torácica, los tonos cardíacos parecen distantes, pero no hay ruidos pulmonares sobreañadidos. Las venas del cuello están distendidas hasta el ángulo de la mandíbula, incluso en sedestación. Hay una lesión irregular de color oscuro y de 1,2 cm en la piel del hombro derecho. La radiografía de tórax muestra bordes prominentes de las cavidades derecha e izquierda del corazón. La pericardiocentesis revela la presencia de líquido sanguinolento. Entre los resultados de laboratorio destacan una concentración sérica de troponina I de 0,3 ng/ml. ¿Cuál de las siguientes lesiones es la causa más probable de este cuadro?

A Estenosis aórtica calcificada
B Ateroesclerosis coronaria
C Metástasis epicárdicas
D Valvulitis mitral
E Pericarditis tuberculosa

60 Una mujer de 48 años previamente sana refiere cuatro episodios de pérdida del conocimiento repentina en los últimos 6 meses. En tres de las ocasiones estuvo inconsciente solo unos minutos. Tras el cuarto episodio, hace 1 mes, permaneció inconsciente 6 h y tenía debilidad en el brazo derecho y dificultades para hablar. En la exploración física no presenta fiebre, y la presión arterial es normal. No se auscultan soplos. Los pulsos carotídeos son buenos, sin soplos. ¿Cuál de las siguientes lesiones cardíacas es más probable que tenga esta mujer?

A Válvula aórtica bicúspide
B Trombosis de una arteria coronaria

- C Mixoma de la aurícula izquierda
- D Estenosis mitral
- E Derrame pericárdico

61 Un hombre de 55 años se somete a un trasplante cardíaco ortotópico. A los 2 meses, una biopsia endomiocárdica muestra muerte focal de células miocárdicas con linfocitos y células plasmáticas perivasculares diseminados. Recibe tratamiento con sirolimús. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos explica mejor los hallazgos de la biopsia?

- A Autoinmunidad
- B Autofagia
- C Isquemia
- D Infección
- E Rechazo

62 Un hombre de 45 años recibe un aloinjerto cardíaco por una miocardiopatía dilatada. No tiene problemas de rechazo, pero 5 años después empeora su tolerancia al esfuerzo con disnea y edemas periféricos progresivos. La ecocardiografía muestra una fracción de eyección reducida, del 35%. ¿Cuál de las siguientes anomalías es más probable que se haya desarrollado en el aloinjerto?

- A Amiloidosis
- B Pericarditis constrictiva
- C Arteriopatía coronaria
- D Linfoma no hodgkiniano
- E Toxoplasmosis

Respuestas

1 **F** El marcapasos del corazón es el nódulo sinoauricular (SA) con un ritmo natural cercano a 70 latidos/min y un intervalo normal de 60-100 latidos/min. Otras partes del sistema de conducción cardíaco transmiten esta frecuencia. Las frecuencias inferiores a 60 latidos/min se consideran bradicardia, y las superiores a 100 latidos/min, taquicardia. Las bradiarritmias con menos de 50 latidos/min apuntan a un trastorno del nódulo SA. La disfunción del nódulo SA puede empeorar con fármacos cardioactivos, como glucósidos cardíacos, β-bloqueantes, antagonistas del calcio y amiodarona. Un incremento en la

frecuencia sinusal se relaciona con el aumento del tono simpático actuando a través de receptores β-adrenérgicos; una reducción del tono parasimpático actuando a través de receptores muscarínicos, o ambos. No es probable que las anomalías de las demás opciones produzcan esa bradicardia tan pronunciada y mantenida.

2 **F** Las células madre cardíacas originales pueden proliferar y reemplazar a los miocitos cardíacos durante toda la vida, pero estas células madre son más activas en los neonatos. Tienen el potencial de responder a la lesión. Algunos casos de comunicación interventricular se cierran a lo largo de la vida. Se están investigando métodos para inducir la proliferación de células madre. De las demás células reseñadas, los adipocitos aumentan de tamaño con la edad. Las células endoteliales pueden proliferar para producir más canales coronarios colaterales en respuesta al entrenamiento en ejercicio y pueden reepitelizar injertos vasculares. Los fibroblastos responden a la lesión produciendo tejido cicatricial colágeno que reduce la contractilidad.

3 **E** Estos hallazgos son compatibles con insuficiencia cardíaca congestiva derecha, que provoca edemas periféricos, derrames en cavidades corporales (derrame pleural en este caso), congestión pasiva del hígado y distensión de las venas yugulares. La insuficiencia derecha pura es menos frecuente que la izquierda, y habitualmente se debe a enfermedad pulmonar (corazón pulmonar). La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es más frecuente que la enfermedad pulmonar restrictiva, y el tabaquismo provoca EPOC. Los mixomas auriculares son infrecuentes, por lo general aparecen en el lado izquierdo del corazón y es posible que causen obstrucción valvular intermitente. La hipertensión esencial es sistémica y supone una carga de presión para el lado izquierdo del corazón. La hiperlipidemia es un factor de riesgo de la cardiopatía isquémica, y la probabilidad de que afecte a la cavidad izquierda del corazón es mayor. La cardiopatía reumática puede producir insuficiencia cardíaca, pero suele ser izquierda.

4 **C** La insuficiencia cardíaca congestiva izquierda provoca congestión y edema pulmonares. La hipertensión sistémica es

frecuente y da lugar a carga de presión con hipertrofia del ventrículo izquierdo predominantemente concéntrica y disfunción sistólica. Es más probable que las demás opciones reseñadas causen disfunción diastólica y reducción de la función de los ventrículos derecho e izquierdo.

5 **E** La disnea paroxística nocturna es una característica de la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, la cardiopatía reumática afecta con más frecuencia a la válvula mitral, a la aórtica o a ambas, y la valvulopatía izquierda provoca edema de pulmón. En bipedestación, el líquido del edema pulmonar está más concentrado en las bases de los pulmones, lo que ayuda a mejorar la respiración. La cardiopatía reumática era más frecuente cuando no se contaba con antibióticos para tratar las infecciones por estreptococo β-hemolítico del grupo A; entonces múltiples episodios desde la infancia derivaban en lesiones valvulares en el plazo de décadas. Los mixomas auriculares suelen originarse en el lado izquierdo del corazón, pero la obstrucción es con frecuencia intermitente. La pericarditis fibrinosa es una causa de dolor torácico, pero la cantidad de líquido acompañante suele ser pequeña, de modo que la función cardíaca no se altera. La miocarditis de células gigantes es una causa infrecuente de insuficiencia cardíaca. La endocarditis de Libman-Sacks, observada en el lupus eritematoso sistémico, no suele afectar a la función valvular ni a la ventricular.

6 **B** Los hallazgos apuntan a una insuficiencia cardíaca congestiva derecha pura. Rara vez esta se debe a lesiones valvulares derechas, como, por ejemplo, estenosis tricuspídea o pulmonar. La hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares obstructivas, como enfisema o bronquitis crónica, cuya causa más frecuente es fumar cigarrillos, resulta mucho más frecuente. La hipertensión pulmonar primaria también provoca insuficiencia cardíaca derecha, pero es una causa mucho menos frecuente que las enfermedades pulmonares obstructivas. Como el infarto agudo de miocardio suele afectar al ventrículo izquierdo, en esos pacientes sería más frecuente una insuficiencia cardíaca izquierda. En último término, la insuficiencia cardíaca izquierda crónica causa insuficiencia cardíaca derecha.

7 **D** Hay varias mutaciones en genes ligados a las cardiopatías congénitas que codifican proteínas de vías de transcripción o señales. La vía NOTCH participa en la modulación del desarrollo vascular, incluidos los tractos de salida cardíacos. Las mutaciones de *NOTCH2* se asocian a tetralogía de Fallot, como en este recién nacido. Las mutaciones del gen *β-MHC* se asocian, en algunos casos, a miocardiopatía hipertrófica. El síndrome de Marfan se debe a mutaciones del gen *fibrilina 1 (FBN1).* En el síndrome del QT largo es posible observar mutaciones de *KCNQ1.* Una forma de amiloidosis cardíaca está relacionada con mutaciones del gen *transtiretina (TTR).*

8 **E** Este cortocircuito se relaciona con la confluencia anómala de las venas pulmonares que se dirigen a la aurícula derecha (o venas sistémicas) y no a la izquierda. A menudo existe obstrucción, como en este caso, con congestión pulmonar. La sangre venosa desoxigenada sistémica y la pulmonar oxigenada se mezclan en la aurícula derecha. Tiene que existir un defecto del tabique auricular para que la sangre llegue a la aurícula izquierda, pero una comunicación interauricular no explica por sí sola este caso. La coartación no se asocia a cianosis; una coartación preductal es potencialmente mortal. El conducto arterioso persistente implica un cortocircuito de izquierda a derecha sin cianosis. La tetralogía de Fallot puede provocar cianosis, pero la mezcla de sangre se produce en una aorta cabalgada.

9 **D** Este es el tristemente famoso «émbolo paradójico», que aparece con mucha más frecuencia en los exámenes que en la vida real. La paciente comenzó con tromboflebitis, que provocó una embolia pulmonar, pero debe haber una explicación para el «ictus» que tuvo lugar después. Los émbolos pulmonares pueden obstruir la circulación arterial pulmonar y elevar, por tanto, la presión de la aurícula derecha y abrir un agujero oval persistente, que normalmente está cerrado gracias a la presión más elevada de la aurícula izquierda. Las demás opciones no explican la tromboembolia pulmonar. Es posible que un mixoma de la aurícula izquierda embolice al encéfalo; las lesiones de la endocarditis son más frecuentes en la cavidad izquierda del corazón y podrían producir émbolos encefálicos; los aneurismas

ventriculares están prácticamente siempre en el lado izquierdo del corazón porque se produce por infartos cicatrizados y es posible que estén ocupados por trombos murales capaces de embolizarse.

10 **D** La figura muestra una gran comunicación interventricular. Antes de los 5 años de edad, esos defectos no corregidos causan un gran cortocircuito de sangre de izquierda a derecha y provocan hipertensión pulmonar (complejo de Eisenmenger). Las cavidades ventriculares izquierda y derecha se hipertrofian y presentan cierta dilatación, pero el funcionamiento de las válvulas cardíacas no se afecta mucho. En la mayoría de los casos, las cardiopatías congénitas no anteceden a la cardiopatía isquémica. La endocarditis trombótica no bacteriana se produce con más frecuencia de forma secundaria a un estado de hipercoagulabilidad en adultos. La miocardiopatía restrictiva se debe a enfermedades como la amiloidosis o la hemocromatosis.

11 **B** Un defecto del tipo *ostium secundum* persistente es la forma más frecuente de comunicación interauricular. Como las presiones auriculares son bajas, la magnitud del cortocircuito de la aurícula izquierda a la derecha es pequeña, y es posible que esta lesión permanezca asintomática durante muchos años. En último término, puede producirse hipertensión pulmonar, con inversión del cortocircuito. La cianosis es característica de los cortocircuitos de derecha a izquierda. Un corazón dilatado con aurículas agrandadas predispone a trombosis murales y embolias. El derrame pericárdico puede producirse mucho después si se desarrolla insuficiencia cardíaca congestiva.

12 **D** Aunque no suele causar grandes cortocircuitos, el conducto arterioso persistente sí puede producir un soplo importante y predisponer a infecciones. Es posible que este cortocircuito de izquierda a derecha produzca, en último término, hipertensión pulmonar. Las válvulas atrésicas no tienen flujo a su través y no causan soplos, pero sí encontraríamos un soplo a través del cortocircuito alrededor de la válvula atrésica. La atresia aórtica no es compatible con una supervivencia prolongada, como se observa en el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. La coartación de la aorta, por sí misma, no produce cortocircuitos ni hipertensión pulmonar. No es probable que una comunicación

interauricular cause un soplo fuerte por la mínima diferencia de presión entre las aurículas. Como la estenosis pulmonar es un componente de la tetralogía de Fallot, no hay hipertensión pulmonar, y el cortocircuito de derecha a izquierda provoca cianosis con menor saturación arterial de oxígeno. El retorno venoso pulmonar anómalo total no se acompaña de soplos por la baja presión venosa.

13 **E** La cianosis a esta edad tan temprana indica un cortocircuito de derecha a izquierda. El tronco arterioso, la transposición de las grandes arterias y la tetralogía de Fallot son las causas más frecuentes de cardiopatía congénita cianótica. La lesión cerebral apunta a un absceso como consecuencia de un émbolo séptico por endocarditis infecciosa, que puede complicar las cardiopatías congénitas. La comunicación interauricular e interventricular y el conducto arterioso persistente provocan inicialmente cortocircuitos de izquierda a derecha, aunque estos pueden revertirse con el desarrollo de hipertensión pulmonar. La coartación no se acompaña de cortocircuito ni cianosis. En la mayoría de los casos, una válvula bicúspide es asintomática hasta la edad adulta y no hay cortocircuito.

14 **A** En la tetralogía de Fallot, la gravedad de la obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho determina la dirección del flujo. Si la estenosis pulmonar es leve, la anomalía se parece a una comunicación interventricular y el cortocircuito puede producirse de izquierda a derecha, sin cianosis. Cuando aparece una obstrucción significativa al tracto de salida pulmonar, la presión del ventrículo derecho puede alcanzar o sobrepasar la resistencia vascular sistémica, y la sangre pasaría de derecha a izquierda, con lo que se produciría una cardiopatía cianótica. Aunque la estenosis pulmonar sea leve en el momento del nacimiento, el orificio pulmonar no se expande proporcionalmente a medida que crece el corazón, y sobreviene una cardiopatía cianótica.

15 **D** La figura muestra que la aorta nace del ventrículo derecho y el tronco pulmonar sale del ventrículo izquierdo, lo que es compatible con una transposición completa de los grandes vasos. A menos que exista otra conexión anómala entre la circulación sistémica y la pulmonar, este cuadro es incompatible

con la vida extrauterina. Las conexiones anómalas adicionales más frecuentes serían la comunicación interventricular, el conducto arterioso persistente y agujero oval persistente (o comunicación interauricular). En la estenosis pulmonar y aórtica, las grandes arterias tienen una posición normal, pero son pequeñas. En la tetralogía de Fallot, la aorta está cabalgada sobre una comunicación interventricular, pero no hay transposición. En el tronco arterioso, el tabique espiral que separa embriológicamente las grandes arterias no se desarrolla bien.

16 **B** En niños y adultos, la coartación suele ser típicamente posductal, y las ramas colaterales de la aorta proximal irrigan las extremidades superiores, lo que da lugar a la gran diferencia de pulsos entre las extremidades superiores y las inferiores. En las colaterales a menudo participan las arterias intercostales, cuyo aumento de tamaño produce las «muescas costales» en la radiografía de tórax. El descenso del flujo sanguíneo renal por debajo de la coartación aumenta la producción de renina y promueve la hipertensión. La estenosis de la válvula aórtica causa insuficiencia cardíaca izquierda sin diferencias de presión en las extremidades. Un conducto arterioso persistente produce un pequeño cortocircuito de izquierda a derecha. La transposición causa un cortocircuito de derecha a izquierda con cianosis. La atresia de la válvula tricúspide afecta al lado derecho del corazón.

17 **C** Estos hallazgos son compatibles con el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, que tiene una gravedad variable, desde formas de hipoplasia graves (como este caso, en el que prácticamente no hay función del corazón izquierdo) hasta otras más leves. La mayor parte de la sangre oxigenada que retorna a la aurícula izquierda regresa a los pulmones a través del agujero oval, con lo que aumenta el flujo pulmonar y se reduce la oxigenación. La sangre menos oxigenada que sale del ventrículo derecho al tronco pulmonar puede derivarse a través de un conducto arterioso persistente a la aorta para irrigar la circulación sistémica. Un retorno venoso anómalo no suele conectarse con la aorta, y aun así debe existir una conexión entre esta y los pulmones. Es muy poco frecuente que persista el

cuarto arco aórtico. El tronco arterioso es una separación anómala incompleta de los troncos pulmonar y de la aorta. Si no hay prácticamente cavidad ventricular izquierda, la comunicación interventricular no aportaría un flujo significativo.

18 **A** Una oclusión notable de la arteria coronaria con este grado de estenosis impide una perfusión adecuada del corazón cuando la demanda miocárdica aumenta con el esfuerzo. El paciente tiene angina de esfuerzo y recientemente ha desarrollado una angina inestable, puesta de manifiesto por la mayor frecuencia y gravedad de los ataques y la angina de reposo. La elevación del segmento ST indica un síndrome coronario agudo en desarrollo con isquemia miocárdica, pero la ausencia de aumento de las enzimas cardíacas apunta a que aún no se ha producido un infarto. En la mayoría de los pacientes, la angina inestable está inducida por la rotura de una placa ateroesclerótica seguida de un trombo mural y, posiblemente, embolización distal, vasoespasmo o ambos. Un infarto de miocardio (IM) agudo puede provocar una pericarditis fibrinosa focal, pero es improbable que provoque cicatrices extensas que rodeen el corazón. La fibrosis es un fenómeno tardío por la cicatrización de un infarto. No es probable que la hipertrofia cardíaca progrese significativamente en este caso porque no hay hipertensión ni lesiones valvulares. Es posible que se desarrolle una trombosis mural en la superficie endocárdica por encima de un infarto, y podría ocupar un aneurisma ventricular después de un IM. Los IM agudos se complican a veces con la rotura de un músculo papilar, con la consiguiente insuficiencia mitral.

19 **C** La figura muestra una arteria coronaria con un estrechamiento marcado de la luz causado por una placa ateromatosa, complicado por un trombo reciente que ocupa la luz reducida. La ateroesclerosis se acelera con la diabetes mellitus. Si una mujer premenopáusica desarrolla ateroesclerosis grave, como en este caso, hay que sospechar encarecidamente una diabetes mellitus subyacente o alteraciones de los lípidos. En los pacientes con leucemia es posible que reviertan los ateromas, pero pueden desarrollar estados de hipercoagulabilidad. Cuando esto sucede, se producen trombosis generalizadas en vasos sanguíneos

normales. Las personas con alcoholismo crónico suelen tener menos ateroesclerosis que los individuos de la misma edad que no consumen grandes cantidades de alcohol. La necrosis quística de la media que tiene lugar en el síndrome de Marfan afecta con más frecuencia a la aorta ascendente y predispone a una disección que podría involucrar a las arterias coronarias, aunque por compresión externa. La panarteritis nudosa puede afectar a las arterias coronarias y dar lugar a trombosis coronaria cuando la pared arterial está necrosada e inflamada.

20 **B** La angina de pecho aparece típicamente cuando la estenosis de la arteria coronaria supera el 75%. Los factores de riesgo son hiperglucemia (diabetes mellitus) e hipercolesterolemia. La estenosis aórtica calcificada produce insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) izquierda y la carga de trabajo adicional del ventrículo izquierdo puede causar angina de pecho. La estenosis aórtica calcificada (en ausencia de una válvula aórtica bicúspide congénita) casi nunca es sintomática a los 50 años de edad, no obstante. Las miocardiopatías provocan una insuficiencia cardíaca, pero sin dolor torácico. Los pacientes con cardiopatía reumática presentan ICC con empeoramiento progresivo pero lento. La pericarditis es una causa de dolor torácico, pero no está relacionada con el esfuerzo y no mejora con nitroglicerina. Una miocarditis vírica puede durar semanas, no 1 año, y es posible que exista dolor en reposo.

21 **E** El infarto de miocardio aparece por la oclusión de grandes ramas arteriales coronarias y en la mayoría de los casos existe un trombo oclusivo. La parte posterior del ventrículo izquierdo y el tabique están irrigados por la arteria descendente posterior. La arteria circunfleja izquierda se ocupa de la pared lateral del ventrículo izquierdo, mientras que la descendente anterior izquierda vasculariza la porción anterior del ventrículo izquierdo. Una disección aórtica que se extienda proximalmente puede causar taponamiento y comprimir el corazón, los grandes vasos e, incluso, las arterias coronarias, pero esta es una causa mucho menos probable de infarto de miocardio que la enfermedad ateroesclerótica de las arterias coronarias. El seno coronario es el lugar donde la sangre venosa del miocardio drena a la aurícula derecha.

22 **C** La figura muestra fibras miocárdicas intensamente eosinófilas con pérdida de núcleos; todas son indicativas de necrosis por coagulación. Las bandas transversales teñidas de rojo oscuro se denominan *bandas de contracción.* Los neutrófilos están infiltrados entre las fibras miocárdicas. Lo más probable es que este patrón se deba a un infarto de miocardio (IM) de 24 a 48 h de evolución. Aparece dolor torácico en la mayoría de los IM, pero no en todos. La miocarditis reumática se caracteriza por necrosis miocárdica mínima con focos de inflamación granulomatosa (cuerpos de Aschoff). No hay inflamación significativa en las miocardiopatías restrictivas, como amiloidosis o hemocromatosis. Los émbolos sépticos determinan la formación local de abscesos. En la miocarditis vírica hay una mínima necrosis miocárdica focal con infiltrados de células redondas.

23 **E** La reperfusión de un miocardio isquémico por trombólisis espontánea o terapéutica modifica las características morfológicas del área afectada. La vuelta del flujo de sangre a la vasculatura dañada durante el período de isquemia provoca disfunción mitocondrial, seguida de salida de sangre a los tejidos (hemorragia). Las bandas de contracción están compuestas por sarcómeros hipercontraídos y densamente empaquetados. Probablemente estén causadas por una contracción exagerada de miofibrillas dañadas previamente que se ven expuestas a altas concentraciones de iones de calcio procedentes del plasma. La membrana celular dañada de las fibras miocárdicas lesionadas permite que el calcio entre rápidamente en las células. La formación de radicales libres y la liberación de enzimas leucocíticas potencian aún más la muerte de células miocárdicas. La hemorragia no sería una característica prominente en las demás opciones reseñadas. Las vasculitis que afectan al corazón son infrecuentes; la arteritis de Takayasu puede afectar a las arterias coronarias, pero suele tratarse de una enfermedad pediátrica infrecuente. Los fármacos usados para controlar las arritmias en el síndrome coronario agudo no suelen asociarse a hemorragia como efecto adverso. La angioplastia por sí misma no aumenta el riesgo de hemorragia, y las endoprótesis vasculares ayudan a mantener abierta la arteria más tiempo. No

es frecuente la embolia séptica en una arteria coronaria procedente de vegetaciones valvulares infectadas, aunque esos émbolos podrían producir necrosis focal y hemorragia.

24 **B** La actividad de CK comienza a elevarse 2-4 h después de un IM, alcanza su máximo en 24-48 h y se normaliza a las 72 h. Las concentraciones de troponina I empiezan a aumentar aproximadamente al mismo tiempo que CK y CK-MB, pero se mantienen altas durante 7-10 días. La actividad de CK total es un marcador sensible de lesión miocárdica en las primeras 24-48 h. La CK-MB ofrece más especificidad, pero no aumenta la sensibilidad. El riesgo de rotura del miocardio es máximo de 4 a 7 días después de una necrosis miocárdica transmural. Este paciente tuvo un IM el día del dolor en el hombro. Cuando vio al médico al tercer día, las concentraciones de CK se habían normalizado, pero la de troponina I seguía estando elevada. A los 3 días, el infarto se rompió y la sangre ocupó la cavidad pericárdica. Las válvulas cardíacas son básicamente avasculares y no resultan afectadas por las lesiones isquémicas. La formación de aneurismas ventriculares es una complicación tardía de un IM cicatrizado. Los músculos papilares muestran riesgo de romperse, igual que la pared libre, pero la consecuencia sería una insuficiencia valvular aguda, no un hemopericardio. Un IM transmural puede producir pericarditis, habitualmente con cierto derrame pericárdico acompañante, pero el episodio agudo de este caso en el marco temporal descrito apunta a rotura.

25 **C** De las enzimas reseñadas, la CK-MB es la más específica de lesión miocárdica por el infarto de miocardio (IM) agudo descrito en este paciente. Las concentraciones de esta enzima empiezan a elevarse a las 2-4 h de la lesión isquémica del miocardio. El aumento de ALT es más específico de daño hepático. La AST está presente en varios tejidos; una concentración elevada no es específica de lesión miocárdica. El incremento de la lactato deshidrogenasa (LDH) 1, a diferencia de LDH-2, es indicativo de lesión miocárdica, pero la actividad de la LDH alcanza su máximo 3 días después de un IM. La proteína C reactiva aumenta en los procesos inflamatorios, aunque es inespecífica; se ha usado como parámetro predictivo

de síndrome coronario agudo. La lipasa es un marcador de pancreatitis.

26 **C** Los hallazgos de laboratorio sugieren un infarto agudo de miocardio. Las personas con hipercolesterolemia familiar tienen ateroesclerosis acelerada y avanzada, incluso en la segunda o tercera década de la vida. El síndrome de DiGeorge puede asociarse a varias malformaciones cardíacas congénitas, pero la supervivencia con él suele ser limitada por las infecciones secundarias a la inmunodeficiencia mediada por células. El síndrome de Down (trisomía 21) se acompaña con frecuencia de defectos del cojinete endocárdico, no de cardiopatía isquémica. La hemocromatosis hereditaria puede inducir una miocardiopatía infiltrante con sobrecarga de hierro, típicamente en la quinta década de la vida. El síndrome de Marfan se asocia a disección de la aorta y válvula mitral laxa.

27 **F** La figura muestra un corazón dilatado y aumentado de tamaño con un gran aneurisma ventricular de paredes delgadas y superficie endocárdica fibrosa blanca. Ese tipo de aneurismas suele relacionarse con un debilitamiento de la pared ventricular en la zona de un infarto de miocardio previo cicatrizado. Por el daño del revestimiento endocárdico, con la estasis y la turbulencia del flujo sanguíneo en la región del aneurisma, es probable que se desarrollen trombos murales. Cuando se desprenden, los trombos del lado izquierdo del corazón embolizan a la circulación sistémica y pueden causar infartos en cualquier lugar. Un mixoma auricular es la neoplasia cardíaca primaria más frecuente, pero resulta excepcional y no se relaciona con cardiopatía isquémica. La rotura cardíaca con taponamiento es más frecuente 5-7 días después de un infarto agudo de miocardio. Una pericarditis constrictiva sigue a una pericarditis supurativa o tuberculosa previa. La miocardiopatía hipertrófica no está relacionada con la cardiopatía isquémica, pero el 50% de los casos son familiares y podrían estar asociados a mutaciones de genes que codifican los elementos contráctiles cardíacos. Es más probable que una endocarditis infecciosa complique cardiopatías valvulares o defectos septales.

28 **A** El antecedente de diabetes mellitus y el dolor torácico sitúan a la cardiopatía isquémica en el primer lugar de la lista

del diagnóstico diferencial para este hombre, que presenta hallazgos de insuficiencia ventricular izquierda y derecha, y aumento del tamaño de los dos ventrículos, indicativos de miocardiopatía isquémica. Una concentración de péptido natriurético B sérico elevada (que se determina en vez de la de péptido natriurético auricular) es compatible con insuficiencia cardíaca. La ateroesclerosis coronaria oclusiva puede provocar múltiples infartos o bien causar silentemente una pérdida progresiva de fibras musculares, pero el estadio final es la miocardiopatía isquémica. Es posible la formación de trombos murales auriculares en la disfunción de la válvula aórtica y con las arritmias. La desorganización de las miofibrillas es característica de la miocardiopatía hipertrófica, que afecta preferencialmente al tabique interventricular y suele ser sintomática en los primeros años de la edad adulta. Aunque la valvulitis reumática con engrosamiento puede afectar a los lados izquierdo y derecho del corazón, es inusual y no se asocia a enfermedad arterial coronaria. La acumulación de líquido pericárdico puede limitar el movimiento cardíaco sin un corazón agrandado, y es posible que se produzca hemopericardio agudo ante una rotura ventricular.

29 **F** Una miocardiopatía isquémica puede deberse a ateroesclerosis coronaria, pero la paciente no tiene un síndrome coronario agudo. El principal factor de riesgo identificable en este caso es la hipercolesterolemia, y los fármacos inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas) resultan útiles para reducir el colesterol, en especial el colesterol de LDL. La amiodarona se usa en las arritmias refractarias. La gliburida se emplea en el tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2, pero esta paciente no tiene hiperglucemia. La nitroglicerina es un vasodilatador usado en la angina. El propranolol es un β-bloqueante que se utilizaba como antihipertensivo, y puede empeorar la bradicardia y la insuficiencia cardíaca congestiva. La alteplasa (activador del plasminógeno tisular) se administra precozmente en el tratamiento de la trombosis coronaria para ayudar a restablecer el flujo sanguíneo.

30 **D** En el período inmediatamente posterior a una trombosis coronaria, las arritmias son la complicación más importante y

pueden provocar muerte súbita cardíaca. Se cree que, incluso antes de que se manifieste la lesión isquémica en el corazón, la irritabilidad eléctrica está muy aumentada, lo que predispone a las arritmias. Varios días después se puede producir la rotura del miocardio, insuficiencia valvular por afectación de músculos papilares y pericarditis. Otra complicación es el aneurisma del ventrículo izquierdo, fenómeno tardío secundario a la cicatrización de un gran infarto transmural; es posible que un trombo mural ocupe el aneurisma y se convierta en una fuente de émbolos. Si se desprenden porciones del trombo coronario y se embolizan, llegarán a ramas arteriales más pequeñas de la distribución ya afectada por la isquemia. La insuficiencia valvular por rotura de un músculo papilar se produciría en etapas posteriores de la evolución.

31 **A** La causa más frecuente de parada cardíaca súbita es la cardiopatía isquémica. El riesgo de muerte súbita aumenta en paralelo a la estenosis ateroesclerótica de las arterias coronarias. Sin embargo, el primer episodio de un síndrome coronario agudo suele ser una arritmia y, por este motivo, la reanimación, incluida la desfibrilación, puede ser eficaz y es posible que los supervivientes no presenten cambios en el ECG o las enzimas indicativos de que se ha producido un infarto de miocardio. La inflamación tarda días en desarrollarse en caso de infarto o infección. Una insuficiencia valvular súbita por rotura de un músculo papilar, o por la rotura de la pared, puede complicar un infarto 3-7 días después del proceso inicial.

32 **E** La pared notablemente engrosada del ventrículo izquierdo es característica de la hipertrofia de fibras miocárdicas causada por la mayor carga de presión de la hipertensión, que a menudo se asocia a una nefropatía crónica. La insuficiencia del ventrículo izquierdo provoca edema de pulmón. El alcoholismo crónico se asocia más a menudo a una miocardiopatía dilatada. La diabetes mellitus acelera la ateroesclerosis, con lo que da lugar a cardiopatía isquémica e infarto de miocardio; la concentración normal de glucosa no encaja con una diabetes mellitus. La hemocromatosis provoca miocardiopatía dilatada. Las neumoconiosis producen enfermedad pulmonar restrictiva con corazón pulmonar e hipertrofia predominante del ventrículo

derecho.

33 **A** La válvula bicúspide mostrada tiende a calcificarse con el envejecimiento, lo que finalmente produce una estenosis con hipertrofia del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca izquierda con edema de pulmón. En las personas con válvulas bicúspides congénitas, los síntomas suelen aparecer a los 50-60 años de edad. Por el contrario, la estenosis aórtica calcificada de válvulas tricúspides se manifiesta en la séptima u octava década de la vida. La cardiopatía isquémica, esperable en la diabetes mellitus, no provoca estenosis valvulares. En la endocarditis infecciosa, el paciente tendría una infección y la válvula tendería a quedar destruida, lo que provocaría insuficiencia. En el síndrome de Marfan, la pérdida de tejido elástico de la media conduce a la dilatación de la raíz aórtica, que produce insuficiencia valvular aórtica. La hipertensión sistémica explica la hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero la válvula aórtica no resulta afectada.

34 **D** La calcificación del anillo mitral suele ser un descubrimiento incidental en radiografías de tórax, ecocardiogramas o autopsias. No obstante, una mayor acumulación de calcio en el anillo mitral puede afectar al sistema de conducción y causar arritmias o alterar el endocardio de tal modo que se convierta en un foco de endocarditis infecciosa y formación de trombos (que pueden embolizarse y causar accidentes cerebrovasculares, como en esta paciente). Algunos casos se asocian a un prolapso de la válvula mitral. La cardiopatía carcinoide provoca engrosamiento colágeno del endocardio y de las válvulas. El hiperparatiroidismo puede causar calcificaciones metastásicas, que no suelen afectar al corazón, y los depósitos no serían tan focales; esta paciente no tiene hipercalcemia. La endocarditis infecciosa es un proceso destructivo y la cicatrización conduce en ocasiones a fibrosis, pero no provoca el depósito nodular de calcio. Las miocardiopatías infiltrantes más frecuentes son hemocromatosis y amiloidosis. La cardiopatía reumática puede provocar cicatrices con cierto depósito de calcio, pero las valvas de las válvulas sufren una cicatrización extensa con acortamiento y engrosamiento de las cuerdas tendinosas que impiden el

desplazamiento hacia arriba. La estenosis calcificada senil afecta a la válvula aórtica; en este caso, no hay indicios de estenosis.

35 **A** Obsérvese que esta válvula tiene tres cúspides, pero los depósitos nodulares de calcio interfieren en el movimiento de las cúspides y causan estenosis aórtica calcificada. Este es un cambio degenerativo que puede producirse en una válvula aórtica normal con el envejecimiento. Es posible que se produzcan síncopes con el esfuerzo porque la válvula estenosada impide que aumente el volumen latido en presencia de vasodilatación sistémica, lo que provoca hipotensión. La ateroesclerosis no produce valvulopatías por afectación de las propias válvulas. No es probable que las anomalías congénitas con aneuploidías cromosómicas (p. ej., trisomía 21) se asocien a estenosis aórtica ni de la válvula bicúspide. La hipercalcemia puede causar calcificaciones metastásicas, pero son infrecuentes en las válvulas cardíacas; es más probable que origine arritmias. El lupus eritematoso sistémico da lugar en ocasiones a pequeñas vegetaciones estériles sobre la válvula mitral o la tricúspide, pero casi nunca causan valvulopatía. En la sífilis, la raíz de la aorta se dilata y aparece insuficiencia aórtica.

36 **D** La degeneración mixomatosa de la válvula mitral puede ser primaria por un trastorno del tejido conjuntivo, como el síndrome de Marfan, o secundaria a fuerzas hemodinámicas crónicas (en etapas posteriores de la vida); las cuerdas tendinosas se alargan y es posible que se rompan, lo que produciría insuficiencia valvular aguda. Las vegetaciones destructivas se originan en la endocarditis infecciosa y tardan de días a semanas en desarrollarse. En ancianos puede aparecer calcificación distrófica en el anillo mitral y la válvula aórtica; la primera suele ser incidental y la segunda provoca a veces estenosis sintomática. La necrosis fibrinoide es más característica de la arterioloesclerosis hiperplásica que de las válvulas cardíacas. La cardiopatía reumática causa cicatrices valvulares con acortamiento y engrosamiento de las cuerdas tendinosas, no adelgazamiento y elongación.

37 **B** Una válvula mitral laxa (prolapsada) suele ser asintomática. En caso de originar síntomas, causa cansancio, dolor torácico y arritmias. Algunos casos están relacionados con depresión

clínica y ansiedad, y otros se asocian a síndrome de Marfan. Las vegetaciones valvulares apuntan a endocarditis, y es probable que se escuche un soplo cuando existe una endocarditis infecciosa causante de insuficiencia valvular. Un conducto arterioso persistente causa un soplo sistólico estridente. La estenosis pulmonar es con más frecuencia una cardiopatía congénita. La insuficiencia tricuspídea se acompaña de un soplo sistólico estruendoso.

38 **D** Este niño desarrolló una insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo, complicación infrecuente pero grave de la fiebre reumática aguda. La pancarditis con pericarditis, endocarditis y miocarditis se desarrolla durante la fase aguda. La miocarditis condicionó una dilatación del ventrículo tan marcada que la válvula mitral pasó a ser insuficiente. La cardiopatía reumática es infrecuente hoy día, y el número de niños que requieren tratamiento antibiótico profiláctico para prevenir solo un caso es > 10.000. Los trastornos inflamatorios crónicos pueden producir amiloidosis sistémica reactiva, pero es improbable que esta ocurra por la naturaleza limitada y episódica de la infección estreptocócica causante de la cardiopatía reumática. La pericarditis fibrinosa provoca un roce de fricción audible, pero no es constrictiva, y la cantidad de líquido y fibrina no es excesiva, de modo que no se produce taponamiento. La necrosis miocárdica asociada a miocarditis es parcheada, y el ventrículo no se rompe y no produce taponamiento. La fibrosis y fusión de las valvas mitrales se desarrollan a lo largo de semanas o meses e indican valvulitis reumática crónica. Las vegetaciones verrugosas son pequeñas y es posible que produzcan un soplo, pero no interfieren mucho en la función valvular ni tienden a embolizar.

39 **E** La válvula mitral de la figura muestra el acortamiento y el engrosamiento de las cuerdas tendinosas, típicos de la valvulitis reumática crónica, y las pequeñas vegetaciones verrugosas *(puntas de flecha)* son características de una fiebre reumática aguda superpuesta. La cicatrización valvular puede producirse años después de la infección inicial por estreptococos del grupo A. La cardiopatía reumática se desarrolla una vez que la respuesta inmunitaria dirigida contra los antígenos bacterianos

(similares a antígenos cardíacos y, por tanto, un tipo de mimetismo molecular) lesiona el corazón, porque los antígenos estreptocócicos tienen reactividad cruzada con este órgano. Las válvulas más afectadas son la mitral y la aórtica, de modo que una dilatación del ventrículo derecho por afectación tricuspídea es menos probable. En casi todos los casos, la pericarditis fibrinosa observada en la fase aguda con el roce de fricción se resuelve sin cicatrices significativas, y no es habitual que se desarrolle una pericarditis constrictiva. Aunque existe miocarditis en la fiebre reumática aguda, no culmina en una miocardiopatía dilatada. Los aneurismas del ventrículo izquierdo son una complicación de la cardiopatía isquémica. Las neoplasias cardíacas primarias, incluido el mixoma, son muy infrecuentes y no están relacionadas con infecciones.

40 **A** La fiebre reumática aguda puede afectar a cualquier capa del corazón o a todas ellas. Como la fiebre reumática sigue a las infecciones por estreptococos del grupo A, los títulos de antihialuronidasa, anti-ADNasa y antiestreptolisina O (ASO) suelen estar elevados. Es menos probable que las cepas de estreptococos del grupo A que provocan fiebre reumática aguda causen glomerulonefritis, de modo que no sería de esperar un aumento de la concentración de creatinina. Los títulos de ANA podrían estar elevados en el lupus eritematoso sistémico, que produce con más frecuencia pericarditis serosa. Una prueba de reagina plasmática rápida positiva indica sífilis, pero las manifestaciones clínicas de este caso no corresponden a esa infección, y la sífilis cardiovascular es una forma de sífilis terciaria que se desarrolla décadas después de la infección inicial. Las troponinas cardíacas son marcadores de lesión miocárdica isquémica. Aunque sus concentraciones podrían estar elevadas por la miocarditis aguda que se produce en la fiebre reumática, este aumento no es característico de la cardiopatía reumática.

41 **E** La válvula aórtica mostrada tiene grandes vegetaciones destructivas. La sonda atraviesa una valva perforada, típica de la endocarditis infecciosa causada por microorganismos muy virulentos, como *Staphylococcus aureus.* Las vegetaciones verrugosas de la fiebre reumática aguda son pequeñas y no

destructivas, y el diagnóstico se debe sospechar ante un título alto de antiestreptolisina O. Un resultado positivo en la determinación de los ANCA apunta a vasculitis, que no suele afectar a las válvulas cardíacas. El aumento de la concentración de creatina cinasa-MB denota lesión miocárdica, no endocárdica. Los anticuerpos anti-ADN bicatenario son indicativos de lupus eritematoso sistémico, que puede producir una endocarditis de Libman-Sacks no destructiva.

42 **E** Este hombre presenta una endocarditis infecciosa. Si existen malformaciones cardiovasculares congénitas conocidas, las intervenciones dentales deben estar precedidas por un tratamiento antibiótico profiláctico. El soplo sistólico indica una lesión izquierda, con cortocircuito de izquierda a derecha. Es posible que una pequeña comunicación interventricular (CIV) no provoque un cortocircuito importante de sangre y permanezca subclínico, pero sigue representando un riesgo de endocarditis. Solo un soplo sería la clave, y el tono más agudo acompaña a un defecto de menor tamaño. La mayoría de las CIV se localizan en el tabique membranoso, pero cerca del 10% están en el muscular, y esta diferencia podría deberse al cierre de muchos defectos musculares a lo largo de la vida. Las demás opciones reseñadas representan zonas menos frecuentes de anomalías o áreas donde podría desarrollarse una endocarditis infecciosa.

43 **A** La paciente desarrolló una sepsis bacteriana seguida de endocarditis infecciosa de la válvula mitral. Por este motivo, tiene un riesgo elevado de sufrir complicaciones de la endocarditis infecciosa. Esas vegetaciones valvulares destruyen la válvula. La función alterada de la válvula mitral (insuficiencia con más frecuencia) daría lugar a dilatación de la aurícula izquierda e insuficiencia del ventrículo izquierdo con edema de pulmón. Los émbolos sépticos de la vegetación de la válvula mitral podrían alcanzar la circulación sistémica y provocar abscesos. La infección de una pared arterial puede debilitarla, con formación de un aneurisma y riesgo de rotura. La miocardiopatía dilatada puede deberse a alcoholismo crónico o bien ser idiopática. Es posible que sea familiar o que siga a una miocarditis, pero no es una complicación directa de la

endocarditis infecciosa. La degeneración mixomatosa de la válvula mitral se relaciona con un defecto del tejido conjuntivo, ya sea bien definido o desconocido; las valvas de la válvula mitral están aumentadas de tamaño, laxas y redundantes. Las lesiones de las válvulas derechas pueden producir émbolos sépticos que afectan a los pulmones, pero las vegetaciones izquierdas se embolizan a la circulación sistémica, lo que provoca lesiones en el bazo, los riñones y el encéfalo. Una posible causa de abscesos pulmonares es la endocarditis infecciosa derecha, porque los émbolos sépticos inundan la circulación arterial pulmonar.

44 **D** La fiebre prolongada, el soplo cardíaco, la esplenomegalia leve y las hemorragias en astilla apuntan al diagnóstico de endocarditis infecciosa. Las vegetaciones valvulares de la endocarditis infecciosa son frágiles y pueden desprenderse trozos que se embolizan. La evolución temporal de semanas apunta a una forma subaguda de endocarditis bacteriana resultante de la infección por un microorganismo menos virulento, como estreptococos del grupo viridans. Los estreptococos del grupo A son más conocidos como causa de cardiopatía reumática, con vegetaciones no infecciosas. *Pseudomonas aeruginosa* suele inducir una forma aguda de endocarditis bacteriana que empeora en días, no en semanas; este microorganismo es más frecuente como infección nosocomial o bien aparece en adictos a drogas por vías parenteral. El virus de Coxsackie B y *Trypanosoma cruzi* son causas de miocarditis. La tuberculosis que afecta al corazón se manifiesta con más frecuencia en forma de pericarditis.

45 **E** Las vegetaciones maránticas pueden producirse sobre cualquier válvula cardíaca, pero suelen ser pequeñas y no dañan las válvulas. No obstante, tienden a embolizarse. Aparecen en los estados de hipercoagulabilidad que acompañan a ciertas neoplasias malignas, especialmente adenocarcinomas secretores de mucinas. La trombosis puede producirse en cualquier lugar, pero es más frecuente en las venas de las piernas, lo que predispone a la tromboembolia pulmonar. Este estado paraneoplásico se conoce como *síndrome de Trousseau.* La estenosis aórtica calcificada tiene lugar a una edad mucho mayor, por lo general en la octava o novena década de la vida, y

produce obstrucción, pero no embolias. Las metástasis cardíacas son infrecuentes y suelen afectar al epicardio; no explican la embolia con infarto cerebral de este caso. Es posible que un tumor metastásico rodee el corazón y produzca constricción, pero es un fenómeno muy infrecuente. Las trombosis murales aparecen cuando se altera el flujo sanguíneo, como sucede en un aneurisma ventricular o una aurícula dilatada, pero probablemente las personas con neoplasias malignas no tengan cardiopatía isquémica o en ellas esta sea mínima.

46 **D** La endocarditis de Libman-Sacks es una complicación infrecuente del lupus eritematoso sistémico (LES), cuya relevancia clínica es mínima porque las pequeñas vegetaciones, aunque se extienden por las válvulas y el endocardio, no suelen embolizarse ni causar problemas funcionales de flujo. La estenosis aórtica calcificada se observa en personas ancianas con válvulas tricúspides o bien como complicación de válvulas bicúspides. Aunque los derrames pericárdicos son frecuentes en el LES activo, junto con derrame pleural y ascitis por serositis, habitualmente se trata de derrames serosos y no hay hemorragia ni cicatrices significativas. Las vegetaciones de la endocarditis trombótica no bacteriana tienden a embolizar. Los trombos murales se forman con más frecuencia cuando las cavidades cardíacas están dilatadas o hay una lesión endocárdica importante. La cardiopatía reumática es una enfermedad inmunitaria basada en el mimetismo molecular; los análisis serológicos serían positivos para antiestreptolisina O (ASO), no para ANA.

47 **E** Las bioprótesis de válvulas de cerdo pueden sufrir desgaste. Las valvas pueden calcificarse, con la consiguiente estenosis, o bien perforarse o rasgarse y provocar insuficiencia. Es improbable que se produzca trombosis con embolización en las bioprótesis indicadas para personas que no pueden recibir tratamiento anticoagulante; se trata de una complicación infrecuente de las prótesis mecánicas, mitigada con el tratamiento anticoagulante. La hemólisis no aparece en las bioprótesis y es infrecuente con las prótesis mecánicas modernas. El infarto de miocardio por embolización o de forma secundaria a una válvula mal colocada no es frecuente. Las fugas

paravalvulares son complicaciones excepcionales del período postoperatorio precoz.

48 **F** Es necesario un tratamiento anticoagulante en pacientes con prótesis mecánicas para prevenir complicaciones trombóticas. Si el paciente no puede recibir anticoagulantes, puede plantearse el uso de una bioprótesis (válvula de origen porcino). El ácido acetilsalicílico en dosis bajas se emplea para reducir el riesgo de síndrome coronario agudo. No está indicado un tratamiento antibiótico con fármacos como el ciprofloxacino, a no ser que el paciente tenga una infección o requiera cobertura antibiótica profiláctica para intervenciones quirúrgicas o dentales. La ciclosporina y otros inmunodepresores no están indicados, porque no se trasplantó tejido alógeno (además, las bioprótesis son básicamente inertes desde la perspectiva inmunitaria). La digoxina no está indicada porque la función cardíaca del paciente ha mejorado. Tampoco son necesarios los β-bloqueantes, como el propranolol, en ausencia de insuficiencia cardíaca crónica.

49 **C** La insuficiencia cardíaca congestiva con dilatación de las cuatro cavidades es indicativa de una miocardiopatía dilatada; en su aparición están implicados factores genéticos (20-50% de los casos), miocarditis y abuso de alcohol. La excreción fraccionada de sodio del paciente es inferior al 1%, compatible con una uremia prerrenal. En muchos casos, la miocardiopatía dilatada no tiene una causa conocida. La dilatación es más notable que la hipertrofia, aunque ambas están presentes, y todas las cavidades resultan afectadas. La amiloidosis produce una miocardiopatía restrictiva. La hipercolesterolemia predispone a la aterogenia con estenosis de las arterias coronarias y cardiopatía isquémica. Con más frecuencia, la cardiopatía reumática provocaría cierto grado de estenosis valvular, a menudo con cierta insuficiencia, y la evolución suele ser más prolongada. La enfermedad de Chagas, secundaria a la infección por *T. cruzi,* afecta al ventrículo derecho más que al izquierdo.

50 **C** Los hallazgos apuntan a una miocardiopatía dilatada (MCD) con insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. El tóxico que con más frecuencia produce MCD es el alcohol y las personas con

alcoholismo crónico tienen más probabilidad de presentar MCD que cardiopatía isquémica. La ingestión de paracetamol puede asociarse a necrosis hepática y nefropatía por analgésicos. La cocaína produce efectos isquémicos en el miocardio. El lisinopril es un inhibidor de la enzima conversora de angiotensina usado para tratar la hipertensión. La nicotina de los cigarrillos es un factor de riesgo de ateroesclerosis. El propranolol es un β-bloqueante que se ha utilizado en el tratamiento de la hipertensión y puede agravar la taquicardia y la insuficiencia cardíaca congestiva.

51 **A** La miocardiopatía arritmógena del ventrículo derecho (displasia arritmógena del ventrículo derecho) es, muy frecuentemente, un trastorno hereditario autosómico dominante con anomalías en las proteínas de adhesión de los desmosomas de los miocitos. Las infecciones del corazón se acompañan de inflamación, aunque un hallazgo tardío en la enfermedad de Chagas es la fibrosis ventricular con adelgazamiento de la pared ventricular. La hipertensión provoca hipertrofia ventricular. No hay hallazgos macroscópicos ni microscópicos característicos del síndrome del QT largo causado por canalopatías de los miocitos. La radioterapia es causa de fibrosis, pero no es probable que se localice en el ventrículo derecho; las técnicas mejoradas que enfocan el haz y lo sincronizan con el movimiento respiratorio reducen el daño cardíaco en el tratamiento de cánceres de tórax.

52 **B** La miocardiopatía hipertrófica es familiar en > 70% de los casos y habitualmente se transmite de forma autosómica dominante. Las mutaciones afectan a genes que codifican proteínas de los elementos contráctiles cardíacos. La mutación más frecuente en las formas hereditarias altera la cadena pesada de la β-miosina. No es probable que el miocardio resulte afectado en las enfermedades autoinmunitarias. La amiloidosis causa una miocardiopatía restrictiva. Es posible que la hemocromatosis provoque una miocardiopatía, pero tiene lugar en etapas mucho más tardías de la vida. Las infecciones víricas producen inflamación generalizada y dilatación cardíaca.

53 **B** La miocardiopatía hipertrófica es la causa más frecuente de muerte súbita inexplicable en deportistas jóvenes. Hay una hipertrofia asimétrica del tabique que reduce la fracción de

eyección del ventrículo izquierdo, especialmente durante el ejercicio. Histológicamente, se observan fibras miocárdicas hipertróficas dispuestas caóticamente. Puede haber arritmias. Si las personas con este trastorno sobreviven hasta la edad adulta, es posible que desarrollen una insuficiencia cardíaca crónica. La hemocromatosis origina una miocardiopatía en personas de mediana edad. La destrucción valvular con vegetaciones aparece en la endocarditis infecciosa y estaría acompañada de signos de sepsis. La cardiopatía reumática con alteraciones valvulares crónicas sería inusual en un paciente de esta edad, y la evolución es con más frecuencia lentamente progresiva. Los taquizoítos de *Toxoplasma gondii* significan miocarditis, proceso que puede tener lugar en personas inmunodeprimidas.

54 **B** La reducción de la distensibilidad de las cavidades cardíacas es una característica de la miocardiopatía restrictiva. La amiloidosis cardíaca puede estar confinada al corazón (amiloidosis cardíaca senil derivada de la proteína transtiretina) o bien formar parte de la afectación de órganos en la amiloidosis sistémica producida por la proteína asociada al amiloide sérico (SAA) o, en el mieloma múltiple, por depósito de cadenas ligeras (amiloide AL). Los depósitos auriculares aislados de amiloide, descubiertos incidentalmente, derivan del péptido natriurético auricular. La disfunción de las fibras miocárdicas reduce notablemente la distensibilidad ventricular. La obstrucción dinámica al tracto de salida del ventrículo izquierdo es característica de la miocardiopatía hipertrófica. En la miocardiopatía dilatada puede haber insuficiencia de las válvulas mitral y tricúspide, lo que también reduce la contractilidad y la fracción de eyección, con aumento del volumen telesistólico.

55 **A** La necrosis miocárdica focal con infiltrado linfocítico es compatible con miocarditis vírica. Se trata de un cuadro infrecuente, y muchos afectados podrían estar asintomáticos. En Norteamérica, la mayoría de los casos están causados por los virus de Coxsackie A y B. Con frecuencia, esta enfermedad es autolimitada. Es menos probable que culmine en muerte súbita o progrese a insuficiencia cardíaca crónica. Las infecciones del corazón por micobacterias son infrecuentes, pero la afectación

pericárdica es el patrón más probable. Es posible que una sepsis por infección bacteriana afecte al corazón, pero el paciente estaría gravemente enfermo con insuficiencia de múltiples órganos. Los estreptococos de grupo viridans y *Staphylococcus aureus* provocan con más frecuencia endocarditis con infiltrados inflamatorios de neutrófilos. *Toxoplasma gondii* es una causa de miocarditis con infiltrados de células inflamatorias mixtas en pacientes inmunodeprimidos. *Trypanosoma cruzi* es el microorganismo causal de la enfermedad de Chagas, observada más a menudo en niños. Esta es probablemente la causa infecciosa de miocarditis más común en el mundo.

56 **C** La pericarditis fibrinosa provoca que, como muestra la figura, las superficies del epicardio y del saco pericárdico abierto y plegado se vuelvan rugosas, onduladas y de color pardo, imagen denominada en ocasiones en «pan y mantequilla» (después de que el lado untado con mantequilla ha caído sobre la alfombra). La fricción entre las superficies epicárdica y pericárdica da origen al roce, que puede desaparecer ante la acumulación de líquido (pericarditis serofibrinosa). La causa más frecuente es la uremia secundaria a insuficiencia renal. La elevación del título de antiestreptolisina O acompaña a la fiebre reumática. Una fiebre reumática aguda puede producir pericarditis fibrinosa, pero la fiebre reumática es infrecuente a esta edad. En algunas formas de hipertensión se observa una concentración de renina elevada, pero por sí misma no indica insuficiencia renal. En el infarto de miocardio aumenta la concentración de creatina cinasa sérica. Es posible que un infarto agudo de miocardio se acompañe de un exudado fibrinoso sobre el área infartada, pero no la pericarditis difusa observada en este paciente. Un resultado positivo en la prueba de ANA orienta hacia una enfermedad del tejido conjuntivo, como el lupus eritematoso sistémico, asociado con más frecuencia a pericarditis serosa (sin un exudado fibrinoso extenso). La pericarditis fibrinosa casi nunca es el resultado de una infección, pero un aspecto fibrinopurulento podría indicar infección bacteriana.

57 **D** Las características clínicas corresponden a pericarditis con derrame, y las causas más frecuentes de pericarditis

hemorrágica son carcinoma metastásico y tuberculosis. Un derrame de esta cuantía puede producir suficiente taponamiento cardíaco como para que se reduzca el gasto cardíaco; la caída paradójica de la presión (superior a 10 mmHg) se llama *pulso paradójico* y puede deberse a pericarditis y taponamiento. *Candida* es una causa infrecuente de infección cardíaca en personas inmunodeprimidas. Los virus de Coxsackie son una causa conocida de miocarditis. Los estreptococos del grupo A son los responsables de la fiebre reumática; en la forma aguda, la fiebre reumática puede provocar pericarditis fibrinosa y, en su forma crónica, derrames serosos por insuficiencia cardíaca congestiva. *Staphylococcus aureus* es con más frecuencia una causa de endocarditis infecciosa.

58 **A** La figura muestra sangre de color rojo oscuro en la cavidad pericárdica abierta, un hemopericardio masivo con taponamiento pericárdico. Una vez descartados los traumatismos, hay que sospechar una complicación de la cardiopatía isquémica. La rotura de un infarto de miocardio transmural se produce típicamente de 3 a 7 días después del inicio, cuando la necrosis es máxima y aún no hay una cicatrización importante del infarto. La cardiopatía isquémica se produce en pacientes de esta edad, y factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, la diabetes mellitus y la hiperlipidemia están implicados en su desarrollo. Las miocardiopatías provocan hipertrofia y/o dilatación ventricular, pero no causan roturas. La tuberculosis puede producir pericarditis hemorrágica, típicamente sin taponamiento. La esclerodermia origina con más frecuencia derrames serosos. Las metástasis de melanomas y otros carcinomas son una causa posible de pericarditis hemorrágica sin taponamiento. Este paciente no tiene un hábito marfanoide, aunque el síndrome de Marfan puede provocar necrosis quística de la media en la aorta, que da lugar a disección aórtica, causa de hemopericardio agudo. La arteritis de Takayasu afecta en ocasiones a las arterias coronarias con aneurismas y rotura, pero habitualmente se trata de una enfermedad pediátrica infrecuente.

59 **C** Los derrames pericárdicos hemorrágicos suelen estar causados por tumores o tuberculosis. La neoplasia más

frecuente del corazón es el cáncer metastásico, porque las neoplasias cardíacas primarias son excepcionales. El origen primario más habitual está próximo: pulmón, mama y esófago. La lesión cutánea de esta paciente probablemente sea un melanoma, que tiende a provocar metástasis diseminadas, incluso en el corazón. La mayoría de las metástasis cardíacas se localizan en el epicardio/pericardio. (Por convención, aunque las superficies epicárdicas suelen mostrar la afectación más grave, típicamente se usa el término *derrame pericárdico* cuando hay líquido o *pericarditis* en presencia de inflamación.) Un gran derrame causa taponamiento, que interfiere en el movimiento cardíaco. La estenosis aórtica calcificada provoca insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, con edema de pulmón como hallazgo clave. La ateroesclerosis coronaria puede provocar un infarto de miocardio, que en ocasiones se complica con rotura del ventrículo y hemopericardio, pero en este caso la concentración de troponina I indica que no se ha producido un infarto. La cardiopatía reumática afecta principalmente a las válvulas, pero la fiebre reumática aguda sí es una causa de pericarditis fibrinosa. La tuberculosis sería improbable en este caso, porque no se observan lesiones pulmonares en la radiografía.

60 **C** El mixoma auricular es la neoplasia cardíaca primaria más frecuente. En el lado izquierdo del corazón, puede producir un efecto de válvula flotante que ocluye intermitentemente la válvula mitral y da lugar a episodios de síncopes y posibles accidentes cerebrovasculares por embolización a las arterias cerebrales. La calcificación de una válvula bicúspide provoca en ocasiones estenosis e insuficiencia cardíaca, pero este trastorno es progresivo. La trombosis de arterias coronarias determina un episodio isquémico agudo, típicamente con dolor torácico. Para cuando se produjera el aumento del tamaño de la aurícula izquierda con trombosis mural y riesgo de embolia como consecuencia de una estenosis mitral, esta paciente llevaría años con síntomas. La mayoría de los derrames pericárdicos no son grandes ni causan problemas importantes. Un derrame de gran cuantía podría provocar taponamiento, pero este no es un problema intermitente.

61 **E** Tras un trasplante cardíaco se realizan, en todos los casos, biopsias endomiocárdicas para controlar un posible rechazo inmunitario, y la pregunta describe un rechazo celular agudo susceptible de ser tratado con inmunodepresores. Los orgánulos celulares se recambian continuamente mediante autofagia y, al hacerlo, generan pigmento lipofuscina en las células, pero este proceso lento no es característico del rechazo. El trasplante es un tejido ajeno al huésped, de modo que el rechazo no es un proceso autoinmunitario. De meses a años más tarde, una enfermedad arterial coronaria característica de los trasplantes cardíacos puede provocar alteraciones isquémicas. La infección es una posibilidad clara por los fármacos inmunodepresores administrados para controlar el proceso de rechazo, aunque las células plasmáticas no son una característica clave de las infecciones agudas.

62 **C** Casi todos los aloinjertos desarrollan cierto grado de enfermedad arterial en 10 años, y la mitad de los pacientes tienen una afectación arterial significativa a los 5 años del trasplante. A diferencia de la ateroesclerosis, preferentemente se afectan las ramas más pequeñas de las arterias coronarias, pero el resultado es el mismo: daño isquémico. La inflamación que puede provenir del rechazo no es un factor de riesgo de depósito de amiloide. Un corazón trasplantado carece de saco pericárdico funcional y, aunque es posible que haya adherencias fibrosas tras la cirugía, no son constrictivas. Los receptores de trasplantes que reciben inmunodepresores tienen una desregulación inmunitaria que aumenta el riesgo de carcinomas y neoplasias malignas linfoides, pero no es probable que estas afecten al corazón. La inmunodepresión por los fármacos antirrechazo aumenta el riesgo de infección por microorganismos oportunistas, pero no son frecuentes y suele ser posible tratarlos.

CAPÍTULO

13

Hematopatología de los leucocitos

PEF9 Capítulo 13: Enfermedades de los leucocitos, ganglios linfáticos, bazo y timo

BP9 Capítulo 11: Sistemas hematopoyético y linfático

1 Un niño de 14 años tiene fiebre alta de 10 días de evolución. La exploración física muestra temperatura de 38,3 °C; frecuencia cardíaca de 100 latidos/min; frecuencia respiratoria de 28 respiraciones/min, y presión arterial de 80/40 mmHg. Presenta hemorragias petequiales diseminadas en tronco y extremidades. No hay aumento del tamaño del hígado, del bazo ni de los ganglios linfáticos. El hemograma revela cifras de hemoglobina de 13,2 g/dl; de hematocrito del 38,9%; de VCM de 93 μm^3; de plaquetas de 175.000/mm^3 y de leucocitos de 1.850/mm^3 con un 1% de neutrófilos, un 98% de linfocitos y un 1% de monocitos. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Leucemia linfoblástica aguda
B Leucemia mieloide aguda
C Anemia aplásica
D Púrpura trombocitopénica idiopática
E Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica

2 Una mujer de 29 años con VIH ha desarrollado fiebre, tos y disnea en la última semana. En la exploración física la temperatura es de 37,9 °C. Hay matidez a la percusión de los campos pulmonares posteriores. Se realiza un lavado broncoalveolar y aparecen quistes de *Pneumocystis jiroveci*. Se le administra trimetoprim/sulfametoxazol. A la semana siguiente, el estado respiratorio ha mejorado. Las pruebas de laboratorio muestran

entonces cifras de hemoglobina de 7,4 g/dl; de hematocrito del 22,2%; de VCM de 98/µm^3; de plaquetas de 47.000/mm^3, y de leucocitos de 1.870/mm^3 con un 2% de neutrófilos, un 2% de cayados, un 85% de linfocitos, un 10% de monocitos y un 1% de eosinófilos. Una semana después presenta disnea progresiva y una TC torácica pone de manifiesto múltiples nódulos de 1 a 3 cm con bordes hemorrágicos en todos los campos pulmonares. ¿Cuál de los siguientes agentes es más probable que cause la infección responsable de esos nódulos?

A *Aspergillus fumigatus*
B *Bartonella henselae*
C Complejo *Micobacterium avium*
D *Escherichia coli*
E Virus del herpes simple
F *Pneumocystis jiroveci*
G *Toxoplasma gondii*



3 Un hombre de 41 años lleva 2 semanas con fiebre, tiritona y escalofríos. En la exploración física, la temperatura es de 39,2 °C. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 13,9 g/dl; de hematocrito del 40,5%; de VCM de 93 µm^3; de plaquetas de 210.000/mm^3, y de leucocitos de 13.750/mm^3, con el frotis de sangre periférica mostrado en la figura. La biopsia de médula ósea revela

hipercelularidad. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que cause estos hallazgos?

A Hepatitis vírica aguda
B Leucemia mieloide crónica
C Tratamiento con glucocorticoides
D Absceso pulmonar
E Esplenomegalia

4 Una mujer de 23 años refiere que desarrolla un exantema cutáneo si pasa mucho tiempo en la calle. En la exploración física tiene un exantema cutáneo malar. Las pruebas de laboratorio revelan un resultado positivo de la prueba de ANA con título de 1:1.024 y patrón «en anillo». La prueba de anti-ADN bicatenario también es positiva. La concentración de hemoglobina es de 12,1 g/dl; la de hematocrito, del 35,5%; el VCM, 89 μm^3; plaquetas, 109.000/mm^3, y leucocitos, 4.500/mm^3. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que muestre la fórmula diferencial de los leucocitos?

A Basofilia
B Eosinofilia
C Monocitosis
D Neutrofilia
E Trombocitosis

5 Un hombre de 23 años que está recibiendo quimioterapia por una leucemia linfoblástica aguda ha desarrollado fiebre y dolor abdominal en la última semana. En el momento actual tiene tos intensa. En la exploración física, la temperatura es de 38,4 °C. Se escuchan crepitantes en la auscultación de todos los campos pulmonares. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 12,8 g/dl; de hematocrito del 39%; de VCM de 90 μm^3; de plaquetas de 221.000/mm^3, y de leucocitos de 16.475/mm^3 con un 51% de neutrófilos, un 5% de cayados, un 18% de linfocitos, un 8% de monocitos y un 18% de eosinófilos. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que cause la infección que está complicando la evolución de este paciente?

A *Cryptococcus neoformans*
B Citomegalovirus
C *Pseudomonas aeruginosa*
D *Strongyloides stercoralis*

E *Toxoplasma gondii*
F Virus de la varicela-zóster

6 Llevan al servicio de urgencias a un hombre de 28 años con shock que se ha desarrollado en las últimas 12 h. En la exploración física, la temperatura es de 38,6 °C; la frecuencia cardíaca, de 101 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 26 respiraciones/min, y la presión arterial de 80/40 mmHg. Se observan marcas de agujas en la fosa del codo izquierdo. Es posible escuchar crepitantes en los campos pulmonares inferiores. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 14,1 g/dl; de hematocrito del 42,6%; de VCM de 93 μm^3; de plaquetas de 127.500/mm^3, y de leucocitos de 12.150/mm^3 con un 71% de neutrófilos, un 8% de cayados, un 14% de linfocitos y un 7% de monocitos. Los neutrófilos muestran gránulos citoplásmicos tóxicos y cuerpos de Döhle. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?
A Leucemia mieloide aguda
B Leucemia mieloide crónica
C Mononucleosis infecciosa
D Neumonía por *Pneumocystis jiroveci*
E Sepsis por *Pseudomonas aeruginosa*
F *Mycobacterium tuberculosis* pulmonar

7 Un hombre de 26 años tiene fiebre con tos seca de 10 semanas de evolución. En la exploración, la temperatura es de 37,4 °C. La radiografía de tórax revela un nódulo de 4 cm en el lóbulo superior izquierdo. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 13,3 g/dl; de hematocrito del 40,5%; de plaquetas de 281.000/mm^3, y de leucocitos de 13.760/mm^3 con un 38% de neutrófilos, un 2% de cayados, un 45% de linfocitos y un 15% de monocitos. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?
A Leucemia/linfoma linfoblástico agudo
B Linfoma de Hodgkin de tipo rico en linfocitos
C Granuloma por *Mycobacterium tuberculosis*
D Síndrome mielodisplásico
E Absceso por *Staphylococcus aureus*

8 Una mujer de 36 años lleva 1 semana con tos y fiebre. En la exploración física, la temperatura es de 38,3 °C. Tiene crepitantes difusos en todos los campos pulmonares. La radiografía de tórax revela infiltrados bilaterales extensos. El hemograma muestra

cifras de hemoglobina de 13,9 g/dl; de hematocrito del 42%; de VCM de 89 μm^3; de plaquetas de 210.000/mm^3, y de leucocitos de 56.000/mm^3 con un 63% de neutrófilos, un 16% de cayados, un 7% de metamielocitos, un 3% de mielocitos, un 1% de blastos, un 8% de linfocitos y un 2% de monocitos. Se realiza una biopsia de médula ósea que muestra una maduración normal de las células mieloides. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos siguientes es más probable?

A Leucemia mieloide crónica
B Tricoleucemia
C Linfoma de Hodgkin de tipo depleción de linfocitos
D Reacción leucemoide
E Síndrome mielodisplásico



9 Un hombre de 23 años previamente sano lleva 2 semanas con malestar general, febrícula y odinofagia. En la exploración física la temperatura es de 37,6 °C y presenta eritema faríngeo sin exudados. Hay adenopatías dolorosas a la palpación en la región cervical, axilar e inguinal. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 12,2 g/dl; de hematocrito del 36,6%; de plaquetas de 190.200/mm^3, y de leucocitos de 8.940/mm^3. La figura muestra el frotis de sangre periférica. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que cause su enfermedad?

A Contacto personal estrecho (besos)

B Consumo de ostras crudas
C Trastorno hereditario de la síntesis de cadenas de globina
D Compartir agujas infectadas para el consumo de drogas por vía parenteral
E Transfusión de concentrados de eritrocitos

10 Un niño de 6 años se queja de dolor progresivo en la ingle derecha desde hace 1 semana. La exploración física revela ganglios linfáticos tumefactos y dolorosos en la región inguinal derecha. Se realiza la biopsia de un ganglio linfático inguinal, que al microscopio tiene centros germinales grandes de tamaño variable que contienen numerosas mitosis. Hay múltiples neutrófilos parafoliculares y sinusoidales. ¿Cuál es la causa más probable de estas alteraciones histológicas?

A Linfoadenitis aguda
B Leucemia linfoblástica aguda
C Enfermedad por arañazo de gato
D Linfoma folicular
E Sarcoidosis
F Toxoplasmosis

11 Una mujer de 39 años notó un bulto en la mama hace 1 semana. En la exploración física tiene una masa irregular, firme y fija de 3 cm en el cuadrante superoexterno de la mama derecha y un ganglio linfático de consistencia firme no doloroso en la axila derecha. Se realiza tumorectomía y disección del ganglio axilar, y el examen microscópico revela un carcinoma ductal infiltrante de la mama. El análisis por citometría de flujo del nódulo muestra una población policlonal de linfocitos CD3+, CD19+, CD20+ y CD68+ sin aneuploidía. ¿Las características histológicas típicas de cuál de los siguientes trastornos es más probable que revele el examen microscópico del ganglio linfático axilar?

A Linfoadenitis aguda
B Linfoma de linfocitos B grandes difuso
C Carcinoma ductal infiltrante metastásico
D Granulomas necrosantes
E Plasmocitosis
F Histiocitosis sinusal
G Síndrome de Sézary

12 Una niña de 9 años aparentemente sana refiere dolor en la axila

derecha desde hace 1 semana. La exploración muestra ganglios linfáticos aumentados de tamaño y dolorosos en la región axilar derecha. Hay cuatro abrasiones lineales prácticamente curadas en un área de 3 × 2 cm de la cara anterior distal del antebrazo derecho y un nódulo único de 0,5 cm, eritematoso y ligeramente abultado sobre una de las abrasiones. No se aprecian otras anomalías. El examen histológico de uno de los ganglios linfáticos revela granulomas necrosantes estrellados. Las adenopatías se resuelven en los 2 meses siguientes. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que haya producido la infección responsable de estos hallazgos?

A *Bartonella henselae*
B Citomegalovirus
C Virus de Epstein-Barr
D *Staphylococcus aureus*
E *Yersinia pestis*

13 Un estudio de personas con neoplasias malignas linfoides revela que hay factores de riesgo para el desarrollo de los linfomas no hodgkinianos de linfocitos B. ¿Cuál de las siguientes enfermedades hereditarias es más probable que predisponga al desarrollo de neoplasias malignas linfoides?

A Fibrosis quística
B Esferocitosis hereditaria
C Drepanocitosis
D Enfermedad de von Willebrand
E Síndrome de Wiskott-Aldrich

14 Un niño de 14 años refiere molestias en el tórax que han empeorado en los últimos 5 días. En la exploración física presenta adenopatías generalizadas. La radiografía de tórax muestra campos pulmonares limpios, pero el mediastino está ensanchado. Una TC torácica revela una masa de 10 cm en el mediastino anterior. Se realiza una biopsia de la masa y al microscopio aparece borrada por células linfoides con núcleos lobulados que contienen cromatina nuclear de aspecto frágil con un fino punteado. Apenas hay citoplasma y se observan muchas mitosis. Las células expresan antígenos CD2 y CD7 y son negativas para la desoxinucleotidiltransferasa (TdT−). El análisis molecular revela una mutación puntual del gen *NOTCH1.* El oncólogo informa a la

familia que la quimioterapia resulta curativa en la inmensa mayoría de los casos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Linfoma de Burkitt
B Linfoma folicular
C Linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular
D Linfoma linfoblástico
E Linfoma de células del manto
F Linfoma de células pequeñas linfocítico

15 Un hombre de 70 años presenta cansancio progresivo en los últimos 6 meses. En la exploración física tiene adenopatías axilares y cervicales indoloras, sin hepatoesplenomegalia. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 9,5 g/dl; de hematocrito del 28%; de VCM de 90 μm^3; de plaquetas de $120.000/mm^3$, y de leucocitos de $42.000/mm^3$. El frotis de sangre periférica pone de manifiesto una población uniforme de linfocitos pequeños y redondeados de aspecto maduro. La citometría de flujo revela que estas células son CD19+, CD5+ y negativas para la desoxinucleotidiltransferasa (TdT −). ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que revele el análisis citogenético y molecular de las células anómalas de la sangre?

A Reordenamiento clonal de genes de inmunoglobulinas
B Reordenamiento clonal de genes del receptor de linfocitos T
C t(8;14) causante de sobreexpresión de *c-MYC*
D t(9;22) causante de reordenamiento de *BCR-ABL*
E t(14;18) causante de sobreexpresión de *BCL2*



16 Un hombre de 69 años se nota bultos en el lado derecho del cuello que han aumentado de tamaño durante el último año. La exploración física revela ganglios linfáticos cervicales posteriores de 1-2 cm de diámetro, firmes e indoloros. La piel suprayacente está indemne y no muestra eritema. Se biopsia un ganglio linfático, en la figura se presenta su imagen microscópica. El análisis molecular del ADN extraído de las células revela reordenamientos del gen del receptor de linfocitos B. ¿Cuál de las siguientes características es la que más sugiere presencia de un linfoma en este ganglio?

A Ausencia del patrón de folículos linfoides con centros germinales

B Reducción de las células plasmáticas y los inmunoblastos sinusoidales

C Presencia de grandes células multinucleadas CD30+

D Expresión uniforme de cadenas ligeras κ, pero no λ, en las células linfoides

E Proliferación de capilares pequeños en las regiones medular y paracortical

17 Un niño de 4 años ha estado apático la última semana. Muestra irritabilidad al tocarle los brazos y las piernas. En los últimos 2 días han aparecido equimosis de gran tamaño en el muslo derecho y en el hombro izquierdo. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 9,3 g/dl; de hematocrito del 28,7%; de VCM de 96

µm^3; de plaquetas de 45.000/mm^3, y de leucocitos 13.990/mm^3. El examen del frotis de sangre periférica revela blastos sin gránulos positivos para peroxidasa pero con agregados positivos para PAS y se tiñen con desoxinucleotidiltransferasa negativa (TdT−). La citometría de flujo pone de manifiesto que el fenotipo de los blastos es CD19+, CD3− e Igs−. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Leucemia linfoblástica aguda
B Leucemia mieloide aguda
C Leucemia linfática crónica
D Leucemia mieloide crónica
E Púrpura trombocitopénica idiopática

18 Un niño de 7 años lleva 1 semana quejándose de cefalea intensa. En la exploración física hay dolor a la palpación de los huesos largos, hepatoesplenomegalia y adenopatías generalizadas. La piel presenta hemorragias petequiales. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 8,8 g/dl; de hematocrito del 26,5%; de plaquetas de 34.700/mm^3, y de leucocitos de 14.800/mm^3. Una biopsia de médula ósea pone de manifiesto una celularidad del 100%, con sustitución casi total por una población de células grandes con citoplasma escaso, sin gránulos y con una cromatina nuclear de aspecto frágil y nucléolos infrecuentes. El oncólogo confía en que la quimioterapia induzca una remisión completa. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de marcadores fenotípicos y cariotípicos es más probable que esté presente en las células de la médula ósea de este niño?

A Hiperdiploidía de pre-B precoz CD19+
B t(9;22) de pre-B precoz CD20+
C Cariotipo normal de pre-B CD5+
D Deleción de 11q de pre-B CD23+
E Numerosos blastos de linfocitos T CD2+
F Translocación del gen *MLL* en linfocitos T CD3+

19 Un hombre de 66 años ha detectado un aumento en el número y el tamaño de bultos por todo su cuerpo en los últimos 5 meses. En la exploración hay adenopatías inguinales, axilares y cervicales firmes indoloras. La biopsia de un ganglio cervical revela un patrón histológico de agregados nodulares de células linfoides pequeñas y hendidas, y células más grandes con cromatina nuclear

abierta, varios nucléolos y cantidades moderadas de citoplasma. Una biopsia de médula ósea muestra agregados linfoides de células similares con inmunoglobulinas de superficie que son CD10+ pero CD5−. La determinación del cariotipo de esas células linfoides indica la presencia de t(14;18). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Linfoadenitis aguda
B Linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular
C Linfoma folicular
D Linfoma de células del manto
E Toxoplasmosis



20 La patinadora artística Sonja Henie, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1928, 1932 y 1936, empezó a sentirse cada vez más cansada al final de la quinta década de la vida. En la exploración física tenía ganglios linfáticos axilares e inguinales palpables indoloros, y se palpaba la punta del bazo. Las pruebas de laboratorio mostraron cifras de hemoglobina de 10,1 g/dl; de hematocrito del 30,5%; de VCM de 90 μm^3; de plaquetas de 89.000/mm^3, y de leucocitos de 31.300/mm^3. A partir del frotis de sangre periférica mostrado en la figura, ¿cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Leucemia linfoblástica aguda

B Leucemia linfática crónica
C Mononucleosis infecciosa
D Anemia ferropénica
E Reacción leucemoide

21 Un hombre de 37 años con infección por el VIH en los últimos 10 años ingresa en el hospital por dolor abdominal de 3 días de evolución. La exploración física revela distensión abdominal y ausencia de ruidos hidroaéreos. La TC abdominal muestra una masa en el íleon. Se realiza cirugía para extirpar un área de obstrucción intestinal en el íleon. El examen a simple vista de la pieza muestra una masa blanca y firme de 10 cm de largo y 3 cm de espesor máximo. La masa ha infiltrado a través de la pared del íleon. Los exámenes histológicos ponen de manifiesto una población mitóticamente activa de células linfoides CD19+ con núcleos y nucléolos prominentes. ¿Cuál de los siguientes genomas víricos es más probable que muestre el análisis molecular en las células linfoides?

A Citomegalovirus
B Virus de Epstein-Barr
C VIH
D Virus del herpes humano 9
E Virus linfótropo de los linfocitos T humanos de tipo 1

22 Un niño de 12 años presenta distensión y dolor abdominal progresivos de 3 días de evolución. La exploración física del abdomen muestra dolor en la parte inferior, con timpanismo y ruidos hidroaéreos reducidos. La TC abdominal revela una masa de 7 cm en la región de la válvula ileocecal. Se realiza cirugía, y el examen microscópico de la masa resecada pone de manifiesto láminas de células linfoides de tamaño intermedio, con núcleos que contienen cromatina gruesa, varios nucléolos y muchas mitosis. Una biopsia de médula ósea resulta negativa para esta población de células. El análisis citogenético de las células de la masa revela un cariotipo con t(8;14). La citometría de flujo muestra que el 40% de las células están en la fase S. El tumor disminuye de tamaño espectacularmente tras la quimioterapia. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Leucemia/linfoma linfoblástico agudo
B Linfoma de Burkitt

C Linfoma de linfocitos B grandes difuso
D Linfoma folicular
E Plasmocitoma

23 Un hombre de 55 años se notó un bulto cerca del hombro hace 1 semana. En la exploración física se observan un ganglio linfático supraclavicular aumentado de tamaño e indoloro, e hipertrofia del anillo de Waldeyer de tejido linfoide bucofaríngeo. No hay hepatoesplenomegalia. El hemograma es normal salvo anemia leve. La biopsia de un ganglio linfático muestra sustitución por una población uniforme de células linfoides cuyo tamaño es dos veces mayor que el de los linfocitos normales, con núcleos más grandes y nucléolos prominentes. Las tinciones inmunohistoquímicas y la citometría de flujo del ganglio indican que la mayoría de las células linfoides son CD19+, CD10+, CD3−, CD15− y negativas para la desoxinucleotidiltransferasa terminal (TdT−). Está presente una mutación del gen *BCL6*. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Linfoma linfoblástico agudo
B Linfoadenitis crónica
C Linfoma de linfocitos B grandes difuso
D Linfoma de Hodgkin
E Linfoma de células pequeñas linfocítico

24 Un hombre de 62 años lleva 6 meses con molestias abdominales vagas acompañadas de distensión y diarrea. En la exploración física se detecta una masa firme en la parte media del abdomen. La prueba de sangre oculta en heces es positiva. La TC abdominal revela una masa de 11 × 4 cm que afecta a la pared del íleon distal y el mesenterio adyacente. Se realiza una laparotomía para extirpar la masa. Al microscopio, la masa está compuesta por láminas de células linfoides de gran tamaño con núcleos grandes, nucléolos prominentes y mitosis abundantes. Las células neoplásicas se marcan con CD19+ y CD20+ y presentan reordenamiento del gen *BCL6*. ¿Cuál de las siguientes características pronósticas es más aplicable a este caso?

A Invasivo; puede curarse con quimioterapia
B Invasivo; a menudo se extiende al hígado, al bazo y a la médula ósea
C Invasivo; con frecuencia se transforma en leucemia aguda

D Indolente; puede curarse con quimioterapia
E Indolente; a menudo hay remisión espontánea
F Indolente, con una supervivencia de 7-9 años sin tratamiento

25 Un niño de 9 años que vive en Uganda ha presentado dolor y tumefacción progresivamente mayores en el lado derecho de la cara durante los últimos 8 meses. En la exploración física hay una masa grande e indolora en la mandíbula que deforma el lado derecho de la cara. No hay adenopatías ni esplenomegalia, y está afebril. Se realiza una biopsia de la masa, y el examen microscópico revela linfocitos de tamaño intermedio con una tasa de mitosis elevada. Un análisis cromosómico muestra que el cariotipo de esas células es 46,XY,t(8;14). La concentración de hemoglobina es de 13,2 g/dl; la de plaquetas, de 272.000/mm^3, y la de leucocitos, de 5.820/mm^3. ¿Cuál de los siguientes virus es más probable que se relacione causalmente con el desarrollo de esos hallazgos?

A Citomegalovirus
B Virus de Epstein-Barr
C Virus de la hepatitis B
D VIH
E Virus del papiloma humano
F Virus respiratorio sincitial



26 Un hombre de 61 años refiere dolor de espalda de 5 meses de evolución. Recientemente ha desarrollado tos productiva con esputos amarillentos. En la exploración física tiene fiebre y se escuchan estertores difusos en la auscultación pulmonar. No presenta adenopatías ni esplenomegalia. Entre las pruebas de laboratorio se realiza un cultivo de esputo, en el que crece *Streptococcus pneumoniae.* La concentración sérica de creatinina es de 3,7 mg/dl, y la de nitrógeno ureico, de 35 mg/dl. La figura muestra una radiografía del cráneo. ¿La cifra de cuál de las siguientes células es más probable que esté aumentada en una biopsia de la médula ósea de este hombre?

A Mieloblastos
B Linfocitos maduros pequeños
C Células plasmáticas
D Células de Reed-Sternberg
E Granulomas no necrosantes

27 Un hombre de 67 años presenta debilidad, cansancio y pérdida de peso progresivos en los últimos 5 meses. Actualmente ha

perdido algo de visión en ambos ojos, y sufre cefaleas y mareos. Las manos son sensibles al frío. En la exploración física se aprecian adenopatías generalizadas y hepatoesplenomegalia. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración sérica de proteínas de 15,5 g/dl y de albúmina de 3,2 g/dl. Se realiza una biopsia de médula ósea, y el examen microscópico pone de manifiesto infiltración por numerosas células linfoides plasmocitoides pequeñas con cuerpos de Russell en el citoplasma. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio adicionales es más probable que presente este paciente?

A Proteinuria de Bence Jones
B Hipercalcemia
C Cariotipo con translocación t(14;18)
D Pico de IgM monoclonal en el suero
E Recuento de leucocitos de 255.000/mm^3



28 Una mujer de 69 años refiere dolor de espalda progresivo en el último mes. En la exploración física hay dolor a la palpación en la parte baja de la espalda, sin cifosis ni escoliosis. Una radiografía de columna muestra colapso parcial de T10 y múltiples lesiones líticas de 0,5-1 cm con aspecto de pompa de jabón redondeada en las vértebras torácicas y lumbares. Se realiza una biopsia de médula ósea y la figura muestra un frotis del aspirado. ¿Cuál de

los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que presente esta paciente?

- A Proteínas de Bence Jones en la orina
- B Menor concentración de fosfatasa alcalina sérica
- C Hipogammaglobulinemia
- D Recuento de plaquetas de $750.000/mm^3$
- E t(9;22) en el cariotipo de las células de médula ósea
- F Recuento de leucocitos de $394.000/mm^3$



29 Un hombre de 48 años acude a un chequeo de salud rutinario. No refiere problemas, salvo preocupación por envejecer y tener cáncer. La exploración física revela que no tiene fiebre y su presión arterial es normal. No presenta hepatoesplenomegalia ni adenopatías. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración sérica de proteínas totales de 7,4 g/dl con albúmina de 3,9 g/dl. Las concentraciones séricas de calcio y fósforo son normales. En el análisis de orina no se encuentra proteinuria de

Bence Jones. La cifra de hemoglobina es de 13,6 g/dl; la de plaquetas, de 301.500/mm^3, y la de leucocitos, 6.630/mm^3. La figura ilustra los resultados de la electroforesis de proteínas séricas. Una biopsia de médula ósea pone de manifiesto celularidad normal con maduración de todas las líneas celulares. Las células plasmáticas constituyen cerca del 4% de la médula. Los resultados de una gammagrafía ósea son normales, sin áreas de mayor captación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Enfermedad de cadenas pasadas con linfoma linfoplasmocítico
B Gammapatía monoclonal de significado incierto
C Mieloma múltiple con inmunofenotipo IgD
D Amiloidosis sistémica reactiva
E Plasmocitoma solitario del pulmón
F Macroglobulinemia de Waldenström con hiperviscosidad

30 Un hombre de 62 años ha tenido fiebre y pérdida de 4 kg de peso en los últimos 6 meses. En la exploración física la temperatura es de 38,6 °C. Presenta adenopatías generalizadas indoloras y la punta del bazo es palpable. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 10,1 g/dl; de hematocrito del 30,3%; de plaquetas de 140.000/mm^3, y de leucocitos de 24.500/mm^3 con un 10% de neutrófilos, un 1% de cayados, un 86% de linfocitos y un 3% de monocitos. El examen microscópico de la biopsia de un ganglio linfático cervical revela un patrón nodular de células linfoides pequeñas. Una biopsia de médula ósea pone de manifiesto la presencia de infiltrados de células pequeñas similares con inmunoglobulinas de superficie que son CD5+ pero CD10−. El análisis citogenético indica una t(11;14) en esas células. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Linfoma linfoblástico agudo
B Linfoma de Burkitt
C Linfoma folicular
D Linfoma de células del manto
E Linfoma de células pequeñas linfocítico

31 Una mujer de 54 años lleva 7 meses con náuseas, vómitos y saciedad precoz. En la exploración física no tiene fiebre ni se aprecian adenopatías ni hepatoesplenomegalia. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 12,9 g/dl; de hematocrito del

41,9%; de plaquetas de 263.000/mm^3, y de leucocitos de 8.430/mm^3. Una endoscopia digestiva alta revela pérdida de los pliegues rugosos del estómago en un área de 4 × 8 cm del fondo. La biopsia gástrica pone de manifiesto la presencia de *Helicobacter pylori* en el moco situado por encima de las células epiteliales de superficie. Hay extensos infiltrados uniformes en la mucosa y submucosa de linfocitos pequeños, que son CD19+ y CD20+ pero CD3−. Tras el tratamiento de la infección por *H. pylori* el trastorno mejora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Leucemia linfoblástica aguda
B Leucemia linfática crónica
C Linfoma de linfocitos B grandes difuso
D Linfoma folicular
E Linfoma de Hodgkin de tipo celularidad mixta
F Linfoma MALT (zona marginal)



32 Un hombre de 41 años ha sufrido varios episodios de neumonía en el último año. Actualmente refiere dolor abdominal vago y sensación de plenitud. La exploración física muestra esplenomegalia marcada. El hemograma revela cifras de hemoglobina de 8,2 g/dl; de hematocrito del 24,6%; de VCM de 90 μm^3; de plaquetas de 63.000/mm^3, y de leucocitos de 2.400/mm^3. El frotis de sangre periférica pone de manifiesto múltiples leucocitos

pequeños con las características que muestra la figura. La radiografía de tórax presenta infiltrados parcheados, y en un cultivo de esputo crece *Mycobacterium kansasii.* ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más característico de este trastorno?

A Bastones de Auer citoplásmicos en células mieloides
B Linfocitos positivos para CD20 y CD11c
C IgM monoclonal en el suero
D Translocación t(9:22) en las células madre
E Granulaciones tóxicas en el citoplasma de los neutrófilos

33 Un hombre de 29 años previamente sano presenta un área nodular progresivamente más grande en el brazo desde hace 8 meses. En la exploración física hay una lesión ulcerada, de color violeta rojizo y de 3 × 7 cm en el antebrazo derecho, así como adenopatías indoloras en las regiones axilar derecha e inguinal izquierda. La radiografía de tórax muestra una masa nodular pleural izquierda de 4 cm. La TC abdominal revela una masa de 5 cm en el retroperitoneo derecho. Se realiza la biopsia de un ganglio inguinal y el examen microscópico muestra células grandes; algunas tienen núcleos en herradura con citoplasma voluminoso. Las células tumorales se agrupan alrededor de las vénulas e infiltran los senos. El paciente logra la remisión con quimioterapia. ¿Cuál de los siguientes marcadores es más probable que resulte positivo en las células tumorales?

A Proteína ALK
B Antígeno CD10
C Protooncogén *c-KIT*
D Receptor de IL-2
E Antígeno p24

34 Un hombre de 51 años presenta en la piel de la cara, del cuello y del tronco descamación de color rojo y prurito intenso, y ha perdido 3 kg en los últimos 2 meses. En la exploración física la temperatura es de 37,6 °C y tiene eritrodermia exfoliativa generalizada. Hay adenopatías diseminadas indoloras. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 12,9 g/dl; de hematocrito del 42%; de plaquetas de 231.000/mm^3, y de leucocitos de 7.940/mm^3 con un 57% de neutrófilos, un 3% de cayados, un 26% de linfocitos, un 5% de monocitos y un 9% de

eosinófilos. El examen microscópico de una biopsia de piel revela la presencia de células linfoides en la epidermis y la dermis superiores. Estas células tienen núcleos cerebriformes con pliegues internos marcados de las membranas nucleares. En el frotis de sangre periférica aparecen células similares. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de marcadores fenotípicos es más probable que expresen estos linfocitos anómalos?

A CD3+, CD4+
B CD5+, CD56+
C CD10+, CD19+
D CD13+, CD33+
E CD19+, Igs+

35 Un hombre de 58 años de Nagasaki, Japón, ha observado que presenta un número creciente de lesiones cutáneas desde hace 8 meses. En la exploración se aprecian áreas de descamación de color pardo rojizo en todas las superficies cutáneas. También tiene adenopatías generalizadas y hepatoesplenomegalia. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 9,7 g/dl; de hematocrito del 31%; de VCM de 89 μm^3; de plaquetas de 177.000/mm^3, y de leucocitos de 18.940/mm^3 con un 35% de neutrófilos, un 2% de cayados, un 58% de linfocitos y un 5% de monocitos. Su concentración de calcio sérico es de 11,5 mg/dl. El examen de un frotis de sangre periférica pone de manifiesto células multilobuladas en «hoja de trébol». ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que haya causado su enfermedad?

A *Bartonella henselae*
B Citomegalovirus (CMV)
C Virus de Epstein-Barr (VEB)
D *Helicobacter pylori*
E VIH
F VLTH-1

36 Un hombre de 26 años se ha notado bultos en el cuello, los cuales han aumentado de tamaño en los últimos 6 meses. En la exploración física tiene un grupo de ganglios linfáticos cervicales derechos agrandados e indoloros. La biopsia de uno de ellos muestra al microscopio macrófagos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y unas cuantas células plasmáticas. Hay células

grandes CD15+ dispersas, con múltiples núcleos o un solo núcleo con varios lóbulos nucleares, cada uno de ellos con un gran nucléolo similar a una inclusión. ¿Cuál es de las siguientes combinaciones de célula de origen y agente infeccioso es más probable en estas células de gran tamaño?

A Linfocito B, virus de Epstein-Barr
B Linfocito CD4+, virus linfótropo T humano
C Célula endotelial, virus del herpes del sarcoma de Kaposi
D Macrófago, virus de la inmunodeficiencia humana
E Linfocito NK, citomegalovirus

37 Una mujer de 34 años refiere cansancio generalizado y sudoración nocturna de 3 meses de evolución. La exploración física muestra una adenopatía cervical derecha indolora. Se realiza la biopsia de un ganglio linfático, y su examen microscópico pone de manifiesto un patrón de bandas gruesas de tejido conjuntivo fibroso con linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, macrófagos y alguna célula de Reed-Sternberg. La TC abdominal y una biopsia de médula ósea no muestran alteraciones. ¿Cuál de los siguientes subtipos de enfermedad es más probable en esta paciente?

A Depleción linfocítica
B Predominio linfocítico
C Rico en linfocitos
D Celularidad mixta
E Esclerosis nodular

38 Un hombre de 74 años ha sufrido episodios de fiebre y pérdida de 6 kg de peso en los últimos 5 meses. En la exploración física la temperatura es de 37,5 °C y tiene esplenomegalia. Una TC abdominal revela adenopatías mesentéricas. La biopsia de un ganglio linfático pone de manifiesto el borrado de la arquitectura nodular por una población de linfocitos pequeños, células plasmáticas, eosinófilos y macrófagos. ¿Cuál de los siguientes tipos celulares, que se tiñen con CD15 y CD30, es más probable que se encuentre también en esta enfermedad?

A Célula epitelioide
B Inmunoblasto
C Mastocito
D Mieloblasto
E Célula de Reed-Sternberg

39 Un hombre de 63 años se notó un bulto en el cuello hace 2 meses. La exploración revela un grupo de tres ganglios cervicales posteriores derechos definidos e indoloros, y una masa de ganglios linfáticos axilares derechos aumentados de tamaño. La TC toracoabdominal muestra adenopatías mediastínicas y hepatoesplenomegalia. El examen microscópico de un ganglio linfático cervical revela abundantes células binucleadas CD15+ y CD30+ de gran tamaño con nucléolos acidófilos prominentes, dispersas en un infiltrado linfocítico escaso. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que se ponga de manifiesto en el análisis molecular de esta lesión?

A Integración clonal del VEB en las células grandes
B Reordenamientos del gen *BCL6* en las células grandes
C Deleciones de 5q en todas las células
D Infección por *Helicobacter pylori* en todas las células
E Mutaciones del gen *JAK2* en los linfocitos

40 Una mujer de 22 años presenta disnea progresiva desde hace 2 meses. En la exploración física está afebril y normotensa. En la auscultación del tórax se escuchan sibilancias inspiratorias. La TC torácica muestra una masa de 8 × 10 cm en el mediastino posterior que presiona la tráquea y el esófago. Se realiza una mediastinoscopia, y la biopsia de la masa pone de manifiesto grandes células multinucleadas dispersas con nucléolos prominentes que se marcan con CD15, y linfocitos y macrófagos separados por bandas de colágeno densas. ¿Cuál de las siguientes células es más probable que se observe al microscopio en esta biopsia?

A Linfocitos atípicos
B Tricoleucocitos
C Células de Langerhans
D Células lagunares
E Linfoblastos
F Mieloblastos



41 Una mujer de 29 años refiere cansancio, fiebre, sudoración nocturna y bultos indoloros en la parte derecha del cuello de 3 meses de evolución. En la exploración física la temperatura es 37,5 °C. Tiene adenopatías cervicales derechas no dolorosas. Se biopsia uno de los ganglios linfáticos; en la figura se muestra un hallazgo histológico a gran aumento. ¿Cuál de las siguientes anomalías genéticas es más probable que revele el análisis molecular de las células grandes ejemplificadas por la célula central?

A Reordenamiento clonal de genes del receptor de linfocitos T
B Reordenamiento clonal de genes de inmunoglobulinas
C Integración del genoma del VLTH-1
D Integración del genoma del virus del herpes humano 8
E Reordenamiento policlonal de genes del receptor de linfocitos T
F Reordenamiento policlonal de genes de inmunoglobulinas

42 Un hombre de 33 años ha sufrido múltiples episodios de epistaxis y hemorragia gingival en el último mes. En la exploración la temperatura es de 37,3 °C. Tiene numerosas equimosis cutáneas. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 8,5 g/dl; de hematocrito del 25,7%; de plaquetas de 13.000/mm^3, y de leucocitos de 52.100/mm^3 con un 5% de neutrófilos, un 5% de cayados, un 2% de mielocitos, un 83% de blastos, un 3% de linfocitos y un 2% de monocitos. El examen del frotis de sangre periférica muestra que los blastos tienen cromatina nuclear de

aspecto frágil junto con gránulos azurófilos citoplásmicos finos. Estos blastos son CD33+. ¿Cuál de los siguientes hallazgos morfológicos es más probable que esté presente en el frotis de sangre periférica?

A Bastones de Auer
B Cuerpos de Döhle
C Proyecciones a modo de pelos
D Cuerpos de Heinz
E Drepanocitos
F Granulaciones tóxicas



43 Un hombre de 38 años presenta cefalea intensa de inicio súbito. La exploración física no muestra signos neurológicos de localización ni organomegalia. Una muestra de heces es positiva para sangre oculta. En la piel de las extremidades aparecen áreas de púrpura. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de hemoglobina de 9,6 g/dl; de hematocrito del 28,9%; de plaquetas de 16.400/mm^3, y de leucocitos de 75.000/mm^3. El frotis de sangre periférica ofrece la imagen mostrada en la figura; también se observan esquistocitos. La concentración de dímero D plasmático (productos de degradación de la fibrina), el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial están aumentados. ¿Cuál de las siguientes anomalías del cariotipo es

más probable que revele el análisis citogenético de células procedentes de una biopsia de médula ósea?

A t(8;14)
B t(8;21)
C t(9;22)
D t(14;18)
E t(15;17)

44 Una mujer de 38 años lleva 3 semanas con hemorragias gingivales. La exploración física muestra que las encías están engrosadas y friables. Tiene hepatoesplenomegalia y adenopatías generalizadas indoloras. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 11,2 g/dl; de hematocrito del 33,9%; de VCM de 89 μm^3; de plaquetas de $95.000/mm^3$, y de leucocitos de $4.500/mm^3$ con un 25% de neutrófilos, un 10% de cayados, un 2% de metamielocitos, un 55% de linfocitos, un 8% de monocitos y un 1 eritrocito nucleado por cada 100 leucocitos. Una biopsia de médula ósea revela celularidad del 100% con muchos blastos grandes que son negativos para peroxidasa y positivos para esterasa inespecífica, CD13 y CD14. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Eritroleucemia aguda
B Leucemia linfoblástica aguda
C Leucemia megacariocítica aguda
D Leucemia monocítica aguda
E Leucemia promielocítica aguda



45 Una estudiante universitaria de 22 años refiere cansancio fácil de 2 meses de evolución. En la exploración física no tiene hepatoesplenomegalia ni adenopatías. Se observan hemorragias de la mucosa gingival. El hemograma revela cifras de hemoglobina de 9,5 g/dl; de hematocrito del 28,2%; de VCM de 94 μm^3; de plaquetas de 20.000/mm^3, y de leucocitos de 107.000/mm^3. La figura ilustra el frotis de sangre periférica, cuyas células contienen gránulos positivos para peroxidasa. Una biopsia de médula ósea pone de manifiesto celularidad del 100% con pocas células hematopoyéticas normales residuales. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Leucemia linfoblástica aguda
B Leucemia mieloide aguda
C Leucemia linfática crónica
D Leucemia mieloide crónica
E Linfoma de Hodgkin

46 Un hombre de 50 años con un linfoma de linfocitos B grandes difuso recibió quimioterapia intensiva y logró una remisión completa durante 7 años. Actualmente refiere cansancio e infecciones pulmonares y urinarias de repetición de 4 meses de evolución. No se encuentran masas, adenopatías ni hepatoesplenomegalia en la exploración física. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 8,7 g/dl; de hematocrito del 25,2%; de VCM de 88 μm^3; de plaquetas de 67.000/mm^3, y de leucocitos de 2.300/mm^3 con un 15% de neutrófilos, un 5% de

cayados, un 2% de metamielocitos, un 2% de mielocitos, un 6% de mieloblastos, un 33% de linfocitos, un 35% de monocitos y un 2% de eosinófilos. Una biopsia de médula ósea muestra celularidad del 90% con muchas células inmaduras, incluidos sideroblastos en anillo, megaloblastos, megacariocitos hipolobulados y mieloblastos. El análisis de cariotipo muestra deleciones de 5q en muchas células. ¿Qué enfermedad es más compatible con este cuadro clínico?

A Leucemia mieloblástica aguda *de novo*
B Metaplasia mieloide con mielofibrosis
C Mielodisplasia relacionada con el tratamiento
D Recaída del linfoma previo
E Transformación en leucemia mieloide

47 En un experimento se recogen muestras de células procedentes de aspirados de la médula ósea de pacientes diagnosticados de trastornos linfoproliferativos. Se realizan análisis citogenéticos en esas células y se encuentra que un subgrupo tiene el gen de fusión *BCR-ABL* formado por la translocación recíproca t(9;22)(q34;11). La presencia de este gen determina un incremento de la actividad tirosina cinasa. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que tengan los pacientes que poseen este gen?

A Leucemia promielocítica aguda
B Leucemia mieloide crónica
C Linfoma folicular
D Linfoma de Hodgkin de tipo depleción linfocítica
E Mieloma múltiple

48 Una mujer de 63 años refiere una sensación urente en manos y pies. Hace 2 meses tuvo un episodio de tumefacción y dolor en la pierna derecha, seguidos de disnea y dolor en el hemitórax derecho. En la exploración física actual, el bazo y el hígado parecen estar agrandados. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 13,3 g/dl; de hematocrito del 40,1%; de VCM de 91 μm^3; de plaquetas de 657.000/mm^3, y de leucocitos de 17.400/mm^3. El frotis de sangre periférica revela plaquetas anómalamente grandes. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Leucemia mieloide aguda
B Leucemia mieloide crónica
C Trombocitosis esencial

D Mielofibrosis con metaplasia mieloide
E Policitemia vera

49 Una mujer de 60 años ha tenido cefalea y mareos en las últimas 5 semanas. Ha estado tomando omeprazol porque presentaba úlceras. En la exploración física está afebril y normotensa, y la cara tiene un aspecto de pletórico a cianótico. Hay esplenomegalia leve sin otros hallazgos anómalos. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 21,7 g/dl; de hematocrito del 65%; de plaquetas de 400.000/mm^3, y de leucocitos de 30.000/mm^3 con un 85% de polimorfonucleares, un 10% de linfocitos y un 5% de monocitos. El frotis de sangre periférica revela plaquetas anómalamente grandes y eritrocitos nucleados. ¿A cuál de los siguientes trastornos es más característico que la enfermedad de esta paciente evolucione?

A Desarrollo de un linfoma no hodgkiniano gástrico
B Aumento de inmunoglobulina monoclonal sérica
C Fibrosis medular con hematopoyesis extramedular
D Remisiones espontáneas y recaídas sin tratamiento
E Transformación en una leucemia linfoblástica aguda de linfocitos B



50 Un hombre de 45 años presenta pérdida de peso gradual y debilidad, anorexia y fácil fatigabilidad desde hace 9 meses. La

exploración física revela esplenomegalia marcada. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 12,9 g/dl; de hematocrito del 38,1%; de VCM de 92 μm^3; de plaquetas de 410.000/mm^3, y de leucocitos de 168.000/mm^3. La figura presenta el frotis de sangre periférica. Un análisis de cariotipo revela el cromosoma Ph^1. El paciente recibe quimioterapia con mesilato de imatinib (inhibidor de la tirosina cinasa). Se mantiene en remisión 3 años y después comienza a sentirse cansado y pierde 8 kg de peso. El hemograma muestra hemoglobina de 10,5 g/dl; hematocrito, 30%; plaquetas, 60.000/µl; y leucocitos, 40.000/µl. El análisis del cariotipo revela dos cromosomas Ph^1 y aneuploidía. Un análisis por citometría de flujo de la sangre periférica pone de manifiesto células CD19+, CD10+, Igs− y CD3−. ¿Cuál de las siguientes complicaciones de la enfermedad inicial es más probable que desarrolle este paciente tras el tratamiento?

A Leucemia mieloide aguda
B Leucemia linfoblástica de linfocitos B
C Tricoleucemia
D Síndrome mielodisplásico
E Síndrome de Sézary

51 Un hombre de 50 años refiere cefalea, mareo y cansancio de 3 meses de evolución. Sus amigos comentan que cada vez está más rubicundo. También ha sufrido prurito intenso generalizado, especialmente en la ducha. Observa que las heces son negras. En la exploración física no tiene fiebre y la presión arterial es de 165/95 mmHg. No hay hepatoesplenomegalia ni adenopatías. Una muestra de heces resulta positiva para sangre oculta. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 22,3 g/dl; de hematocrito del 67,1%; de VCM de 94 μm^3; de plaquetas de 453.000/mm^3, y de leucocitos de 7.800/mm^3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Leucemia mieloide crónica
B Eritroleucemia
C Trombocitosis esencial
D Síndrome mielodisplásico
E Policitemia vera

52 Un hombre de 66 años presenta cansancio, pérdida de 5 kg de peso, sudoración nocturna y molestias abdominales desde hace 10

meses. En la exploración física tiene esplenomegalia marcada; no hay adenopatías. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 10,1 g/dl; de hematocrito del 30,5%; de VCM de 89 μm^3; de plaquetas de 94.000/mm^3, y de leucocitos de 14.750/mm^3 con un 55% de neutrófilos, un 9% de cayados, un 20% de linfocitos, un 8% de monocitos, un 4% de metamielocitos, un 3% de mielocitos, un 1% de eosinófilos y 2 eritrocitos nucleados por cada 100 leucocitos. El frotis de sangre periférica revela también dacriocitos. La concentración sérica de ácido úrico es de 12 mg/dl. Una biopsia de médula ósea pone de manifiesto fibrosis extensa y agregados de megacariocitos atípicos. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que explique el aumento de tamaño del bazo de este paciente?

A Hematopoyesis extramedular
B Granulomas con *Histoplasma capsulatum*
C Linfoma de Hodgkin
D Adenocarcinoma metastásico
E Hipertensión portal



53 Un niño de 9 años lleva 15 días con fiebre. El año anterior fue diagnosticado y tratado de otitis media en múltiples ocasiones. En la exploración física se observan adenopatías leves, hepatomegalia y esplenomegalia. Hay pápulas con costra extensas en la piel. La TC craneal revela una masa osteolítica de 4 cm en la mastoides. Se realiza una biopsia de la masa y se obtiene la microfotografía electrónica mostrada en la figura. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Leucemia linfoblástica aguda
B Tuberculosis diseminada
C Linfoma de Hodgkin de tipo celularidad mixta
D Histiocitosis de células de Langerhans
E Mieloma múltiple

54 Una niña de 18 meses ha desarrollado erupciones seborreicas

en la piel en los últimos 3 meses. El año anterior tuvo episodios de repetición de infección respiratoria alta y otitis media por *Streptococcus pneumoniae.* La exploración física revela que también tiene hepatoesplenomegalia y adenopatías generalizadas. La audición está reducida en el oído derecho. La radiografía de cráneo muestra una lesión lítica expansible de 2 cm en el hueso temporal derecho. Las pruebas de laboratorio constatan la ausencia de anemia, trombocitopenia y leucopenia. Se procede a realizar el legrado de la masa. ¿Qué es más probable observar en el examen microscópico de la masa?

A Histiocitosis con gránulos de Birbeck
B Linfoblastos que se marcan con CD3
C Células plasmáticas con cuerpos de Russell
D Células de Reed-Sternberg y variantes
E Sideroblastos en anillo con gránulos perinucleares
F Células de Sézary con núcleos cerebriformes



55 Un hombre de 20 años es depositado en la puerta del servicio de urgencias por unos «amigos» después de pasar la noche en un *pub*. En la exploración, las constantes vitales son: temperatura, 37 °C; frecuencia cardíaca, 110 latidos/min; frecuencia respiratoria, 26

respiraciones/min y presión arterial, 75/40 mmHg. Tiene dolor a la palpación en el hipocondrio izquierdo. Se realiza una TC abdominal, mostrada en la figura. ¿Cuál es la causa subyacente más probable del cuadro clínico?

A Cirrosis
B Enfermedad de Gaucher
C Paludismo
D Síndrome mieloproliferativo
E Endocarditis trombótica no bacteriana
F Infección por *Salmonella typhi*
G Traumatismo

56 Un hombre de 60 años con antecedentes de consumo crónico de alcohol presenta molestias abdominales y cansancio crecientes desde hace 9 meses. Ha observado que aparecen hematomas en la piel con traumatismos mínimos en el último mes. En la exploración no tiene fiebre, pero el bazo está aumentado de tamaño y es doloroso a la palpación. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 7,7 g/dl; hematocrito del 23%; plaquetas, 30.000/mm^3, y leucocitos, 2.300/mm^3 con un 45% de polimorfonucleares, un 50% de linfocitos y un 5% de monocitos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Leucemia mieloide aguda
B Mononucleosis infecciosa
C Cirrosis micronodular
D Enfermedad de Niemann-Pick
E Adenocarcinoma metastásico
F Lupus eritematoso sistémico



57 Un hombre de 27 años lleva 10 días con fiebre, escalofríos y tiritona. En la exploración física la temperatura es de 37,9 °C; la frecuencia cardíaca, de 87 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 21 respiraciones/min, y la presión arterial, de 100/55 mmHg. En la auscultación del tórax se escucha un soplo diastólico. La punta del bazo es palpable y dolorosa. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 12,8 g/dl; de hematocrito del 38,4%; de plaquetas de 231.000/mm^3, y de leucocitos de 12.980/mm^3 con un 69% de neutrófilos, un 8% de cayados, un 1% de metamielocitos, un 18% de linfocitos y un 4% de monocitos. La figura muestra una imagen macroscópica representativa del bazo. ¿Cuál de las siguientes enfermedades subyacentes es más probable que ocasione las alteraciones del bazo?

A Leucemia mieloide aguda
B Histoplasmosis diseminada
C Linfoma de Hodgkin
D Endocarditis infecciosa
E Carcinoma metastásico
F Cirrosis micronodular
G Cardiopatía reumática

58 Un niño de 14 años presenta tos y fiebre alta desde hace 4 días. En la exploración física la temperatura es de 39,2 °C. Se auscultan estertores difusos en todos los campos pulmonares. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 14,8 g/dl; de

hematocrito del 44,4%; de plaquetas de 496.000/mm^3, y de leucocitos de 15.600/mm^3. El examen del frotis de sangre periférica revela eritrocitos con anisocitosis marcada y cuerpos de Howell-Jolly. En el cultivo de esputo crece *Haemophilus influenzae.* ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Síndrome de DiGeorge
B Galactosemia
C Enfermedad de Gaucher
D Síndrome mieloproliferativo
E Esplenectomía previa
F Trisomía 21

59 Se realiza un estudio clínico con niños de 1 a 4 años de edad que han tenido múltiples infecciones por virus, hongos y parásitos. Comparados con un grupo control normal, estos niños carecen de células tímicas que contengan marcadores de linfocitos corticales. ¿Cuál de las siguientes anomalías del cariotipo es más probable que se observe en los niños del estudio?

A +21
B 22q11.2
C t(9;22)
D t(15;17)
E X(fra)
F XXY

60 Una mujer de 49 años presenta debilidad y dolor torácico progresivos en los 6 meses anteriores. En la exploración física no tiene fiebre y su presión arterial es normal. La fuerza motora es de 5/5 en todas las extremidades, pero desciende a 4/5 con el movimiento repetitivo. No hay dolor muscular espontáneo ni a la palpación. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 14 g/dl; de hematocrito del 42%; de plaquetas de 246.000/mm^3, y de leucocitos de 6.480/mm^3. La TC torácica revela una masa irregular de 10 × 12 cm en el mediastino anterior. Al cirujano le resulta difícil resecar la masa porque infiltra las estructuras circundantes. En el examen microscópico la masa está compuesta por grandes células epiteliales fusiformes y atípicas mezcladas con células linfoides. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que ocasione esta lesión de tipo masa?

A Tuberculosis extrapulmonar

B Linfoma de Hodgkin
C Linfoma linfoblástico
D Timoma maligno
E Carcinoma de mama metastásico
F Absceso en organización

Respuestas

1 **E** El hallazgo principal en este paciente es granulocitopenia marcada. En la sangre periférica solo quedan células mononucleares (recuerde que hay que multiplicar los porcentajes de la fórmula diferencial por la cifra de leucocitos totales para obtener los valores absolutos; podría ser que una línea celular prácticamente esté ausente, en vez de que otra se encuentre sobrerrepresentada). Una retirada o destrucción acelerada de los neutrófilos podría explicar la ausencia selectiva de granulocitos en este caso. Las infecciones agudas fulminantes y otras causas que provoquen una respuesta generalizada de la inmunidad innata determinan un mayor uso periférico de neutrófilos en las zonas de inflamación. Las hemorragias petequiales también aparecen en infecciones bacterianas fulminantes como las debidas a *Neisseria meningitidis.* Es improbable que la hemorragia se deba a trombocitopenia, porque en este caso el recuento de plaquetas es normal. Los hallazgos normales de la médula ósea descartan leucemia mieloide o linfoide. En la anemia aplásica, la médula tiene celularidad escasa y está reducida la producción de eritrocitos, leucocitos y plaquetas.

2 **A** La grave pancitopenia fue consecuencia de una toxicidad farmacológica. Esta la predispuso a la sepsis posterior, con aspergilosis como causa de los nódulos pulmonares y neutropenia como el factor de riesgo más relevante. Estos hongos invaden con frecuencia los vasos sanguíneos y producen lesiones hemorrágicas. La bartonelosis puede producir una angiomatosis bacilar, que suele afectar a la piel. El complejo *Mycobacterium avium* afecta con más frecuencia a órganos del sistema mononuclear fagocítico y no es probable que cause nódulos grandes. *Escherichia coli,* de un modo similar al de muchas infecciones bacterianas, puede aparecer en la infección

por el VIH, pero tiene un patrón de infiltrados agudos por neutrófilos. El virus del herpes simple (tipo 1 o 2) es una infección diseminada infrecuente en la provocada por el VIH. La neumonía por *Pneumocystis* casi nunca produce lesiones nodulares. La toxoplasmosis no es frecuente en el pulmón, ni siquiera en personas inmunodeprimidas.

3 **D** Las figuras muestran una leucocitosis con neutrofilia, y también es posible una «desviación izquierda» debido al aumento de la concentración de cayados. Las infecciones crónicas y los trastornos inflamatorios mantenidos, como los abscesos pulmonares, pueden provocar la expansión del grupo de precursores mieloides en la médula ósea, con hiperplasia mieloide. La hepatitis vírica aguda, a diferencia de las infecciones bacterianas agudas, no causa leucocitosis con neutrofilia. En la leucemia mieloide crónica, la médula está ocupada por células mieloides de toda la línea de maduración y hay formas más inmaduras en la sangre periférica, incluidos metamielocitos, mielocitos e, incluso, unos cuantos blastos, junto con un mayor número de eosinófilos y basófilos. Los glucocorticoides aumentan la liberación de las células de depósito de la médula y disminuyen la salida de los neutrófilos a los tejidos. Un ejercicio vigoroso es capaz de provocar neutrofilia transitoria por el aumento de neutrófilos circulantes. Un bazo grande tiende a secuestrar células de la sangre periférica, con lo que disminuyen las cifras de células circulantes.

4 **C** Una enfermedad autoinmunitaria, con más probabilidad lupus eritematoso sistémico (LES) en esta paciente, puede acompañarse de monocitosis. En el LES también son posibles las citopenias por autoanticuerpos contra elementos de la sangre, un tipo de hipersensibilidad de tipo II. La basofilia es infrecuente, pero también se observa en la leucemia mieloide crónica (LMC). La eosinofilia es una característica presente con más frecuencia en trastornos alérgicos, infecciones parasitarias de los tejidos y LMC. La neutrofilia se observa en infecciones agudas y trastornos inflamatorios. La trombocitosis suele producirse en trastornos neoplásicos de las células madre mieloides, como los síndromes mieloproliferativos, entre los que se encuentran la LMC y la trombocitosis esencial.

5 **D** La eosinofilia apunta a una infestación parasitaria. Las personas inmunodeprimidas pueden tener una sobreinfección por estrongiloidosis y diseminación del parásito. La hipersensibilidad de tipo I con reacciones alérgicas también se acompaña en ocasiones de eosinofilia. Los demás microorganismos reseñados no se asocian a eosinofilia, hasta donde sabemos.

6 **E** Las granulaciones tóxicas, que son gránulos primarios gruesos y oscuros, y los cuerpos de Döhle, parches de retículo endoplásmico rugoso, representan cambios reactivos de los neutrófilos que indican, sobre todo, trastornos inflamatorios fulminantes, como sepsis bacteriana. La vía de infección, en este caso, es el uso de drogas por vía intravenosa. La mononucleosis infecciosa se acompaña de un incremento de linfocitos «atípicos». Las leucemias y las infecciones granulomatosas y víricas no causan cambios tóxicos en los neutrófilos.

7 **C** Esta infección granulomatosa ha provocado leucocitosis con linfocitosis y monocitosis. Los monocitos sanguíneos se convierten en macrófagos tisulares que pasan a ser células epitelioides y células gigantes de la inflamación granulomatosa. La forma más constante de leucocitosis por infección es la neutrofilia de las infecciones bacterianas agudas, como la causada por *Staphylococcus aureus.* Las infecciones víricas, micobacterianas y fúngicas producen hallazgos menos constantes en la sangre periférica. Una leucemia linfoblástica aguda probablemente se acompañe de un recuento mayor de leucocitos con linfoblastos circulantes. El linfoma de Hodgkin no se asocia a hallazgos constantes en la sangre periférica y es improbable que cause nódulos pulmonares solitarios. Los síndromes mielodisplásicos se caracterizan por la presencia de células mieloides inmaduras y citopenias en la sangre periférica.

8 **D** Una leucocitosis marcada y la presencia de células mieloides inmaduras en la sangre periférica puede representar una respuesta exagerada a la infección (reacción leucemoide) o bien ser una manifestación de leucemia mieloide crónica (LMC). La maduración normal de las células mieloides en la médula descarta LMC. Aunque no está reseñado en este caso, el índice de fosfatasa alcalina leucocítica (LAP) está elevado en la

población más diferenciada de la leucocitosis reactiva, mientras que en la LMC el índice de LAP es bajo. El cromosoma Filadelfia (presente en la mayoría de los casos de LMC) falta en los pacientes con reacciones leucemoides. La tricoleucemia se acompaña de leucocitos en sangre periférica que se marcan con fosfatasa ácida resistente al tartrato. El linfoma de Hodgkin no se caracteriza por un aumento del recuento de leucocitos. Un síndrome mielodisplásico es un trastorno de la maduración de las células madre que afecta a todas las estirpes celulares no linfoides, no solo a los granulocitos.

9 **A** El frotis muestra grandes linfocitos «atípicos» con abundante citoplasma hendidos por eritrocitos, que aparecen con más frecuencia en pacientes con mononucleosis infecciosa y a veces en otras infecciones víricas, como citomegalovirus. Estas células atípicas son linfocitos grandes con citoplasma abundante y un gran núcleo con cromatina fina. La mononucleosis infecciosa está causada por el virus de Epstein-Barr (VEB) y se transmite por contacto estrecho entre personas. En pacientes con mononucleosis infecciosa, los genes del VEB causan la proliferación y la activación de múltiples clones de linfocitos B y se produce una expansión policlonal de estos linfocitos, que secretan anticuerpos con diversas especificidades, incluidos algunos con reacción cruzada ante eritrocitos de carnero. Estos anticuerpos heterófilos provocan un resultado positivo en la prueba de aglutinación para la mononucleosis (Paul-Bunnell). Los linfocitos atípicos son linfocitos T CD8+ activados por linfocitos B infectados por el VEB. En la mononucleosis infecciosa no aumentan las cifras de basófilos, de eosinófilos ni de monocitos. El consumo de ostras crudas es un factor de riesgo de hepatitis A, porque las ostras que filtran agua de mar contaminada concentran el virus en sus tejidos. Los trastornos de la síntesis de cadenas de globina afectan a los eritrocitos, como sucede en las talasemias. La mononucleosis infecciosa no se ha descrito en asociación con transfusiones. Del mismo modo, el uso de drogas por vía intravenosa no es un factor de riesgo característico de la mononucleosis infecciosa, pero las personas que comparten agujas infectadas están en riesgo de sufrir infecciones bacterianas y por el VIH, así como hepatitis

víricas.

10 **A** Los ganglios dolorosos y con aumento agudo del tamaño apuntan a un trastorno reactivo y no a un proceso neoplásico, como un linfoma o leucemia. En los niños, los ganglios agrandados y dolorosos y la linfoadenitis aguda son frecuentes. Muchos procesos infecciosos dan lugar a estos hallazgos, especialmente las infecciones bacterianas. Los niños son «esponjas de antígenos» cuando se exponen a las infecciones banales habituales; son bastante activos y se hacen múltiples cortes y arañazos en las extremidades, que pueden infectarse, con hiperplasia reactiva de los ganglios regionales. La enfermedad por arañazo de gato puede producir granulomas de tipo sarcoide con abscesos estrellados. Los linfomas foliculares son neoplasias de linfocitos B que borran la arquitectura normal de los ganglios linfáticos; estos tumores no aparecen en niños. La sarcoidosis es un proceso granulomatoso crónico observado típicamente en adultos y caracterizado por la formación de granulomas no necrosantes. La toxoplasmosis puede ser una infección congénita o bien producirse en personas inmunodeprimidas; genera un patrón de hiperplasia folicular.

11 **F** Los ganglios linfáticos que drenan un cáncer muestran con frecuencia un patrón reactivo, con sinusoides dilatados que tienen hiperplasia endotelial y están ocupados por histiocitos (es decir, macrófagos). La histiocitosis sinusal representa una respuesta inmunitaria a los antígenos cancerosos. Así pues, no todos los ganglios agrandados se deben a metástasis en los pacientes con cáncer. CD3 es un marcador de linfocitos T, CD19 y CD20 son marcadores de linfocitos B y CD68 es un marcador de macrófagos (histiocitos). Las proliferaciones policlonales son procesos reactivos típicamente benignos, mientras que una proliferación monoclonal indica neoplasia. La aneuploidía y fase S elevada son características de las neoplasias malignas; una fase S elevada se produce con más frecuencia en tumores de crecimiento rápido, como linfomas de linfocitos B grandes difusos, y en unos pocos carcinomas, como carcinoma anaplásico de células pequeñas. La inflamación produciría fiebre y dolor, y la paciente podría tener fiebre. Las enfermedades inflamatorias generalizadas y las infecciones crónicas pueden

aumentar el número de células plasmáticas en los ganglios linfáticos.

12 **A** La enfermedad por arañazo de gato es una forma de linfoadenitis infecciosa autolimitada que se observa con más frecuencia en niños, por lo general «anterógrada» al drenaje linfático desde la zona de lesión en una extremidad distal. Por este motivo, las regiones de ganglios linfáticos axilares y cervicales son las afectadas con más frecuencia. La infección por citomegalovirus se observa típicamente en personas inmunodeprimidas y no es una causa habitual de adenopatías. La infección por el virus de Epstein-Barr (VEB) a esta edad se asocia con más frecuencia a mononucleosis infecciosa y faringitis, y las adenopatías son inespecíficas. *Staphylococcus aureus* puede producir inflamación supurativa con sepsis. *Yersinia pestis*, el microorganismo causante de la peste bubónica, produce adenopatías que se ulceran y una linfoadenitis necrosante hemorrágica; tiene una mortalidad elevada.

13 **E** Las inmunodeficiencias primarias y adquiridas producen una desregulación inmunitaria que puede dar lugar a neoplasias malignas, con más frecuencia proliferaciones neoplásicas de leucocitos: linfomas, leucemias y linfoma de Hodgkin, aunque también son posibles los carcinomas. De las inmunodeficiencias primarias, el síndrome de Wiskott-Aldrich tiene el porcentaje más alto de linfomas entre las neoplasias malignas que se desarrollan. Es posible que la infección por el virus de Epstein-Barr sea un desencadenante adicional. Por el contrario, las personas con neoplasias malignas linfoides pueden desarrollar una inmunodeficiencia secundaria, con mayor riesgo de infecciones oportunistas. Las demás opciones reseñadas no están ligadas específicamente al desarrollo de neoplasias malignas.

14 **D** Su edad y la localización mediastínica son típicas del linfoma linfoblástico del timo. Esta lesión pertenece al grupo de la leucemia o linfoma linfoblástico agudo (LLA). La mayoría de los casos de LLA con presentación linfomatosa son del tipo prelinfocito T, como indica la expresión de los marcadores de linfocitos T CD2 y CD7. El gen *NOTCH1* codifica un receptor transmembrana necesario para el desarrollo de linfocitos T, y

más de la mitad de los tumores de prelinfocitos T tienen mutaciones puntuales activadoras. La TdT es un marcador pre-T y pre-B. El linfoma de Burkitt es un linfoma de linfocitos B que también aparece en adolescentes, pero por lo general se localiza en la mandíbula o el abdomen. Los linfomas foliculares con esclerosis nodular y los linfomas de células del manto son tumores de linfocitos B que suelen observarse en pacientes ancianos y no afectan al timo. El linfoma de Hodgkin sí aparece en el mediastino, pero afecta a los ganglios mediastínicos, no al timo. Entre las características histológicas del linfoma de Hodgkin están las células de Reed-Sternberg, y esta variante tiene bandas fibrosas que rodean a las células linfoides. El linfoma de células pequeñas linfocítico es la fase tisular de la leucemia linfática crónica observada en ancianos.

15 **A** La historia clínica, el frotis de sangre periférica y los marcadores fenotípicos son característicos de la leucemia linfática crónica (LLC), una neoplasia clonal de linfocitos B en la que se reordenan los genes de inmunoglobulinas, y los genes del receptor de linfocitos T están en la configuración de la línea germinal. Típicamente, hay un componente tisular de linfoma de células pequeñas linfocítico (LLP). La translocación t(8;14) es característica del linfoma de Burkitt; este linfoma aparece en niños en zonas extraganglionares. La t(9;22) es típica de la leucemia mieloide crónica. La translocación t(14;18) caracteriza a los linfomas foliculares, que son tumores de linfocitos B definidos que afectan a los ganglios y producen un patrón folicular. Las células del linfoma pueden estar presentes en la sangre, pero no se parecen a los linfocitos maduros.

16 **D** La figura muestra un linfoma no hodgkiniano folicular. Todas las neoplasias linfoides derivan de una sola célula transformada y son monoclonales. Las neoplasias de linfocitos B representan el 80-85% de todas las neoplasias linfoides, y en general resulta posible demostrar su carácter monoclonal mediante inmunotinciones que revelan una cadena ligera en las células neoplásicas. Las poblaciones de linfocitos B normales o reactivas (policlonales) contienen una mezcla de linfocitos B que expresan cadenas ligeras κ y λ. Algunas neoplasias linfoides tienen un patrón folicular. En ocasiones, falta el patrón normal

de los folículos si el ganglio está afectado, como sucede en algunos trastornos inflamatorios o en la inmunodepresión. El antígeno CD30 es un marcador de linfocitos T y B activados. Las células plasmáticas están presentes a veces en los trastornos reactivos, pero su ausencia no indica neoplasia maligna. La proliferación de capilares es típicamente un proceso reactivo benigno.

17 **A** Estos hallazgos son característicos de una leucemia linfoblástica aguda de la infancia del precursor de linfocitos B. La rápida expansión de la médula causada por la proliferación de blastos provoca dolor óseo espontáneo y a la palpación. Las características a favor de leucemia aguda son anemia, trombocitopenia y presencia de blastos en sangre periférica y médula ósea. La anemia y trombocitopenia son secundarias a la supresión de la hematopoyesis normal por el clon leucémico de la médula. El fenotipo CD19+, CD3− e Igs− es típico de las células pre-B. La TdT es un marcador de células linfoides de tipos T y B precoces. Una leucemia mieloide aguda es una neoplasia de adultos jóvenes o de mediana edad, y habría mieloblastos positivos para peroxidasa y características fenotípicas de las células mieloides. La leucemia linfática crónica es una enfermedad de ancianos: los pacientes tienen muchos linfocitos B maduros pequeños circulantes. La leucemia mieloide crónica es una enfermedad de adultos, y el recuento de leucocitos es bastante elevado; la sangre periférica contiene algunos mieloblastos, pero también se detectan otras fases de la diferenciación mieloide. En la púrpura trombocitopénica idiopática solo está reducido el número de plaquetas por su destrucción mediada por anticuerpos.

18 **A** Los siguientes marcadores son altamente sugestivos de un pronóstico muy bueno en la leucemia linfoblástica aguda (LLA), la neoplasia maligna más frecuente en niños: precursor de linfocitos B precoz, hiperdiploidía, y edad del paciente entre 2 y 10 años, trisomía cromosómica y t(12;21). La infiltración de la médula por las células leucémicas provoca pancitopenia. Los marcadores de mal pronóstico en la leucemia/linfoma linfoblástico son fenotipo de linfocitos T, edad del paciente > 2 años, recuento de leucocitos > 100.000, presencia de mutaciones

t(9;22) del gen *MLL* y presentación en la adolescencia y en la edad adulta. En la mayoría de las LLA de linfocitos T de adolescentes aparece una masa mediastínica en el timo y surgen infiltrados linfoides en los tejidos del sistema mononuclear fagocítico. Al éxito del plan terapéutico también colabora una familia que sea fuente de cariño y apoyo.

19 **C** El linfoma folicular es la forma más frecuente de linfoma no hodgkiniano en adultos de Europa y Norteamérica. Hombres y mujeres resultan afectados por igual. Los linfocitos B neoplásicos remedan una población de células centrofoliculares y producen un patrón nodular o folicular. La afectación ganglionar suele ser generalizada, pero la extraganglionar no es frecuente. La translocación t(14;18), que es característica, causa la sobreexpresión del gen *BCL2* al yuxtaponerlo con el *locus* de IgH; las células son resistentes a la apoptosis. Concordantemente, los linfomas foliculares son tumores indolentes que continúan acumulando células durante 7-9 años. La población linfoide de la linfoadenitis aguda es reactiva, y no hay afectación de la médula ósea. En el linfoma de Hodgkin hay unas pocas células de Reed-Sternberg rodeadas por una población linfoide reactiva. El linfoma de células del manto también es un tumor de linfocitos B; es más invasivo que el linfoma folicular y queda tipificado por la translocación t(11;14), en la que se sobreexpresa el gen de la ciclina D1 *(BCL2)*. En la toxoplasmosis habría una población mixta de células inflamatorias y algo de necrosis.

20 **B** Sonja Henie falleció por las complicaciones de una leucemia linfática crónica (LLC). La figura muestra un número mayor de linfocitos circulantes pequeños, redondeados y maduros con citoplasma escaso en el frotis de sangre periférica. Las células de la LLC expresan el marcador CD5 y los marcadores de todo el grupo B CD19 y CD20. La mayoría de los pacientes tienen la enfermedad durante 4-6 años antes de fallecer y los síntomas surgen cuando las células leucémicas empiezan a ocupar la médula ósea. En algunos pacientes, estos mismos linfocitos pequeños aparecen en los tejidos; este trastorno se conoce entonces como *linfoma de células pequeñas linfocítico.* La leucemia linfoblástica aguda es una enfermedad de niños y adultos

jóvenes caracterizada por la proliferación de linfoblastos. Estas células son mucho más grandes que las células de la LLC y tienen nucléolos. Los linfocitos observados en la mononucleosis infecciosa son linfocitos atípicos, con citoplasma abundante de color azul pálido, que parecen estar hendidos por los eritrocitos circundantes. En la anemia ferropénica, los eritrocitos son hipocrómicos y microcíticos, pero los leucocitos no resultan afectados. Las reacciones leucemoides son típicamente de tipo mieloide, y la sangre periférica contiene células mieloides inmaduras. El recuento de leucocitos puede ser muy alto, pero la cifra de plaquetas es normal.

21 **B** Este paciente con VIH tiene una masa infiltrante extraganglionar, compuesta por linfocitos B (CD19+) en el íleon. Se trata de un linfoma de células grandes difuso de linfocitos B. Estos tumores contienen el genoma del virus de Epstein-Barr (VEB) y se cree que la inmunodepresión permite la proliferación no regulada y la transformación neoplásica de los linfocitos B infectados por el VEB. No se conoce ningún tumor causado por citomegalovirus. No hay VIH en linfocitos B normales ni neoplásicos. El virus del herpes humano 8 (también llamado *virus del herpes del sarcoma de Kaposi*) está presente en las células fusiformes del sarcoma de Kaposi y en los linfomas de linfocitos B de cavidades corporales en pacientes con sida. El virus de la leucemia/linfoma de linfocitos T humanos de tipo 1 está relacionado con el VIH-1 y causa leucemia/linfoma de linfocitos T del adulto.

22 **B** Los linfomas de Burkitt y de tipo Burkitt aparecen esporádicamente (en jóvenes), de forma endémica en África (en niños) y asociados a la infección por el VIH. Todos los tipos están enormemente relacionados con translocaciones del gen *MYC* en el cromosoma 8. En el tipo africano y en el de pacientes infectados por el VIH, las células tienen una infección latente por el virus de Epstein-Barr (VEB), pero en los casos esporádicos no participa el VEB. Esta forma de linfoma es típicamente extraganglionar. Debido a la gran fracción de crecimiento (40% en este caso), los linfomas de Burkitt responden muy bien a la quimioterapia, incluidos los compuestos que interrumpen el ciclo celular. Por el contrario, los tumores de crecimiento lento

con una fracción de crecimiento baja son más indolentes y responden peor a la quimioterapia. Los linfomas linfoblásticos agudos aparecen en niños de esta edad, pero la masa está en el mediastino y las células linfoides son linfocitos T. Los linfomas de células grandes difusos son más frecuentes en adultos, al igual que los linfomas foliculares; no contienen la translocación t(8;14). Los plasmocitomas aparecen en ancianos y es improbable que den lugar a masas abdominales.

23 **C** El linfoma de linfocitos B grandes difuso aparece en personas ancianas y a menudo se manifiesta en forma de enfermedad localizada con afectación extraganglionar, especialmente del anillo de Waldeyer. Una tercera parte de los casos tienen reordenamientos o mutaciones de *BCL6.* El patrón de tinción indica una proliferación de linfocitos B (CD19+, CD10+). No hay marcadores de linfocitos T (CD3) ni de monocitos (CD15). La TdT puede expresarse en células de la línea B en estadios de maduración más precoces. El linfoma linfoblástico es una neoplasia de linfocitos T que aparece típicamente en el mediastino de niños. En la linfoadenitis crónica, el ganglio linfático tiene muchos tipos de células: macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Un infiltrado uniforme es típico de los linfomas no hodgkinianos. Las células de Reed-Sternberg caracterizan el linfoma de Hodgkin. El linfoma de células pequeñas linfocítico también es una neoplasia de linfocitos B, pero se manifiesta con adenopatías generalizadas, aumento del tamaño del hígado y del bazo, y linfocitosis.

24 **A** El linfoma de células grandes difuso de linfocitos B suele aparecer en localizaciones extraganglionares, muestra grandes células linfoides anaplásicas que afectan de forma difusa a los tejidos y contiene reordenamientos del gen *BCL6.* Su evolución clínica es invasiva y resultan rápidamente mortales sin tratamiento. Sin embargo, con quimioterapia intensiva el 60-80% de los pacientes logran la remisión completa y hasta el 50% se curan. Los linfomas más invasivos tienden a ser localizados, mientras que los indolentes suelen afectar a múltiples localizaciones ganglionares o a varios órganos, como el hígado, el bazo y la médula ósea.

25 **B** La variedad endémica africana del linfoma de Burkitt es un linfoma de linfocitos B que aparece típicamente en el maxilar y la mandíbula. Esta particular neoplasia está relacionada con la infección por el virus de Epstein-Barr. La infección por citomegalovirus aparece en pacientes inmunodeprimidos y puede tratarse de una infección congénita, pero no es causa directa de neoplasia. La infección por el virus de la hepatitis B es un factor de riesgo de carcinoma hepatocelular. La infección por el VIH es un factor de riesgo del desarrollo de linfomas no hodgkinianos, pero la mayoría son linfomas de linfocitos B grandes difusos o linfomas pequeños no hendidos de tipo Burkitt. La infección por el virus del papiloma humano está relacionada con displasia y carcinomas epidermoides, con más frecuencia en el cuello uterino. La infección por el virus respiratorio sincitial produce neumonía en lactantes y niños pequeños, pero no se asocia al desarrollo de neoplasias.

26 **C** El mieloma múltiple produce lesiones de tipo masa de células plasmáticas que causan lisis ósea y dolor. La radiografía de cráneo muestra las típicas lesiones líticas en sacabocados, producidas por masas de células plasmáticas en expansión. Los genes de Ig en las células del mieloma siempre muestran evidencias de hipermutación somática. La proteinuria de Bence Jones puede dañar los túbulos renales y provocar insuficiencia renal. El mieloma múltiple se complica en ocasiones por amiloide AL, que también produce insuficiencia renal. Los pacientes con mieloma tienen con frecuencia infecciones por bacterias encapsuladas por la menor producción de IgG, necesaria para la opsonización. Los blastos indican un proceso leucémico. Los nódulos de linfocitos pequeños son indicativos de leucemia/linfoma linfocítico de células pequeñas, que no suele producir lesiones líticas. Las células de Reed-Sternberg sugieren un linfoma de Hodgkin. La médula puede verse afectada por un proceso granulomatoso (que no se debe al neumococo), pero, por lo general, no produce esas lesiones líticas tan bien delimitadas.

27 **D** El síndrome de hiperviscosidad comprende alteraciones visuales, mareos, cefalea y fenómeno de Raynaud. La médula ósea del paciente está infiltrada por linfocitos plasmocitoides

que han acumulado inmunoglobulinas en el citoplasma (cuerpos de Russell). Todos esos hallazgos son compatibles con un linfoma linfoplasmocítico (macroglobulinemia de Waldenström). En este trastorno, los linfocitos B neoplásicos se diferencian a células productoras de IgM; hay un pico de IgM monoclonal en el suero. Estas moléculas de IgM se agregan y producen hiperviscosidad, y algunas de ellas se aglutinan con temperaturas bajas y causan enfermedad por crioaglutininas. El mieloma, que típicamente se acompaña de una gammapatía monoclonal, no suele causar un aumento del tamaño del hígado ni del bazo y, morfológicamente, sus células se parecen a las plasmáticas. Las cadenas ligeras en la orina (proteínas de Bence Jones) también son una característica del mieloma. Aparece hipercalcemia en el mieloma porque sus células producen MIP1-α, que regula al alza la producción de RANKL y estimula una mayor actividad osteoclástica, de modo que las lesiones líticas en sacabocados son características del mieloma múltiple. La translocación t(14;18) es distintiva del linfoma folicular. Típicamente no hay fase leucémica en la macroglobulinemia de Waldenström.

28 **A** Las características lesiones óseas en sacabocados del mieloma múltiple que se observan en las radiografías son consecuencia de la destrucción ósea mediada por RANKL, una citocina producida por las células del mieloma que activa los osteoclastos. Varias citocinas, en especial la IL-6, son factores de crecimiento importantes para las células plasmáticas. Son generadas por las células tumorales y células del estroma medular. Las concentraciones séricas elevadas de IL-6 se correlacionan con enfermedad activa y mal pronóstico. La población monoclonal de células plasmáticas suele producir un «pico» sérico monoclonal observado en la electroforesis de proteínas en suero u orina. No es frecuente que el mieloma se acompañe de leucocitosis. Los pacientes con destrucción y remodelado óseos pueden tener hipercalcemia y una concentración elevada de fosfatasa alcalina sérica. Las células neoplásicas están bien diferenciadas por lo general, con características tales como un halo claro perinuclear, similar a las células plasmáticas normales. La translocación t(9;22) es el

cromosoma Filadelfia presente en la leucemia mieloide crónica (LMC), con un índice bajo de fosfatasa alcalina leucocítica. Las leucemias, incluida la LMC, y los síndromes mieloproliferativos pueden ocupar los espacios medulares y en ocasiones se acompañan de trombocitosis, pero no es probable que produzcan lesiones de tipo masa ni destrucción de hueso.

29 **B** La gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI) se caracteriza por la presencia de un «pico» de proteína M en ausencia de trastornos asociados de los linfocitos B. El diagnóstico de GMSI se establece cuando el pico monoclonal es pequeño (< 3 g) y el paciente no tiene proteinuria de Bence Jones, como muestra el pico pequeño (2,8 g) de γ-globulina, caracterizada como IgG-κ en la inmunoelectroforesis. La GMSI progresa a mieloma múltiple en cerca del 20% de los pacientes a lo largo de 10-15 años. La enfermedad por cadenas pesadas es un trastorno muy infrecuente. En el mieloma múltiple, el pico es mayor de 3 g y habitualmente el paciente tiene lesiones óseas. En la amiloidosis sistémica reactiva, la proteína asociada al amiloide sérico (SAA) derivada de enfermedades inflamatorias crónicas se deposita en forma de amiloide AA en órganos viscerales, pero no hay gammapatía monoclonal. Un plasmocitoma es una lesión de tipo masa que aparecería en una prueba de imagen ósea, pero también pueden ser extraóseos. La macroglobulinemia de Waldenström se acompaña de un pico de IgM, hepatoesplenomegalia y adenopatías; las concentraciones de proteínas serían muy altas, con hiperviscosidad.

30 **D** El inmunofenotipo es característico del linfoma de células del manto. De las lesiones reseñadas, el linfoma linfoblástico y el de Burkitt aparecen en un grupo de edad mucho menor. El linfoma de Burkitt tiene una translocación t(8;14). Las tres lesiones restantes surgen en un grupo de mayor edad. De estas, el linfoma de células pequeñas linfocítico se manifiesta por linfocitosis absoluta y la imagen en sangre periférica de la leucemia linfática crónica. El linfoma folicular tiene una translocación definida y característica, t(14;18), que afecta al gen *BCL2*. Por el contrario, el linfoma de células del manto, observado en hombres ancianos, presenta la translocación t(11;14), que activa el gen de la ciclina D1 *(BCL1);* estos tumores

no responden bien a la quimioterapia, especialmente cuando afectan a la sangre periférica.

31 **F** Los linfomas de la zona marginal afectan a adultos de mediana edad en áreas de estimulación infecciosa o autoinmunitaria. Si la lesión se asocia a tejido linfoide, a veces se denomina *tumor del tejido linfoide asociado a mucosas* (linfoma MALT o MALToma). Los lugares más frecuentes son el tiroides (en la tiroiditis de Hashimoto), glándulas salivales (síndrome de Sjögren) y estómago (infección por *Helicobacter pylori*). Aunque son monoclonales (del mismo modo que las neoplasias), estas lesiones del MALT pueden resolverse con tratamiento antibiótico frente a *H. pylori*. Una lesión del MALT puede transformarse en un linfoma de linfocitos B grandes difuso. Las células corresponden a los linfocitos B marginales presentes en la periferia de los folículos linfoides activados. Las demás enfermedades reseñadas son neoplasias no relacionadas con *H. pylori* que requieren quimioterapia para su control.

32 **B** La figura muestra células mononucleares con núcleos arriñonados y citoplasma azul claro con extensiones parecidas a pelos. Este paciente tiene tricoleucemia, una neoplasia infrecuente de los linfocitos B. Estas células CD19+, CD20+ y CD11c+ infiltran el bazo y la médula ósea. La pancitopenia se debe a una escasa producción de células hematopoyéticas en la médula y el secuestro de las células maduras en el bazo. Hay dos características distintivas de esta enfermedad: presencia de proyecciones a modo de pelos en los leucocitos neoplásicos del frotis de sangre periférica y coexpresión de marcadores de linfocitos B (CD19, CD20) y monocitos (CD11c). Anteriormente, se usaba la tinción para fosfatasa ácida resistente al tartrato (TRAP) con el fin de identificar esas células anómalas, como muestra el panel derecho de la figura. Los bastones de Auer aparecen en los mieloblastos de la leucemia mieloide aguda. Un pico de IgM monoclonal es característico del linfoma linfoplasmocítico (macroglobulinemia de Waldenström). El cromosoma Ph^1 es una característica distintiva de la leucemia mieloide crónica. Las granulaciones tóxicas en los neutrófilos aparecen con más frecuencia en infecciones bacterianas fulminantes.

33 **A** Este paciente tiene un tipo de neoplasia de linfocitos T conocido como *linfoma de células grandes anaplásico,* que aparece con más frecuencia en niños y adultos jóvenes. Suele ser extraganglionar y tiene un reordenamiento característico de genes en el cromosoma 2p23 que condiciona la producción de cinasa del linfoma anaplásico (ALK) con actividad tirosina cinasa. CD10 es un marcador de linfocitos B. Las proliferaciones de linfocitos T en la piel, conocidas como *micosis fungoide/síndrome de Sézary,* son CD4+. El protooncogén *c-KIT* ha sido relacionado con algunos linfomas de linfocitos NK. El receptor de IL-2 se asocia a linfohistiocitosis con activación de macrófagos. El antígeno p24 forma parte del VIH, que se relaciona con más frecuencia con neoplasias de los linfocitos B.

34 **A** La afectación de la piel y la presencia de linfocitos con núcleos cerebriformes intricados en piel y sangre son características de los linfomas T cutáneos. Estas neoplasias malignas de linfocitos T CD4+ y CD3+ pueden producir una infiltración tumoral de la piel (micosis fungoide) o un cuadro leucémico sin lesión cutánea (síndrome de Sézary). Los linfomas T cutáneos son tumores indolentes, y la mediana de supervivencia de los pacientes es de 8-9 años. Los demás fenotipos reseñados son los correspondientes a linfocitos NK CD3−, CD56+; linfocitos B maduros con CD19+, Igs+; monocitos/granulocitos con CD33+, CD13+, y linfocitos B neoplásicos de la leucemia linfocítica crónica con CD19+, CD5+.

35 **F** El paciente vive en un área donde es endémico el VLTH-1, que puede causar leucemia/linfoma y enfermedad desmielinizante. Las células linfoides neoplásicas pueden infiltrar muchos órganos. Las lesiones cutáneas se parecen a la micosis fungoide. La enfermedad por arañazo de gato debida a la infección por *Bartonella henselae* cursa con adenopatías con necrosis estrellada microscópica. El CMV no se asocia al desarrollo de neoplasias, pero puede complicar la evolución de pacientes con neoplasias que desarrollan una inmunodepresión. El VEB se asocia a linfoma de Burkitt africano. *Helicobacter pylori* puede relacionarse con lesiones del MALT. La relación más conocida del VIH es la observada con linfomas no hodgkinianos y con el sarcoma de Kaposi, pero no con leucemias.

36 **A** Las células grandes son células de Reed-Sternberg y elaboran citocinas que promueven una proliferación celular reactiva acompañante que forma la mayor parte de la masa neoplásica. Las células de Reed Sternberg tienen su origen en los linfocitos B y en muchos casos es posible demostrar en ellas la presencia de infección por el virus de Epstein-Barr (VEB). Las demás opciones reseñadas no pertenecen a la patogenia del linfoma de Hodgkin.

37 **E** Las bandas de fibrosis son características del tipo esclerosis nodular del linfoma de Hodgkin, que se observa con más frecuencia en adultos jóvenes, especialmente en mujeres. La afectación de un grupo de ganglios linfáticos condiciona que este tumor se encuentre en el estadio I. Es frecuente que el mediastino esté afectado. La mayoría de los casos de esclerosis nodular se encuentran en el estadio I o II, y el pronóstico de esos pacientes en estadios precoces es bueno. Los hallazgos no encajan con los demás tipos de linfoma de Hodgkin reseñados.

38 **E** Las características son sugestivas de linfoma de Hodgkin (LH) de tipo celularidad mixta, que suele afectar a hombres ancianos. Al igual que sucede en los demás tipos de LH, excepto el de predominio de linfocitos, las células de Reed-Sternberg y sus variantes se tiñen con CD15. Estas células también expresan CD30, un marcador de activación de los linfocitos T y B, y de monocitos. Los síntomas clínicos son frecuentes en el tipo de celularidad mixta del LH, y esta forma histológica tiende a manifestarse en estadios avanzados. Las células de Reed-Sternberg suponen un porcentaje relativamente pequeño de la masa tumoral: la mayor parte de la población celular corresponde a células reactivas, como linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y eosinófilos. Las células epitelioides aparecen en las reacciones inflamatorias granulomatosas. Los inmunoblastos denotan una proliferación de linfocitos B. Los mastocitos no son abundantes en el LH; participan en las reacciones de hipersensibilidad de tipo I. Los mieloblastos son numerosos en la leucemia mieloide aguda.

39 **A** La variante de depleción de linfocitos del linfoma de Hodgkin contiene abundantes células de Reed-Sternberg y escasos linfocitos. La mayoría de los casos debutan con

enfermedad avanzada (estadio IV en este ejemplo). El virus de Epstein-Barr (VEB) está presente en más del 90% de los casos. Los reordenamientos del gen *BCL6* son típicos de los linfomas de linfocitos B grandes difusos. Las deleciones de 5q son características del síndrome mielodisplásico. La infección por *Helicobacter pylori* puede dar lugar a un linfoma de la zona marginal. Las mutaciones de *JAK2* están presentes en la policitemia vera y otros síndromes mieloproliferativos.

40 **D** Las células lagunares y las células de Reed-Sternberg CD15+ son indicativas de linfoma de Hodgkin, y la banda fibrosa apunta al tipo esclerosis nodular. Las células lagunares tienen núcleos multilobulados que contienen muchos nucléolos pequeños. Estas células presentan un artefacto de retracción del citoplasma alrededor del núcleo, responsable de su imagen característica. El tipo esclerosis nodular del linfoma de Hodgkin es más frecuente en mujeres. Los linfocitos atípicos son característicos en la sangre periférica de personas con mononucleosis infecciosa. La tricoleucemia se acompaña con frecuencia de esplenomegalia, no de masas mediastínicas, y las células leucémicas son linfocitos B. Los histiocitos con gránulos de Birbeck son característicos de la histiocitosis de células de Langerhans. Los linfoblastos que se marcan como linfocitos T se observan en las masas del mediastino anterior (timo) en niños con leucemia/linfoma linfoblástico agudo. Los mieloblastos son típicos de la leucemia mieloide aguda, que en ocasiones se acompaña de masas en tejidos blandos.

41 **B** La célula binucleada con nucléolos prominentes en el centro de la figura es una célula de Reed-Sternberg (RS), característica del linfoma de Hodgkin. Los estudios han establecido sin lugar a dudas que en la mayoría de los casos de linfoma de Hodgkin las células RS derivan de linfocitos B. En un tumor determinado, todas las células RS tienen reordenamientos clonales (idénticos) de genes de inmunoglobulinas, típicos de las neoplasias. Las proliferaciones policlonales son características de los procesos reactivos. Los reordenamientos del gen del receptor de linfocitos T ocurren en linfocitos T normales o neoplásicos (p. ej., linfoma linfoblástico agudo). En la mayoría de los casos de linfoma de Hodgkin, las células RS contienen el genoma del virus de

Epstein-Barr (VEB), pero no el del virus del herpes humano 8 (VHH-8). Este último genoma se encuentra en células del sarcoma de Kaposi. El VLTH-1 infecta linfocitos T CD4+ y da origen a la leucemia/linfoma de linfocitos T del adulto.

42 **A** La leucemia mieloide aguda (LMA) infiltra la médula ósea y reduce la hematopoyesis normal, lo que causa anemia y trombocitopenia marcada. La presentación inicial puede ser aguda. Los bastones de Auer son condensaciones de los gránulos azurófilos. Los cuerpos de Döhle, que consisten en áreas de retículo endoplásmico dilatado, y las granulaciones tóxicas, que son gránulos primarios gruesos y oscuros, son cambios reactivos en neutrófilos maduros indicativos, sobre todo, de inflamación marcada, como sucede en la sepsis bacteriana. Las proyecciones a modo de pelos aparecen en los linfocitos B circulantes de la tricoleucemia. Los cuerpos de Heinz se observan en el déficit de G6PD y son precipitados de globina desnaturalizada. La conversión de eritrocitos en células falciformes es una característica de la anemia drepanocítica, que no está relacionada con la leucemia.

43 **E** El frotis de sangre periférica es característico de la leucemia promielocítica aguda (clase M3 de la leucemia mieloide aguda), con muchos promielocitos que contienen gránulos azurófilos prominentes e inclusiones citoplásmicas cortas, rojas y parecidas a bastones denominadas *bastones de Auer.* La liberación de los gránulos puede activar la cascada de la coagulación y producir coagulación intravascular diseminada (CID). Como en este caso, muchos pacientes desarrollan CID. La translocación t(15;17) es característica de esta enfermedad; produce la fusión del gen del receptor del ácido retinoico en el cromosoma 17 con el gen de la leucemia promielocítica en el cromosoma 15. El gen de fusión se traduce en la elaboración de un receptor anómalo del ácido retinoico que bloquea la diferenciación mieloide. El tratamiento con ácido retinoico (vitamina A) puede mejorar el bloqueo e inducir la remisión en muchos pacientes. La translocación t(8;14) aparece en aquellos con linfoma de Burkitt. La anomalía t(8;21) se observa en la variante M2 de la leucemia mieloide aguda. La translocación t(9;22) da origen al cromosoma Filadelfia de la leucemia mieloide crónica. Un cariotipo t(14;18)

es sugestivo de linfoma folicular.

44 **D** Esta paciente tiene una leucemia aleucémica, en la que la cifra de leucocitos en sangre periférica no es alta, pero los blastos leucémicos ocupan la médula. Estos blastos muestran características de los monoblastos porque son negativos para peroxidasa y positivos para esterasa inespecífica. La paciente tiene una leucemia M5, caracterizada por una incidencia elevada de infiltración tisular y organomegalia. La eritroleucemia es muy infrecuente y se acompaña de precursores eritroides displásicos. La leucemia linfoblástica aguda aparece típicamente en niños y adultos jóvenes. La leucemia megacariocítica aguda es infrecuente, suele acompañarse de mielofibrosis y los blastos reaccionan con anticuerpos específicos de plaquetas. La variante M3 de la leucemia mieloide aguda (leucemia promielocítica) tiene muchos promielocitos llenos de gránulos azurófilos, que los convierten en fuertemente positivos para peroxidasa.

45 **B** La figura muestra mieloblastos con bastones de Auer prominentes. Junto a la cifra tan elevada de leucocitos y la presencia de blastos positivos para peroxidasa (mieloblastos) ocupando la médula ósea, estos hallazgos son característicos de la leucemia mieloide aguda (LMA). Este tipo de leucemia aparece con más frecuencia en personas de 15 a 39 años de edad. La leucemia linfoblástica aguda se produce en niños y adultos jóvenes. Los gránulos azurófilos positivos para peroxidasa distinguen los mieloblastos de los linfoblastos. La leucemia linfática crónica se caracteriza por la presencia de linfocitos pequeños y maduros en la sangre periférica y en la médula ósea de ancianos. La leucemia mieloide crónica también aparece en adultos, pero se trata de un proceso mieloproliferativo con distintos grados de diferenciación mieloide, y la mayoría de las células mieloides son maduras, con pocos blastos. El linfoma de Hodgkin carece de una fase leucémica. Algunos linfomas cutáneos de linfocitos T pueden presentar células circulantes, llamadas *células de Sézary.*

46 **C** La mielodisplasia se caracteriza por una médula ósea celular en la que hay defectos de maduración en múltiples series. Un dato a favor de este diagnóstico es la presencia de sideroblastos en anillo, megaloblastos, megacariocitos anómalos y

mieloblastos en la médula ósea. Como estas células hematopoyéticas anómalas no logran madurar normalmente, no se liberan a la sangre periférica, con las consiguientes pancitopenia y susceptibilidad a las infecciones. Las mielodisplasias son trastornos clonales de las células madre que aparecen *de novo* o bien tras una quimioterapia con compuestos alquilantes, como en este caso. La presencia de deleciones cromosómicas, como la de 5q, es un marcador de mielodisplasia postratamiento. Estas anomalías morfológicas de la médula ósea no se observan en ninguna de las demás enfermedades reseñadas.

47 **B** Este es el cromosoma Filadelfia, o Ph^1, característico de los pacientes con leucemia mieloide crónica (LMC). Esta anomalía cariotípica puede descubrirse con técnicas citogenéticas, como hibridación *in situ* fluorescente (FISH). En los pocos casos en que parece ser negativo mediante FISH y determinación del cariotipo, el análisis molecular muestra reordenamientos del *BCR-ABL,* y la tirosina cinasa activada a través de este gen de fusión es la diana del tratamiento actual de la LMC. Este reordenamiento se considera un criterio diagnóstico de LMC. Esta es una enfermedad de las células madre pluripotenciales que afecta a todas las series, pero los precursores de granulocitos se expanden preferencialmente en la fase crónica. Las leucemias promielocíticas agudas suelen tener la anomalía t(15;17). Los linfomas foliculares se asocian a una anomalía cariotípica t(14;18) que afecta al gen *BCL2.* La enfermedad de Hodgkin y los mielomas no tienen, por lo general, anomalías del cariotipo.

48 **C** La trombocitosis esencial es un síndrome mieloproliferativo. Al igual que sucede en todos estos síndromes mieloproliferativos, la transformación se produce en una célula madre mieloide. En esta forma de síndrome mieloproliferativo, el tipo celular afectado dominante es el megacariocito, y hay trombocitosis. Otros síndromes dentro de este grupo, como la leucemia mieloide crónica, la mielofibrosis y la policitemia vera, también pueden acompañarse de un aumento del recuento de plaquetas. El diagnóstico de trombocitosis esencial solo puede establecerse una vez

descartadas otras causas de trombocitosis reactiva y si el examen de la médula ósea muestra un aumento de megacariocitos sin indicios de leucemia. El dolor urente y pulsante de las extremidades está causado por agregados de plaquetas que ocluyen arteriolas pequeñas. La manifestación principal de esta enfermedad son las crisis trombóticas o hemorrágicas. La tumefacción en la pierna de esta paciente es una flebotrombosis, seguida de embolia pulmonar con infarto. El recuento de leucocitos periféricos estaría elevado en la leucemia mieloide aguda, sin trombocitosis.

49 **C** Los síntomas de la policitemia vera (PCV) se deben a un aumento de la masa de eritrocitos con un hematocrito y un volumen sanguíneo mayores. Una eritropoyetina indetectable junto a policitemia es característica de la PCV, un síndrome mieloproliferativo en el que las células mieloides neoplásicas se diferencian preferencialmente a la serie roja. Otras series también resultan afectadas, con leucocitosis y trombocitosis en este caso. Estos pacientes carecen del cromosoma Ph^1. Sin tratamiento, estas personas fallecerán por episodios de hemorragia o trombosis –ambos relacionados con alteración de la función plaquetaria y los efectos hemodinámicos sobre los vasos sanguíneos distendidos–. Las sangrías terapéuticas reducen el hematocrito. Con este tratamiento, la enfermedad suele transformarse en el 15-20% de los casos en mielofibrosis con metaplasia mieloide. La evolución a leucemia aguda es infrecuente, a diferencia de lo que sucede en la leucemia mieloide crónica. De producirse, será una leucemia mieloide aguda, no linfoblástica.

50 **B** Esta anamnesis clásica de la leucemia mieloide crónica (LMC) se confirma por la presencia de distintos estadios de diferenciación mieloide en la sangre y el cromosoma Filadelfia. El paciente logró la remisión, pero después presentó una crisis blástica de linfocitos B (CD19+). El hecho de que los linfocitos B contengan el cromosoma Ph^1 original y otras anomalías más indica que los linfocitos B y las células mieloides pertenecen al mismo clon original. La mejor explicación de este fenómeno es que el proceso transformador inicial afectó a una célula madre pluripotencial, que se diferenció a la serie mieloide y produjo un

cuadro de LMC. El análisis, incluso en esta fase, indica que el homólogo molecular del cromosoma Ph[1] –el reordenamiento de *BCR-ABL*– afecta a todas las series, incluidos los linfocitos B y T, y las células mieloides. Con la evolución de la enfermedad se acumulan más mutaciones en las células madre, que se diferencian principalmente a la serie B, lo que da lugar a leucemia linfoblástica B; las crisis blásticas también pueden afectar a las células mieloides, pero estas no son CD19+. El síndrome mielodisplásico, que no está presente en este caso, puede preceder al desarrollo de una leucemia mieloide aguda. La tricoleucemia es una enfermedad indolente sin blastos. El síndrome de Sézary tiene un componente leucémico de linfocitos CD4+, además de la afectación cutánea (micosis fungoide).

51 **E** Este paciente tiene policitemia vera (PCV), un síndrome mieloproliferativo caracterizado por aumento de la masa eritrocítica, con valores del hematocrito típicamente por encima del 60%. Aunque la mayor masa eritrocítica es la responsable de la mayoría de los síntomas y signos, estos pacientes también tienen trombocitosis y granulocitosis. Esto es así porque, de forma similar a como ocurre en otros síndromes mieloproliferativos, la PCV se debe a la transformación de una célula madre multipotencial. El elevado hematocrito causa un incremento del volumen sanguíneo y distensión de los vasos. Las células progenitoras eritroides neoplásicas requieren cantidades sumamente pequeñas de eritropoyetina para su supervivencia y proliferación; las concentraciones de eritropoyetina son prácticamente indetectables en la PCV. Si se acompaña de alteraciones de la función plaquetaria, esta enfermedad predispone al paciente a sufrir hemorragias. Las alteraciones de la función plaquetaria también pueden predisponer a presentar trombosis. El prurito y la úlcera péptica probablemente se deban a la liberación de histamina por parte de los basófilos. En algunos pacientes, la enfermedad se convierte en mielofibrosis. En pocos pacientes se transforma leucemia mieloide aguda y en otros (a menudo con el gen de fusión *BCR-ABL*) se desarrolla una leucemia mieloide crónica. Los síndromes mielodisplásicos y los demás síndromes

mieloproliferativos, como la trombocitosis esencial (con mutaciones de *JAK2*) no se acompañan de esos incrementos tan notables de la masa eritrocítica. Típicamente, la eritroleucemia no cursa con hematocritos elevados porque los progenitores eritroides leucémicos no se diferencian a eritrocitos maduros.

52 **A** La mielofibrosis con metaplasia mieloide es un síndrome mieloproliferativo que también constituye un trastorno de células madre en el que los megacariocitos neoplásicos secretan factores fibrogénicos que inducen fibrosis de la médula ósea. Después, el clon neoplásico se traslada al bazo, donde aparece una proliferación hematopoyética de las tres series (hematopoyesis extramedular) con predominio de megacariocitos. La fibrosis medular y la hematopoyesis extramedular del bazo no logran regular ordenadamente la liberación de leucocitos a la sangre. La sangre periférica contiene precursores inmaduros de eritrocitos y leucocitos (imagen leucoeritroblástica). La proliferación y el recambio de las células hematopoyéticas aumentan el metabolismo de las purinas y la producción de ácido úrico. Los eritrocitos en lágrima, o dacriocitos, son eritrocitos deformes que aparecen cuando la médula ósea se fibrosa. La lesión de la médula ósea también puede deberse a otras causas (p. ej., tumores metastásicos, irradiación). Estas causas pueden dar lugar a una imagen leucoeritroblástica, pero por lo general no aparece esplenomegalia con proliferación de las tres series. Las demás causas mencionadas –linfoma de Hodgkin, hipertensión portal e infección por *Histoplasma capsulatum*– pueden producir aumento del tamaño del bazo pero no fibrosis de la médula ósea. Las metástasis son infrecuentes en el bazo.

53 **D** Aquí se muestran gránulos de Birbeck tubulares parecidos a bastones, con la periodicidad característica observada en las proliferaciones de células de Langerhans. En este caso, las erupciones cutáneas, la organomegalia y la lesión de la mastoides apuntan a infiltrados en múltiples órganos. El diagnóstico es histiocitosis de células de Langerhans multifocal, una enfermedad observada con más frecuencia en niños. En la mitad de estos casos se produce exoftalmos, y la afectación del hipotálamo y del tallo hipofisario provoca diabetes insípida;

estos hallazgos se denominan *enfermedad de Hand-Schüller-Christian*. En los niños, la leucemia linfoblástica aguda puede afectar a la médula ósea, pero no produce lesiones cutáneas ni óseas. La tuberculosis es causa de enfermedad granulomatosa con destrucción ósea, pero los macrófagos presentes en los granulomas son macrófagos epitelioides que no tienen gránulos de Birbeck. El linfoma de Hodgkin aparece en adultos jóvenes y no causa lesiones cutáneas ni óseas. El mieloma es una enfermedad de adultos que puede provocar lesiones óseas líticas, pero no lesiones en la piel.

54 **A** La enfermedad de Letterer-Siwe es una forma de histiocitosis de células de Langerhans, con gránulos de Birbeck como característica distintiva identificados por microscopia electrónica, que están presentes en el citoplasma de las células de Langerhans. Los linfoblastos que se marcan como linfocitos T (CD3+) aparecen en las masas del mediastino anterior (timo) en niños con leucemia/linfoma linfoblástico agudo. Las células plasmáticas se observan en el mieloma múltiple, enfermedad de ancianos que se acompaña de una gammapatía monoclonal. Las células de Reed-Sternberg son características del linfoma de Hodgkin, un diagnóstico improbable en niños. Los sideroblastos en anillo aparecen en los síndromes mielodisplásicos. Es posible observar células de Sézary en linfomas/leucemias de linfocitos T periféricos, que a menudo afectan a la piel.

55 **G** Este paciente presenta una rotura con formación de un hematoma en su bazo, que es de tamaño normal. Obsérvese el anillo de sangre más oscuro adyacente al bazo, de tamaño normal, y medial a las costillas, muy blancas, a la izquierda en la imagen de la TC. El consumo agudo de alcohol hace que los traumatismos secundarios a caídas, peleas y accidentes de tráfico sean más probables. Es posible una rotura «espontánea» del bazo en ausencia de traumatismos cuando el bazo está agrandado por infecciones y neoplasias. Otras causas de esplenomegalia son depósito de amiloide, esplenomegalia congestiva por hipertensión portal en la cirrosis, enfermedades de depósito como la enfermedad de Gaucher y síndromes mieloproliferativos. Las embolias por endocarditis son más frecuentes en la endocarditis infecciosa y la trombótica no

bacteriana.

56 **C** Las citopenias junto con esplenomegalia apuntan a hiperesplenismo como causa de la anemia, la leucopenia y la trombocitopenia del paciente. Las células sanguíneas circulantes quedan secuestradas en un bazo aumentado de tamaño. Una de las causas más frecuentes es esplenomegalia congestiva por hipertensión portal secundaria a cirrosis hepática. El aumento de la cifra de AST, superior a la de ALT, es indicativo de hepatopatía alcohólica. El recuento de leucocitos debería ser bastante alto en las leucemias agudas. Aunque la mononucleosis infecciosa puede causar esplenomegalia y presentar linfocitosis, típicamente no evoluciona en 9 meses, y es más frecuente en personas de menor edad. La enfermedad de Niemann-Pick es una enfermedad de depósito debida a un error innato del metabolismo que afecta a la esfingomielinasa y aparece habitualmente en la infancia causando problemas neurológicos muy graves. El bazo es una localización infrecuente de metástasis. Es posible que el lupus eritematoso sistémico produzca citopenias por reducción de la función de la médula ósea, pero el bazo no suele estar agrandado.

57 **D** Las áreas firmes y pálidas de color pardo amarillento mostradas en la figura son infartos. Estas lesiones tienen forma de cuña con base en la cápsula o bien presentan una forma más irregular dentro del parénquima. Los émbolos de la circulación sistémica se originan con más frecuencia en el corazón, y los signos de infección aguda en este caso apuntan a émbolos procedentes de vegetaciones de las válvulas cardíacas en un paciente con endocarditis infecciosa; dichos émbolos pueden provocar infartos esplénicos. Los émbolos que salen de la aorta por el tronco celíaco suelen acceder directamente al bazo. Los riñones y el encéfalo son otros lugares frecuentes donde se alojan los émbolos sistémicos. Aunque la leucemia mieloide aguda puede causar esplenomegalia, típicamente no hay lesiones focales sino solo una infiltración uniforme del parénquima, pero el aumento del tamaño masivo del bazo en la leucemia mieloide crónica predispone al desarrollo de infartos esplénicos. En caso de enfermedades granulomatosas del bazo, como la histoplasmosis, habría granulomas diseminados

redondeados y de color marrón. En el linfoma de Hodgkin puede haber nódulos focales. Es posible que el aumento del tamaño del bazo se deba a metástasis, pero estas no son frecuentes en el bazo y es improbable que se acompañen de signos de infección. Del mismo modo, la esplenomegalia congestiva que se produce en la cirrosis con hipertensión portal no causa lesiones esplénicas focales. En la fiebre reumática aguda las vegetaciones verrugosas no suelen embolizarse; en la valvulitis reumática crónica hay cicatrices con deformidad valvular y esto aumenta el riesgo de endocarditis infecciosa.

58 **E** La esplenectomía en la infancia reduce la inmunidad humoral frente a bacterias encapsuladas, porque los linfocitos B esplénicos productores de IgM y los macrófagos del bazo ayudan a eliminar estos microorganismos infecciosos. El bazo también es un centro de reciclaje de eritrocitos y retira inclusiones tales como cuerpos de Howell-Jolly (algo similar a deshuesar cerezas sin dañar la fruta). Cerca de un tercio de todas las plaquetas circulantes se encuentran retenidas en el bazo, y los granulocitos están marginados en sinusoides esplénicos, de modo que, cuando falta el bazo, las cifras de leucocitos y plaquetas están ligeramente aumentadas. El síndrome de DiGeorge provoca inmunodeficiencia mediada por células y un número mayor de infecciones víricas, fúngicas y parasitarias. La galactosemia se debe a un error innato del metabolismo y cursa con hepatopatía y fibrosis que puede asociarse a esplenomegalia. La enfermedad de Gaucher provoca esplenomegalia sin inmunodeficiencia significativa. Los síndromes mieloproliferativos aumentan el tamaño del bazo. El timo, pero no el bazo, resulta afectado en ocasiones en pacientes con síndrome de Down (trisomía 21) que tienen inmunodeficiencia.

59 **B** Estas células se marcan como linfocitos corticales en el timo de un niño. La ausencia de esas células aparece en el síndrome de DiGeorge con 22q11.2. Esos pacientes también pueden tener hipoplasia paratiroidea y cardiopatía congénita. Es posible que los pacientes con síndrome de Down (trisomía 21) presenten anomalías del timo y desregulación de linfocitos T, que predispone a desarrollar leucemia aguda, pero el timo

habitualmente está presente. La t(9;22) da origen al cromosoma Filadelfia, característico de la leucemia mieloide crónica. La t(15;17) aparece en pacientes con leucemia promielocítica aguda. Los individuos con síndrome del cromosoma X frágil suelen tener cierto grado de retraso mental. Los hombres con síndrome de Klinefelter (XXY) no tienen anomalías inmunitarias.

60 **D** Los timomas son neoplasias muy poco frecuentes que pueden ser benignas o malignas. Entre un tercio y la mitad de los casos de timoma se asocian a miastenia grave como presentación inicial (igual que en este caso). Los timomas benignos tienen una población mixta de linfocitos y células epiteliales y están bien delimitados, mientras que los malignos son invasivos y contienen células atípicas. Los carcinomas del timo recuerdan a los carcinomas epidermoides. Los granulomas pueden tener macrófagos epitelioides y linfocitos, pero el timo sería una localización inusual. El linfoma de Hodgkin afecta a ganglios linfáticos en la zona media o posterior del mediastino, con un componente de células de Reed-Sternberg. El linfoma linfoblástico T aparece en la región mediastínica, incluido el timo, en niños, pero carece de componente epitelial. Las metástasis son bastante infrecuentes en el timo. Un absceso en organización podría tener tejido de granulación en los extremos, con una mezcla de células inflamatorias, pero no contendría células atípicas.

CAPÍTULO

14

Hematopatología de los eritrocitos y trastornos hemorrágicos

PEF9 Capítulo 14: Trastornos de los eritrocitos y trastornos hemorrágicos

PH9 Capítulo 11: Sistemas hematopoyético y linfático

---

1 Una mujer de 77 años se da cuenta de que le han aparecido áreas pequeñas, de puntitos a manchitas, en las encías y la piel de brazos y piernas desde hace 3 semanas. En la exploración física, está afebril y no tiene organomegalias. Las pruebas de laboratorio muestran que el tiempo de protrombina y tromboplastina parcial son normales. El hemograma revela cifras de hemoglobina de 12,7 g/dl; de hematocrito del 37,2%; de VCM de 80 μm^3; de plaquetas de 276.000/mm^3, y de leucocitos de 5.600/mm^3. Los estudios de función plaquetaria y la concentración de fibrinógeno son normales y no se detectan productos de degradación de la fibrina. ¿Cuál de las siguientes enfermedades explica mejor estos hallazgos?

A Insuficiencia renal crónica
B Cirrosis macronodular
C Meningococemia
D Carcinoma metastásico
E Déficit de vitamina C

2 Una joven sana de 19 años sufrió un traumatismo abdominal cerrado en un accidente de tráfico. En el momento del ingreso en el hospital, el nivel de hematocrito inicial era del 33%, pero descendió al 28% en la hora siguiente. Una paracentesis puso de

manifiesto líquido serosanguíneo. La llevaron al quirófano, donde se reparó una laceración hepática y se extrajo 1 l de líquido sanguinolento de la cavidad peritoneal. Permaneció estable. ¿Cuál de los siguientes hallazgos morfológicos de la sangre periférica es más probable que muestre un hemograma obtenido 3 días después?

A Punteado basófilo en los eritrocitos
B Eritrocitos hipocrómicos
C Leucoeritroblastosis
D Reticulocitosis
E Esquistocitosis

3 Un hombre de 65 años refiere cansancio progresivo desde hace 5 meses. En la exploración física no hay fiebre, y la frecuencia cardíaca es de 91 latidos/min, la frecuencia respiratoria, de 18 respiraciones/min, y la presión arterial, de 105/60 mmHg. No hay organomegalias. Una muestra de heces resulta positiva para sangre oculta. Entre los hallazgos de laboratorio destacan cifras de hemoglobina de 5,9 g/dl; de hematocrito del 18,3%; de VCM de 99 μm^3; de plaquetas de 250.000/mm^3, y de leucocitos de 7.800/mm^3. La concentración de reticulocitos es del 3,9%. No se detectan productos de degradación de la fibrina, y las pruebas de Coombs, directa e indirecta, son negativas. Una biopsia de médula ósea pone de manifiesto hiperplasia eritroide marcada. ¿Cuál de los siguientes trastornos explica mejor estos hallazgos?

A Anemia aplásica
B Anemia hemolítica autoinmunitaria
C Pérdida de sangre crónica
D Anemia ferropénica
E Carcinoma metastásico

4 En los últimos 6 meses una mujer de 25 años ha notado una erupción cutánea en la región malar que empeora con la exposición al sol. También ha tenido artralgias y mialgias. En la exploración física, no hay fiebre, y la frecuencia cardíaca es de 100 latidos/min, la frecuencia respiratoria, de 20 respiraciones/min, y la presión arterial, de 100/60 mmHg. La piel sobre el puente de la nariz está eritematosa. No se aprecian organomegalias. Los hallazgos de laboratorio consisten en resultados positivos en las pruebas de ANA y ADN bicatenario; hemoglobina, 8,1 g/dl;

hematocrito, 24,4%; plaquetas, 87.000/mm^3, y leucocitos, 3.950/mm^3. El frotis de sangre periférica revela eritrocitos nucleados. Una tira reactiva de orina resulta positiva para sangre, pero en el examen microscópico de orina no se observan leucocitos, eritrocitos ni cilindros. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que esté presente?

A Haptoglobina reducida
B Disminución del hierro
C Reticulocitosis reducida
D Aumento de dímero D
E Elevación de hemoglobina F
F Aumento de protoporfirina

5 Una mujer de 28 años presenta una sensación continua de letargo desde la infancia. En la exploración física no tiene fiebre; la frecuencia cardíaca es de 80 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 15 respiraciones/min, y la presión arterial, de 110/70 mmHg. Se palpa la punta del bazo, pero no hay dolor abdominal espontáneo ni a la palpación. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 11,7 g/dl; de plaquetas de 159.000/mm^3, y de leucocitos de 5.390/mm^3. El frotis de sangre periférica revela pequeños eritrocitos redondeados que carecen de una zona pálida central. ¿Cuál de los siguientes componentes de los eritrocitos es más probable que presente una anomalía hereditaria que pueda explicar estos hallazgos?

A Cadena de α-globina
B Cadena de β-globina
C Anhidrasa carbónica
D Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
E Hemo con anillo de porfirina
F Espectrina (proteína del citoesqueleto)



6 Un niño de 13 años presenta súbitamente dolor abdominal intenso con retortijones acompañado de dolor torácico, tos seca y fiebre. En la exploración física, la temperatura es de 39 °C; la frecuencia cardíaca, de 110 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 22 respiraciones/min, y presión arterial, de 80/50 mmHg. Tiene dolor abdominal difuso, sin masas ni organomegalias. Las pruebas de laboratorio muestran un nivel de hematocrito del 18%. La figura ilustra el frotis de sangre periférica. La radiografía de tórax revela infiltrados pulmonares bilaterales. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que desencadenara los problemas pulmonares?

A Hipoxia crónica del parénquima pulmonar
B Defectos en la vía alternativa de activación del complemento
C Adhesión diseminada de eritrocitos al endotelio
D Formación de autoanticuerpos contra la membrana basal alveolar
E Hemólisis intravascular inducida por anticuerpos

7 Una mujer de 18 años de Copenhague, Dinamarca, lleva 1 semana con malestar general y fiebre de escasa cuantía, junto con artralgias. En la exploración física está muy pálida, excepto por un exantema malar de color rojo brillante. Tiene antecedentes de anemia crónica y se observan esferocitos en el frotis de sangre periférica. El nivel de hematocrito, que normalmente oscila entre el 35 y el 38%, ahora es del 28%, y el recuento de reticulocitos

resulta muy bajo. La concentración de bilirrubina sérica es de 0,9 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que haya tenido lugar en esta paciente?

A Hemólisis extravascular acelerada en el bazo
B Desarrollo de anticuerpos frente a eritrocitos
C Coagulación intravascular diseminada
D Disminución de la eritropoyesis debida a infección por parvovirus
E Ferropenia dietética añadida

8 Un estudio clínico de pacientes que heredan mutaciones que reducen la cantidad de anquirina, lugar de unión principal para la espectrina en el citoesqueleto de la membrana eritrocítica, revela una mayor prevalencia de anemia crónica con esplenomegalia. En muchos pacientes se observa que la esplenectomía reduce la gravedad de la anemia. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que guarde relación con este efecto beneficioso de la esplenectomía?

A Reducción de la opsonización de eritrocitos y lisis en el bazo
B Disminución de la producción de especies reactivas del oxígeno por parte de los macrófagos esplénicos
C Menores secuestro y lisis de eritrocitos en el bazo
D Aumento de la capacidad de deformación de los eritrocitos en los sinusoides esplénicos
E Incremento del depósito esplénico de hierro

9 Un niño siciliano de 3 años tiene poco apetito y su peso es inferior al correspondiente para su edad y talla. La exploración física muestra hepatoesplenomegalia. La concentración de hemoglobina es de 6 g/dl, y el frotis de sangre periférica revela eritrocitos intensamente hipocrómicos y microcíticos. La concentración sérica total de hierro es normal, y el recuento de reticulocitos es del 10%. Una radiografía de cráneo pone de manifiesto deformidades maxilofaciales y aumento de tamaño de los espacios de médula ósea. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que se relacione con la enfermedad de este niño?

A Desequilibrio en la producción de cadenas de α-globina y β-globina
B Mayor fragilidad de las membranas eritrocíticas
C Síntesis reducida de hemoglobina F

D Déficit relativo de vitamina B_{12}

E Secuestro de hierro en las células reticuloendoteliales

10 Un niño de 10 años ha presentado múltiples episodios de neumonía y meningitis con sepsis desde la etapa de lactante. Entre los microorganismos causales están *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae.* En la exploración física, el niño no tiene organomegalias ni deformidades. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 9,2 g/dl; de hematocrito del 27,8%; de plaquetas de 372.000/mm^3, y de leucocitos de 10.300/mm^3. Una electroforesis de hemoglobinas pone de manifiesto un 1% de hemoglobina A_2, un 7% de hemoglobina F y un 92% de hemoglobina S. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que se relacione con las infecciones de repetición en este niño?

A Ausencia de expresión de moléculas de adhesión por parte de las células endoteliales

B Menor síntesis hepática de proteínas del complemento

C Alteración de la producción de neutrófilos

D Pérdida de la función normal del bazo

E Reducción de la síntesis de inmunoglobulinas

11 Una mujer de 32 años de Hanói, Vietnam, da a luz a las 34 semanas de gestación un mortinato feto varón muy hidrópico. Entre los hallazgos en la autopsia destacan hepatoesplenomegalia y cardiomegalia, derrames serosos en todas las cavidades corporales e hidropesía generalizada. No se observan malformaciones congénitas. Hay una hematopoyesis extramedular notable en los órganos viscerales. ¿Cuál de las siguientes hemoglobinas es más probable que predomine en la electroforesis de hemoglobinas de los eritrocitos fetales?

A Hemoglobina A_1

B Hemoglobina A_2

C Hemoglobina de Bart

D Hemoglobina E

E Hemoglobina F

F Hemoglobina H



12 Una joven de 17 años tiene antecedentes de cansancio y debilidad durante toda su vida. No ha experimentado los cambios propios de la pubertad. En la exploración física las características sexuales secundarias no están bien desarrolladas. Tiene hepatoesplenomegalia. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 9,1 g/dl; de hematocrito del 26,7%; de VCM de 66 μm^3; de plaquetas de 89.000/mm^3, y de leucocitos de 3.670/mm^3. La figura presenta una imagen del frotis de sangre periférica. Otros hallazgos de laboratorio son concentración de glucosa sérica de 144 mg/dl; de TSH de 6,2 mU/ml, y de ferritina de 679 ng/ml. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que haya sufrido una mutación en esta paciente?

A Gen de la anquirina
B Gen de la β-globina
C Gen de la G6PD
D Gen *HFE*
E Gen de la NADPH oxidasa

13 Un niño de 12 años tiene antecedentes de episodios de dolor intenso abdominal, torácico y de espalda desde el inicio de la infancia. En la exploración física está afebril y no se aprecian organomegalias. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 11,2 g/dl; de plaquetas de 194.000/mm^3, y de leucocitos de 9.020/mm^3. El frotis de sangre periférica muestra algunos drepanocitos, eritrocitos nucleados y cuerpos de Howell-

Jolly. La electroforesis de hemoglobinas revela un 1% de hemoglobina A_2, un 6% de hemoglobina F y un 93% de hemoglobina S. El tratamiento con hidroxiurea resulta útil en este paciente. ¿Un incremento en cuál de los siguientes procesos es más probable que sea la base de esta eficacia terapéutica?

A Producción de eritrocitos
B Síntesis global de cadenas de globina
C Afinidad del oxígeno por la hemoglobina
D Producción de hemoglobina A
E Producción de hemoglobina F

14 Una mujer de 25 años tiene antecedentes de artralgias de 3 años de evolución. La exploración física no revela deformidades articulares, pero la paciente está pálida. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de eritrocitos de 4,7 millones/mm^3; de hemoglobina de 12,5 g/dl; de hematocrito del 37,1%; de plaquetas de 217.000/mm^3, y de leucocitos de 5.890/mm^3. En el frotis de sangre periférica se observan eritrocitos hipocrómicos y microcíticos. Las concentraciones séricas de hierro total y ferritina son normales. La electroforesis de hemoglobinas muestra un 93% de hemoglobina A_1 con una cifra elevada de hemoglobina A_2 (5,8%) y un 1,2% hemoglobina F. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Anemia de las enfermedades crónicas
B Anemia hemolítica autoinmunitaria
C β-talasemia menor
D Infección por *Plasmodium vivax*
E Anemia ferropénica

15 Un hombre afroamericano de 23 años elimina orina de color marrón rojizo 3 días después de tomar un medicamento antiinflamatorio que contiene fenacetina. Esto le sorprende, porque siempre ha estado sano y no ha tenido enfermedades importantes. En la exploración física está afebril y no hay hallazgos de interés. El hemograma muestra anemia normocítica leve, pero el frotis de sangre periférica revela precipitados de globina desnaturalizada (cuerpos de Heinz) con tinción supravital y algunos «eritrocitos mordidos» en esta población celular. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A α-talasemia menor

B β-talasemia menor
C Déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
D Rasgo drepanocítico
E Anquirina anómala en la membrana del citoesqueleto eritrocítico
F Anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos calientes

16 Desde la infancia, un hombre de 30 años se cansa fácilmente ante esfuerzos mínimos. Las pruebas de laboratorio muestran anemia microcítica hipocrómica. La electroforesis de hemoglobinas revela disminución de la HbA_1 con aumento de HbA_2 y HbF. La concentración de ferritina sérica está muy elevada. ¿Cuál de las siguientes mutaciones es más probable que esté presente en el gen de la β-globina de este hombre?

A Nuevo codón de terminación
B Inserción de una sola base con desplazamiento del marco de lectura
C Lugar de procesamiento
D Deleción de tres bases
E Repetición de trinucleótido

17 Un adolescente de 16 años observa que su orina es oscura. Tiene antecedentes de múltiples infecciones bacterianas y trombosis venosas desde hace 10 años, incluida una trombosis de la vena porta el año anterior. En la exploración física, la pierna derecha está tumefacta y dolorosa. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 9,8 g/dl; de hematocrito del 29,9%; de VCM de 92 μm^3; de plaquetas de $150.000/mm^3$, y de leucocitos de $3.800/mm^3$ con un 24% de neutrófilos, un 1% de cayados, un 64% de linfocitos, un 10% de monocitos y un 1% de eosinófilos. Tiene reticulocitosis, y la concentración sérica de haptoglobina es muy baja. ¿Cuál de los siguientes productos génicos es más probable que esté mutado y produzca este cuadro clínico?

A Cadena de β-globina
B Factor V
C Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
D Fosfatidilinositol glucano A (PIGA)
E Protrombina G20210A
F Espectrina

18 Un hombre de 30 años previamente sano, procedente de Lagos

(Nigeria), elimina orina de color marrón oscuro 2 días después de comenzar a tomar primaquina como tratamiento profiláctico del paludismo. En la exploración física está pálido y afebril. No hay organomegalias. Las pruebas de laboratorio muestran que la concentración sérica de haptoglobina está reducida. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que explique estos hallazgos?

A Hemólisis mediada por anticuerpos
B Alteración de la síntesis de ADN
C Alteración de la síntesis de cadenas de globina
D Mayor susceptibilidad a la lisis inducida por el complemento
E Fragmentación mecánica de los eritrocitos debida a estrechamiento vascular
F Daño oxidativo de la hemoglobina
G Menor capacidad de deformación de la membrana eritrocítica

19 Una mujer de 34 años refiere cansancio progresivo en los últimos 5 meses. En la exploración física no hay fiebre y tiene esplenomegalia leve. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de hemoglobina de 10,7 g/dl y un nivel de hematocrito del 32,3%. El frotis de sangre periférica revela esferocitos y algunos eritrocitos nucleados. Las pruebas de Coombs, directa e indirecta, son positivas a 37 °C, pero no a 4 °C. ¿Cuál de las siguientes enfermedades subyacentes es más probable que se diagnostique en esta paciente?

A Septicemia por *Escherichia coli*
B Esferocitosis hereditaria
C Mononucleosis infecciosa
D Infección por *Mycoplasma pneumoniae*
E Lupus eritematoso sistémico

20 Una mujer de 22 años refiere malestar general y dolor de garganta de 2 semanas de evolución. Al exponerse al frío, los dedos se le quedan blancos. En la exploración física tiene 37,8 °C de temperatura y la faringe eritematosa. Entre los hallazgos de laboratorio destacan un resultado positivo en la prueba de Paul-Bunnell (anticuerpos heterófilos). Las pruebas de Coombs, directa e indirecta, son positivas a 4 °C pero no a 37 °C. ¿Cuál de las siguientes moléculas unida a la superficie de los eritrocitos es más probable que explique estos hallazgos?

A α_2-macroglobulina

B C3b del complemento
C Fibronectina
D Histamina
E IgE

21 Un hombre de 65 años diagnosticado de linfoma no hodgkiniano folicular recibe quimioterapia. Desarrolla fiebre y tos de 1 semana de duración. En la exploración hay estertores pulmonares bilaterales. La radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales difusos. Una muestra de esputo es positiva para citomegalovirus. Desarrolla ictericia de las escleróticas y fenómeno de Raynaud. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de hemoglobina de 10,3 g/dl; de hematocrito del 41,3%; de VCM de 101 μm^3; de leucocitos de 7.600/mm^3, y de plaquetas de 205.000/mm^3. La concentración de bilirrubina total sérica es de 6 mg/dl, con 0,8 mg/dl de bilirrubina directa y 1.020 U/l de LDH. La prueba de Coombs es positiva. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que ocasione la anemia?

A Aplasia medular causada por la quimioterapia
B Déficit de vitamina K debido a hepatitis por citomegalovirus
C Anemia megaloblástica secundaria a déficit de folato
D Hemólisis extravascular por crioaglutininas
E Ferropenia debida a metástasis en el colon

22 Una mujer de 29 años ha presentado cansancio y mareos durante los últimos 5 meses. En la exploración física tiene un exantema malar eritematoso. No se aprecian adenopatías, pero la punta del bazo es palpable. Está afebril. Las pruebas de laboratorio muestran: hemoglobina, 8,9 g/dl; hematocrito, 27,8%; VCM, 103 μm^3; índice de la anchura de la distribución de eritrocitos, 22; leucocitos, 8.650/mm^3; plaquetas, 222.000/mm^3, y reticulocitos, 3,3%. El frotis de sangre periférica revela policromía sin esquistocitos. La concentración de bilirrubina total sérica es de 3,2 mg/dl con 0,8 mg/dl de bilirrubina directa y 5 mg/dl de haptoglobina. Los anticuerpos antinucleares y anti-ADN bicatenario son positivos. ¿Cuáles de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que presente esta paciente?

A Dímero D de 10 μg/ml
B Aumento de la fragilidad osmótica de los eritrocitos
C Prueba de Coombs positiva

D Cobalamina (vitamina B_{12}) sérica de 50 pg/ml

E Ferritina sérica de 240 ng/ml

23 Un jugador de *rugby* de 29 años participa en un partido especialmente disputado entre Nueva Zelanda y Sudáfrica. Es el pilar delantero en las melés y por eso golpea fuertemente y recibe golpes importantes de otros jugadores. Se siente mejor tras beber varios tercios de cerveza después del partido, pero nota que la orina es más oscura. El análisis de orina es positivo para sangre. ¿Cuál de los siguientes mecanismos patogénicos es responsable del cambio de color de la orina?

A Lisis del complemento

B Alteración intravascular

C Fragilidad osmótica

D Deformación falciforme en los sinusoides

E Secuestro esplénico

24 En un estudio epidemiológico de anemias, los hallazgos revelan que la prevalencia de anemia es mayor en personas de origen en África Occidental. Según la electroforesis de hemoglobinas, algunos individuos de esta región tienen una mayor cantidad de hemoglobina S. Estas mismas regiones también muestran una prevalencia alta de una enfermedad infecciosa. ¿Cuál de los siguientes microorganismos infecciosos es más probable que sea endémico en la región donde esa anemia tiene una prevalencia mayor?

A *Borrelia burgdorferi*

B *Clostridium perfringens*

C *Cryptococcus neoformans*

D *Plasmodium falciparum*

E *Treponema pallidum*

F *Trypanosoma brucei*

25 Una mujer de 28 años G3, P2, da a luz en la semana 34 de la gestación. En el momento del parto se observa que el recién nacido está muy hidrópico e ictérico. Se toma una muestra de sangre del cordón y la prueba de Coombs directa resulta positiva para los eritrocitos del neonato. ¿Cuál de los mecanismos siguientes es más probable que explique los hallazgos en el recién nacido?

A Hemólisis de eritrocitos recubiertos por anticuerpos

B Defecto de la célula madre hematopoyética

C Alteración de la síntesis de globina
D Fragmentación mecánica de los eritrocitos
E Daño oxidativo de la hemoglobina
F Menor capacidad de deformación de la membrana eritrocítica

26 Una mujer de 22 años ha presentado episodios de fiebre en las últimas 2 semanas tras regresar de un viaje a África. En la exploración física la temperatura es de 37,5 °C; de frecuencia cardíaca 82 latidos/min; de frecuencia respiratoria de 18 respiraciones/min, y de presión arterial de 105/65 mmHg. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 10,8 g/dl; de hematocrito del 32,5%; de plaquetas de 245.700/mm^3, y de leucocitos de 8.320/mm^3. La concentración sérica de haptoglobina está reducida y las pruebas de Coombs, directa e indirecta, son negativas. El número de reticulocitos está aumentado. El tiempo de protrombina es de 12 s, y el tiempo de tromboplastina parcial, 31 s. Queda ingresada para observación en la semana siguiente y se constatan máximos de temperatura de 39,1 °C con escalofríos y tiritona cada 48 h. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que cause la enfermedad de esta paciente?

A *Aspergillus niger*
B *Babesia microti*
C *Dirofilaria immitis*
D *Escherichia coli*
E *Plasmodium vivax*
F *Wuchereria bancrofti*

27 Un hombre de 33 años previamente sano con fiebre persistente y un soplo cardíaco recibe el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Se le administra una cefalosporina en dosis altas durante los 10 días siguientes. Actualmente tiene cansancio progresivo. En la exploración física se aprecian ictericia de las escleróticas y taquicardia. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de hemoglobina de 7,5 g/dl; plaquetas, 261.000/mm^3, y leucocitos totales, 8.300/mm^3. La prueba de Coombs directa es positiva. El frotis de sangre periférica revela reticulocitosis. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que provoque la anemia?

A Déficit dietético de nutrientes
B Coagulopatía intravascular diseminada

C Hemólisis mediada por la inmunidad
D Infección por parvovirus
E Hemoglobinopatía hereditaria
F Alteración de las proteínas del citoesqueleto eritrocítica



28 Un niño de 7 años presenta cefaleas progresivamente más intensas y obnubilación desde hace 2 días. La exploración física muestra una temperatura de 39,5 °C; frecuencia cardíaca de 103 latidos/min; frecuencia respiratoria de 18 respiraciones/min, y presión arterial de 90/55 mmHg. Hay edema de papila bilateral en el examen del fondo de ojo. No se aprecian déficits neurológicos focales. La palpación del abdomen revela hepatoesplenomegalia. Entre los hallazgos de laboratorio destacan cifras de hemoglobina de 9,5 g/dl; de hematocrito del 28,8%; de VCM de 101 μm^3; de plaquetas de 145.000/mm^3; de leucocitos de 6.920/mm^3; de Na^+ de 146 mmol/l; de K^+ de 5,5 mmol/l; de Cl^- de 106 mmol/l; de CO_2 de 26 mmol/l; de creatinina de 2,3 mg/dl; de nitrógeno ureico de 22 mg/dl; de LDH de 1.095 U/l, y de amilasa de 45 U/l. La figura presenta el frotis de sangre periférica. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que produzca estos hallazgos?

A *Babesia microti*
B *Borrelia burgdorferi*
C *Leishmania donovani*

D *Plasmodium falciparum*
E *Trypanosoma brucei*
F *Wuchereria bancrofti*

29 Un hombre de 54 años previamente sano nota cansancio leve con el esfuerzo durante los últimos 9 meses. En la exploración física no hay hallazgos de interés. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 11,7 g/dl; de hematocrito del 34,8%; de VCM de 73 μm^3; de plaquetas de 315.000/mm^3, y de leucocitos de 8.035/mm^3. ¿Cuál de las siguientes pruebas es más sensible y rentable y debería ser solicitada por el médico con el fin de determinar la causa de esos hallazgos?

A Biopsia de médula ósea
B Electroforesis de hemoglobinas
C Ferritina sérica
D Haptoglobina sérica
E Hierro sérico
F Transferrina sérica



30 Un hombre de 73 años no toma ningún medicamento ni ha tenido enfermedades importantes ni intervenciones quirúrgicas. Desde el año anterior cada vez se encuentra más cansado y apático. La exploración física muestra palidez, pero no hay hepatoesplenomegalia ni deformidades. El hemograma revela

cifras de hemoglobina de 9,7 g/dl; de hematocrito del 29,9%; de VCM de 69,7 μm^3; de eritrocitos de 4,28 millones/mm^3; de plaquetas de 331.000/mm^3, y de leucocitos de 5.500/mm^3. La figura presenta el frotis de sangre periférica. ¿Cuál de los siguientes trastornos subyacentes es más probable que explique los hallazgos de este paciente?

A Anemia hemolítica autoinmunitaria
B Alcoholismo crónico
C β-talasemia mayor
D Hemofilia A
E Neoplasia maligna oculta
F Déficit de vitamina B_{12}

31 Se realiza un estudio clínico con pacientes adultos diagnosticados de enfermedad ulcerosa péptica, pérdida de sangre crónica y anemia microcítica hipocrómica. Las concentraciones séricas de ferritina son de 5-7 ng/ml de media. Se descubre que la tasa de absorción duodenal de hierro en el grupo del estudio es mucho mayor que la de un grupo control normal. Tras el tratamiento con omeprazol y claritromicina, los pacientes del estudio tienen niveles de hematocrito en torno al 40-42%, VCM de 82-85 μm^3 y concentraciones de ferritina sérica de 30-35 ng/ml. Las tasas de absorción de hierro medidas en el grupo del estudio tras el tratamiento han descendido a los valores del grupo control. ¿Cuál de las siguientes sustancias del hígado es más probable que estuviera reducida en los pacientes del grupo del estudio antes del tratamiento y se normalizara tras este?

A Transportador de metales divalentes 1 (DMT-1)
B Hemosiderina
C Hepcidina
D Proteína transmembrana de tipo HLA
E Transferrina

32 Un hombre de 39 años ha experimentado cansancio crónico y pérdida de peso en los últimos 3 meses. La exploración física no pone de manifiesto hallazgos de interés. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 10 g/dl; de hematocrito del 30,3%; de VCM de 91 μm^3; de plaquetas de 240.000/mm^3; de leucocitos de 7.550/mm^3; de hierro sérico de 80 μg/dl; de capacidad total de fijación de hierro de 145 μg/dl, y de

ferritina sérica de 565 ng/ml. Las concentraciones séricas de eritropoyetina corresponden a la cifra de Hb y las concentraciones de hepcidina están elevadas. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Anemia de las enfermedades crónicas
B Anemia aplásica
C Anemia ferropénica
D Anemia megaloblástica
E Anemia hemolítica microangiopática
F Talasemia menor

33 Una mujer de 45 años presenta artritis progresiva en manos y pies desde hace 15 años. En la exploración física se encuentran deformidades importantes de manos y pies, con desviación cubital de las manos y deformidad en cuello de cisne de los dedos. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración elevada de factor reumatoide. El hemograma revela cifras de hemoglobina de 11,6 g/dl; de hematocrito del 34,8%; de VCM de 87 μm^3; de plaquetas de 268.000/mm^3, y de leucocitos de 6.800/mm^3. La concentración sérica de haptoglobina es normal y la de hierro llega a 20 µg/dl, con una capacidad total de fijación de hierro de 195 µg/dl, un porcentaje de saturación de 10,2 y una ferritina sérica de 317 ng/ml. No se detectan productos de degradación de la fibrina. La concentración de reticulocitos es del 1,1%. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que conduzca a las anomalías hematológicas de la paciente?

A Autoanticuerpos contra membranas eritrocíticas
B Alteración de la síntesis de cadenas de β-globina
C Uso inadecuado del hierro almacenado
D Mutación en el gen del fosfatidilinositol glucano A *(PIGA)*
E Secuestro de eritrocitos en los sinusoides esplénicos
F Lesiones ocupantes de espacio en la médula ósea

34 Llevan a un hombre de 62 años a urgencias en estado de embriaguez. Lo conocen bien en el servicio porque esta circunstancia se ha repetido en múltiples ocasiones desde hace 15 años. En la exploración física no tiene fiebre. La punta del bazo es palpable y el reborde hepático resulta firme. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 8,2 g/dl, de hematocrito del 25,1%; de VCM de 107 μm^3; de plaquetas de

135.000/mm^3, y de leucocitos de 3.920/mm^3. El frotis de sangre periférica revela anisocitosis prominente y macrocitosis. Es difícil encontrar eritrocitos policromatófilos. Algunos neutrófilos muestran seis o siete lóbulos nucleares. ¿Cuál de las siguientes explicaciones es más probable que justifique estos hallazgos en las células de la sangre periférica?

A Menor maduración nuclear por alteración de la síntesis de ADN
B Hemólisis extravascular de eritrocitos recubiertos de anticuerpos
C Desequilibrio en la síntesis de las cadenas de α-globina y β-globina
D Mayor susceptibilidad a la lisis por el complemento
E Menor capacidad de deformación de la membrana eritrocítica

35 Un hombre de 83 años refiere malestar general y cansancio progresivos desde hace 5 meses. En la exploración física está afebril y normotenso. La punta del bazo es palpable. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 10,6 g/dl; de hematocrito del 29,8%; de VCM de 92 μm^3; de plaquetas de 95.000/mm^3, y de leucocitos de 4.900/mm^3 con un 63% de neutrófilos, un 7% de cayados, un 2% de metamielocitos, un 1% de mielocitos, un 22% de linfocitos, un 5% de monocitos y 3 eritrocitos nucleados por cada 100 leucocitos. El frotis de sangre periférica pone de manifiesto algunos dacriocitos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que muestren el examen y el frotis de una biopsia de médula ósea?

A Hiperplasia eritroide
B Fibrosis extensa
C Sustitución grasa
D Muchos megaloblastos
E Numerosos mieloblastos

36 Se realiza un estudio clínico para evaluar los resultados en pacientes con anemias macrocíticas secundarias a déficit de vitamina B_{12} o folato. Una comparación entre estrategias de pruebas de laboratorio muestra que la mejor consiste en determinar en suero las concentraciones de homocisteína, ácido metilmalónico, vitamina B_{12} (cobalamina) y folato. ¿Cuál de los siguientes motivos es más importante para solicitar todas estas

pruebas al mismo tiempo?

- A La anemia aplásica puede deberse a la falta de todos esos nutrientes
- B Ambos nutrientes se absorben de un modo parecido
- C Es necesario prevenir la lesión neurológica
- D En ambos puede producirse una trombocitopenia potencialmente mortal
- E El tratamiento de un déficit también trata el otro

37 Una mujer de 37 años presenta dolor abdominal y diarrea intermitente de escaso volumen en los últimos 3 meses. En la exploración física no tiene fiebre. Una muestra de heces resulta positiva para sangre oculta. Se realiza una colonoscopia, y las biopsias del íleon terminal y colon presentan hallazgos compatibles con enfermedad de Crohn. No responde al tratamiento médico, y se resecan parte del colon y el íleon terminal. Durante la cirugía se transfunden 2 concentrados de eritrocitos. A las 3 semanas tiene buen aspecto, pero refiere fatigabilidad fácil. En el estudio, el hemograma muestra cifras de hemoglobina de 10,6 g/dl; de hematocrito del 31,6%; de eritrocitos de 2,69 millones/µl; de VCM de 118 μm^3; de plaquetas de 378.000/mm^3, y de leucocitos de 9.800/mm^3. El recuento de reticulocitos es 0,3%. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que produzca estos hallazgos hematológicos?

- A Anemia de las enfermedades crónicas
- B Hemorragia crónica
- C Anemia hemolítica
- D Anemia mieloptísica
- E Déficit de vitamina B_{12}

38 Un hombre de 28 años previamente sano refiere cansancio progresivamente mayor en los últimos 6 meses y formación de hematomas con traumatismos mínimos. En los últimos 2 días ha desarrollado tos. En la exploración física la temperatura es de 38,9 °C y tiene estertores difusos en ambos pulmones. No se aprecian hepatoesplenomegalia ni adenopatías. Entre los hallazgos de laboratorio destacan un cultivo de esputo positivo para *Streptococcus pneumoniae;* cifras de hemoglobina de 7,2 g/dl, de hematocrito del 21,7%, de plaquetas de 23.400/mm^3 y de leucocitos de 1.310/mm^3; un tiempo de protrombina de 13 s; un tiempo de

tromboplastina parcial de 28 s, y una concentración de bilirrubina total de 1 mg/dl. Los ANA son negativos. ¿Cuál de las siguientes explicaciones es más probable para estos hallazgos?

A Defecto de la célula madre hematopoyética
B Hemólisis de eritrocitos recubiertos por anticuerpos
C Mayor susceptibilidad a la lisis por el complemento
D Adenocarcinoma metastásico en la médula ósea
E Hiperesplenismo secundario

39 En un estudio de la anemia aplásica idiopática, se descubren pacientes con senescencia prematura de las células madre hematopoyéticas. Sus células hematopoyéticas tienen una morfología normal, pero hay menos células en la serie mieloide, eritroide y megacariocítica. ¿Cuál de las siguientes enzimas es más probable que sea deficiente en las células madre de la médula ósea?

A Fosfatasa alcalina
B Metaloproteinasa
C Piruvato cinasa
D Telomerasa
E Tirosina cinasa

40 Una mujer de 44 años presenta múltiples equimosis en las extremidades tras sufrir traumatismos mínimos hace 2 semanas. También refiere sentirse muy débil. En las 24 h anteriores desarrolló tos intensa productiva con esputos amarillentos. En la exploración física la temperatura es de 38,4 °C y tiene crepitantes difusos en todos los campos pulmonares. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 7,2 g/dl; de hematocrito del 21,4%; de VCM de 88 μm^3; de plaquetas de 35.000/mm^3, y de leucocitos de 1.400/mm^3 con un 20% de neutrófilos, un 1% de cayados, un 66% de linfocitos y un 13% de monocitos. El recuento de reticulocitos es del 0,1%. ¿Cuál de los siguientes parámetros de la anamnesis resultaría más útil para determinar la causa de su enfermedad?

A Hábitos dietéticos
B Exposición a medicamentos
C Antecedentes familiares de anemias
D Historial menstrual
E Infecciones bacterianas recientes

41 Un hombre de 77 años presenta malestar general creciente y pérdida de 6 kg de peso en el último año. Refiere dolor de espalda más intenso y constante desde hace 3 meses. En la exploración física la temperatura es de 38,7 °C. La próstata es irregular y firme a la palpación durante el tacto rectal. No hay organomegalias. Una muestra de heces resulta negativa para sangre oculta. Entre las pruebas de laboratorio destacan un cultivo de orina positivo para *Escherichia coli;* una concentración de glucosa sérica de 70 mg/dl, y concentraciones de creatinina de 1,1 mg/dl, de bilirrubina total de 1 mg/dl, de fosfatasa alcalina de 293 U/l, de calcio de 10,3 mg/dl, de fósforo de 2,6 mg/dl y de PSA de 25 ng/ml. El hemograma revela unas cifras de hemoglobina de 9,1 g/dl; de hematocrito del 27,3%; de VCM de 94 μm^3; de plaquetas de 55.600/mm^3, y de leucocitos de 3.570/mm^3 con un 18% de neutrófilos, un 7% de cayados, un 2% de metamielocitos, un 1% de mielocitos, un 61% de linfocitos, un 11% de monocitos y 3 eritrocitos nucleados por cada 100 leucocitos. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Anemia de las enfermedades crónicas
B Anemia aplásica
C Anemia hemolítica
D Anemia megaloblástica
E Anemia mieloptísica

42 Una mujer de 48 años presenta debilidad y disnea progresivas desde hace 5 meses. En la exploración física la temperatura es de 37 °C; la frecuencia cardíaca, de 100 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 19 respiraciones/min, y la presión arterial, de 115/75 mmHg. La auscultación pulmonar revela crepitantes basales bilaterales. La fuerza muscular baja es de 5/5 a 4/5 con el movimiento repetitivo de los brazos y se recupera al administrar un inhibidor de la acetilcolinesterasa. La TC torácica pone de manifiesto una masa bien delimitada de 6 cm en el mediastino anterior. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que se descubra en el examen microscópico de la biopsia de médula ósea?

A Hipoplasia eritroide
B Linfocitosis
C Hiperplasia megacariocítica
D Carcinoma metastásico
E Mielofibrosis

F Plasmocitosis

43 Poco después de cruzar la línea de meta en una carrera de 10 km, un hombre de 31 años cae desmayado. En la exploración física la temperatura es de 40,1 °C; la frecuencia cardíaca, de 101 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 22 respiraciones/min, y la presión arterial, de 85/50 mmHg. No está sudoroso y la piel muestra una disminución de la turgencia. Las pruebas de laboratorio revelan unas cifras de Na^+ de 155 mmol/l; de K^+ de 4,6 mmol/l; de Cl^- de 106 mmol/l; de CO_2 de 27 mmol/l; de glucosa de 68 mg/dl; de creatinina de 1,8 mg/dl; de hemoglobina de 20,1 g/dl; de hematocrito del 60,3%; de plaquetas de 230.400/mm^3, y de leucocitos de 6.830/mm^3. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Eritroleucemia

B Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

C Diabetes insípida

D Hemoconcentración

E Síndrome paraneoplásico

F Policitemia vera

44 Una mujer de 33 años, G3, P0, que ha tenido dos abortos espontáneos está en el segundo trimestre de su tercera gestación. Una ecografía a las 18 semanas reveló un retraso del crecimiento simétrico. Da a luz un feto muerto a las 25 semanas y presenta disnea de inicio súbito. Una gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión indica alta probabilidad de tromboembolia. A los 4 meses, sufre de forma brusca alteración del nivel de consciencia y pérdida del movimiento del brazo derecho. Una angiografía cerebral pone de manifiesto la oclusión de una rama de la arteria cerebral media izquierda. Los hallazgos de laboratorio son: hemoglobina, 13,4 g/dl; hematocrito, 40,3%; VCM, 91 μm^3; plaquetas, 124.000/mm^3; leucocitos, 5.530/mm^3; tiempo de protrombina, 13 s; tiempo de tromboplastina parcial, 46 s; anticuerpos anticardiolipina positivos; prueba serológica de sífilis positiva, y ANA negativos. ¿Cuál de los siguientes procesos explica mejor estos hallazgos?

A Síndrome antifosfolipídico

B Síndrome mieloproliferativo

C Tromboflebitis

D Infección por *Treponema pallidum*
E Síndrome de Trousseau
F Enfermedad de von Willebrand

45 Una mujer de 23 años en la semana 25 de la gestación lleva 3 días sin notar movimientos fetales. A las 3 semanas aún no ha dado a luz y desarrolla bruscamente disnea con cianosis. En la exploración física la temperatura es de 37 °C; la frecuencia cardíaca, de 106 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 23 respiraciones/min, y la presión arterial, de 80/40 mmHg. Tiene grandes equimosis cutáneas por todo el cuerpo. Una muestra de heces resulta positiva para sangre oculta. Las pruebas de laboratorio muestran un aumento de los tiempos de protrombina y tromboplastina parcial. El recuento de plaquetas está reducido, el nivel de fibrinógeno plasmático es muy bajo y se detectan productos de degradación de la fibrina. Un hemocultivo es negativo. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que explique esta diátesis hemorrágica?

A Consumo de factores de la coagulación
B Defectos de la agregación plaquetaria
C Mayor fragilidad vascular
D Menor producción de plaquetas
E Daño tóxico del endotelio



46 Un hombre de 30 años lleva 1 semana sintiendo dolor y una sensación urente al orinar. En la exploración física, tiene fiebre, y la frecuencia cardíaca es de 92 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 18 respiraciones/min, y la presión arterial, de 80/45 mmHg. En el tacto rectal, la próstata está aumentada de tamaño y es dolorosa a la palpación. En el lado derecho, la palpación de la fosa renal resulta dolorosa. Se aprecian equimosis diseminadas en el tronco y las extremidades. Las pruebas de laboratorio muestran un hemocultivo positivo para *Klebsiella pneumoniae.* La figura muestra una imagen de los eritrocitos en el frotis de sangre periférica. ¿Cuál de los siguientes trastornos hematológicos es más probable que tenga este hombre?

A Anemia hemolítica autoinmunitaria
B Esferocitosis hereditaria
C Anemia ferropénica
D Anemia megaloblástica
E Anemia hemolítica microangiopática

47 Una mujer de 37 años observa que el flujo menstrual ha sido excesivo en todos los ciclos de los últimos 6 meses. También ha notado un número creciente de hemorragias puntiformes en las extremidades inferiores desde hace 1 mes. La exploración física no revela organomegalias ni adenopatías. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 14,2 g/dl; de hematocrito del 42,5%; de VCM de 91 μm^3; de plaquetas de 15.000/mm^3, y de leucocitos de 6.950/mm^3. En el momento del ingreso en el hospital, tiene melena y el recuento plaquetario no aumenta con una transfusión de plaquetas. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que explique su tendencia a presentar hemorragias?

A Producción anómala de plaquetas por los megacariocitos
B Interacciones defectuosas entre plaquetas y endotelio
C Destrucción de plaquetas recubiertas por anticuerpos en el bazo
D Pérdida excesiva de plaquetas en el sangrado menstrual
E Supresión de la división de una célula madre pluripotencial

48 Un niño de 9 años desarrolla hematomas prominentes en las extremidades en la semana anterior. En la exploración física, tiene equimosis y petequias en brazos y piernas. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 13,8 g/dl; de

hematocrito del 41,9%; de VCM de 93 μm^3; de plaquetas de 11.300/mm^3, y de leucocitos de 7.720/mm^3. Hace 3 semanas tuvo una neumonía por virus respiratorio sincitial. Su estado mejora con corticoesteroides. ¿Cuál de las siguientes anomalías es más probable que cause la diátesis hemorrágica?

A Anticuerpos antiplaquetarios
B Aplasia medular
C Disfunción de la glucoproteína IIb/IIIa
D Déficit de vitamina C
E Déficit de metaloproteinasa del factor de von Willebrand

49 Una mujer de 21 años con déficit de proteína C conocido desarrolla tromboembolias pulmonares de repetición y se le administra tratamiento anticoagulante. A las 2 semanas de comenzar este tratamiento presenta una alteración brusca del estado mental y dificultades para hablar y tragar. La angiografía cerebral revela una oclusión de la arterial cerebral media izquierda. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 13 g/dl; de plaquetas de 65.400/mm^3; de leucocitos de 5.924/mm^3; de tiempo de protrombina de 12 s, y de tiempo de tromboplastina parcial de 51 s. Se suspende el tratamiento anticoagulante. ¿Cuál de los siguientes fármacos usados como anticoagulantes en esta paciente es más probable que haya causado estos hallazgos?

A Ácido acetilsalicílico
B Heparina
C Activador del plasminógeno tisular
D Urocinasa
E Warfarina

50 Una mujer de 56 años presenta cefalea y fotofobia de inicio brusco, y su estado empeora los 2 días siguientes. En la exploración física su temperatura es de 38 °C y está desorientada. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 11,2 g/dl; de hematocrito del 33,7%; de VCM de 94 μm^3; de plaquetas de 32.000/mm^3, de leucocitos de 9.900/mm^3. El frotis de sangre periférica revela esquistocitos. La concentración sérica de nitrógeno ureico es de 38 mg/dl, y la de creatinina, de 3,9 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Anemia hemolítica autoinmunitaria

B β-talasemia mayor
C Coagulación intravascular diseminada
D Púrpura trombocitopénica idiopática
E Hemoglobinuria paroxística nocturna
F Púrpura trombótica trombocitopénica

51 Una mujer de 44 años lleva 3 meses con malestar general, náuseas y vómitos. En la exploración física tiene ictericia en la esclerótica y un tono amarillento de la piel. Presenta dificultades para recordar tres objetos a los 3 min. No hay otros déficits neurológicos. Las pruebas de laboratorio muestran una serología positiva para hepatitis C, y concentraciones de ALT sérica de 310 U/l, de AST de 269 U/l, de bilirrubina total de 7,6 mg/dl, de bilirrubina directa de 5,8 mg/dl, de fosfatasa alcalina de 75 U/l y de amoníaco de 55 µmol/l. ¿Cuál de los siguientes parámetros de función hemostática del laboratorio es más probable que resulte anómalo?

A Productos de degradación de la fibrina
B Inmunoanálisis del factor de von Willebrand plasmático
C Agregación plaquetaria
D Recuento de plaquetas
E Tiempo de protrombina

52 Una mujer de 23 años tiene antecedentes de desarrollo de hematomas ante traumatismos mínimos. La exploración física muestra múltiples hematomas de color variable, de rojo a azul y de azul a morado, en los brazos y las piernas. No hay organomegalia ni se aprecian deformidades. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 9,5 g/dl; de hematocrito del 28,2%; de plaquetas de 229.300/mm^3; de leucocitos de 7.185/mm^3; de tiempo de protrombina de 12 s, y de tiempo de tromboplastina parcial de 38 s. Una dilución del plasma de la paciente con plasma mixto normal 1:1 corrige el tiempo de tromboplastina parcial. La agregación plaquetaria dependiente de ristocetina está muy reducida en el plasma de la paciente. La actividad del factor VIII es del 30% (intervalo de referencia, 50-150%). ¿Cuál de las siguientes consecuencias es más probable que genere esta enfermedad?

A Insuficiencia de la médula ósea por aplasia
B Hemorragia excesiva tras cirugía maxilofacial
C Dificultad creciente para el movimiento articular

D Síndrome mieloproliferativo
E Trombosis venosas profundas de repetición

53 Una mujer de 42 años presenta epistaxis, aparición de hematomas tras traumatismos mínimos y mayor volumen del período menstrual en los últimos 4 meses. En la exploración física, la temperatura es de 37 °C; la frecuencia cardíaca, de 88 latidos/min, y la presión arterial, de 90/60 mmHg. Tiene petequias diseminadas en la parte distal de las extremidades. No hay organomegalias. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 12,3 g/dl; de hematocrito del 37%; de plaquetas de 21.500/mm^3, y de leucocitos de 7.370/mm^3. Una biopsia de médula ósea revela un aumento notable de los megacariocitos. Los tiempos de protrombina y tromboplastina parcial están en el intervalo de referencia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Coagulación intravascular diseminada
B Hemofilia B
C Púrpura trombocitopénica inmunitaria
D Carcinoma de mama metastásico
E Púrpura trombótica trombocitopénica
F Déficit de vitamina K
G Enfermedad de von Willebrand

54 Se realiza un estudio clínico con pacientes adultos diagnosticados de anemia hemolítica microangiopática. Se descartó a un subgrupo de pacientes que había tenido fiebre o diarrea antes del diagnóstico inicial de la anemia. Había esquistocitos en los frotis de sangre periférica de los pacientes. En algunos se encontró déficit de una metaloproteinasa conocida como ADAMTS13. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que desarrollen los pacientes con este déficit?

A Coagulación intravascular diseminada (CID)
B Síndrome urémico hemolítico (SUH)
C Trombocitopenia inducida por heparina (TIH)
D Púrpura trombocitopénica idiopática (PTId)
E Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT)

55 Una mujer de 45 años ha presentado varios episodios de cefalea y visión borrosa en los últimos 6 meses. Desde hace 3 días está progresivamente más confusa, con parestesias. En la exploración física, la temperatura es de 39,6 °C; frecuencia cardíaca, 100

latidos/min; frecuencia respiratoria 20 respiraciones/min, y presión arterial, 80/50 mmHg. Hay hemorragias petequiales en tronco y extremidades. Entre los hallazgos de laboratorio destacan cifras de hemoglobina de 10,9 g/dl; de hematocrito del 34%; de VCM de 96 μm^3; de plaquetas de 28.000/mm^3, y de leucocitos de 8.500/mm^3. En el frotis de sangre periférica se observan eritrocitos fragmentados. El nitrógeno ureico sanguíneo llega a los 40 mg/dl y la concentración de creatinina sérica es de 3,1 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que explique estos hallazgos?

A Toxina circulante que daña el endotelio capilar
B Reducción de la actividad del factor VIII
C Defecto de la agregación plaquetaria inducida por ADP
D Formación de autoanticuerpos contra las glucoproteínas IIb/IIIa y Ib-IX de las plaquetas
E Liberación inapropiada de sustancias tromboplásicas a la sangre
F Presencia de anticuerpos contra la metaloproteinasa ADAMTS13

56 Un niño de 12 años tiene dificultades de movilidad articular progresivas en brazos y piernas, especialmente de rodillas y tobillos, desde hace 6 años. Ha estado recibiendo tratamiento por este trastorno. Su abuelo padeció una enfermedad similar y falleció a los 25 años. En la exploración física no tiene petequias ni áreas de púrpura visibles. Las pruebas de laboratorio muestran que el tiempo de protrombina es de 12 s, y el tiempo de tromboplastina parcial, de 52 s. Si se añade una parte alícuota equivalente de plasma normal, el tiempo de tromboplastina parcial desciende a 30 s. La concentración de hemoglobina es de 12,9 g/dl, la de plaquetas, de 238.500/mm^3, y la de leucocitos, de 6.620/mm^3. Los estudios de función plaquetaria son normales. ¿Cuál de los siguientes patrones de herencia es más probable en esta enfermedad?

A Autosómico dominante
B Autosómico recesivo
C Mosaicismo placentario limitado
D Mutación en la línea germinal
E Recesivo ligado al cromosoma X

57 Un niño de 11 años tiene antecedentes de aparición de

hematomas ante traumatismos mínimos. A los 9 años sufrió una hemorragia alrededor de la faringe que produjo una obstrucción aguda de las vías respiratorias. Los antecedentes familiares indican que otros varones de la familia han tenido problemas hemorrágicos similares. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 13,1 g/dl; de hematocrito del 39,2%; de plaquetas de 228.000/mm^3; de leucocitos de 5.950/mm^3; de tiempo de protrombina de 13 s, y de tiempo de tromboplastina parcial de 52 s. Una dilución en proporción 1:1 del plasma del paciente con plasma mixto normal corrige el tiempo de tromboplastina parcial. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones de esta enfermedad es más probable que se produzca sin tratamiento?

A Petequias conjuntivales
B Hemartrosis
C Hemólisis
D Hemocromatosis
E Esplenomegalia

58 Una niña de 15 años tiene antecedentes de aparición de hematomas ante traumatismos mínimos y hemorragias. Desde la menarquia a los 13 años de edad ha sufrido menometrorragia. En la exploración física se aprecian deformidades articulares y reducción de la movilidad de tobillos, rodillas y muñecas. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 11,8 g/dl; de hematocrito del 35,1%; de plaquetas de 267.000/mm^3; de leucocitos de 5.960/mm^3; de tiempo de protrombina de 13 s, y de tiempo de tromboplastina parcial de 60 s. Una dilución en proporción 1:1 del plasma de la paciente con plasma mixto normal corrige el tiempo de tromboplastina parcial. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Síndrome antifosfolipídico
B Hemofilia B
C Púrpura trombocitopénica idiopática
D Púrpura trombótica trombocitopénica
E Enfermedad de von Willebrand

59 Una adolescente de 16 años presenta epistaxis frecuentes desde la infancia. Las encías le sangran fácilmente, incluso al cepillarse los dientes. Tiene menorragia desde la menarquia, a los 13 años. En la exploración física no hay hallazgos anómalos. Las pruebas de

laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 14,1 g/dl; de hematocrito del 42,5%; de VCM de 90 μm^3; de plaquetas de 277.400/mm^3, y de leucocitos de 5.920/mm^3. Las plaquetas no se agregan en respuesta al ADP, al colágeno, a la adrenalina y a la trombina. La prueba de aglutinación con ristocetina es normal. Hay un déficit de glucoproteína IIb/IIIa. El tiempo de protrombina es de 12 s, y el de tromboplastina parcial, de 28 s. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Coagulación intravascular diseminada
B Trombastenia de Glanzmann
C Púrpura trombocitopénica inmunitaria
D Déficit de vitamina C
E Enfermedad de von Willebrand

60 Un hombre de 25 años implicado en un accidente de motocicleta presenta una laceración en el muslo. La hemorragia se estabiliza de camino al hospital, pero a la llegada se detecta que tiene hipotensión ortostática y una concentración de hematocrito del 21%. Recibe 2 unidades de concentrado de eritrocitos. Cuando la transfusión del primer concentrado está prácticamente terminada desarrolla fiebre e hipotensión. La diuresis se interrumpe. El suero por encima del coágulo en un tubo de extracción de tapón rojo es de color rosa. ¿Cuál de las siguientes complicaciones de la transfusión es más probable que haya ocurrido en este hombre?

A Anticuerpos del donante dirigidos contra sus granulocitos
B Sangre del donante contaminada con virus de la hepatitis C
C Insuficiencia cardíaca congestiva por sobrecarga de líquidos
D Procesamiento de muestras mal etiquetadas en el laboratorio
E Linfocitos T ajenos que atacaron sus tejidos

61 Una mujer de 72 años se somete a una laparotomía por diverticulitis perforada. Al día siguiente las cifras de leucocitos están elevadas y la presión arterial es de 85/45 mmHg. El frotis de sangre periférica muestra esquistocitos. Recibe 5 unidades de plasma fresco congelado. Cuando se está transfundiendo la quinta unidad presenta bruscamente disnea grave y comienza a toser expulsando grandes cantidades de esputo espumoso. La radiografía de tórax revela edema de pulmón bilateral. ¿Ante cuál de los siguientes componentes del hemoderivado de donante es

más probable que se haya producido una reacción de transfusión en esta mujer?

A Albúmina
B Fibrinógeno
C Granulocitos
D Plaquetas
E Eritrocitos

62 Un estudio sobre reacciones de transfusión pone de manifiesto que algunos pacientes presentaron un incremento de la temperatura corporal superior a 1 °C, acompañado de hipotensión y escalofríos. Los hemocultivos son positivos para bacterias. Estos pacientes responden al tratamiento antibiótico. ¿Cuál de los siguientes tipos de hemoderivado es más probable que hayan recibido?

A Crioprecipitado
B Plasma fresco congelado
C Granulocitos
D Plaquetas
E Eritrocitos

Respuestas

1 **E** El número y la función de las plaquetas son normales en este caso, y no hay anomalías detectables en la vía extrínseca ni intrínseca de la coagulación, según determinan el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial. Las petequias y las equimosis son consecuencia de una mayor fragilidad vascular, secundaria a déficits nutricionales (p. ej., vitamina C), infecciones (p. ej., meningococemia) y vasculitis. La insuficiencia renal crónica puede disminuir la función plaquetaria. Una hepatopatía crónica afectaría al tiempo de protrombina. La meningococemia es una enfermedad aguda. Las metástasis no afectan directamente a la hemostasia, aunque las metástasis extensas en la médula ósea podrían reducir la producción de plaquetas.

2 **D** La hemorragia aguda, en este caso intraperitoneal, condiciona reticulocitosis debido a la estimulación medular por la anemia. El punteado basófilo de los eritrocitos es sugestivo de una lesión de la médula ósea, secundaria a fármacos o toxinas,

por ejemplo. Los eritrocitos hipocrómicos aparecen en la ferropenia y las talasemias, ambas asociadas a menor síntesis de hemoglobina. Una hemorragia aguda no provoca déficit de hierro si los depósitos de este metal y la dieta son adecuados. La leucoeritroblastosis es típica de un proceso mieloptísico en la médula ósea, con presencia de leucocitos inmaduros (mielocitos) y eritrocitos inmaduros (nucleados). Los esquistocitos son indicativos de anemia hemolítica microangiopática, que puede acompañar al shock o la sepsis.

3 **C** La notable reticulocitosis y la hiperplasia medular indican que la médula está respondiendo al descenso de los eritrocitos. Los reticulocitos son eritrocitos de mayor tamaño que aumentan ligeramente el VCM. Una médula aplásica es muy hipocelular e incapaz de responder a la anemia; se asocia a una pancitopenia. Los resultados normales en la prueba de Coombs descartan una anemia hemolítica autoinmunitaria. La ferropenia altera la capacidad de la médula de lograr una reticulocitosis significativa y mantenida. La anemia ferropénica suele ser hipocrómica y microcítica, pero aquí podría estar enmascarada, en parte, por la reticulocitosis, que no sería tan intensa en caso de no disponer de hierro, pero la dieta del paciente aporta el hierro necesario. Los trastornos infiltrantes, como las metástasis en la médula ósea, alterarían la capacidad de lograr una reticulocitosis de este grado.

4 **A** La haptoglobina es una proteína sérica que se une a la hemoglobina libre. En condiciones normales, la hemoglobina circulante está dentro de los eritrocitos, pero la hemólisis puede liberar hemoglobina libre. La haptoglobina se consume a medida que aumenta la cantidad de hemoglobina libre. El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmunitaria que puede provocar hemólisis mediante autoanticuerpos dirigidos a los eritrocitos, y la prueba de Coombs resulta positiva con frecuencia. El LES es conocido, sobre todo, por afectar a mujeres jóvenes, pero el intervalo de edad es amplio. Una reducción del hierro puede causar anemia hipocrómica y microcítica, pero en la hemólisis los eritrocitos se reciclan. La hemólisis se acompaña a menudo de reticulocitosis si la médula ósea está indemne y no se pierde hierro. Una concentración de

dímero D elevada indica anemia hemolítica microangiopática. Las enfermedades autoinmunitarias no afectan a la síntesis de cadenas de globinas. Las cifras de protoporfirinas están aumentadas en algunos tipos de porfiria.

5 **F** La esferocitosis hereditaria es un trastorno en el que una mutación afecta a una de las proteínas del citoesqueleto de la membrana. La espectrina y sus proteínas relacionadas son proteínas del citoesqueleto importantes para mantener la forma del eritrocito. Estas proteínas comprenden anquirina (la más abundante) y banda 4.2, que une la espectrina al transportador de iones transmembrana; banda 3, y proteína 4.1, que conecta la «cola» de la espectrina con otra proteína transmembrana, la glucoforina A. Los eritrocitos anómalos con esas proteínas mutadas resultan menos deformables, carecen de la claridad central en el frotis de sangre periférica, y son secuestrados y destruidos en el bazo. Las talasemias con cadenas anómalas de α-globina o β-globina se asocian a una anemia microcítica hipocrómica. La ferropenia afecta a la porción hemo de la hemoglobina, lo que provoca hipocromía y microcitosis. La anhidrasa carbónica ayuda a los eritrocitos a mantener la capacidad de amortiguación acidobásica. El déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) es un trastorno ligado al cromosoma X que afecta con más frecuencia a hombres negros. Las porfirias pueden alterar la producción de anillos de porfirina y provocar anemia hemolítica, además de dolor abdominal, problemas neurológicos y manifestaciones cutáneas.

6 **C** Los eritrocitos en forma de hoz o media luna (drepanocitos) son característicos de la hemoglobina SS. Esta enfermedad es más frecuente en personas de ascendencia africana y árabe oriental. Los drepanocitos son susceptibles a la hemólisis (principalmente extravascular, en el bazo), pero también causan oclusiones microvasculares en cualquier lugar del organismo, con más frecuencia en huesos, en los pulmones, en el hígado y en el encéfalo, que provocan isquemia y dolor intenso. Las oclusiones vasculares de los pulmones suelen acompañarse de infección y dan lugar al «síndrome pulmonar agudo». El dolor abdominal y de espalda es frecuente y grave, por lo que precisa analgesia eficaz de forma inmediata. Las membranas celulares

de los eritrocitos deformados reversiblemente son anómalamente «pegajosas» y se adhieren al endotelio capilar, especialmente en los pulmones. La vasoconstricción está causada por la depleción de NO por la hemoglobina libre. La adhesión de los eritrocitos al endotelio ralentiza el flujo sanguíneo, causa hipoxia y precipita la deformación en hoz de los eritrocitos y la oclusión vascular. En la anemia drepanocítica se produce hipoxia tisular crónica, que provoca una alteración insidiosa de la función en órganos como el corazón, los riñones y los pulmones. Los defectos en la vía alternativa de activación del complemento predisponen a las infecciones por bacterias encapsuladas, como *Haemophilus influenzae* y *Streptococcus pneumoniae.* Los autoanticuerpos contra la membrana basal alveolar pueden formar parte del síndrome de Goodpasture, que también afecta a los riñones. La hemólisis intravascular más intensa aparece en las reacciones transfusionales graves.

7 **D** Los pacientes con esferocitosis hereditaria pueden sufrir crisis aplásicas precipitadas por una infección por parvovirus. En adultos que no tengan alteraciones en la producción de eritrocitos, como esferocitosis hereditaria o anemia drepanocítica, o que no estén inmunodeprimidos, la infección por parvovirus es autolimitada y a menudo pasa desapercibida. Cuando existe un defecto subyacente en la generación de eritrocitos, el parvovirus interrumpe la producción de estas células y no hay reticulocitosis. La coagulación intravascular diseminada da lugar a trombocitopenia, hemorragias y presencia de eritrocitos fragmentados en el frotis de sangre periférica. La reticulocitosis sería prominente en casos de hemólisis y anticuerpos eritrocíticos. No se produce ferropenia en las anemias hemolíticas porque el hierro liberado de las células hemolizadas vuelve a utilizarse.

8 **C** En pacientes con esferocitosis hereditaria, los eritrocitos esferoidales quedan atrapados en el bazo y allí son destruidos porque estos eritrocitos anómalos tienen menor capacidad de deformación. La esplenectomía resulta útil, puesto que los esferocitos ya no quedan retenidos en el bazo. La esplenectomía no afecta a la síntesis de espectrina ni a la capacidad de deformación de los eritrocitos; los eritrocitos de la esferocitosis

no son destruidos por opsonización. En la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, el bazo retira los eritrocitos opsonizados. Las especies reactivas del oxígeno no participan en las anemias. El hierro no es el paso limitante de la velocidad en la producción de eritrocitos cuando este metal puede ser reciclado en el organismo.

9 **A** Este paciente de ascendencia mediterránea presenta una β-talasemia mayor. En esta enfermedad hay una reducción grave de la síntesis de cadenas de β-globina sin alteración de la síntesis de α-globina. Las cadenas libres de α-globina no emparejadas forman agregados que precipitan en los normoblastos y hacen que sufran apoptosis. La muerte de precursores eritrocíticos en la médula ósea se denomina *eritropoyesis ineficaz.* Esta no solo causa anemia, sino que también aumenta la absorción de hierro de la dieta, lo que provoca sobrecarga de hierro, que produce una hemocromatosis con miocardiopatía infiltrante, cirrosis hepática y «diabetes bronceada» debida a la disfunción de los islotes pancreáticos. La intensa anemia activa la síntesis de eritropoyetina, que expande la médula ósea eritropoyética. El aumento de volumen medular hace que los huesos se expandan y causen deformidades maxilofaciales. La hematopoyesis extramedular determina la aparición de hepatoesplenomegalia. Por el contrario, la anemia hemolítica es leve en la β-talasemia menor y apenas hay eritropoyesis ineficaz. La hemocromatosis resulta especialmente perjudicial para el hígado y el corazón. Los pacientes con anemia crónica pueden precisar transfusiones de eritrocitos, lo que añade aún más hierro a los depósitos corporales. Las demás opciones reseñadas no provocan una expansión notable de la hematopoyesis.

10 **D** En la anemia drepanocítica, el daño isquémico acumulado del bazo causa autoesplenectomía, que, en último término, convierte a este órgano en un pequeño remanente fibrótico. La alteración de la función esplénica y la incapacidad resultante de retirar bacterias del torrente sanguíneo pueden producirse desde el inicio de la infancia y se traducen en riesgo de infección por bacterias encapsuladas. La inmunodeficiencia se debe a la ausencia de función esplénica, no a la falta de

inmunoglobulinas. El endotelio puede resultar dañado por la formación de drepanocitos, y la adhesión entre células endoteliales y eritrocitos está aumentada en la anemia drepanocítica. Las proteínas del complemento pertenecen a la respuesta inmunitaria innata en la inflamación aguda. No hay alteraciones de la producción ni de la función de los neutrófilos.

11 **C** El feto presentaba α-talasemia mayor, más frecuente en personas de ascendencia en el sureste asiático; cada uno de los progenitores podría tener dos genes de α-globina anómalos en el cromosoma 16. Una ausencia completa de cadenas de α-globina impide la formación de las hemoglobinas A_1, A_2 y F. Solo es posible generar un tetrámero de cadenas γ (hemoglobina de Bart), lo que provoca anemia fetal grave. La herencia de tres cadenas de α-globina anómalas da lugar a enfermedad por hemoglobina H, con tetrámeros de cadenas β; la supervivencia es posible hasta la etapa adulta. La enfermedad por hemoglobina E es causa de anemia hemolítica leve.

12 **B** Esta paciente presenta β-talasemia, probablemente de gravedad al menos intermedia. La formación de cadenas de β-globina está reducida, con aumento de las cifras de hemoglobina A_2 y F para compensar. Hay eritropoyesis ineficaz y una concentración de eritropoyetina elevada que aumenta la absorción del hierro, lo que ocasiona sobrecarga de hierro. La anemia crónica que requiere transfusiones agrava la hemocromatosis. El hierro depositado en tejidos endocrinos puede provocar insuficiencia gonadal, hipofisaria, tiroidea, suprarrenal y de las células de los islotes. Es posible que se produzca hiperesplenismo secundario a la esplenomegalia, con secuestro de plaquetas y leucocitos. El gen anómalo de anquirina da lugar a esferocitosis hereditaria y anemia hemolítica leve con esplenomegalia, pero no provoca sobrecarga de hierro. En el déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, la sensibilidad a los compuestos oxidantes causa anemia hemolítica, pero habitualmente no es mantenida. El gen *HFE* es anómalo en la hemocromatosis hereditaria, lo que provoca sobrecarga de hierro, pero la enfermedad debuta en personas de mediana edad. Las mutaciones que afectan a la NADPH oxidasa dan lugar a inmunodeficiencia en las enfermedades granulomatosas

crónicas.

13 **E** Los niños y adultos con anemia drepanocítica pueden beneficiarse del tratamiento con hidroxiurea, que aumenta la concentración de hemoglobina F en los eritrocitos, lo que interfiere en la polimerización de la hemoglobina S. Sin embargo, la respuesta terapéutica a la hidroxiurea precede con frecuencia al incremento de las concentraciones de hemoglobina F. La hidroxiurea también tiene un efecto antiinflamatorio, aumenta el volumen medio de los eritrocitos y es oxidada por los grupos hemo, de lo que se deriva la producción de óxido nítrico, que promueve la vasodilatación. Como las concentraciones de hemoglobina F siguen siendo elevadas durante los primeros 5-6 meses de vida, los pacientes con anemia drepanocítica típicamente no manifiestan la enfermedad en la lactancia. Debido a la afectación de ambas cadenas de β-globina, no se produce hemoglobina A_1 y las concentraciones de A_2 nunca son altas. La síntesis global de globina no va a aumentar, y la síntesis de globinas debe estar equilibrada para producir la hemoglobina normal. La hemólisis asociada a la formación de drepanocitos promueve la eritropoyesis, pero la concentración de hemoglobina S no varía. La hidroxiurea no desplaza significativamente la curva de disociación del oxígeno ni cambia la afinidad por el oxígeno de las distintas hemoglobinas.

14 **C** Aunque la β-talasemia menor y la ferropenia se caracterizan por eritrocitos hipocrómicos y microcíticos, no hay un aumento de hemoglobina A_2 en las situaciones de déficit de hierro. Una concentración sérica normal de ferritina también descarta ferropenia. A diferencia de la β-talasemia mayor, en la menor suele existir anemia leve sin disfunción de órganos importantes. Las enfermedades causantes de hemólisis y aumento de la eritropoyesis (p. ej., anemia hemolítica autoinmunitaria, paludismo) no alteran la composición de la producción de cadenas de β-globina. La anemia de las enfermedades crónicas puede simular ferropenia y talasemia menor respecto a la hipocromía y la microcitosis; sin embargo, la anemia de las enfermedades crónicas se asocia a un incremento de la concentración de ferritina sérica.

15 **C** El déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) es un

trastorno ligado al cromosoma X que afecta a cerca del 10% de los hombres afroamericanos. El déficit de esta enzima hace que la hemoglobina sufra alteraciones por compuestos oxidantes, incluidos fármacos tales como primaquina, sulfonamidas, nitrofurantoína y ácido acetilsalicílico (en dosis altas). Las infecciones también pueden causar daño oxidativo a la hemoglobina. Los cuerpos de Heinz son hemoglobina desnaturalizada y lesionan la membrana eritrocítica, lo que da lugar a hemólisis intravascular. Las «células mordidas» aparecen como consecuencia del empeño de los excesivamente entusiastas macrófagos esplénicos en extraer los cuerpos de Heinz, lo que añade un componente de hemólisis extravascular. Las personas heterocigotas con α-talasemia (uno o dos genes anómalos de un total de cuatro genes de α-globina) no tienen problemas importantes, pero en el caso de la α-talasemia mayor se suele producir la muerte perinatal. Del mismo modo, la β-talasemia menor y el rasgo drepanocítico son situaciones que, por lo general, no causan problemas importantes ni se relacionan con el consumo de fármacos. Las anomalías de la membrana eritrocítica, como la esferocitosis hereditaria (debida a una espectrina anómala), suelen producir anemia leve sin hemólisis significativa, y en ellas no hay sensibilidad a fármacos. Algunas anemias hemolíticas autoinmunitarias están relacionadas con fármacos, pero la hemólisis es predominantemente extravascular.

16 **C** Este es uno de los mecanismos de la talasemia β^{+}. Como habitualmente están implicados los intrones, los exones adyacentes permanecen y puede producirse cierto procesamiento alternativo normal, de modo que se sintetizan cadenas de β-globina, pero no en la cantidad suficiente como para que tenga lugar una producción adecuada de hemoglobina. Las demás opciones reseñadas ocasionan un bloqueo en la traducción, sin síntesis de cadenas de β-globina funcionales, situación típica de la talasemia β^{0}.

17 **D** La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es un trastorno resultante de un defecto de la membrana de las células madre producido por una mutación del gen *PIGA* que impide la expresión en la membrana de ciertas proteínas que precisan un

anclaje de glucolípidos. Entre estas se encuentran unas proteínas que protegen a las células de la lisis por parte del complemento activado espontáneamente. Como resultado, los eritrocitos, los granulocitos y las plaquetas son extremadamente sensibles a la actividad lítica del complemento. La lisis de eritrocitos es intravascular, de modo que los pacientes pueden tener hemoglobinuria (orina oscura). Se cree que los defectos de la función plaquetaria son los responsables de las trombosis venosas. Las infecciones de repetición se deberían a la alteración de las funciones de los leucocitos. Los pacientes con HPN pueden desarrollar leucemia aguda o anemia aplásica como complicaciones. Las mutaciones en la cadena de la β-globina generan hemoglobinopatías, como anemia drepanocítica. Los pacientes con mutaciones del factor V (Leiden) y protrombina G20210A pueden presentar trombosis, pero no hay anemia ni leucopenia. Las personas con déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) tienen un curso episódico por la exposición a compuestos, como algunos fármacos, que inducen hemólisis. Las mutaciones de la espectrina dan lugar a la esferocitosis hereditaria.

18 **F** El déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) predispone a la hemoglobina de los eritrocitos al daño oxidativo por fármacos como la primaquina y puede inducir hemólisis. El daño de los oxidantes a la hemoglobina produce inclusiones de hemoglobina desnaturalizada en los eritrocitos. Las inclusiones lesionan directamente la membrana celular, lo que causa hemólisis intravascular. La membrana de los eritrocitos dañados tiene menor capacidad de deformación, y el bazo retira estas células de la circulación. Los demás mecanismos mencionados no dependen directamente de fármacos. Las anemias hemolíticas con anticuerpos que recubren los eritrocitos aparecen en las enfermedades autoinmunitarias, en caso de transfusión previa y en la eritroblastosis fetal. La alteración de la maduración nuclear de los eritrocitos se produce como consecuencia del déficit de vitamina B_{12} o folato. Las talasemias se deben a una síntesis insuficiente de globina. La lisis por el complemento está potenciada en la hemoglobinuria paroxística nocturna, que se debe a mutaciones en el gen *PIGA.* La

fragmentación mecánica de los eritrocitos es característica de las anemias hemolíticas microangiopáticas, como la coagulación intravascular diseminada. Se observa una reducción de la capacidad de deformación de la membrana eritrocítica en pacientes con anomalías de las proteínas del citoesqueleto, como la espectrina; esta última causa la esferocitosis hereditaria.

19 **E** Esta paciente tiene una anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos calientes secundaria a lupus eritematoso sistémico (LES). Un resultado positivo en la prueba de Coombs indica la presencia de anticuerpos frente a los eritrocitos en el suero y la superficie de los eritrocitos. La mayoría de los casos de anemia hemolítica autoinmunitaria caliente son idiopáticos, pero una cuarta parte se producen en personas con una enfermedad autoinmunitaria identificable, como el LES; en otros casos, los fármacos son la causa. Las inmunoglobulinas que recubren los eritrocitos actúan de opsoninas y promueven la fagocitosis esplénica. En la hemólisis activa se observan eritrocitos nucleados porque la médula ósea compensa liberando eritrocitos inmaduros. Es más probable que la sepsis provoque una anemia hemolítica microangiopática. La mayor destrucción de eritrocitos en la esferocitosis hereditaria es extravascular y no está mediada por la inmunidad. Ciertas infecciones, como la mononucleosis y la producida por *Mycoplasma*, se asocian a una anemia hemolítica autoinmunitaria por anticuerpos fríos (con un título elevado de crioaglutininas).

20 **B** En la enfermedad por crioaglutininas hay anticuerpos (habitualmente IgM) recubriendo los eritrocitos. Los anticuerpos IgM se unen a los eritrocitos a temperaturas bajas en áreas periféricas del organismo y fijan el complemento; sin embargo, el complemento no resulta lítico a esta temperatura. Con el incremento de la temperatura en los órganos internos centrales, la IgM se disocia de la célula y el C3b permanece. La mayor parte de la hemólisis es extravascular, en las células del sistema mononuclear fagocítico, como las células de Kupffer del hígado o los macrófagos esplénicos, porque la cubierta de C3b del complemento actúa de opsonina. La IgG suele participar en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, que es crónica y

no se desencadena por el frío. El fenómeno de Raynaud aparece en las áreas más frías y expuestas del organismo, como los dedos de las manos y los pies. La paciente probablemente tenga un título elevado de crioaglutininas. La histamina se libera en las reacciones de hipersensibilidad de tipo I. La fibronectina es una glucoproteína adhesiva de la superficie celular que colabora en la cicatrización de los tejidos. La IgE está presente en los trastornos alérgicos.

21 **D** Los hallazgos apuntan a anemia hemolítica inmunitaria con prueba de Coombs positiva y a hiperbilirrubinemia indirecta. La anemia inmunohemolítica por crioaglutininas puede aparecer en neoplasias linfoides e infecciones por *Mycoplasma,* por el virus de Epstein-Barr, por el VIH, por el virus de la gripe y por citomegalovirus (CMV). La IgM se une a los eritrocitos en regiones periféricas más frías del organismo y, a continuación, fija el complemento. En las regiones centrales más cálidas, el anticuerpo se disocia, pero el complemento marca a los eritrocitos para su destrucción extravascular en el bazo; no obstante, hay una mínima hemólisis intravascular. El mayor recambio de eritrocitos aumenta el VCM y la concentración de bilirrubina, que será principalmente indirecta. La quimioterapia consigue suprimir la producción de la médula ósea, pero con más frecuencia la de todas las líneas celulares, y carece de un componente inmunitario. Aunque este paciente tiene una infección por CMV, la hepatitis por CMV probablemente aumentaría las concentraciones de bilirrubina directa e indirecta, pero no provocaría anemia. Un déficit de folato explicaría la macrocitosis, pero no una prueba de Coombs positiva. Los linfomas no hodgkinianos no suelen afectar al colon, pero esto podría causar hemorragia digestiva con las características de la ferropenia y microcitosis.

22 **C** Tiene anticuerpos circulantes dirigidos contra los eritrocitos que provocan anemia hemolítica. La prueba de antiglobulina (Coombs) indirecta detecta anticuerpos en el plasma. La prueba de antiglobulina (Coombs) directa detecta anticuerpos unidos a los eritrocitos. Las anemias hemolíticas autoinmunitarias pueden aparecer en las enfermedades autoinmunitarias, como lupus eritematoso sistémico en esta mujer. La mayor parte de la

hemólisis es extravascular, en el bazo, pero parte de ella es intravascular. El recuento de reticulocitos suele estar aumentado (policromasia) con hemólisis, y la concentración de haptoglobina sérica se encuentra reducida. Un aumento del nivel de dímero D apunta a anemia hemolítica microangiopática, pero el frotis de sangre periférica no muestra esquistocitos. La mayor fragilidad osmótica es una característica de los eritrocitos en la hemoglobinuria paroxística nocturna. La ligera macrocitosis de esta paciente indica un aumento de la reticulocitosis, no un déficit de vitamina B_{12}, y no hay hemólisis en la anemia perniciosa. El incremento de la concentración de ferritina sérica es típico de la anemia de las enfermedades crónicas (ascenso discreto) y de la hemocromatosis (aumento notable).

23 **B** Los traumatismos mecánicos de los eritrocitos son posibles pero no suelen ser graves. Pueden producirse tras un ejercicio enérgico que implique golpes repetidos a partes del organismo. La lisis mediada por el complemento es característica de las anemias inmunohemolíticas. La esferocitosis cursa con un aumento de la fragilidad osmótica. No es probable encontrar anemia drepanocítica en los grupos de población de los países reseñados, y no es frecuente que las personas con esta enfermedad jueguen al *rugby.* El secuestro esplénico se produce en las anemias hemolíticas debido a defectos de la membrana y anticuerpos.

24 **D** A lo largo de la historia de la humanidad, el paludismo ha influido en la mayor frecuencia del gen de la hemoglobina S. Las personas heterocigotas para la hemoglobina S tienen el rasgo drepanocítico. Son más resistentes al paludismo, especialmente a la forma más maligna, la causada por *P. falciparum,* porque los parásitos crecen poco o mueren con concentraciones bajas de oxígeno, quizá debido a las bajas concentraciones de potasio secundarias a la salida de potasio de los eritrocitos al adoptar estos la forma de hoz. El parásito del paludismo tiene problemas para completar su ciclo vital, incluso en células con cantidades moderadas de hemoglobina S, como las presentes en los heterocigotos, lo que otorga una ventaja selectiva a esas personas residentes en áreas endémicas de paludismo por *P.*

falciparum. *Borrelia burgdorferi* es la espiroqueta responsable de la enfermedad de Lyme. *Clostridium perfringens* puede producir gangrena gaseosa tras lesiones de tejidos blandos. *Cryptococcus neoformans* es causa de enfermedad granulomatosa en personas inmunodeprimidas. *Treponema pallidum* es el microorganismo infeccioso responsable de la sífilis. La infección por *Trypanosoma brucei* causa la enfermedad del sueño.

25 **A** Este recién nacido presenta con más probabilidad eritroblastosis fetal porque hay anticuerpos maternos recubriendo los eritrocitos fetales. Una hemorragia fetal-materna en el útero o en el momento del parto de una gestación previa (o por una transfusión anterior de sangre incompatible) sensibiliza a la madre, con la consiguiente producción de anticuerpos IgG irregulares. En las gestaciones posteriores, estos anticuerpos (a diferencia de los anticuerpos IgM producidos naturalmente) cruzan la placenta, se unen a los eritrocitos fetales y provocan hemólisis. En el pasado, la mayoría de los casos se debían a incompatibilidad Rh (p. ej., madre Rh negativo, feto Rh positivo) pero el uso de inmunoglobulina Rho (D) administrada en el momento del parto a madres Rh negativo ha eliminado prácticamente todos esos casos cuando se detectan. Sin embargo, otros antígenos de grupos sanguíneos menos frecuentes también pueden estar implicados en este proceso. Las demás enfermedades reseñadas no están mediadas por anticuerpos. Un defecto de la célula madre provoca anemia aplásica e inmunodeficiencia. La alteración de la síntesis de globinas se produce en la talasemia. La fragmentación mecánica de los eritrocitos es característica de las anemias hemolíticas microangiopáticas, como la coagulación intravascular diseminada, más típica de mujeres gestantes con complicaciones obstétricas. El daño oxidativo a la hemoglobina caracteriza el déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD). Se observa una reducción de la capacidad de deformación de la membrana eritrocítica en pacientes con anomalías de las proteínas del citoesqueleto, como la espectrina; esta última causa la esferocitosis hereditaria.

26 **E** Se trata de un paludismo terciano benigno. La picadura del mosquito *Anopheles* introduce esporozoítos, que se desplazan al

hígado para reproducirse. Los merozoítos resultantes se liberan al torrente sanguíneo e infectan los eritrocitos. La reproducción asexual dentro de los eritrocitos genera trofozoítos, y la hemólisis periódica con liberación de los parásitos produce las manifestaciones clínicas características. *Aspergillus* invade los vasos sanguíneos y causa trombosis, pero la hemólisis de eritrocitos es intrascendente. La babesiosis es mucho menos frecuente que el paludismo, resulta endémica en el noreste de EE. UU. y no produce fiebre episódica. *Dirofilaria* es el parásito cardíaco de los perros, que casi nunca infecta a las personas y no causa hemólisis. Del mismo modo que otras bacterias gramnegativas, *Escherichia coli* libera lipopolisacáridos, causantes de sepsis grave y posible coagulación intravascular diseminada, una anemia hemolítica microangiopática. *Wuchereria bancrofti* es un nematodo con preferencia por alojarse en los linfáticos.

27 **C** Las anemias hemolíticas inducidas por fármacos no son suficientemente frecuentes ni graves como para ser detectadas, porque la hemólisis es fundamentalmente extravascular. No obstante, muchos pacientes reciben fármacos, de modo que existe riesgo de reacciones farmacológicas, y este mecanismo mediado por la inmunidad debe diferenciarse de otras causas de anemia. Las cefalosporinas son los fármacos implicados con más frecuencia. El tratamiento consiste en la suspensión del fármaco, porque la mayoría de los casos se deben a la formación de anticuerpos dependiente del medicamento. Los déficits de nutrientes reducen la producción medular, de modo que la reticulocitosis será improbable. No es habitual que una coagulopatía intravascular diseminada curse con cifras normales de plaquetas. La infección por parvovirus puede suprimir la eritropoyesis de forma temporal en personas con eritrocitos normales, pero puede precipitar una crisis aplásica en aquellas con hemoglobinopatías. Los individuos con eritrocitos anómalos probablemente tendrán antecedentes de anemia. Las hemoglobinopatías no condicionan que la prueba de Coombs sea positiva.

28 **D** Este niño tiene paludismo cerebral; el frotis muestra numerosas formas en anillo de los parásitos en el interior de los

eritrocitos. La infección se produce por la picadura del mosquito *Anopheles.* Los parásitos infectan los eritrocitos y causan hemólisis y anemia. El paludismo por *P. falciparum* es el más grave. Los parásitos se liberan de las células a intervalos periódicos y provocan fiebre y escalofríos periódicos. Los parásitos se adhieren al endotelio vascular y provocan isquemia en varios órganos, incluido el encéfalo, con el consiguiente edema cerebral agudo. Hay también anemia hemolítica. El hígado y el bazo aumentan de tamaño progresivamente. La babesiosis es una enfermedad infrecuente transmitida por garrapatas en el noreste de EE. UU. que puede producir anemia hemolítica, pero los microorganismos ocasionan una «tétrada» clásica en los eritrocitos. La enfermedad de Lyme, causada por *Borrelia burgdorferi,* causa sobre todo artritis crónica, pero también puede complicarse con meningoencefalitis, neuritis y neuropatía. La leishmaniosis, debida a *Leishmania donovani,* provoca, principalmente, enfermedad visceral sin alteraciones cerebrales. La enfermedad del sueño, cuyo responsable es *Trypanosoma brucei,* es una enfermedad crónica o bien se manifiesta de forma más aguda con disfunción encefálica (enfermedad del sueño). *Wuchereria bancrofti* produce filariasis linfática con elefantiasis.

29 **C** Ante una microcitosis de los eritrocitos hay que considerar la anemia ferropénica. Podría tratarse de un déficit nutricional en niños y mujeres gestantes, pero con más frecuencia se debe a una pérdida crónica de sangre en adultos. La concentración de ferritina es una medida de los depósitos de hierro porque se obtiene a partir del conjunto global de los depósitos del organismo en el hígado, el bazo y la médula ósea. Cerca del 80% del hierro corporal funcional está en la hemoglobina; el resto se encuentra en la mioglobina del músculo. Las personas con hepatopatía grave pueden presentar una concentración sérica de ferritina elevada por su liberación de los depósitos hepáticos. Una biopsia de médula ósea constituye un buen indicador de los depósitos de hierro, porque la tinción para este metal en la médula muestra la hemosiderina de los macrófagos, pero dicha biopsia es una técnica cara. Algunos pacientes con hemoglobinopatías, como β-talasemias, también tienen anemia

microcítica, pero esto es mucho menos frecuente que la ferropenia. La concentración sérica de haptoglobina disminuye en la hemólisis intravascular, pero la anemia es normocítica porque el hierro se recicla. La concentración sérica de hierro o la de transferrina, por sí mismas, no informan de los depósitos de hierro: en la anemia de las enfermedades crónicas la concentración de hierro del paciente es normal o baja, igual que la de transferrina, pero los depósitos de hierro son mayores. La transferrina, una proteína sérica de transporte del hierro, suele tener una saturación de hierro en torno al 33%.

30 **E** La figura muestra hipocromía y microcitosis de los eritrocitos, compatible con ferropenia, la causa más frecuente de anemia en todo el mundo debido a déficit nutricional o pérdida crónica de sangre. La falta de hierro altera la síntesis del hemo. La respuesta de la médula ósea es «hacer recortes» a los eritrocitos, lo que ocasiona anemia hipocrómica y microcítica. En personas de la edad de este paciente hay que sospechar, sobre todo, que la causa de la ferropenia sea una pérdida de sangre por una neoplasia maligna oculta, como adenocarcinoma de colon. Una anemia hemolítica autoinmunitaria daría la imagen de anemia normocítica o con un ligero aumento del VCM con reticulocitosis pronunciada. La macrocitosis acompaña a los antecedentes de alcoholismo crónico, probablemente por una mala dieta y un déficit de folato. Las talasemias pueden producir microcitosis, pero la β-talasemia mayor causa anemia grave poco después del nacimiento, y no es probable que la persona llegue a cumplir 73 años. Con la edad de este paciente, la hemofilia A habría producido problemas articulares; como las hemorragias se producen principalmente en tejidos blandos sin pérdida de sangre, el hierro se recicla. El déficit de vitamina B_{12} también es causa de anemia macrocítica.

31 **C** La absorción intestinal de hierro está controlada rigurosamente. Cuando los depósitos corporales son adecuados, la absorción de hierro de la dieta a través de DMT-1 se retrasa en el duodeno, y se inhibe la liberación de hierro de los depósitos. Si los depósitos de hierro del organismo disminuyen, como sucede en la pérdida crónica de sangre, la absorción de hierro aumenta. Se ha descubierto que el péptido plasmático

hepcidina, de origen hepático, es el regulador de la absorción de hierro. Las concentraciones de hepcidina aumentan cuando los depósitos son abundantes. Ese control tan exquisito de la absorción de hierro puede fallar, como sucede en los pacientes con eritropoyesis ineficaz (p. ej., β-talasemia), en los que se sigue absorbiendo hierro a pesar del exceso de los depósitos de este metal. Las concentraciones de hepcidina son inadecuadamente bajas en caso de hemocromatosis hereditaria y adquirida. El DMT-1 es un transportador de hierro que traslada el hierro no ligado al hemo desde la luz intestinal hasta el epitelio duodenal. La hemosiderina es una forma de ferritina en agregados que no circula y solo está presente en los tejidos. Las mutaciones del gen *HFE,* que codifica una proteína transmembrana de tipo HLA, conducen a una absorción excesiva del hierro dietético y a hemocromatosis. La transferrina transporta hierro entre el plasma, los depósitos y los eritroblastos en desarrollo.

32 **A** La concentración de ferritina aumentada y la capacidad total de fijación de hierro reducida son típicas de la anemia de las enfermedades crónicas, como en las enfermedades autoinmunitarias. Una concentración mayor de citocinas, como la interleucina 6, provocan un aumento de la producción hepática de hepcidina que impide a la ferroportina liberar hierro de los depósitos, promoviendo así el secuestro del hierro almacenado, con un escaso uso para la eritropoyesis. La secreción de eritropoyetina por el riñón es insuficiente. Varias enfermedades subyacentes, como el cáncer, las enfermedades del tejido conjuntivo y las infecciones crónicas, producen este tipo de anemia. La ferropenia causaría una anemia microcítica, con baja concentración de ferritina sérica y menor producción de hepcidina. La anemia aplásica es improbable porque el recuento de plaquetas y el de leucocitos son normales. Las anemias megaloblásticas son macrocíticas sin aumento de los depósitos de hierro. Las anemias hemolíticas microangiopáticas están causadas por enfermedades agudas graves, como coagulación intravascular diseminada; estos pacientes tienen trombocitopenia secundaria a trombosis generalizadas. La talasemia menor es infrecuente y no se asocia a una prueba de

ANA positiva.

33 **C** La concentración de hierro y la capacidad de fijación del hierro son bajas; sin embargo, a diferencia de lo que sucede en la anemia ferropénica, la concentración sérica de ferritina está elevada. Este aumento es típico de la anemia de las enfermedades crónicas. En este caso, la enfermedad crónica es artritis reumatoide. Las enfermedades inflamatorias crónicas o las neoplásicas subyacentes aumentan la secreción de citocinas tales como la interleucina 1, el interferón γ y el factor de necrosis tumoral. Estas citocinas promueven el secuestro del hierro en los compartimentos de depósito y reducen la producción de eritropoyetina. Las anemias hemolíticas por autoanticuerpos tienen lugar en varias enfermedades autoinmunitarias, como el lupus eritematoso sistémico, pero no son habituales en pacientes con artritis reumatoide, como el de este caso. Una haptoglobina sérica normal descarta hemólisis intravascular; el hierro se recicla rápidamente. La alteración de la síntesis de β-globina causa las β-talasemias, caracterizadas también por hemólisis. La lisis del complemento está potenciada en la hemoglobinuria paroxística nocturna, secundaria a mutaciones del gen *PIGA.* Los pacientes con este trastorno tienen antecedentes de infecciones. El secuestro esplénico de los eritrocitos tiene lugar cuando las membranas eritrocíticas son anómalas, como sucede en la esferocitosis hereditaria y la anemia drepanocítica, o los eritrocitos están recubiertos de anticuerpos, como en las anemias hemolíticas autoinmunitarias. Las metástasis son lesiones ocupantes de espacio (proceso mieloptísico) que pueden producir leucoeritroblastosis, con eritrocitos nucleados y leucocitos inmaduros en el frotis de sangre periférica.

34 **A** El alcoholismo crónico puede provocar déficit de folato, que conduce a la anemia megaloblástica. El ácido fólico y la vitamina B_{12} actúan como coenzimas en las vías de síntesis del ADN. Un déficit de cualquiera de los dos altera el proceso de maduración nuclear normal. Los núcleos de las células hematopoyéticas siguen siendo grandes y de aspecto primitivo, lo que da lugar a megaloblastos. Los eritrocitos maduros son más grandes de lo normal (macrocitos). Los neutrófilos suelen mostrar una

segmentación defectuosa, puesta de manifiesto por lóbulos nucleares adicionales. El defecto de la maduración nuclear afecta a todas las células de división rápida del organismo. Los pacientes con alcoholismo crónico pueden tener trombocitopenia y leucopenia, con frecuencia por hiperesplenismo secundario (cirrosis alcohólica, que provoca esplenomegalia). Los eritrocitos policromatófilos representan reticulocitos, y su número es bajo por la incapacidad de la médula ósea de producir una cifra correcta de eritrocitos a pesar de la anemia. Las anemias hemolíticas, en las que los eritrocitos están recubiertos de anticuerpos, aparecen en las enfermedades autoinmunitarias, en caso de transfusiones previas y en la eritroblastosis fetal. Las hemoglobinopatías son una causa posible de ligera macrocitosis porque se liberan más reticulocitos. El desequilibrio en la síntesis de cadenas de α-globina y β-globina, presente en las talasemias, conduce a la microcitosis de los eritrocitos. La lisis del complemento está potenciada en la hemoglobinuria paroxística nocturna, secundaria a mutaciones del gen *PIGA.* Se observa una reducción de la capacidad de deformación de la membrana eritrocítica en pacientes con anomalías de las proteínas del citoesqueleto, como la espectrina; esta última causa la esferocitosis hereditaria.

35 **B** Los eritrocitos en lágrima (dacriocitos) son indicativos de trastorno mieloptísico (es decir, algo que ocupa la médula ósea, como tejido conjuntivo fibroso). La leucoeritroblastosis, con eritrocitos y leucocitos inmaduros, es indicativa, sobre todo, de mielofibrosis. La esplenomegalia también se aprecia típicamente en la mielofibrosis. En pacientes con infecciones y metástasis en la médula ósea se observa, asimismo, una imagen leucoeritroblástica. La hiperplasia de normoblastos eritroides aparece en las anemias hemolíticas, pero estas no cursan con leucoeritroblastosis. La sustitución de la médula ósea por grasa se produce en la anemia aplásica, caracterizada por pancitopenia. La presencia de megaloblastos en la médula ósea es indicativa de déficit de folato o vitamina B_{12}: en ambos casos se produce anemia macrocítica. Una médula ósea repleta de mieloblastos es típica de la leucemia mieloide aguda. En esta

enfermedad, la sangre periférica también mostraría muchos mieloblastos y fracaso de la maduración mieloide.

36 **C** Aunque el déficit de folato y el de vitamina B_{12} dan lugar a anemia macrocítica, la falta de vitamina B_{12} también puede condicionar la desmielinización de los cordones posteriores y laterales de la médula espinal. En algunos casos este déficit solo se pone de manifiesto por concentraciones elevadas de homocisteína y ácido metilmalónico en el suero, porque estos son indicadores más sensibles, especialmente en las primeras etapas de la enfermedad. La anemia secundaria al déficit de vitamina B_{12} se alivia con una mayor administración de folato: este enmascara la posible lesión neurológica al mejorar la anemia. Sin embargo, el tratamiento del déficit de vitamina B_{12} no mejora la anemia causada por falta de folato. No es probable que un déficit nutricional origine una anemia aplásica. El folato no tiene ningún cofactor para absorberse, pero la vitamina B_{12} debe asociarse al factor intrínseco secretado por las células parietales gástricas, y después el complejo se absorbe en el íleon terminal, de modo que enfermedades como las gastritis y la enfermedad de Crohn afectan a la absorción de vitamina B_{12} más que a la de folato. El frotis de sangre periférica tendría el mismo aspecto y no aportaría información para diferenciar estos déficits.

37 **E** El alto VCM indica macrocitosis importante, mayor a la esperable solo por la reticulocitosis. Las dos causas más conocidas de ese tipo de anemia (denominada anemia megaloblástica cuando se observan los precursores megaloblásticos típicos en la médula ósea) son déficit de vitamina B_{12} y folato. Como el complejo vitamina B_{12}-factor intrínseco se absorbe en el íleon terminal, la resección de este segmento causa déficit de vitamina B_{12}. Por lo general, la anemia de las enfermedades crónicas es normocítica. La pérdida crónica de sangre y la ferropenia producen anemia microcítica, al igual que el déficit de hierro en la dieta. No es probable que aparezca anemia hemolítica varias semanas después de la transfusión de sangre. Las enfermedades inflamatorias intestinales (p. ej., enfermedad de Crohn) aumentan el riesgo de neoplasias

malignas, pero las anemias mieloptísicas (por lesiones ocupantes de espacio en la médula ósea) suelen ser normocíticas o ligeramente macrocíticas (debido a la reticulocitosis).

38 **A** La anemia aplásica provoca pancitopenia marcada. Muchos casos son idiopáticos, aunque en algunos sigue a exposiciones tóxicas a fármacos quimioterápicos o a sustancias químicas, como el benceno. En otros se produce después de hepatitis víricas. Un defecto intrínseco de las células madre o la supresión de estas por linfocitos T pueden intervenir en el desarrollo de la anemia aplásica. La hemólisis es improbable porque la concentración de bilirrubina es normal y no hay antecedentes de enfermedades autoinmunitarias. La mayor susceptibilidad a la lisis por el complemento se encuentra en la hemoglobinuria paroxística nocturna como resultado de mutaciones del gen *PIGA*. No es probable que se trate de metástasis con la edad de este paciente, que no refiere enfermedades previas; las metástasis producen con más frecuencia una imagen leucoeritroblástica en la sangre periférica. El secuestro de células de la sangre periférica en un bazo agrandado podría justificar una pancitopenia leve, pero en este caso no hay esplenomegalia.

39 **D** La telomerasa suele estar presente en células que se dividen continuamente, como las células madre hematopoyéticas, para prevenir el acortamiento de los telómeros cromosómicos; de no ser así, los cromosomas acortados no se dividirían correctamente. Se han encontrado formas genéticas y adquiridas de anemia aplásica que muestran este mecanismo. La fosfatasa alcalina participa en el remodelado óseo. El déficit de ADAMTS13, una metaloproteinasa, puede provocar la acumulación de grandes polímeros de von Willebrand que promueven la formación de microagregados plaquetarios, con desarrollo de púrpura trombótica trombocitopénica (PTT). El déficit de piruvato cinasa es un tipo infrecuente de anemia congénita. Las tirosina cinasas participan en la regulación del crecimiento celular y son más conocidas por su implicación en los síndromes mieloproliferativos.

40 **B** La pancitopenia y la ausencia de reticulocitosis apuntan principalmente a una insuficiencia de la médula ósea. La anemia

aplásica no tiene una causa obvia en la mitad de los casos. En otros es posible identificar fármacos y toxinas; los medicamentos más asociados a este efecto son los quimioterápicos. Se identifica una infección vírica precedente en algunos pacientes, pero las infecciones bacterianas casi nunca causan anemia aplásica. Las personas con pancitopenia pueden sufrir trastornos hemorrágicos por el bajo recuento plaquetario, así como infecciones debido a los escasos neutrófilos. La información sobre los hábitos dietéticos no sería útil porque el cuadro clínico y los hallazgos de laboratorio de la paciente no son característicos de la ferropenia ni de los déficits de folato o vitamina B_{12}. La única causa familiar conocida de anemia aplásica (anemia de Fanconi) es infrecuente. El historial menstrual sería relevante si la paciente presentara una anemia hipocrómica microcítica.

41 **E** El adenocarcinoma prostático del paciente ha metastatizado en la médula ósea. La concentración de fosfatasa alcalina elevada, la hipercalcemia y el patrón leucoeritroblástico en la sangre periférica (eritrocitos y leucocitos inmaduros) son consecuencia de que el tumor se comporta como una lesión ocupante de espacio. Estas anemias mieloptísicas también pueden estar causadas por infecciones. La anemia de las enfermedades crónicas es leve. No es probable que las anemias aplásicas se acompañen de leucoeritroblastosis. La anemia hemolítica debería cursar con un aumento de la concentración de bilirrubina y con ausencia de anomalías del metabolismo del calcio. El VCM no está en el intervalo megaloblástico en este caso.

42 **A** La paciente tiene miastenia grave con un timoma y aplasia eritroide. El edrofonio, inhibidor de la acetilcolinesterasa, contrarresta el efecto de los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina de la miastenia grave, pero no mejora la función muscular en caso de los anticuerpos dirigidos a los canales de calcio regulados por voltaje en el síndrome miasténico de Lambert-Eaton (síndrome paraneoplásico asociado habitualmente al carcinoma de células pequeñas de pulmón). Los hallazgos pulmonares apuntan a insuficiencia cardíaca, y la taquicardia es sugestiva de insuficiencia cardíaca congestiva de

alto gasto debida a la anemia. La aplasia eritroide pura puede ser primaria o secundaria a neoplasias, especialmente a tumores del timo, y a trastornos autoinmunitarios. La linfocitosis sería característica de la leucemia linfocítica, pero esta no afectaría a la fuerza muscular, y la leucemia/linfoma linfoblástico produce masas mediastínicas en personas mucho más jóvenes. La hiperplasia de megacariocitos suele aparecer ante un consumo periférico de plaquetas, en trastornos tales como la púrpura trombocitopénica inmunitaria (PTI), que no se asocia habitualmente a un timoma. La mayoría de los timomas se comportan de forma benigna y no provocan metástasis diseminadas. La mielofibrosis podría producir anemia con cansancio y debilidad, pero no predominantemente con el movimiento repetitivo. La plasmocitosis se asocia a un mieloma en la médula ósea, no en el mediastino.

43 **D** El golpe de calor causado por la hipertermia y la falta de sudoración secundaria a la deshidratación está produciendo hemoconcentración con policitemia relativa (obsérvese la elevada concentración sérica de sodio). La eritroleucemia es bastante infrecuente, y los pacientes que la sufren están demasiado enfermos como para participar en una carrera. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una causa de policitemia secundaria por hipoxemia crónica, pero no provoca hemoconcentración. La diabetes insípida se produce por la falta de liberación de hormona antidiurética, que conduce a pérdida de agua libre y deshidratación, no a hipertermia. El aumento de las concentraciones de eritropoyetina se observa en las policitemias secundarias, incluidas las asociadas a hipoxemia crónica (grandes alturas o enfermedad pulmonar) y a neoplasias secretoras de eritropoyetina (síndrome paraneoplásico). La policitemia vera es un tipo de síndrome mieloproliferativo que cursa con concentraciones bajas de eritropoyetina, sin deshidratación.

44 **A** Algunos pacientes con síndrome antifosfolipídico (SAF) tienen lupus eritematoso sistémico, pero otros no (como esta paciente). En el SAF pueden aparecer trombosis arteriales y venosas profundas, con un mayor riesgo, especialmente, de trombosis arteriales cerebrales. Los anticuerpos anticardiolipina

a menudo dan lugar a un falso positivo en la prueba serológica de la sífilis (infección por *Treponema pallidum*). Con frecuencia hay trombocitopenia. Siempre se debe considerar el SAF en mujeres con abortos de repetición. La policitemia vera es un síndrome mieloproliferativo que predispone a la trombosis, pero la cifra de hemoglobina de esta paciente no respalda ese diagnóstico. La tromboflebitis es más frecuente en la gestación, pero esto solo explicaría la trombosis y no los anticuerpos anticardiolipina. El síndrome de Trousseau, un estado de hipercoagulabilidad asociado a neoplasias malignas ocultas, podría justificar las trombosis venosas y arteriales, pero no los anticuerpos anticardiolipina. La edad de esta paciente es un argumento en contra del cáncer. La enfermedad de von Willebrand es un trastorno hemorrágico sin complicaciones trombóticas.

45 **A** La presencia de trombocitopenia, el aumento de los tiempos de protrombina y tromboplastina parcial y de los productos de degradación de la fibrina, y la baja concentración de fibrinógeno son sugestivos de coagulación intravascular diseminada (CID), probablemente causada por la retención del feto muerto. Esta complicación obstétrica conduce a CID a través de la liberación de tromboplastinas del feto. Las tromboplastinas causan trombosis microvasculares generalizadas y consumo de factores de la coagulación y plaquetas. No hay alteración de la función plaquetaria. No se produce lesión del endotelio ni de la pared vascular. La producción de plaquetas es normal, pero las plaquetas se consumen en la trombosis generalizada de pequeños vasos.

46 **E** La sepsis por gramnegativos con lesión endotelial generalizada causa coagulación intravascular diseminada. La figura muestra eritrocitos fragmentados, incluidas células «en casco», típicas de trastornos capaces de producir anemia hemolítica microangiopática, como coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica, lupus eritematoso sistémico, síndrome urémico hemolítico e hipertensión maligna. Esos eritrocitos fragmentados se llaman *esquistocitos.* En la anemia hemolítica autoinmunitaria la hemólisis también es extravascular y a veces se forman esferocitos. En la esferocitosis

hereditaria puede haber esferocitos, pero la destrucción de eritrocitos es extravascular y no aparecen eritrocitos fragmentados en la sangre periférica. Es posible la presencia de anisocitosis marcada y poiquilocitosis en las anemias ferropénica y megaloblástica, pero no se observa fragmentación de los eritrocitos.

47 **C** La tendencia hemorrágica de esta paciente se debe al bajo recuento de plaquetas. Lo más probable es que presente púrpura trombocitopénica inmunitaria (PTI) crónica idiopática, en la que las plaquetas son destruidas en el bazo tras ser recubiertas por anticuerpos contra las glucoproteínas IIb-IIIa o Ib-IX de la membrana plaquetaria. Estos anticuerpos recubren las plaquetas del paciente y las transfundidas. Como el bazo es el origen principal de los anticuerpos y el lugar de destrucción de las plaquetas, la esplenectomía resulta útil si los corticoesteroides fracasan. No hay defectos en la producción de plaquetas. La función plaquetaria es normal en la PTI. Una pérdida crónica de sangre no provoca trombocitopenia si la función de la médula ósea es normal. Las alteraciones de la interacción entre plaquetas y endotelio suelen causar trombosis. La supresión de las células madre pluripotenciales produce anemia aplásica, que se acompaña de pancitopenia.

48 **A** La púrpura trombocitopénica inmunitaria (PTI) aguda y la PTI crónica están causadas por autoanticuerpos frente a las plaquetas, pero la forma aguda aparece típicamente en niños tras una infección vírica. Si la médula ósea fuera aplásica, se reducirían todas las líneas celulares. La disfunción/déficit de las glucoproteínas IIb/IIIa aparece en la trombastenia de Glanzmann y en la PTI crónica. El escorbuto, causado por déficit de vitamina C, provoca un aumento de la fragilidad capilar con equimosis, no trombocitopenia. El déficit de metaloproteinasa del factor de von Willebrand es una característica de la púrpura trombótica trombocitopénica.

49 **B** La trombocitopenia inducida por heparina afecta al 3-5% de los pacientes tratados durante 1-2 semanas con heparina no fraccionada. Esos pacientes forman anticuerpos IgG contra el complejo heparina-factor plaquetario 4 que se unen a los receptores de Fc en la superficie de las plaquetas, lo que causa la

activación de estas y, paradójicamente, trombosis. El ácido acetilsalicílico tiene efectos antiagregantes que tardan días en aparecer y el riesgo principal es la hemorragia (no la trombosis). El activador del plasminógeno tisular y la urocinasa son compuestos fibrinolíticos: el primero se usa en el tratamiento agudo de trastornos tales como la trombosis coronaria, aunque el segundo también podría emplearse para la lisis de coágulos venosos. La warfarina se evitó en esta paciente por el déficit de proteína C; típicamente, se pasa de heparina a warfarina en los pacientes. El tratamiento con warfarina prolonga el tiempo de protrombina al interferir en la síntesis de los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K en el hígado.

50 **F** El diagnóstico de púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) se basa en la presencia de la pentalogía clásica: problemas neurológicos transitorios, fiebre, trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática e insuficiencia renal aguda. El diagnóstico se debe sospechar ante una actividad reducida de ADAMTS13. Hay un déficit de ADAMTS13, que actúa como proteasa de multímeros del factor de von Willebrand. La mayoría de los casos de PTT son idiopáticos y se asocian a anticuerpos contra ADAMTS13. La PTT hereditaria puede deberse a mutaciones en el gen de ADAMTS13. Las anomalías están producidas por minúsculos trombos de plaquetas y fibrina en los pequeños vasos de múltiples órganos. Con frecuencia, el corazón, el encéfalo y los riñones están gravemente afectados. De las demás opciones solo la coagulación intravascular diseminada es una anemia hemolítica microangiopática, pero carece de las demás manifestaciones de la PTT.

51 **E** Esta paciente tiene hepatitis C con daño grave de los hepatocitos. En el hígado se sintetizan muchos de los factores de la coagulación que resultan fundamentales para la medición *in vitro* de la vía extrínseca de la coagulación, determinada por el tiempo de protrombina. El aumento de los productos de degradación de la fibrina es sugestivo de una coagulopatía de consumo, como lo es la coagulación intravascular diseminada. El factor de von Willebrand lo producen las células endoteliales, no los hepatocitos. La agregación plaquetaria es una medida de la función de las plaquetas, que no resulta afectada

significativamente por las hepatopatías. Estas enfermedades no influyen directamente sobre el recuento plaquetario.

52 **B** Un trastorno hemorrágico hereditario con recuento plaquetario normal y tiempo de hemorragia prolongado apunta a enfermedad de von Willebrand, confirmado por el bioanálisis dependiente de ristocetina del factor de von Willebrand (vWF). La enfermedad de von Willebrand es un trastorno hemorrágico frecuente, con una prevalencia estimada del 1%. En la mayoría de los pacientes se hereda como rasgo autosómico dominante. En estos casos, la reducción de la cantidad de vWF altera la adhesión de las plaquetas a las paredes vasculares dañadas, con lo que la hemostasia se ve comprometida. Como el vWF actúa de transportador para el factor VIII, la concentración de esta proteína procoagulante (necesaria en la vía intrínseca) disminuye, como sucede en este caso. Sin embargo, las concentraciones de factor VIII casi nunca están tan reducidas como para ser clínicamente relevantes; quizá sucede en 1 de cada 10.000 personas. Un tiempo de tromboplastina parcial prolongado que se corrige con plasma normal refleja el déficit de factor VIII. Como la enfermedad no es un trastorno de las células madre, la insuficiencia de la médula ósea y los síndromes mieloproliferativos no son resultados probables. Las hemorragias articulares son características de la hemofilia A y B, no de la enfermedad de von Willebrand. Los pacientes con enfermedad de von Willebrand no están predispuestos a las trombosis, a diferencia de las personas con mutaciones del factor V (Leiden) y otros trastornos hereditarios de la anticoagulación.

53 **C** Un número reducido de plaquetas puede deberse a una menor producción o a una mayor destrucción. En este caso, el examen de la médula ósea muestra numerosos megacariocitos, lo que descarta una producción reducida. Una posible causa de destrucción acelerada es el hiperesplenismo, pero no hay esplenomegalia en este caso. La destrucción periférica de las plaquetas suele estar mediada por la inmunidad y puede asociarse a enfermedades autoinmunitarias bien conocidas, como el lupus eritematoso sistémico, o ser idiopática. Una vez descartadas todas las causas conocidas de trombocitopenia es

posible establecer el diagnóstico de púrpura trombocitopénica inmunitaria (PTI) idiopática. Esta paciente no parece tener más síntomas ni signos y carece de antecedentes de consumo de fármacos o infecciones capaces de causar trombocitopenia. La PTI es más probable. La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) es otra entidad que debe tenerse en cuenta, pero esta produce una anemia hemolítica microangiopática (AHMA) que típicamente se asocia a fiebre, insuficiencia renal y síntomas neurológicos. La coagulación intravascular diseminada (CID) es otra forma de AHMA. La hemofilia B, del mismo modo que la hemofilia A, cursa con hemorragias de tejidos blandos y el tiempo de tromboplastina parcial está prolongado, con un recuento plaquetario normal. Las metástasis pueden actuar como lesiones ocupantes de espacio en la médula ósea y reducir así la hematopoyesis, pero es improbable que esto sea selectivo de los megacariocitos y, en este caso, hay hiperplasia de megacariocitos. El déficit de vitamina K prolonga el tiempo de protrombina inicialmente y el tiempo de tromboplastina parcial si es grave, pero no afecta a las plaquetas. En la enfermedad de von Willebrand, las hemorragias se deben a una adhesión plaquetaria anómala, pero las cifras de plaquetas son normales.

54 **E** El déficit de ADAMTS13, debido a anticuerpos adquiridos contra esta metaloproteinasa o a una mutación de su gen, provoca la acumulación de grandes multímeros de von Willebrand que promueven la formación de microagregados plaquetarios, con desarrollo de una PTT caracterizada por la pentalogía de anemia hemolítica microangiopática, fiebre, alteraciones neurológicas, trombocitopenia e insuficiencia renal. La CID se debe a trastornos adquiridos que promueven el consumo de factores de la coagulación, no al déficit de metaloproteinasa. El SUH es muy parecido a la PTT, pero es más probable que se asocie a gastroenteritis infecciosa con diarrea previa. La TIH aparece en cerca del 5% de las personas que reciben heparina, y su complicación más grave son las trombosis generalizadas, arteriales y venosas. La complicación principal de la PTId es una hemorragia secundaria a la trombocitopenia.

55 **F** Las características clínicas (anomalías neurológicas, fiebre, trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática,

insuficiencia renal) son indicativas de púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), enfermedad en la que existe un déficit hereditario o adquirido de la metaloproteinasa (ADAMTS13) del factor de von Willebrand (vWF), que normalmente escinde multímeros de vWF de peso molecular muy alto. La ausencia de ADAMTS13 da lugar a grandes multímeros de vWF, que promueven la agregación generalizada de plaquetas, y las oclusiones microvasculares resultantes en el encéfalo, el riñón y otras zonas producen disfunción de órganos, trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática (AHMA) y hemorragias. Las toxinas circulantes, principalmente endotoxinas elaboradas por enterobacterias como *Escherichia coli*, son importantes en la génesis de la lesión endotelial del síndrome urémico hemolítico (SUH). Este presenta hallazgos clínicos similares a los de la PTT, pero su patogenia es diferente. Una actividad reducida del factor VIII es la característica de la hemofilia A, un trastorno ligado al cromosoma X, infrecuente en mujeres y caracterizado por hemorragias en tejidos blandos, como en las articulaciones, y número y función de las plaquetas normales. La alteración de la agregación plaquetaria en presencia de ADP y trombina es la marca distintiva de un trastorno hereditario infrecuente de las plaquetas llamado *trombastenia de Glanzmann*. La liberación de sustancias tromboplásicas por parte de células tumorales o un feto muerto retenido puede provocar una coagulación intravascular diseminada con AHMA, pero esta paciente no tiene ninguna fuente de tromboplastinas.

56 **E** La hemofilia A del paciente se controla mediante la actividad del factor VIII. Una hemofilia B con déficit de factor IX presentaría hallazgos similares, pero es mucho menos frecuente. La transfusión del factor VIII ayuda a prevenir hemorragias de articulaciones y de otros tejidos blandos. De las personas con hemofilia A, el 20% desarrollan un inhibidor del factor VIII, típicamente un anticuerpo IgG que neutraliza la actividad del factor VIII transfundido. En este caso, el tiempo de tromboplastina parcial (TTP) se corrige parcialmente, lo que indica que podría existir cierta cantidad de inhibidor. Las hemorragias mucocutáneas son más típicas de los trastornos de las plaquetas y de la enfermedad de von Willebrand. En la

hemofilia, las hemorragias suelen afectar a las articulaciones y otros tejidos blandos. El tiempo de protrombina (TP) es normal y los factores de la coagulación correspondientes a esta vía se fabrican en el hígado; en la vía intrínseca, el factor VIII se mide con el TTP. Las hemofilias A y B son trastornos hereditarios ligados al cromosoma X, de modo que el sexo masculino es el principal afectado. Excepcionalmente se producen mutaciones nuevas (como la de la Reina Victoria) que introducen el gen en una familia.

57 **B** La gravedad de la hemofilia A depende de la cuantía de la actividad del factor VIII. Con menos del 1% de actividad hay enfermedad grave y las hemorragias articulares son frecuentes y producen deformidades graves de las articulaciones y anquilosis. Las actividades ligeras (1-5%) y moderadas (5-75%) suelen ser asintomáticas excepto ante traumatismos importantes. La hemofilia A suele estar causada por un descenso de la actividad del factor VIII. Los pacientes afectados son hombres y algunos de sus familiares varones también están afectados (transmisión ligada al cromosoma X). El tiempo de tromboplastina parcial (TTP) está prolongado porque se necesita factor VIII para la vía intrínseca; el tiempo de protrombina (TP) es normal porque la vía extrínseca no depende de la función de este factor. La corrección del TTP al mezclar con plasma normal es importante. Con un déficit exclusivo de factor VIII, la adición de plasma normal, que aporta factor VIII, corrige el TTP. La ausencia de normalización del TTP con plasma normal indica la presencia de un inhibidor en el suero del paciente. Cerca del 15% de los pacientes con hemofilia desarrollan, en último término, un inhibidor del factor VIII. Las petequias, presentes en pacientes con trombocitopenia, no son características de la hemofilia. El déficit de factor VIII no afecta a la vida útil de los eritrocitos. Como las personas con déficit de factor VIII no precisan transfusiones de eritrocitos, la sobrecarga de hierro no es una consecuencia frecuente. La tendencia hemorrágica de la hemofilia no se asocia a esplenomegalia.

58 **B** La historia clínica de este caso es similar a la reflejada en la pregunta anterior; sin embargo, el tiempo de tromboplastina parcial (TTP) se corrige con plasma mixto normal. La paciente

presenta hemofilia B causada por déficit de factor IX y no hay inhibidores de este factor en el suero. ¿Cómo es esto posible en una mujer? La inactivación del cromosoma X («lionización desfavorable») explica este fenómeno y la tendencia a las hemorragias de las mujeres portadoras de hemofilia A o B. («Una vez descartado lo imposible, lo que queda es la verdad por improbable que parezca», señaló Sherlock Holmes en *El signo de los cuatro*.) Un análisis *in vitro* de una mezcla de múltiples plasmas agregados y plasma del paciente como este suele corregir las anomalías causadas por déficit de un factor procoagulante, pero si hay inhibidores de la coagulación en el plasma del paciente, la prueba de coagulación daría un resultado anómalo. La prueba de la mezcla descarta el síndrome antifosfolipídico. La púrpura trombocitopénica idiopática se caracteriza por la presencia de anticuerpos frente a las plaquetas y trombocitopenia. La púrpura trombótica trombocitopénica es una anemia hemolítica microangiopática caracterizada por la insuficiencia renal y alteraciones del sistema nervioso central. La enfermedad de von Willebrand está causada por una reducción de la adherencia plaquetaria y sus características se parecen a las de la trombocitopenia.

59 **B** La trombastenia de Glanzmann es un trastorno autosómico recesivo infrecuente con alteraciones de la agregación plaquetaria debidas a déficit o disfunción de la glucoproteína IIb/IIIa. Los estudios de agregación plaquetaria descritos son característicos de este trastorno. La coagulación intravascular diseminada condiciona el consumo de todos los factores de la coagulación y de las plaquetas, de modo que los tiempos de protrombina y tromboplastina parcial están prolongados en presencia de trombocitopenia. La púrpura trombocitopénica inmunitaria se debe a anticuerpos contra las glucoproteínas IIb/IIIa o Ib/IX de la membrana plaquetaria. El escorbuto secundario al déficit de vitamina C causa hemorragias de tejidos blandos y de la piel debidas a una mayor fragilidad capilar, pero el número y la función de las plaquetas son normales. La enfermedad de von Willebrand es uno de los trastornos hemorrágicos más frecuentes y aparece en relación con defectos cualitativos o cuantitativos del factor de von Willebrand.

60 **D** Los hallazgos corresponden a una reacción hemolítica transfusional (ABO); prácticamente la totalidad de estos casos son consecuencia de errores administrativos. Usted aprendió que una flebotomía correcta implica etiquetar los tubos inmediatamente después de extraer la sangre en lugar de entregárselos a alguien para que los marque, pues podrían mezclarse. Este cuadro no es compatible con una lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (LPART), en la que existen anticuerpos específicos frente a los granulocitos o HLA derivados del donante en el hemoderivado que están dirigidos contra antígenos de los leucocitos del receptor. Si bien sigue siendo posible, aunque poco frecuente, por las transfusiones de sangre, la infección por el virus de la hepatitis C tiene un período de incubación de meses. Es muy improbable que 2 unidades de concentrado de eritrocitos en una persona joven provoquen sobrecarga circulatoria. El paciente no presenta enfermedad del injerto contra el huésped asociada a la transfusión, trastorno infrecuente pero intratable que conlleva una tasa de mortalidad muy elevada.

61 **C** La lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (LPART) aparece cuando el plasma del donante contiene anticuerpos específicos frente a los granulocitos o HLA que corresponden a antígenos presentes en los leucocitos del receptor. Se liberan enzimas de los granulocitos, que aumentan la permeabilidad capilar y provocan edema agudo de pulmón con dificultad respiratoria. La LPART se produce más a menudo por la administración de hemoderivados con plasma, como plasma fresco congelado, y de hemoderivados donados por mujeres con más anticuerpos anti-HLA de gestaciones previas. Puede aparecer LPART cuando los granulocitos son «activados» por sensibilización en los capilares pulmonares debido a enfermedad pulmonar previa. No hay reacciones de transfusión a las proteínas sanguíneas albúmina y fibrinógeno. La transfusión de plaquetas puede causar aloinmunización y posterior destrucción de las plaquetas en la siguiente transfusión de plaquetas. Los eritrocitos incompatibles son una causa de aloinmunización, pero también pueden producir de forma aguda una reacción transfusional hemolítica.

62 **D** Como las plaquetas tienen que almacenarse a temperatura ambiente, es más probable que cualquier contaminación que tuviera lugar en el momento de la extracción, como, por ejemplo, por flora bacteriana de la piel del donante, cause sepsis en el receptor. Los demás productos reseñados están refrigerados, lo que reduce el crecimiento bacteriano. El microorganismo causante de la sífilis, *Treponema pallidum*, suele destruirse con la refrigeración.

CAPÍTULO

15

Pulmón

PEF9 Capítulo 15: Pulmón

PH9 Capítulo 12: Pulmón

1 Se realiza una ecografía fetal a una mujer de 24 años primigrávida a las 18 semanas de gestación y en ella se observa un índice de líquido amniótico normal, pero también se encuentra una extensa región ecógena en el pulmón derecho. El parto se produce a término y el feto no parece tener malformaciones externas, pero poco después de nacer desarrolla dificultad respiratoria. La TC muestra un pulmón izquierdo normal, pero se identifica un área de opacificación en el pulmón derecho irrigada por un vaso procedente de la aorta. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Secuestro extralobular
B Quiste del intestino anterior
C Enfermedad de membrana hialina
D Secuencia de oligohidramnios
E Fístula traqueoesofágica

2 Un hombre de 30 años es ingresado en el hospital tras un accidente de tráfico en el que sufre un traumatismo torácico cerrado. En la exploración se encuentran contusiones en el lado derecho del tórax, sin laceraciones. A la hora del accidente, experimenta de forma súbita dificultad respiratoria e importante dolor en el lado derecho. Las constantes vitales muestran que está afebril, con una frecuencia cardíaca de 80 latidos/min, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones/min con respiración superficial y presión arterial de 100/65 mmHg. El murmullo vesicular no es audible y existe timpanismo a la percusión del lado derecho. ¿Cuál de los siguientes hallazgos radiológicos muestra la figura en este caso?

A Fibrosis intersticial
B Infiltrados parcheados
C Derrame pleural
D Neumotórax
E Desequilibrio ventilación/perfusión



3 Un hombre de 58 años con una cardiopatía isquémica se somete a cirugía de derivación de la arteria coronaria bajo anestesia general. A los 2 días de la intervención presenta dificultad respiratoria creciente con reducción de la saturación de oxígeno arterial. En la exploración se encuentran una frecuencia cardíaca regular de 78 latidos/min, una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones/min y una presión arterial de 135/85 mmHg. La concentración de hemoglobina no ha cambiado y sigue en 13,7 g/dl desde la intervención. La situación del paciente mejora cuando expulsa una gran cantidad de esputo mucoide con la tos. ¿Cuál de los siguientes tipos de atelectasia es más probable que padezca el paciente?

A De compresión
B De contracción
C Microatelectasia
D De relajación
E De reabsorción

4 Un hombre de 45 años sufre un traumatismo torácico cerrado durante un accidente de navegación. En la exploración refiere mucho dolor en la pared torácica derecha. La radiografía de tórax muestra una fractura de la séptima costilla derecha. Durante los 2 días siguientes aparece una tumefacción de los tejidos blandos subcutáneos con crepitantes indoloros a la palpación de la pared torácica derecha. ¿La fuga de cuál de las siguientes sustancias es más probable que sea la causa de esta tumefacción?

A Ácido
B Aire
C Sangre
D Linfa
E Pus

5 Un hombre de 68 años refiere disnea y ortopnea progresivas durante los últimos 3 años con aumento de la producción de un esputo espumoso. En la exploración se auscultan crepitantes en las bases pulmonares. La radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales bilaterales, líneas B de Kerley definidas y un borde izquierdo del corazón llamativo. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de Na^+ de 135 mmol/l; de K^+ de 3,8 mmol/l; de Cl^- de

99 mmol/l; de CO_2 de 25 mmol/l; de glucosa de 76 mg/dl; de creatinina de 1,5 mg/dl, y de nitrógeno ureico de 30 mg/dl. La fracción de excreción de sodio es inferior al 1%. Las concentraciones de renina plasmática, aldosterona y hormona antidiurética están elevadas. La concentración de péptido natriurético de tipo B (BNP) es de 200 pg/ml (normal: < 100 pg/ml). ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable que tenga el paciente?

A Aldosteronoma
B Atrofia bilateral de la suprarrenal
C Glomerulonefritis crónica
D Cardiopatía isquémica
E Fibrosis pulmonar
F Carcinoma de células pequeñas

6 Una mujer de 26 años con sepsis posparto y que recibe tratamiento con antibióticos está afebril, pero la oxigenación se ha deteriorado en los últimos 3 días. La radiografía de tórax muestra opacificaciones pulmonares bilaterales dispersas. La gammagrafía de ventilación-perfusión revela áreas de desajuste. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos es más probable que se encuentre en el pulmón de esta paciente?

A Membranas hialinas alveolares
B Lesiones plexiformes arteriales
C Fibrosis intersticial
D Infiltrados linfocíticos
E Destrucción de los bronquíolos respiratorios

7 Tras una hemicolectomía para resección de un carcinoma de colon, un hombre de 56 años desarrolla dificultad respiratoria. Se intuba y somete a ventilación mecánica con oxígeno al 100%. A los 3 días, la saturación arterial de oxígeno disminuye hasta un 60%. La radiografía de tórax revela una opacificación creciente de todos los campos pulmonares. La biopsia transbronquial del pulmón muestra membranas hialinas que delimitan unos conductos y sacos alveolares distendidos. ¿A cuál de los siguientes mecanismos es más probable que se deban estos cambios morfológicos?

A Aspiración de contenido bucofaríngeo
B Trombos intravasculares con coagulopatía
C Daño mediado por los leucocitos de los capilares alveolares

D Menor producción de surfactante
E Liberación por los macrófagos de citocinas fibrogénicas

8 Un hombre de 48 años ha notado una disnea progresiva con pérdida de 4 kg de peso durante los últimos 2 años. Ha fumado dos paquetes diarios durante 20 años, pero lo ha dejado durante el último año. La exploración física muestra un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. A la auscultación destaca una reducción del murmullo vesicular. La radiografía de tórax revela unos pulmones hiperclaros bilaterales, y esta claridad es especialmente importante en los campos superiores. Las pruebas de función pulmonar indican una reducción importante del FEV_1, pero la CVF es normal y el cociente FEV_1/CVF está disminuido. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que contribuya a la patogenia de esta enfermedad?

A Alteraciones en el transporte del ión cloruro en las células epiteliales
B Reducción de la motilidad ciliar con brazos de dineína irregulares
C Alteración en la liberación hepática de α_1-antitripsina
D Reclutamiento de macrófagos y liberación del interferón γ
E Liberación de elastasa por los neutrófilos

9 Un hombre de 20 años, que estaba sano previamente, se tropieza y cae al suelo una mañana mientras corre por la calle. De forma súbita experimenta una disnea muy pronunciada. En la exploración en urgencias no se consigue auscultar el murmullo vesicular en el lado derecho del tórax. La radiografía de tórax muestra desplazamiento del mediastino de derecha a izquierda. Se coloca un tubo de tórax en el lado derecho y se observa salida de aire. ¿Cuál de las siguientes patologías de base es probable que haya producido esta complicación?

A Asma
B Bronquiectasias
C Enfisema centroacinar
D Bronquitis crónica
E Enfisema acinar distal
F Enfisema panlobulillar

10 Un hombre de 49 años ha presentado disnea progresiva durante los últimos 4 años. En ocasiones ha tenido tos mínimamente

productiva. En la exploración física se detecta una hiperresonancia pulmonar con sibilancias espiratorias. Las pruebas de función pulmonar muestran un aumento de la capacidad pulmonar total (CPT) con un ligero aumento de la CVF y una reducción del FEV_1 y del cociente FEV_1/CVF. La gasometría arterial revela un pH de 7,35; una Po_2 de 65 mmHg, y una Pco_2 de 50 mmHg. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos cabe sospechar que produzca estos hallazgos con mayor frecuencia?

A Enfisema centrolobulillar
B Embolia pulmonar crónica
C Daño alveolar difuso
D Asma no atópica
E Sarcoidosis
F Silicosis



11 Un hombre de 33 años refiere disnea progresiva durante los últimos 8 años. No fuma. En la exploración se observa una reducción del murmullo vesicular en los campos pulmonares inferiores. La radiografía de tórax revela aplanamiento de los

diafragmas; la figura corresponde a su TC. Las pruebas de función pulmonar muestran una reducción de la DLCO y del FEV_1, junto con un aumento de la CVF. La gasometría arterial muestra una Po_2 de 65 mmHg; una Pco_2 de 60 mmHg; HCO_3^- de 32 mEq/l, y un pH de 7,35. Uno de sus hermanos tiene un proceso parecido. ¿Cuál es el mecanismo más probable de esta enfermedad pulmonar?

A Atopia con unión de IgE a los mastocitos
B Mutación del gen *CFTR*
C Aumento de las proteasas de los neutrófilos
D Infección previa por tuberculosis
E Menor actividad antielastasa

12 Un hombre de 45 años ha fumado dos paquetes diarios durante 20 años. Durante los últimos 4 años ha tenido tos crónica, con abundante producción de esputos mucoides. Durante el último año ha presentado múltiples infecciones respiratorias que se han diagnosticado como «gripes». También ha desarrollado dificultad respiratoria, opresión torácica y sibilancias audibles. La dificultad respiratoria se alivia mediante la inhalación de un agonista β-adrenérgico y desaparece cuando se resuelve la infección torácica. ¿Cuál de las siguientes patologías es más probable que sea la responsable de su situación clínica?

A Deficiencia de α_1-antitripsina con enfisema panlobulillar
B Enfisema centrolobulillar con corazón pulmonar
C Bronquitis crónica asmática
D Fibrosis quística con bronquiectasias
E Neumonitis por hipersensibilidad con neumopatía restrictiva

13 Se realiza un estudio sobre pacientes fumadores de al menos un paquete diario durante 30 años. Se somete a pruebas de función pulmonar a estos pacientes, y se encuentra que un subgrupo importante de ellos tienen una reducción de FEV_1, una CVF de normal a reducida y cocientes FEV_1/CVF inferiores al 70%. Se analizan los datos de autopsia del subgrupo de individuos del estudio con un cociente FEV_1/CVF bajo. ¿Cuál de las siguientes estructuras respiratorias pulmonares es más probable que resulte afectada por el proceso patológico de base?

A Conducto alveolar
B Saco alveolar

C Bronquios
D Bronquíolo respiratorio
E Bronquíolo terminal

14 Un hombre de 62 años es fumador y refiere antecedentes de 10 años de tos con expectoración de un esputo mucopurulento abundante. Durante los últimos 6 meses ha desarrollado disnea progresiva. La exploración física revela edema pedio bilateral y un aumento del tamaño del hígado, aunque se aprecia blando. La radiografía de tórax muestra derrame pleural bilateral y un borde cardíaco derecho prominente. La gasometría arterial muestra una P_{O_2} de 60 mmHg; una P_{CO_2} de 52 mmHg; HCO_3^- de 29 mEq/l, y un pH de 7,3. Se intuba al paciente y se conecta al respirador y necesita cada vez más cantidad de oxígeno. ¿Cuál de los siguientes hallazgos microscópicos es más probable encontrar en los pulmones afectados?

A Distribución broncovascular de los granulomas
B Carcinoma que ocupa los espacios linfáticos
C Fibrosis intersticial extensa
D Hipertrofia de las glándulas submucosas bronquiales
E Infiltrados mucosos por eosinófilos

15 Una niña de 12 años tiene antecedentes de tos y sibilancias con crisis repetidas de dificultad respiratoria de 7 años de evolución. Las crisis son especialmente frecuentes en primavera. Durante un episodio de dificultad respiratoria aguda, la exploración física muestra que está afebril. La percusión pulmonar muestra hiperresonancia, y la radiografía de tórax revela un aumento de la claridad de todos los campos pulmonares. Las pruebas de laboratorio evidencian un aumento de la concentración de IgE sérica y eosinofilia en sangre periférica. El estudio histológico de una muestra de esputo permite identificar numerosos eosinófilos. ¿Cuál de los siguientes rasgos histológicos se encuentra de forma característica en el pulmón en este proceso?

A Dilatación de los bronquíolos respiratorios con pérdida de fibras elásticas
B Destrucción inflamatoria de las paredes bronquiales
C Edema intersticial y alveolar con formación de membranas hialinas
D Áreas parcheadas de consolidación con exudados leucocíticos

en los alvéolos
- E Remodelado de las vías respiratorias con hiperplasia del músculo liso

16 Un hombre de 33 años desarrolla de forma súbita una intensa disnea con sibilancias. En la exploración física, las constantes vitales son temperatura de 37 °C; frecuencia cardíaca de 95 latidos/min; frecuencia respiratoria de 35 respiraciones/min, y presión arterial de 130/80 mmHg. La radiografía de tórax muestra un aumento de la claridad en todos los campos pulmonares. La gasometría arterial muestra una Po_2 de 65 mmHg; una Pco_2 de 30 mmHg, y un pH de 7,48. En la muestra de esputo se reconocen espirales de Curschmann, cristales de Charcot-Leyden, hifas tabicadas ramificadas y eosinófilos sobre un fondo con abundante moco. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que produzca predisposición a sufrir esta enfermedad?

- A Polimorfismos de los genes de las citocinas
- B Aspiración de cuerpo extraño
- C Inhalación de polvos inorgánicos ambientales
- D Herencia de una mutación del gen *CFTR*
- E Menor concentración de α_1-antitripsina circulante
- F Tabaquismo durante más de 10 años

17 Una empresa farmacéutica está diseñando fármacos para tratar el broncoespasmo de repetición en el asma bronquial. Se está valorando la eficacia de diversos compuestos que antagonizan la broncoconstricción para reducir la frecuencia y la gravedad de los episodios asmáticos agudos. ¿La reducción con un fármaco inhalado de cuál de los siguientes mediadores es más probable que sea efectiva en el tratamiento del asma bronquial de repetición?

- A Citocinas Th1
- B Aminas vasoactivas
- C Citocinas Th2
- D Leucotrienos
- E Prostaglandinas

18 Un hombre de 35 años refiere antecedentes de sibilancias y tos episódicas desde hace 5 años. Los episodios son más frecuentes en los meses de invierno y ha observado que a menudo se producen después de que presente infecciones respiratorias menores. En el

período interepisódico, el paciente puede respirar con normalidad. No refiere antecedentes familiares de asma u otras alergias. En la exploración física no se encuentra nada llamativo. La radiografía de tórax es normal. La concentración de IgE sérica y el recuento leucocítico tampoco muestran alteraciones. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que contribuya a los hallazgos en esta enfermedad?

A Acumulación de exudado neutrófilo alveolar
B Hiperreactividad bronquial por la inflamación crónica
C Migración de eosinófilos a los bronquios
D Respuesta exagerada frente a las esporas de *Aspergillus*
E Secreción de interleucina (IL) 4 e IL-5 por los linfocitos T

19 Un estudio sobre personas con asma atópica muestra que desarrollan cambios patológicos en las vías respiratorias con los brotes repetidos. Entre estos cambios está la hipertrofia del músculo liso y de las glándulas mucosas. Se observa que la respuesta inflamatoria en fase tardía frente a los alérgenos potencia la producción de citocinas por las células epiteliales y fomenta el remodelado de las vías respiratorias. ¿Cuál de las siguientes células inmunitarias tiene más importancia en esta respuesta inflamatoria excesiva frente a los alérgenos?

A Linfocitos B
B Linfocito citotóxico
C Linfocito citolítico natural
D Linfocito T_H1
E Linfocito T_H2
F Linfocito T_H17

20 Una mujer de 70 años ha presentado episodios de disnea con sibilancias y tos asociados a urticaria durante los últimos 3 años. También ha sufrido brotes de rinitis. Refiere antecedentes de artrosis desde hace 10 años. En la exploración física se observan pólipos nasales. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es el factor de riesgo más probable para su enfermedad respiratoria?

A Paracetamol
B Ácido acetilsalicílico
C Gabapentina
D Morfina
E Prednisona

21 Un hombre de 19 años refiere antecedentes de rinorrea mucoide de repetición con sinusitis crónica y otitis media desde la infancia. Ha presentado brotes múltiples de neumonía. La temperatura es de 37,7 °C. En la exploración torácica se identifican frémito táctil, roncus y estertores finos en los campos pulmonares inferiores. Se encuentran pólipos nasales. La radiografía de tórax muestra dilatación bronquial con engrosamiento de la pared bronquial, atelectasias focales y áreas de hiperinsuflación; la silueta cardíaca se encuentra situada principalmente a la derecha. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que tenga el paciente?

A Deficiencia de α_1-antitripsina
B Atopia
C Disfunción de los canales de cloruro
D Discinesia ciliar
E Infección por el VIH

22 Una mujer de 35 años ha presentado múltiples brotes de neumonía necrosante grave desde la infancia, y los cultivos de esputo han identificado *Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa* y *Serratia marcescens.* En este momento presenta tos productiva con gran cantidad de esputo purulento. En la exploración física, se observa matidez a la percusión con reducción del murmullo vesicular en los campos medios e inferiores del pulmón derecho. La radiografía de tórax muestra áreas de consolidación en el lóbulo inferior derecho. La broncografía revela una marcada dilatación de los bronquios del lóbulo inferior derecho. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es la causa más probable de su enfermedad?

A Malformación congénita de las paredes bronquiales
B Lesión de la mucosa bronquial por la proteína básica mayor de los eosinófilos
C Infiltración difusa por un carcinoma broncógeno
D Inflamación repetida con destrucción de la pared bronquial
E Acción no contrarrestada de la elastasa derivada de los neutrófilos sobre los bronquios

23 Un hombre de 41 años refiere antecedentes de disnea y debilidad progresivas de 6 años de evolución. En la exploración física está afebril y normotenso. La radiografía de tórax muestra marcas intersticiales difusas. Las pruebas de función pulmonar

revelan una reducción de la CVF y de la DLCO (capacidad de difusión) y un cociente FEV_1/CVF normal. ¿Cuál de los siguientes cambios patológicos es más probable que se encuentre en los pulmones de este paciente?

A Inflamación aguda de las paredes bronquiales con llamativa presencia de eosinófilos

B Inflamación crónica con hipertrofia de las glándulas mucosas bronquiales

C Dilatación de los espacios aéreos distales a los bronquíolos respiratorios

D Pulmón en panal con extensa fibrosis de los tabiques alveolares

E Necrosis difusa del epitelio alveolar con llamativa presencia de membranas hialinas



24 Un hombre de 68 años refiere disnea progresiva con tos sin expectoración durante los últimos 9 meses. En la exploración física se encuentra afebril y normotenso. La auscultación del tórax permite identificar crepitantes secos en todos los campos

pulmonares. La radiografía de tórax identifica opacificaciones irregulares en ambos pulmones. Se obtiene una biopsia transbronquial y en la figura se muestran los hallazgos encontrados en una tinción tricrómica. Entre los hallazgos de laboratorio hay resultados serológicos negativos para los anticuerpos frente a ANA, anti-ADN topoisomerasa I, ANCA y anticentrómero. A pesar del tratamiento con glucocorticoides, su situación clínica no mejora y fallece a los 2 años. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Síndrome de Goodpasture
B Neumonitis por hipersensibilidad
C Fibrosis pulmonar idiopática
D Sarcoidosis
E Esclerosis sistémica

25 Un estudio sobre las enfermedades pulmonares en personas fumadoras demuestra que el consumo de una mayor cantidad de tabaco durante más tiempo se correlaciona de forma positiva con el grado de destrucción parenquimatosa pulmonar con enfisema centrolobulillar. Sin embargo, algunas personas con antecedentes de consumo importante de tabaco presentan menos daño pulmonar que otras que han fumado menos. ¿Cuál de los siguientes polimorfismos genéticos es más probable que explique estas diferencias en la respuesta reparativa frente a las lesiones pulmonares en los fumadores?

A *AAT*
B *BMPR2*
C *CFTR*
D *GM-CSF*
E *TGF-β*

26 Una mujer de 52 años, ingeniero eléctrico y no fumadora, refiere disnea progresiva de 3 meses de evolución. En la exploración está afebril y normotensa. La TC torácica muestra opacidades reticulares en los lóbulos inferiores. Se realiza una biopsia transbronquial, y el estudio histológico revela inflamación intersticial parcheada con linfocitos y células plasmáticas. No se reconocen microorganismos. La situación clínica de la paciente se deteriora de forma gradual y lenta en los 10 años siguientes. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Neumonitis intersticial descamativa
B Neumonitis por hipersensibilidad
C Fibrosis intersticial idiopática
D Asma bronquial no atópica
E Neumonía intersticial inespecífica

27 Una mujer de 54 años lleva 1 semana con febrícula y tos. Los síntomas mejoran de forma gradual en los 10 días siguientes, pero de nuevo empieza a presentar fiebre más intensa, tos, disnea y malestar. En este momento, en la exploración física presenta una temperatura de 37,9 °C. Se auscultan crepitantes inspiratorios. La radiografía de tórax muestra opacidades alveolares pequeñas parcheadas bilaterales. La muestra de biopsia transbronquial muestra tapones polipoideos de tejido fibroso laxo y tejido de granulación que ocupan los bronquíolos, además de un infiltrado intersticial constituido por células mononucleares. Recibe un ciclo de tratamiento con corticoesteroides y el cuadro mejora. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Bronquiectasias
B Neumonía organizada criptógena
C Neumonitis intersticial descamativa
D Neumonitis por hipersensibilidad
E Proteinosis alveolar pulmonar

28 Un hombre de 63 años ha presentado disnea progresiva durante los últimos 10 años. Refiere una pérdida de 5 kg de peso durante los últimos 2 años. Tiene tos crónica con mínima producción de esputo y no refiere dolor torácico. En la exploración física está afebril y normotenso. La radiografía de tórax muestra una extensa enfermedad intersticial. Las pruebas de función pulmonar revelan una reducción de la DLCO y de la CVF, con un cociente FEV_1/CVF normal. ¿La exposición prolongada a cuál de los siguientes contaminantes ambientales es más probable que produzca estos hallazgos?

A Monóxido de carbono
B Ozono
C Sílice
D Humo del tabaco
E Polvo de madera

29 Se realiza un estudio sobre mineros con antecedentes de

exposición profesional a polvo inhalado. Aunque se encuentra en el aire urbano en cantidades pequeñas, dicho polvo contiene partículas de 1-5 µm que son inertes e insolubles. Se produce fibrosis solo cuando se acumulan grandes cantidades de polvo, sobre todo en los lóbulos superiores, y se pueden identificar opacidades mayores de 1 cm en las radiografías de tórax. ¿Qué componente es más probable encontrar en este polvo?

A Asbesto
B Berilio
C Carbón
D Hierro
E Dióxido de azufre



30 Un hombre de 76 años refiere disnea progresiva desde hace 4 años. En la exploración está afebril con una frecuencia cardíaca de 70 latidos/min, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones/min y una presión arterial de 120/75 mmHg. La radiografía de tórax muestra un aumento de las marcas intersticiales, pero no hay ningún derrame. El margen derecho del corazón y las arterias pulmonares son prominentes. Se realiza una biopsia transbronquial; la figura muestra el aspecto microscópico con la tinción con azul de Prusia. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Antracosis
B Asbestosis
C Beriliosis
D Calcinosis
E Silicosis

31 Se realiza un estudio radiológico sobre las neumopatías asociadas a inhalación. Se observa un patrón de afectación en las personas con una capacidad pulmonar total, una capacidad de difusión y una distensibilidad disminuidas. Este patrón se caracteriza por numerosas opacificaciones nodulares bilaterales en las radiografías de tórax. El estudio histológico de estos nódulos revela cristales aciculares polarizables. ¿Cuál de las siguientes sustancias inhaladas es más probable que provoque estos cambios?

A Humo del tabaco
B Esporas de levaduras
C Polvo de sílice
D Dióxido de azufre
E Partículas de madera



32 Una mujer de 36 años ha presentado febrícula y tos no

productiva con disnea progresiva desde hace 2 años. En la exploración se ausculta murmullo vesicular en todos los campos pulmonares, y la TC muestra los hallazgos que se ven en la figura. La gasometría arterial revela un pH de 7,45; una P_{O_2} de 83 mmHg; una P_{CO_2} de 30 mmHg, y HCO_3^- de 19 mEq/l. Las pruebas de función pulmonar reflejan una capacidad pulmonar total de 3 l (60% de la predicha), un FEV_1 de 2,5 (66% del predicho) y una DLCO de 10 ml/min/mmHg (50% de la predicha). La distensibilidad pulmonar se encuentra reducida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Deficiencia de α_1-antitripsina
B Bronquitis crónica
C Daño alveolar difuso
D Síndrome de Goodpasture
E Asma no atópica
F Sarcoidosis

33 Un hombre de 65 años trabajó en una naviera durante 10 años y, posteriormente, ha trabajado 5 años más en una empresa instaladora de aislantes ignífugos. Refiere disnea progresiva durante 11 años con insuficiencia respiratoria progresiva e hipoxemia. Actualmente la TC torácica revela una gran masa que atrapa al pulmón izquierdo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que se encuentre en la radiografía de tórax de este paciente?

A Infiltrados bilaterales perihiliares algodonosos
B Cavitación bilateral de los lóbulos superiores
C Placas calcificadas en la pleura diafragmática
D Masa intrabronquial con atelectasias
E Derrames pleurales

34 Una mujer de 61 años refiere disnea y tos productiva progresivas durante los últimos 5 meses. En la exploración física tiene una temperatura de 37,7 °C. La radiografía de tórax revela unas llamativas linfoadenopatías hiliares con infiltrados reticulonodulares bilaterales. Se realiza una biopsia transbronquial y entre los hallazgos microscópicos destacan fibrosis intersticial y pequeños granulomas no caseificados. Un granuloma contiene un cuerpo asteroide en una célula gigante de Langhans. Los antecedentes médicos de la paciente indican que

fumó tabaco durante 10 años, aunque lo dejó hace 5 años. ¿Cuál de los siguientes procesos es la causa más probable de su enfermedad?

A Respuesta mediada por linfocitos T frente a un antígeno desconocido
B Daño alveolar difuso mediado por anticuerpos
C Depósito de inmunocomplejos
D Infección por micobacterias atípicas
E Inhalación de humo con pérdida de bronquíolos

35 Un cultivador de alfalfa de 64 años refiere antecedentes de disnea progresiva desde hace 15 años. En la exploración física destaca una temperatura de 37,6 °C. La radiografía de tórax muestra un aumento bilateral de las marcas lineales. Las pruebas de función pulmonar revelan una reducción de la CVF con un FEV_1 normal. La muestra de biopsia pulmonar transbronquial presenta infiltrados intersticiales de linfocitos y células plasmáticas, fibrosis intersticial mínima y pequeños granulomas. ¿Cuál es la causa más probable de este cuadro clínico y patológico?

A Autoanticuerpos frente a las membranas basales alveolares
B Inhalación crónica de partículas de sílice
C Hipersensibilidad frente a las esporas de actinomicetos
D Infección por *Mycobacterium tuberculosis*
E Exposición prolongada a polvos inorgánicos

36 Un hombre de 25 años presenta de forma aguda fiebre, tos, disnea, cefalea y malestar al día siguiente de mudarse a un apartamento nuevo. Los síntomas ceden en 3 días, cuando acude a otra ciudad a visitar a un amigo. El día que regresa, los síntomas reaparecen. La exploración física no encuentra alteraciones significativas. La radiografía de tórax también parece normal. ¿Cuál de los siguientes mecanismos patógenos es más probable que provoque estos hallazgos?

A Lesión mediada por complejos antígeno-anticuerpo
B Lesión mediada por anticuerpos de la membrana basal
C Formación de ácido micólico como consecuencia de una infección tuberculosa
D Producción de prostaglandinas por reclutamiento de basófilos
E Liberación de histamina por los mastocitos
F Daño tóxico de los neumocitos de tipo I causado por el polvo

inhalado

37 Un hombre de 46 años presenta disnea progresiva con tos no productiva durante el último año. En la exploración física está afebril y presenta acropaquias digitales. Las pruebas de función pulmonar revelan una ligera alteración restrictiva con una reducción de la DLCO. Se realiza una biopsia transbronquial, y el estudio microscópico muestra numerosos macrófagos alveolares, células epiteliales rechonchas, ligera fibrosis intersticial y pérdida de los bronquíolos respiratorios. En el interior de los macrófagos se identifican cuerpos laminares y pigmento férrico. ¿Cuál es la causa más probable de esta enfermedad pulmonar?

A Hipersensibilidad de tipo I
B Tabaquismo
C Discinesia ciliar
D Inhalación de esporas de levaduras
E Respuesta mediada por células frente al polvo de sílice



38 Una mujer de 33 años refiere disnea progresiva con tos de 10 días de evolución. Durante los últimos 2 días, la tos se ha vuelto productiva con expectoración de grumos de esputo gelatinoso. En la exploración se encuentra afebril. Se observa una matidez extensa a la percusión de todos los campos pulmonares. Una radiografía de tórax evidencia opacificaciones difusas bilaterales. Se realiza

una biopsia transbronquial y la figura corresponde al aspecto microscópico de la misma teñida con H-E. El estudio con microscopia electrónica revela múltiples cuerpos laminares. ¿Frente a cuál de las siguientes sustancias se dirigen los anticuerpos considerados los responsables más probables de esta enfermedad?

A α_1-antitripsina
B *Proteína de los canales de cloruro*
C ADN topoisomerasa I
D Membrana basal glomerular
E GM-CSF
F Mieloperoxidasa de los neutrófilos



39 Un hombre de 61 años tuvo un infarto de miocardio hace 1 año y ahora sufre una insuficiencia cardíaca congestiva importante, que reduce su capacidad de deambulación. En las últimas 24 h ha desarrollado dolor torácico derecho. A la auscultación se encuentran estertores en los lóbulos inferiores. Está afebril, con una frecuencia cardíaca de 70 latidos/min, una frecuencia respiratoria de 27 respiraciones/min con respiración superficial y

una presión arterial de 130/85 mmHg. La figura corresponde a la TC torácica de este paciente. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que justifique el aspecto de la lesión que se muestra?

A Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
B Infección por el VIH
C Endocarditis trombótica no bacteriana
D Trombosis venosa profunda
E Panarteritis nudosa
F Silicosis

40 Se realiza un estudio clínico que incluye a pacientes que han estado más de 2 semanas ingresados en el hospital y que han permanecido encamados más del 90% del tiempo de ingreso. Se realiza a estos enfermos una ecografía Doppler venosa de las extremidades inferiores, una gasometría arterial y una gammagrafía de ventilación/perfusión pulmonar. Se encuentra una cohorte de pacientes con alteraciones en la ecografía sugestivas de trombosis, con una Po_2 ligeramente baja y pequeños defectos de perfusión pulmonares. ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas es más probable encontrar en esta cohorte de pacientes?

A Disnea
B Hemoptisis
C Palpitaciones
D Dolor pleurítico
E Ortopnea
F Ausencia de síntomas



41 Una mujer de 68 años sufrió un infarto cerebral y fue ingresada durante 3 semanas. Su situación mejoró, y consiguió levantarse y deambular sin ayuda. Unos minutos después de caminar hacia el baño, notó una disnea grave de aparición súbita con dolor torácico y diaforesis. A pesar de las medidas de reanimación, la paciente falleció en 30 min. La figura muestra el principal hallazgo en la autopsia. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que explique la muerte súbita de esta paciente?

A Broncoconstricción
B Atelectasias compresivas
C Infarto hemorrágico
D Edema intersticial
E Corazón pulmonar agudo

42 Un hombre de 45 años refiere disnea de esfuerzo progresiva con fatiga desde hace 2 años. La auscultación torácica revela un llamativo componente pulmonar de S2, un soplo sistólico por insuficiencia tricuspídea y soplos en los campos pulmonares periféricos. Se observa distensión de la vena yugular hasta el ángulo mandibular en sedestación. Las pruebas de laboratorio revelan la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. La angiografía mediante TC muestra oclusiones excéntricas con arterias pulmonares y atenuación en mosaico del parénquima pulmonar. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que cause esta enfermedad pulmonar?

A Ateroesclerosis
B Neumonitis
C Sarcoidosis
D Tromboembolia
E Vasculitis

43 Una mujer de 75 años ha presentado edema progresivo de la parte distal de la extremidad inferior con disnea en los últimos 5 años. En la exploración física la temperatura es de 36,9 °C; la frecuencia cardíaca, de 74 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 19 respiraciones/min, y la presión arterial, de 110/75 mmHg. La percusión de las bases pulmonares revela matidez. Se ausculta un soplo cardíaco de intensidad baja. La radiografía de tórax muestra derrame pleural bilateral. La ecocardiografía evidencia un defecto amplio (4 cm) en el tabique interauricular. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que tenga esta paciente?

A Hipertensión pulmonar
B Inflamación granulomatosa
C Infarto hemorrágico
D Fibrosis intersticial
E Vasculitis necrosante

44 Una mujer de 25 años presenta disnea progresiva con fatiga desde hace 2 años. En la exploración destaca edema pedio, distensión de la vena yugular y hepatomegalia. La auscultación revela campos pulmonares limpios. La TC torácica muestra un aumento de tamaño del lado derecho del corazón. Se realiza un cateterismo cardíaco, y la presión de la arteria pulmonar está aumentada sin gradientes en la válvula pulmonar ni presencia de comunicaciones. Se obtiene una biopsia transbronquial y el estudio histológico objetiva lesiones plexiformes. ¿Cuál de las siguientes mutaciones génicas es más probable que cause su enfermedad pulmonar?

A Péptido natriurético de tipo B (BNP)
B Receptor morfogénico óseo 2 (BMPR2)
C Óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS)
D Fibrilina 1
E Lisilo hidroxilasa
F Renina

45 Un hombre de 29 años sin enfermedades graves previas

consulta por una hemoptisis de aparición aguda. En la exploración tiene una temperatura de 37 °C, una frecuencia cardíaca de 83 latidos/min, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones/min y una presión arterial de 150/95 mmHg. La radiografía de tórax muestra infiltrados bilaterales algodonosos. El estudio histológico de una biopsia transbronquial pone de manifiesto necrosis focal de las paredes alveolares con llamativa hemorragia intraalveolar. A los 2 días desarrolla oliguria. La concentración de creatinina sérica es de 2,9 mg/dl, y la de nitrógeno ureico, de 31 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes anticuerpos es más probable que esté implicado en la patogenia de este cuadro?

A Anticuerpos anti-ADN topoisomerasa I
B Anticuerpos frente a la membrana basal glomerular
C Anticuerpos antimitocondriales
D Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos
E Anticuerpos antinucleares

46 Un hombre de 42 años presenta una sinusitis crónica de 7 meses de evolución. Actualmente lleva 3 semanas con malestar y febrícula. En la exploración física la temperatura es de 37,9 °C. La auscultación revela algunos crepitantes en los pulmones. En las pruebas de laboratorio destacan cifras de nitrógeno ureico sérico de 35 mg/dl; de creatinina de 4,3 mg/dl; de ALT de 167 U/l; de AST de 154 U/l, y de bilirrubina total de 1,1 mg/dl. La radiografía de tórax muestra nódulos pulmonares dispersos de 1 cm. Se realiza una biopsia pulmonar transbronquial y se reconoce una capilaritis granulomatosa necrosante, un granuloma mal constituido y hemorragia intraalveolar. El análisis de orina muestra eritrocitos con cilindros hemáticos. ¿Cuáles de los siguientes autoanticuerpos es más probable encontrar en este paciente?

A ADN topoisomerasa I (Scl-70)
B ADN bicatenario (ADNbc)
C Membrana basal glomerular (MBG)
D Serina proteinasa 3 (PR3-ANCA)
E *Thermoactinomyces vulgaris*

47 En un estudio clínico se sigue a pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas con intubación, ventilación mecánica y anestesia para determinar el número y el tipo de complicaciones posquirúrgicas. Se observa que el grupo de estudio presenta una

incidencia más elevada de infecciones pulmonares en las 2 semanas posteriores a la intervención que los pacientes que no fueron intubados ni recibieron anestesia general. ¿Por cuál de los siguientes mecanismos es más probable que la anestesia ocasiones este efecto?

A Disminución de la función ciliar
B Menor actividad de los macrófagos
C Hipogammaglobulinemia
D Neutropenia
E Metaplasia escamosa
F Erosiones traqueales



48 Una mujer de 54 años lleva 4 días con tos con expectoración de esputo amarillento cada vez más intensa. En la exploración física la temperatura es de 38,9 °C y se auscultan crepitantes difusos en el campo inferior del pulmón izquierdo en la parte posterior. Las pruebas de laboratorio revelan un recuento leucocítico de 11.990/mm^3 con un 71% de neutrófilos segmentados, un 9% de

cayados, un 16% de linfocitos y un 4% de monocitos. En la figura se muestra el aspecto macroscópico representativo del pulmón afectado. ¿Cuál de los siguientes patógenos es más probable que se cultive en el esputo de esta paciente?

A *Cryptococcus neoformans*
B *Mycobacterium kansasii*
C *Mycoplasma pneumoniae*
D *Nocardia brasiliensis*
E *Pneumocystis jiroveci*
F *Streptococcus pneumoniae*

49 Una mujer de 71 años lleva 50 años fumando un paquete de tabaco diario. Refiere disnea progresiva desde hace 12 años. Durante los últimos 3 días ha presentado fiebre con tos con expectoración y disnea intensa. La auscultación torácica revela estertores y sibilancias espiratorias. Las pruebas de laboratorio muestran neutrofilia en sangre periférica. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que se cultive en el esputo de esta paciente?

A *Histoplasma capsulatum*
B Virus de la gripe A
C *Moraxella catarrhalis*
D *Mycobacterium kansasii*
E *Pneumocystis jiroveci*

50 Un hombre de 51 años refiere antecedentes de alcoholismo crónico. Es encontrado en situación estuporosa después de 3 días de consumo masivo de alcohol. En la exploración la temperatura es 39,2 °C. Se auscultan unos pocos crepitantes en la base pulmonar derecha. La radiografía de tórax revela una lesión redondeada de 3 cm con nivel hidroaéreo en el lóbulo inferior derecho. ¿Cuál de las siguientes parejas de agentes infecciosos es más probable detectar en el esputo de este paciente?

A *Cryptococcus neoformans* y *Candida albicans*
B Citomegalovirus y *Pneumocystis jiroveci*
C *Mycobacterium tuberculosis* y *Aspergillus fumigatus*
D *Nocardia asteroides* y *Actinomyces israelii*
E *Staphylococcus aureus* y *Bacteroides fragilis*

51 Un hombre de 20 años ha presentado febrícula con tos sin expectoración, cefalea y mialgias durante la última semana. En la

exploración física, tiene temperatura de 37,9 °C y eritema faríngeo. En la auscultación de los pulmones se detectan crepitantes difusos. La radiografía de tórax muestra infiltrados parcheados bilaterales extensos. La tinción con Gram del esputo identifica flora normal. El título de crioaglutininas está elevado. Se le administra un ciclo de eritromicina y la situación mejora. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es el responsable más probable de estos hallazgos?

A *Legionella pneumophila*
B *Mycobacterium fortuitum*
C *Mycoplasma pneumoniae*
D *Nocardia asteroides*
E Virus sincitial respiratorio

52 Una mujer de 26 años del este asiático ha desarrollado fiebre con escalofríos durante los últimos 4 días. Ayer presentó disnea progresiva y tos sin expectoración, cefalea y mialgias. En la exploración física destaca una temperatura de 38,6 °C. La radiografía de tórax revela infiltrados en el lóbulo inferior derecho. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 13,4 g/dl y de hematocrito del 40,2%; un recuento de plaquetas de 78.400/mm^3 y un recuento leucocítico de 3.810/mm^3 con un diferencial del 77% de neutrófilos segmentados, del 2% de cayados, del 5% de linfocitos y del 16% de monocitos. En los 2 días siguientes su situación se deteriora con dificultad respiratoria, que obliga a intubar a la mujer y a realizar ventilación mecánica. Una nueva radiografía de tórax muestra una acentuación bilateral de los infiltrados. ¿La infección por cuál de los siguientes virus es más probable que cause la enfermedad de esta paciente?

A Coronavirus
B Citomegalovirus
C Virus del Ébola
D Virus del herpes simple
E Virus sincitial respiratorio

53 Un estudio epidemiológico revela que una cepa muy patógena de virus de la gripe A con el perfil antigénico H5N1 y que normalmente produce enfermedad en los pájaros es causa cada vez más frecuente de gripe en las personas. A diferencia de otras cepas de virus de la gripe A, este virus H5N1 se asocia a una

mortalidad del 60%. ¿Cuál de las siguientes acciones facilitada por la mutación del genoma del virus de la gripe aviar explica su mayor patogenicidad?

A Induce una respuesta de linfocitos T citotóxicos débil
B Penetra en muchos tipos de células huésped
C Elude la inactivación por los macrófagos
D Infecta a los linfocitos T colaboradores CD4+
E Se transmite entre las personas

54 Una niña de 4 años natural de Utrecht, Holanda, y previamente sana lleva 3 días con fiebre acompañada de disnea, taquipnea, tos sin expectoración, mialgias y rinorrea. La auscultación revela sibilancias inspiratorias y espiratorias, y la radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales difusos bilaterales. Se recupera en 2 semanas sin secuelas. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable identificar mediante PCR de sus secreciones respiratorias?

A Estreptococos del grupo A
B *Bordetella pertussis*
C *Candida albicans*
D Citomegalovirus
E *Haemophilus influenzae*
F Metaneumovirus humano

55 Un niño de 3 años lleva 5 días con tos, cefaleas y febrícula. En este momento presenta dificultad respiratoria progresiva. En la exploración física, la temperatura es de 37,8 °C; la frecuencia cardíaca, de 81 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 25 respiraciones/min, y la presión arterial, de 90/55 mmHg. A la auscultación se identifican crepitantes inspiratorios, pero no matidez a la percusión ni timpanismo. En una muestra de esputo se aisló el virus sincitial respiratorio. ¿Cuál de los siguientes patrones es más probable encontrar en la radiografía de tórax?

A Linfoadenopatías hiliares
B Hiperinsuflación
C Infiltrados intersticiales
D Consolidación lobular
E Derrames pleurales
F Cavitación de lóbulos superiores

56 Un estudio sobre pacientes infectados por el VIH demuestra

que los que tienen recuentos de linfocitos CD4+ por debajo de 100 células/μl presentan un mayor riesgo de infecciones pulmonares. Algunos tienen también hepatoesplenomegalia y linfoadenopatías simultáneas y malabsorción con pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre. El estudio histológico de las muestras de lavado broncoalveolar revela macrófagos llenos de microorganismos acidorresistentes. ¿Cuál de las siguientes infecciones han desarrollado es tos pacientes?

A *Aspergillus niger*
B *Candida albicans*
C *Legionella pneumophila*
D Complejo *Mycobacterium avium*
E *Nocardia asteroides*
F *Pseudomonas aeruginosa*



57 Una mujer de 46 años se somete a una revisión de salud habitual. En la exploración física no presenta alteraciones significativas. Tiene un índice de masa corporal de 22. No fuma. La prueba de la tuberculina cutánea es positiva. La radiografía de tórax muestra una masa de 3 cm única en el lóbulo superior izquierdo, sin calcificaciones. Se realiza una resección en cuña de la masa mediante una toracotomía. La figura muestra el aspecto

microscópico de la lesión. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Infección por *Mycobacterium tuberculosis*
B Vasculitis granulomatosa necrosante
C Adenocarcinoma poco diferenciado
D Absceso por *Staphylococcus aureus*
E Tromboembolia con infarto

58 Un hombre de 44 años no fumador ha perdido 3 kg de peso en los últimos 3 meses. Recientemente ha desarrollado febrícula y tos con expectoración de esputo mucoide y 1 semana después identificó hebras de sangre en el esputo. En la exploración física la temperatura es de 37,7 °C. Se auscultan crepitantes bilaterales en el lóbulo superior izquierdo. La TC torácica revela un nódulo de 3 cm en el lóbulo superior izquierdo con una reducción central de la atenuación. Las pruebas de laboratorio muestran una cifra de hemoglobina de 14,5 g/dl; un recuento de plaquetas de 211.400/mm^3 y un recuento de leucocitos de 9.890/mm^3 con un 40% de segmentados, un 2% de cayados, un 40% de linfocitos y un 18% de monocitos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable encontrar en el esputo de este paciente?

A Bacilos acidorresistentes
B Hifas tabicadas ramificadas
C Cristales de Charcot-Leyden
D Células gigantes de cuerpo extraño
E Bacilos gramnegativos
F Células neoplásicas pequeñas y oscuras



59 Una mujer de 20 años previamente sana ha presentado febrícula durante las últimas 2 semanas. En la exploración física tiene una temperatura de 37,7 °C, sin otros hallazgos importantes. La figura muestra el aspecto macroscópico del pulmón representativo de la enfermedad. ¿En cuál de las siguientes pruebas de laboratorio es más probable obtener resultados positivos?

A Anticuerpo anticentrómero
B Serología del VIH
C Prueba de liberación de interferón γ
D Reagina plasmática rápida
E Factor reumatoide
F Cloruro en sudor

60 Un hombre de 46 años originario del norte de México refiere fiebre, tos sin expectoración y pérdida de peso desde hace 2 meses. En la exploración tiene una temperatura de 37,5 °C. La radiografía de tórax muestra un patrón miliar con pequeños nódulos en todos los campos pulmonares. Se realiza un lavado broncoalveolar, cuyo estudio histológico muestra microorganismos de 50 µm de diámetro con paredes gruesas y llenos de endosporas. ¿Cuál de las siguientes infecciones es más probable que tenga el paciente?

A Blastomicosis
B Coccidioidomicosis
C Histoplasmosis
D Micobacteriosis
E Nocardiosis
F Paracoccidioidomicosis



61 Un hombre de 56 años refiere fiebre, sudoración nocturna y pérdida de 3 kg de peso desde hace 4 meses. Durante el último mes ha presentado episodios de hemoptisis. La exploración física revela estertores en el lóbulo superior. Presenta hipoxemia. La figura muestra el aspecto de la radiografía de tórax del paciente. ¿Por cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que sufra una infección este hombre?

A *Candida albicans*
B Virus de la gripe A
C *Legionella pneumophila*
D *Mycobacterium tuberculosis*
E *Mycoplasma pneumoniae*
F *Nocardia asteroides*

62 Un hombre de 56 años está recibiendo quimioterapia por una leucemia. Presenta fiebre, tos sin expectoración, disnea, dolor torácico de tipo pleurítico y hemoptisis desde hace 1 semana. La TC muestra múltiples densidades nodulares de 1-4 cm de

diámetro, rodeadas de áreas de infiltrado en vidrio esmerilado (signo del halo). Se realiza un lavado broncoalveolar, y el estudio histológico del líquido revela hifas ramificadas tabicadas estrechas. El hemograma muestra cifras de hemoglobina de 13 g/dl; de hematocrito del 38,7%; de recuento de leucocitos de 2.000/μl, y de recuento plaquetario de 200.100/μl. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es el responsable más probable de esta infección?

A *Aspergillus fumigatus*
B *Candida albicans*
C *Cryptococcus neoformans*
D *Moraxella catarrhalis*
E *Mucor circinelloides*



63 Una mujer de 47 años con infección por el VIH conocida ha mostrado una disminución del recuento de linfocitos CD4+ durante el último año a pesar del tratamiento con antirretrovíricos. Ha desarrollado fiebre con tos sin expectoración durante la última semana. A la auscultación torácica se identifican crepitantes finos en los dos pulmones. La radiografía de tórax revela infiltrados en ambos pulmones. Se obtiene una biopsia transbronquial cuyo aspecto microscópico se muestra en la figura. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es la causa más probable de la

infección de esta paciente?

A *Candida albicans*
B *Cryptococcus neoformans*
C Citomegalovirus
D *Klebsiella pneumoniae*
E *Pneumocystis jiroveci*



64 Una mujer de 43 años refiere malestar y pérdida de 8 kg de peso en los últimos 3 años. Presenta fiebre y tos sin expectoración con disnea progresiva desde hace 3 días. En la exploración física muestra una temperatura de 37,8 °C. Se encuentran matidez a la percusión en los pulmones y crepitantes difusos a la auscultación. La radiografía de tórax revela infiltrados bilaterales extensos. Se realiza un lavado broncoalveolar y se tiñe el líquido con una plata metenamina de Gomori. La figura corresponde a una imagen histológica a gran aumento de dicho material. ¿Cuál de los siguientes trastornos es el más probable en esta mujer?

A Enfisema centrolobulillar
B Diabetes mellitus
C Infección por el VIH
D Sarcoidosis
E Inmunodeficiencia combinada grave
F Lupus eritematoso sistémico

65 Un hombre de 64 años, fumador empedernido, presenta tos y ha perdido 5 kg de peso en los últimos 3 meses. La exploración física revela acropaquias digitales. Está afebril. La radiografía de tórax no muestra adenopatías hiliares, pero se identifica cavitación con una lesión de 3 cm cercana al hilio derecho. Las pruebas de laboratorio reflejan una calcemia de 12,3 mg/dl, una concentración de fósforo de 2,4 mg/dl y de albúmina de 3,9 g/dl. La broncoscopia muestra una lesión que ocluye casi por completo el bronquio principal derecho. Se trata de resecar la lesión con intención curativa. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es la más probable en este paciente?

A Adenocarcinoma *in situ*
B Sarcoma de Kaposi
C Carcinoma anaplásico de células grandes
D Carcinoma de células renales metastásico
E Linfoma no hodgkiniano
F Carcinoma anaplásico de células pequeñas
G Carcinoma epidermoide



66 Una mujer de 79 años refiere malestar progresivo con pérdida de 5 kg de peso en los últimos 5 meses. Lleva 3 meses con tos crónica sin expectoración. En la exploración física no se observan alteraciones. Las pruebas de función pulmonar son normales, al igual que los recuentos de sangre periférica. La figura corresponde a su radiografía de tórax. ¿Qué hallazgo es más probable encontrar en la biopsia de sus lesiones pulmonares?

A Adenocarcinoma
B Inflamación granulomatosa
C Vasculitis necrosante
D Absceso organizado
E Cristales de sílice

67 Una mujer de 45 años, no fumadora, refiere tos sin expectoración crónica durante 6 meses asociada a una pérdida de 8 kg de peso. La exploración física no revela hallazgos relevantes. La radiografía de tórax muestra una masa subpleural periférica derecha. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina y se procede a una lobulectomía inferior derecha. El estudio histológico de la lesión identifica glándulas que infiltran el pulmón circundante. ¿Cuál de las siguientes pruebas moleculares resultaría más útil para determinar si el tumor de esta paciente se beneficia de los tratamientos específicos frente a tirosina cinasa?

A Amplificación del gen *FGFR1*
B Inactivación del gen *CDKN2A*
C Pérdida de las dos copias de *TP53*
D Mutación del gen *K-RAS*
E Reordenamiento del gen *ALK*



68 Una mujer de 60 años presenta tos crónica sin expectoración desde hace 4 meses asociada a anorexia y pérdida de 6 kg de peso. No fuma. En la exploración física no se identifican alteraciones destacables. La radiografía de tórax revela una masa subpleural derecha periférica. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina y se procede a una lobulectomía inferior derecha. La figura muestra el aspecto microscópico de la lesión. Se le administra inmunoterapia frente al receptor del factor de crecimiento epitelial (EGFR) y la paciente permanece asintomática durante los 10 años siguientes. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que tuviera esta paciente?

A Adenocarcinoma
B Carcinoide bronquial
C Hamartoma
D Carcinoma de células grandes
E Carcinoma anaplásico de células pequeñas
F Carcinoma epidermoide

69 Un hombre de 50 años ha desarrollado obesidad central, lumbalgia y equimosis de fácil aparición durante los últimos 5 meses. La exploración física revela que está afebril, y la presión arterial es de 160/95 mmHg. La radiografía de tórax identifica una masa mal delimitada de 4 cm que afecta al hilio del pulmón izquierdo. El estudio citológico del lavado bronquial obtenido mediante broncoscopia muestra células epiteliales redondeadas,

que recuerdan a linfocitos, aunque son más grandes. Se informa al paciente de que, aunque su enfermedad parece localizada en un solo lado de la cavidad torácica, el tratamiento quirúrgico posiblemente no conseguiría curarlo. Se le indica también que debe dejar el tabaco. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que tenga este paciente?

A Adenocarcinoma
B Carcinoide bronquial
C Carcinoma bronquioloalveolar
D Carcinoma de células grandes
E Linfoma no hodgkiniano
F Carcinoma anaplásico de células pequeñas
G Carcinoma epidermoide



70 Una mujer de 57 años presenta tos y dolor pleurítico durante las últimas 3 semanas. En la exploración física está afebril. Se auscultan algunos crepitantes en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. La radiografía de tórax muestra un área de opacificación mal delimitada en el lóbulo inferior izquierdo. Tras 1 mes de tratamiento antibiótico, su situación no mejora y la lesión sigue siendo visible en el estudio radiológico. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina guiada por TC del lóbulo inferior izquierdo del pulmón, y la muestra presenta el aspecto histológico

que refleja la figura. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que sufra esta paciente?

A Adenocarcinoma *in situ*
B Carcinoma anaplásico de células grandes
C Mesotelioma maligno
D Carcinoma de mama metastásico
E Carcinoma epidermoide

71 Un hombre de 59 años fumador de un paquete de tabaco al día durante los últimos 43 años ha desarrollado tos grave con hemoptisis en el último mes. Refiere una pérdida de 10 kg de peso en el último año. En la exploración física se encuentra afebril. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de Na^+ sérico de 120 mmol/l; de K^+ de 3,8 mmol/l; de Cl^- de 90 mmol/l; de CO_2 de 24 mmol/l; de glucosa de 75 mg/dl; de creatinina de 1,2 mg/dl; de calcio de 8,1 mg/dl; de fósforo de 2,9 mg/dl, y de albúmina de 4,2 g/dl. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable encontrar en su radiografía de tórax?

A Cavitación bilateral de los lóbulos superiores
B Placas calcificadas en la pleura diafragmática
C Infiltrados extensos
D Masa perihiliar infiltrante
E Neumotórax
F Nódulo subpleural con adenopatías hiliares
G Nódulo en la parte superior del pulmón con niveles hidroaéreos

72 Una mujer de 72 años refiere trastornos visuales en el ojo derecho desde hace 3 meses. También ha tenido dolor en la parte superior del tórax derecho. En la exploración física destacan enoftalmos unilateral, miosis, anhidrosis y ptosis del lado derecho de la cara. La radiografía de tórax revela opacificación del lóbulo superior derecho con destrucción ósea de la primera costilla del mismo lado. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que sufra esta paciente?

A Bronconeumonía
B Bronquiectasias
C Carcinoma broncógeno
D Sarcoidosis
E Tuberculosis

73 Una mujer de 43 años no fumadora trabaja como administrativa en una universidad que prohíbe fumar en todas sus dependencias. Una radiografía de tórax rutinaria revela una masa bien delimitada de 3 cm en el lóbulo superior izquierdo del pulmón. Se intenta realizar una punción-aspiración con aguja fina de la misma, pero el patólogo que realiza el procedimiento considera que «es como biopsiar a una pelota de *ping-pong*». No se consigue material. Se realiza una toracotomía con resección de una cuña. La sección de la masa tiene una superficie de corte firme y brillante, de color blanco azulado. Se obtiene un cultivo de la masa, con resultado negativo. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable para esta masa?

A Adenocarcinoma
B Hamartoma
C Carcinoma de células grandes
D Mesotelioma
E Linfoma no Hodgkin
F Carcinoma epidermoide

74 Un hombre de 40 años presenta tos progresiva con hemoptisis durante las últimas 2 semanas. No ha fumado nunca, y su salud es muy buena. En la exploración física presenta una temperatura de 38,2 °C. La radiografía de tórax identifica un área de consolidación en el lóbulo superior del pulmón derecho. Su situación mejora con antibióticos, pero la tos y la hemoptisis persisten durante 2 semanas más. La TC torácica muestra una atelectasia del pulmón superior derecho. En el estudio broncoscópico se identifica una masa parda bien delimitada, que obstruye por ocupación todo el bronquio del lóbulo superior derecho. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es la causa más probable de estos hallazgos?

A Adenocarcinoma
B Tumor carcinoide
C Hamartoma
D Sarcoma de Kaposi
E Carcinoma de células grandes

75 Un hombre de 24 años refiere disnea progresiva de 10 semanas de evolución. En la exploración se encuentra afebril. Se identifica matidez a la percusión en la parte posterior de los pulmones, con atenuación del murmullo vesicular. La radiografía de tórax

muestra derrames pleurales bilaterales extensos con ensanchamiento mediastínico. Se realiza una toracocentesis izquierda, que obtiene 500 ml de líquido blanquecino lechoso. Las pruebas de laboratorio sobre dicho líquido revelan un alto contenido en proteínas y el estudio histológico muestra muchos linfocitos y glóbulos de grasa. ¿Cuál es la causa más probable de estos hallazgos?

A Neumonía bacteriana con empiema
B Cardiopatía congénita con insuficiencia cardíaca
C Síndrome de Marfan con disección de aorta
D Cirrosis micronodular con hipoalbuminemia
E Tuberculosis miliar con pleuritis granulomatosa
F Linfoma no hodgkiniano con obstrucción linfática

76 Un hombre de 68 años refiere disnea progresiva con tos y expectoración de esputos espumosos durante los últimos 5 meses. En la exploración se encuentra afebril con una presión arterial de 165/100 mmHg. Se identifica matidez a la percusión de las bases pulmonares y también edema con fóvea en los tobillos. La radiografía de tórax revela una ocupación de ambos ángulos costofrénicos y cardiomegalia con unos llamativos bordes cardíacos derecho e izquierdo. Se realiza una toracocentesis derecha y se obtienen 300 ml de líquido de color pajizo. Las pruebas de laboratorio sobre este líquido muestran unas cifras de proteínas totales de 2,2 g/dl (en suero, 6,5 g/dl), de glucosa de 45 mg/dl (en suero, 75 mg/dl) y de lactato deshidrogenasa de 200 U/l (en suero, 420 U/l), un pH de 7,2 y un recuento celular de 100 leucocitos mononucleares/mm^3, sin eritrocitos. ¿Qué proceso es más probable que tenga este paciente?

A Tuberculosis cavitaria
B Insuficiencia cardíaca congestiva
C Mesotelioma maligno
D Linfoma no hodgkiniano
E Neumonía neumocócica
F Carcinoma de células pequeñas

77 Un hombre de 78 años refiere disnea progresiva sin tos o expectoración durante los últimos 4 meses. En la exploración física está afebril. El murmullo vesicular está reducido en todos los campos pulmonares. La TC torácica muestra una masa pleural

densa, con atenuación brillante que rodea la mayor parte del pulmón izquierdo. El estudio histológico de una muestra de biopsia pleural revela células fusiformes y cúbicas que infiltran el tejido adiposo. ¿Cuál de los siguientes contaminantes inhalados es el factor más probable en la patogenia de esta masa?

A Asbesto
B Polvo de excremento de aves
C Polvo de carbón
D Fibras de algodón
E Ozono
F Sílice

78 Una mujer de 47 años no fumadora refiere antecedentes de dolor torácico derecho persistente, aunque leve, de 4 meses de evolución. En la exploración física no se identifican alteraciones significativas. La radiografía de tórax muestra una masa pleural en el lado derecho, sin derrame pleural. La TC torácica confirma una masa localizada y delimitada de 3 × 7 cm unida a la pleura visceral; los pulmones y la pared torácica parecen normales. Se extirpa la masa en una toracotomía. El estudio histológico de la misma revela que está constituida por células fusiformes parecidas a fibroblastos con abundante estroma colágeno. El estudio inmunohistoquímico de las células indica que las fusiformes son positivas con CD34 y negativas con citoqueratinas. No se ha producido la recidiva de la lesión. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Carcinoma bronquioloalveolar
B Hamartoma
C Linfoma de Hodgkin de tipo esclerosis nodular
D Mesotelioma maligno
E Metástasis de carcinoma de mama
F Tumor fibroso solitario

Respuestas

1 **A** El secuestro extralobular produce un efecto de masa externo sobre los pulmones normales y limita el intercambio de gases porque no conecta con las vías respiratorias y muestra una conexión anómala con las arterias sistémicas. Los secuestros intralobulares dentro del parénquima pulmonar se diagnostican

típicamente durante la infancia en relación con infecciones de repetición. Los quistes del intestino anterior hiliares o mediastínicos no se conectan con las vías respiratorias y pueden ocasionar un efecto de masa cuando son grandes, pero la mayor parte no lo son. La gestación a término posiblemente descarte la inmadurez pulmonar con ausencia de surfactante. La cantidad normal de líquido amniótico descarta la secuencia de oligohidramnios, que es causa frecuente de hipoplasia pulmonar. Una fístula traqueoesofágica predispone a la infección pulmonar.

2 **D** Los traumatismos torácicos cerrados pueden provocar una fractura costal. Las esquirlas de hueso pueden penetrar la pleura y provocar una fuga de aire, con el consiguiente neumotórax. Aunque este puede producirse como complicación de la rotura de una bulla enfisematosa, este cuadro se observa con más frecuencia en el enfisema paraseptal o enfisema acinar distal que en el centrolobulillar, con aumento del diámetro anteroposterior. Aunque la embolia pulmonar con desequilibrio de la relación V/Q y la neumonía con infiltrados parcheados son posibles complicaciones en pacientes hospitalizados, no se producirían con tanta rapidez. La presencia de líquido en el espacio pleural (hidrotórax) y el edema aislados son poco probables en relación con un traumatismo; la hemorragia es más probable. Las enfermedades intersticiales producirían más opacidad, no menos.

3 **E** Las atelectasias por reabsorción suelen ser consecuencia de la obstrucción de un bronquio por un tapón de moco o mucopurulento. El aire presente en los alvéolos distales a la obstrucción se reabsorbe y esta porción del pulmón se colapsa. Este cuadro puede producirse en el postoperatorio o como complicación de un asma bronquial. La atelectasia por compresión se relaciona con la acumulación de aire o líquido en la cavidad pleural, algo que se puede encontrar en un neumotórax, en un hemotórax o con el derrame pleural. La atelectasia por contracción ocurre cuando el pulmón está rodeado de tejido fibroso cicatricial. Pueden producirse microatelectasias durante el postoperatorio, en caso de daño alveolar difuso y en presencia de dificultad respiratoria del

recién nacido por pérdida de surfactante. El término atelectasia por relajación es sinónimo de atelectasia por compresión.

4 **B** El traumatismo provocó una fuga de aire con enfisema intersticial. Podría haberse producido también un neumotórax, pero en este caso el aire se ha escapado y ha disecado los tejidos blandos. Un proceso que aumente la presión intraparenquimatosa pulmonar y rompa el pulmón, como la ventilación con presión positiva, también puede ocasionar esta complicación. El enfisema intersticial parece más grave de lo que es en realidad y el aire se reabsorbe en unos días. Cuando la fuga es central, se puede emplear el término *enfisema mediastínico.* La expresión *enfisema pulmonar intersticial* (EPI) alude a este proceso en los recién nacidos, a menudo sometidos a ventilación mecánica con presión positiva y cuando existe un síndrome de dificultad respiratoria. La rotura gástrica suele asociarse a la fuga del contenido ácido del estómago al peritoneo con la consiguiente peritonitis y se puede diagnosticar ante la presencia de aire libre por debajo del diafragma en las radiografías. La presencia de sangre en el espacio pleural se llama *hemotórax;* la sangre en los tejidos blandos puede formar un hematoma. La fuga de linfa es poco frecuente, porque los linfáticos están sometidos a poca o ninguna presión; el bloqueo del conducto torácico puede producir un quilotórax. La presencia de pus en el espacio pleural recibe el nombre de *empiema* y suele complicar una neumonía asociada.

5 **D** El paciente tiene una insuficiencia cardíaca izquierda con edema y congestión pulmonar. La disminución del gasto cardíaco reduce el flujo renal, lo que estimula el mecanismo renina-angiotensina para retener sal y agua, y aumentar de este modo la volemia. El paciente tiene uremia prerrenal con un cociente nitrógeno ureico en sangre-creatinina (BUN:Cr) elevado y una excreción fraccional de sodio baja. Las otras opciones no explican el edema pulmonar. Un adenoma suprarrenal secretor de aldosterona (síndrome de Conn) aumentaría la concentración de aldosterona, pero reduciría la de renina plasmática. En la insuficiencia suprarrenal crónica (enfermedad de Addison), se deberían detectar hiperpotasemia e hipoglucemia, además de hiponatremia. La glomerulonefritis crónica con insuficiencia

renal crónica se debería asociar a un cociente BUN:Cr de 10:1. La fibrosis pulmonar causaría corazón pulmonar con un llamativo margen del corazón derecho y rasgos de insuficiencia cardíaca congestiva derecha. El síndrome de la secreción inadecuada de hormona antidiurética (ADH) es un síndrome paraneoplásico, que puede asociarse a los carcinomas de células pequeñas pulmonares, y la secreción de hormona antidiurética (SIADH) incrementaría el nivel de ADH y ocasionaría una hiponatremia más grave, pero no tendría efectos importantes sobre el mecanismo renina-angiotensina y la excreción de sodio sería más alta.

6 **A** La paciente sufre un daño pulmonar agudo con edema pulmonar no cardiógeno y aparición de un daño alveolar difuso (DAD), que, clínicamente, se conoce como *síndrome de dificultad respiratoria aguda* (SDRA). La sepsis, los traumatismos u otros tipos de lesión pulmonar que ponen en marcha este proceso conducen a un círculo vicioso de inflamación con daño progresivo, principalmente por la acción de los neutrófilos. Las lesiones plexiformes son características de la hipertensión pulmonar. Aunque el SDRA puede culminar en una fibrosis, la mayor parte de los pacientes no sobreviven tanto como para que esto ocurra. Pueden encontrarse infiltrados linfocíticos en infecciones como la neumonitis vírica o en las enfermedades pulmonares de mecanismo inmunitario. La destrucción de los bronquíolos respiratorios es una característica del enfisema centrolobulillar.

7 **C** Esta clínica y la imagen morfológica corresponden a daño pulmonar agudo (DPA), que en su forma grave ocasiona el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). Este SDRA se caracteriza por la alteración patológica del daño alveolar difuso (DAD), que en la mayor parte de los casos se inicia por una lesión sobre el endotelio capilar con agregación de neutrófilos y macrófagos en los capilares alveolares y liberación de metabolitos tóxicos del oxígeno, citocinas y eicosanoides. La toxicidad por oxígeno asociada a inspiración de una concentración alta de él agrava el DAD. La lesión del endotelio capilar facilita la fuga de líquidos ricos en proteínas. Al final el epitelio alveolar suprayacente también resulta lesionado. La

aspiración de bacterias causa bronconeumonía. El SDRA y la coagulación intravascular diseminada (CID) pueden complicar de forma conjunta el shock séptico, pero la CID no es causa de SDRA. La liberación de citocinas fibrogénicas es una causa importante de fibrosis pulmonar crónica difusa. La menor producción de surfactante produce síndrome de dificultad respiratoria con enfermedad de membrana hialina en recién nacidos.

8 **E** Los hallazgos en este paciente se corresponden principalmente a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (enfisema) con un patrón de afectación centrolobulillar, sobre todo en los lóbulos superiores. El tabaquismo es una causa importante de esta enfermedad. La inflamación sutil pero prolongada que puede asociarse al tabaquismo aumenta la elaboración de elastasas por los neutrófilos y macrófagos, que no se inhibe de forma adecuada por la actividad antiproteasa de la α_1-antitripsina. Esto se traduce en una pérdida de tejido pulmonar, pero sin fibrogenia, a lo largo de décadas. La fibrogenia es típica de las neumopatías restrictivas, como las neumoconiosis, secundarias a la inhalación de polvo. El transporte anómalo del cloruro es una característica de la fibrosis quística, que produce bronquiectasias diseminadas. Los brazos de dineína son anómalos o faltan por completo en el síndrome de Kartagener, que es causa de bronquiectasias. La deficiencia de α_1-antitripsina es infrecuente y se asocia a un enfisema de patrón panlobulillar. El reclutamiento de macrófagos y la activación por el interferón γ liberado por los linfocitos T es una característica de los trastornos inflamatorios crónicos y las neumoconiosis.

9 **E** El enfisema acinar distal (paraseptal) está localizado por debajo de la pleura y típicamente en el lóbulo superior y puede aparecer en un área de fibrosis o cicatrización. Aunque las lesiones suelen medir menos de 2 cm, tienden a romperse de forma espontánea o con traumatismos menores, con aparición de un neumotórax. Pueden ser causa de un neumotórax espontáneo en adultos jóvenes. El efecto de «válvula» puede condicionar el atrapamiento de aire en la pleura y producir un neumotórax a tensión, como sucede en este caso. El enfisema

centroacinar se origina en los bronquíolos respiratorios y afecta a fumadores. El enfisema panacinar (panlobulillar) afecta a la mayor parte del lobulillo pulmonar y puede afectar a todos los lóbulos. La deficiencia de α_1-antitripsina es el antecedente más probable. El asma se debe a la broncoconstricción con atrapamiento de aire, pero es poco probable que se complique con un neumotórax. Las bronquiectasias se deben a inflamación con destrucción de bronquios; la hemoptisis es la complicación más probable, pero no el neumotórax. Es poco probable que una bronquitis crónica provoque una fístula broncopleural con neumotórax.

10 **A** Estos hallazgos son indicativos de una enfermedad pulmonar obstructiva, como el enfisema, que se produce por estrechamiento de la vía respiratoria y pérdida de la recuperación elástica. Se ha traducido en una acidosis respiratoria compensada en este paciente. La embolia pulmonar crónica no afecta a la CVF porque la vía respiratoria no resulta afectada, pero se asocia a un desequilibrio ventilación/perfusión. El daño alveolar difuso es una neumopatía restrictiva aguda. El asma no atópica puede ocurrir a esta edad, pero es un proceso episódico y no es probable que produzca una pérdida permanente de espacios aéreos distales. La sarcoidosis es una variante de neumopatía restrictiva crónica. Las neumoconiosis, como la silicosis, provocan un patrón de neumopatía restrictiva con reducción de todos los volúmenes pulmonares, CVF baja y cociente FEV_1/CVF normal.

11 **E** La afectación pulmonar extensa con aumento de la claridad de todos los campos pulmonares e incremento del diámetro anteroposterior es compatible con un enfisema. La variante panlobulillar, que puede ser más grave en los lóbulos inferiores, se puede relacionar con una reducción de la concentración de α_1-antitripsina, que es la principal antielastasa circulante. Esta deficiencia es un proceso hereditario, típicamente con un genotipo PiZZ; puede asociarse también a una hepatopatía. Los pacientes atópicos tienen más probabilidad de desarrollar asma, que se asocia a un atrapamiento transitorio de aire, pero no a enfisema. Las mutaciones del gen *CFTR* producen fibrosis quística y bronquiectasias pulmonares diseminadas, que

empiezan en la infancia. El tabaquismo aumenta la inflamación con liberación de proteasas por los neutrófilos, principalmente en los lóbulos superiores, lo que se traduce en un enfisema de patrón centroacinar que se desarrolla a lo largo de décadas. La infección previa por tuberculosis puede ocasionar una cavitación de los lóbulos superiores, pero no enfisema.

12 **C** La enfermedad de este paciente cumple la definición clínica de bronquitis crónica. Refiere tos persistente con expectoración durante al menos 3 meses en 2 años consecutivos. La bronquitis crónica afecta a fumadores y personas que viven en áreas con mala calidad del aire, lo que explica la tos crónica y la expectoración de esputos mucoides. Sin embargo, los episodios que ha presentado este paciente de broncoconstricción desencadenados por infecciones víricas sugieren un elemento de asma no atópica superpuesto. El corazón pulmonar es causa de derrame pleural, pero no se asocia a broncoconstricción. El enfisema centrolobulillar y la bronquitis crónica (ambos cuadros, complicaciones del tabaco) pueden mostrar alteraciones clínico-patológicas similares e, aunque la broncoconstricción importante no es un rasgo del enfisema. El enfisema panlobulillar de la deficiencia de α_1-antitripsina puede empeorar con el tabaquismo, pero no aparece broncoconstricción. Las bronquiectasias se caracterizan por dilatación de la vía respiratoria secundaria a una inflamación destructiva de la pared bronquial, pero la neumopatía asociada a fibrosis quística debuta típicamente durante la infancia. La neumonitis por hipersensibilidad se caracteriza por alteraciones propias de una neumopatía restrictiva, que en ocasiones cursa con disnea, pero sin producción de moco; este proceso suele ser episódico en relación con la exposición intermitente a los antígenos.

13 **D** El enfisema centrolobulillar se produce por una lesión de la parte central del ácino pulmonar, con una dilatación que afecta principalmente a los bronquíolos respiratorios. Los conductos y sacos alveolares distales están relativamente respetados. Los bronquios tienen cartílago, que no resulta afectado en presencia de enfisema. En el enfisema panacinar se afecta todo el lobulillo pulmonar, desde el bronquíolo respiratorio a los alvéolos

terminales. En el enfisema paraseptal resulta afectado el ácino distal.

14 **D** La bronquitis crónica puede complicarse con hipertensión y corazón pulmonares. Existen pocas características microscópicas típicas de bronquitis crónica, por lo cual se define fundamentalmente por la clínica, que es la presencia de tos persistente con expectoración durante al menos 3 meses en 2 años consecutivos como mínimo. La bronquitis crónica no produce fibrosis pulmonar difusa. La enfermedad granulomatosa es más típica de la sarcoidosis o de las infecciones por micobacterias. Las metástasis por vía linfática pueden ocupar los espacios linfáticos y producir un patrón reticulonodular en la radiografía de tórax, pero los enfermos no suelen vivir suficiente tiempo con estos tumores tan evolucionados. El aumento de los eosinófilos es típico del asma bronquial, que es una enfermedad episódica con escasa probabilidad de producir un corazón pulmonar.

15 **E** El asma atópica es una reacción de hipersensibilidad de tipo I en la cual existen mastocitos revestidos por IgE presensibilizados en la mucosa y la submucosa de la vía respiratoria. El contacto con un alérgeno induce la desgranulación de los mastocitos, lo que determina la liberación inmediata (minutos) de mediadores como la histamina para inducir broncoconstricción, así como la liberación tardía (1 h o más) de leucotrienos y prostaglandinas a través de la vía del ácido araquidónico; estos mediadores atraen a los leucocitos, sobre todo a los eosinófilos, e inducen broncoconstricción. Entre los cambios histológicos característicos en los bronquios están el remodelado de las vías respiratorias y la hiperplasia del músculo liso, y se producen por los episodios de inflamación. La dilatación del bronquíolo respiratorio es un rasgo del enfisema centrolobulillar. La dilatación bronquial con destrucción inflamatoria es una característica de las bronquiectasias. En el daño alveolar difuso se identifican membranas hialinas. En los procesos neumónicos, asociados típicamente a infecciones bacterianas, se encuentran exudados de neutrófilos con consolidación.

16 **A** El asma, sobre todo la extrínseca (atópica), se produce por

una respuesta de hipersensibilidad de tipo I y se asocia a una respuesta inmunitaria celular excesiva mediada por T_H2 y T_H17. Los factores genéticos tienen importancia en la patogenia del asma atópica, y la relación con los genes de las citocinas localizados en 5q explica la aparición de asma y otras alergias atópicas. Los cristales de Charcot-Leyden corresponden a los productos de degradación de los gránulos de los eosinófilos. Las espirales de Curschmann son remolinos de epitelio de superficie desprendido dentro de abundante mucina. Las hifas tabicadas son *Aspergillus* que colonizan el árbol traqueobronquial (aspergilosis broncopulmonar alérgica). La aspiración de un cuerpo extraño puede provocar inflamación, pero sin presencia de eosinófilos. La inhalación de polvo inorgánico es causa de una neumopatía restrictiva, no obstructiva. Las mutaciones de *CFTR* con fibrosis quística ocasionan bronquiectasias crónicas dispersas. La inflamación con eosinófilos no es un componente significativo del enfisema relacionado con la deficiencia de α_1-antitripsina o con el tabaquismo.

17 **C** La fase aguda precoz del asma bronquial se activa por la liberación de mediadores químicos, mientras que la fase tardía viene mediada por las células inflamatorias reclutadas y las citocinas Th2 que estas liberan. Los episodios de asma aguda responden mejor a los agonistas β-adrenérgicos inhalados. La histamina liberada por los mastocitos actúa durante la fase aguda precoz de las reacciones de hipersensibilidad de tipo I, pero los antihistamínicos no son útiles como tratamiento de los brotes repetidos de asma. Las citocinas Th2 juegan un papel importante en el asma de repetición y se están desarrollando antagonistas para ellas, sobre todo IL-13 e IL-4. No está claro si alguna de estas citocinas Th2 media por sí sola el broncoespasmo de repetición. Dentro de los mediadores de fase precoz a tardía, los leucotrienos C_4, D_4 y E_4 inducen una intensa broncoconstricción y producción de mucina. El montelukast es un fármaco que se une a los receptores de cisteinil leucotrienos (CysLT) de los mastocitos y eosinófilos, y bloquea así la vía de la lipooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico, que genera los leucotrienos. La prostaglandina D_2 también es un broncoconstrictor, pero su papel está peor definido que el de los

leucotrienos.

18 **B** La anamnesis es típica de un asma no atópica o intrínseca. No existen antecedentes familiares de asma ni eosinofilia, y la concentración de IgE sérica es normal. La principal alteración en estos casos es la hiperrespuesta bronquial (es decir, el umbral para el espasmo del bronquio es intrínsecamente bajo). Cuando se produce inflamación de las vías respiratorias tras las infecciones víricas, el músculo liso bronquial sufre un espasmo y aparece una crisis asmática. Esta hiperreactividad bronquial también puede desencadenarse por la inhalación de contaminantes ambientales, como el ozono, el dióxido de azufre y dióxidos de nitrógeno. Incluso el esfuerzo físico y el aire frío pueden comportarse como desencadenantes. La acumulación de neutrófilos es típica de la neumonía bacteriana, que puede aparecer después de una infección vírica, pero que se asocia a consolidación pulmonar. La aspergilosis broncopulmonar es la colonización de las vías respiratorias de los pacientes asmáticos por *Aspergillus,* que se sigue de la aparición de más anticuerpos IgE. La secreción de interleucina (IL) 4 e IL-5 por los linfocitos T colaboradores de tipo 2 también se produce en casos de asma alérgica.

19 **E** La respuesta de los linfocitos colaboradores T_H2 induce la producción de citocinas, como IL-4, IL-5 e IL-13, lo que fomenta la infiltración por eosinófilos y la producción de IgE por los mastocitos. Esta respuesta alérgica potencia la inflamación, lo que estimula el remodelado de las vías respiratorias y facilita la reactividad adicional de la vía respiratoria y la aparición de episodios asmáticos. La respuesta T_H1 genera una inflamación granulomatosa. Los linfocitos T_H17 contribuyen a la respuesta inflamatoria frente a agentes infecciosos, pero pueden participar también en la autoinmunidad. Los linfocitos B elaboran anticuerpos, pero principalmente por la acción de los linfocitos T colaboradores. Los linfocitos citotóxicos se dirigen sobre todo contra los agentes infecciosos intracelulares. Los linfocitos NK contribuyen a combatir los agentes infecciosos.

20 **B** El asma inducida por fármacos es más probable en los pacientes ancianos, que desarrollan una sensibilidad mayor frente a un fármaco. El ácido acetilsalicílico bloquea la vía de la

ciclooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico, pero no la de la lipooxigenasa, que potencia la broncoconstricción. Los AINE pueden tener el mismo efecto que el ácido acetilsalicílico. Los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (ECA) pueden inducir también episodios similares al asma. El paracetamol es un analgésico que se emplea como sustituto del ácido acetilsalicílico y es poco probable que produzca episodios asmáticos. La gabapentina y la morfina son analgésicos de acción central. La prednisona es un antiinflamatorio empleado en el tratamiento de las enfermedades de mecanismo inmunitario.

21 **D** El paciente presenta un síndrome de Kartagener (sinusitis, bronquiectasias y *situs inversus* asociado a discinesia ciliar). Se produce una alteración de los brazos de dineína del cilio, que reduce la función mucociliar del epitelio respiratorio, lo que predispone a los pacientes a las infecciones crónicas y repetidas de las vías respiratorias alta y baja. Las bronquiectasias se producen por una destrucción mantenida con dilatación de los bronquios en relación con la infección y la obstrucción de la vía respiratoria. La deficiencia de α_1-antitripsina ocasiona un enfisema panlobulillar, principalmente de los lóbulos inferiores, pero no afecta a la vía respiratoria alta. La atopia puede asociarse a pólipos nasales, pero produce asma, no bronquiectasias. La fibrosis quística con mutaciones del gen *CFTR* que afectan a los canales para el ión cloruro puede ocasionar bronquiectasias dispersas, pero en general no se acompaña de trastornos de la vía respiratoria alta ni de *situs inversus.* La infección por el VIH se caracteriza por infecciones oportunistas cuando progresa a sida, pero no suele asociarse a bronquiectasias o *situs inversus.*

22 **D** Las bronquiectasias son una forma de enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria a la dilatación irreversible de los bronquios asociada a la inflamación y destrucción de sus paredes por infecciones u obstrucciones prolongadas. Los brotes graves de neumonía pueden predisponer al desarrollo de bronquiectasias. La condromalacia congénita con debilidad de la pared bronquial es poco frecuente. En el asma bronquial se encuentran lesiones de la mucosa

bronquial por los eosinófilos. No destruye la pared bronquial. El carcinoma bronquioloalveolar puede confundirse con una neumonía infiltrante por el patrón de extensión lepídica, pero principalmente ocasiona un efecto de masa y no se suele encontrar en la infancia. La actividad no contrarrestada de las elastasas daña el tejido elástico alveolar y conduce al enfisema.

23 **D** Los datos de función pulmonar son sugestivos de una neumopatía restrictiva. La fibrosis intersticial pulmonar progresiva asociada a neumopatías restrictivas, como las neumoconiosis, puede provocar, en último término, una dilatación de los espacios aéreos proximales residuales, lo que da lugar a un patrón en panal de abeja. La pérdida de tejido pulmonar asociada a enfisema también produce una dilatación de los espacios aéreos, pero sin fibrogenia de las paredes alveolares. Los infiltrados de eosinófilos son sugestivos de un asma atópica, una enfermedad episódica sin fibrogenia. El aumento de las glándulas mucosas en la bronquitis crónica conduce a la producción de abundante esputo, pero no determina fibrogenia. Las membranas hialinas, el edema, la inflamación y la necrosis focal son características del daño alveolar difuso (síndrome de dificultad respiratoria aguda) en fase aguda; cuando los pacientes sobreviven semanas, el daño alveolar difuso puede resolverse con cambio a panal de abeja.

24 **C** La causa de los múltiples casos de neumopatía restrictiva de lenta evolución se desconoce, y los profesionales sanitarios frustrados, aunque comprensivos, solo podrán decir al paciente: «Lo siento, pero no podemos hacer nada más». Es preciso diferenciar estos casos de los que tienen causas identificables, como infecciones, enfermedades del tejido conjuntivo, consumo de drogas y neumoconiosis. La fibrosis pulmonar idiopática provoca una neumopatía restrictiva progresiva. Un antígeno desconocido incita el proceso inflamatorio T_H2 con liberación por los macrófagos activados de citocinas, como el factor de crecimiento fibroblástico y TGF-β1. Ese último regula a la baja la actividad de la telomerasa y provoca la apoptosis de las células epiteliales. El TGF-β1 reduce el nivel de caveolina 1, una proteína inhibidora de la fibrosis. El síndrome de Goodpasture es una variante de hipersensibilidad de tipo II caracterizada por

hemorragias pulmonares difusas que afectan a un pulmón normal. La neumonitis por hipersensibilidad puede asociarse a un elemento de hipersensibilidad de tipo IV con algo de fibrosis, aunque en general no tan grave o rápida como en este caso. La sarcoidosis se caracteriza por una inflamación granulomatosa. En este hombre, la esclerodermia es menos probable porque los resultados serológicos son negativos.

25 **E** La respuesta inflamatoria frente a la lesión pulmonar puede determinar la naturaleza y la magnitud de la enfermedad pulmonar. La citocina TGF-β puede modular la respuesta de las células mesenquimatosas frente a la lesión pulmonar. Una reducción de las señales de TGF-β puede asociarse a una respuesta de reparación inadecuada, con pérdida de parénquima pulmonar, característica del enfisema. El genotipo PiZZ de la deficiencia de α_1-antitripsina aumenta el riesgo de que los pacientes, sobre todo los fumadores con un consumo elevado de tabaco, desarrollen un enfisema panlobulillar. *BMPR2* se asocia a la aparición de una hipertensión pulmonar primaria. Las mutaciones del gen *CFTR* se asocian al desarrollo de una fibrosis quística. Las mutaciones de *GM-CSF* se vinculan con la aparición de proteinosis alveolar pulmonar.

26 **E** La neumonía intersticial inespecífica tiene dos patrones: celular y fibrosante, de los que el primero tiene un pronóstico mejor. Algunos pacientes sufren una enfermedad del tejido conjuntivo de base. La neumonitis intersticial descamativa (NID) se asocia a tabaquismo. La neumonitis por hipersensibilidad suele relacionarse con la inhalación episódica de alérgenos y es raro que evolucione a una neumopatía intersticial grave. La fibrosis pulmonar idiopática suele evolucionar más rápido y afecta a la mayor parte de los pulmones. El asma no atópica típicamente es episódica y es raro que evolucione a una neumopatía intersticial extensa.

27 **B** La bronquiolitis obliterante es una característica de la neumonía organizada criptógena, una reacción infrecuente e inespecífica frente a las lesiones pulmonares, como las infecciones o las exposiciones a tóxicos. Las bronquiectasias implican una destrucción inflamatoria persistente con dilatación de los bronquios, que no se consigue revertir con

corticoesteroides. La neumonitis intersticial descamativa (NID) es una enfermedad intersticial poco frecuente vinculada con el tabaquismo en la que los monocitos se agrupan para formar macrófagos intraalveolares. La NID no se relaciona con la fibrosis pulmonar idiopática. La neumonitis por hipersensibilidad es una respuesta de hipersensibilidad de tipo III (y IV) frente a un alérgeno inhalado. La proteinosis alveolar pulmonar es un trastorno idiopático poco frecuente en el que se encuentran exudados alveolares proteináceos de tipo gelatinoso.

28 **C** Los cristales de sílice inducen una respuesta fibrogénica tras su inhalación e ingestión por los macrófagos pulmonares. Cuanto mayor sea la exposición al polvo de sílice y cuanto más prolongada sea la exposición, más grave será la lesión pulmonar. La sílice es un componente principal de la corteza de la tierra, incluida la arena, que contiene el mineral cuarzo. La minería, la fabricación, la agricultura y la construcción/restauración generan pequeños cristales de sílice que pueden inhalarse y que, dado su tamaño, pueden llegar a los alvéolos. Allí son ingeridos por los macrófagos, que secretan citocinas que reclutan a otras células inflamatorias y estimulan la fibrogenia. El monóxido de carbono atraviesa con facilidad las paredes alveolares y se une de forma ávida a la hemoglobina, pero no ocasiona lesiones pulmonares directas. El ozono, implicado en la contaminación ambiental, no tiene efectos patológicos evidentes. El tabaquismo condiciona, principalmente, una pérdida del tejido pulmonar con enfisema, pero no fibrosis. Las partículas, como el polvo de la madera, suelen ser eliminadas por el aparato mucociliar de las vías respiratorias altas, pero pueden inducir broncoconstricción.

29 **C** La neumoconiosis de los mineros del carbón es menos frecuente en la actualidad porque se han implantado medidas de seguridad laboral en el ámbito de la minería. El polvo de carbón es relativamente inerte, de forma que es preciso inhalar una gran cantidad para que se produzca una respuesta fibrogénica, pero la respuesta persiste durante muchos años. Las otras sustancias que se indican son más reactivas. El amianto (o asbesto) produce cuerpos ferruginosos. La beriliosis crónica suele asociarse a la aparición de granulomas de tipo sarcoide. El hierro produce siderosis con fibrosis. El dióxido de azufre es un gas que

contribuye a las neumopatías obstructivas, sobre todo a la bronquitis crónica y al asma.

30 **B** Los cuerpos ferruginosos que muestra la figura son cristales largos y delgados de asbesto rodeados de hierro y calcio. La reacción inflamatoria que inducen estos cristales fomenta la fibrogenia y la consiguiente neumoconiosis. La antracosis es un proceso benigno que afecta a las personas que viven en ciudades por la inhalación de polvo de carbón. La beriliosis crónica se caracteriza por granulomas no caseificados. El depósito de calcio a lo largo de las paredes alveolares puede encontrarse en pocos casos en los que la calcemia está muy elevada (calcificación metastásica). Los cristales de sílice no resultan recubiertos por hierro y suelen asociarse a la formación de nódulos fibrosos (nódulos silicóticos).

31 **C** Los nódulos silicóticos se forman cuando los macrófagos ingieren cristales de sílice e inducen una respuesta fibrogénica por la liberación de citocinas, como el factor de necrosis tumoral. Estos nódulos pueden confluir y ocasionar una fibrosis masiva progresiva. Las neumoconiosis, como la silicosis, producen una neumopatía restrictiva. El tabaquismo contribuye a la pérdida del parénquima pulmonar con enfisema. Las esporas de las levaduras suelen causar una neumonitis por hipersensibilidad, que es raro que evolucione a una neumopatía restrictiva extensa. El dióxido de azufre del aire contaminado suele causar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El polvo de madera induce más una respuesta asmática.

32 **F** La paciente sufre una neumopatía restrictiva; la figura muestra adenopatías hiliares y un infiltrado de patrón reticulonodular, típico de la sarcoidosis. La gasometría arterial revela una ligera hipoxemia con una alcalosis respiratoria compensada. Dado que no existe una enfermedad obstructiva, el CO_2 puede ser normal o estar disminuido por el aumento de la frecuencia respiratoria, que trata de compensar el bloqueo de la difusión (con una DLCO baja). La deficiencia de α_1-antitripsina y la bronquitis crónica producen una neumopatía obstructiva con aumento de la capacidad pulmonar total y reducción del FEV_1, y acidosis respiratoria. La bronquitis crónica se define por expectoración prolongada. El daño alveolar difuso es una

neumopatía restrictiva aguda secundaria a una lesión de base grave, como la sepsis. El síndrome de Goodpasture cursa con hemorragia pulmonar y hemoptisis. El asma es una enfermedad pulmonar obstructiva aguda con disnea y sibilancias.

33 **C** Este paciente tiene riesgo profesional de exposición al asbesto. Las fibras de asbesto inhaladas quedan incrustadas en hierro y forman los típicos cuerpos ferruginosos con la tinción para hierro. La masa parda y firme que rodea la pleura posiblemente sea un mesotelioma maligno. La asbestosis suele producir fibrosis pulmonar y una neumopatía intersticial, igual que otras neumoconiosis. Macroscópicamente, esto se traduce en una placa pleural densa, que a menudo está calcificada. La asbestosis puede provocar un carcinoma broncógeno, sobre todo en fumadores. Los infiltrados algodonosos sugieren un proceso infeccioso. La cavitación de los lóbulos superiores es sugestiva de tuberculosis secundaria. Una masa intrabronquial podría ser un tumor carcinoide, que no guarda relación con una asbestosis. La masa pleural puede obliterar el espacio pleural, sin presencia de derrame.

34 **A** Los rasgos clínicos y morfológicos son muy sugestivos de sarcoidosis. Esta enfermedad granulomatosa es de causa desconocida, aunque la presencia de granulomas y linfocitos T activados en los pulmones indica una respuesta de hipersensibilidad tardía frente a algún antígeno inhalado. La afectación pulmonar, que se describe en un tercio de los casos aproximadamente, puede ser asintomática o causar una neumopatía restrictiva. La sarcoidosis puede afectar a múltiples órganos, sobre todo a los relacionados con el sistema mononuclear fagocítico, especialmente a los ganglios linfáticos. El daño alveolar difuso es una lesión pulmonar aguda presente en el síndrome de dificultad respiratoria aguda. La neumonitis por hipersensibilidad es una enfermedad por inmunocomplejos desencadenada por alérgenos inhalados. Esta forma de enfermedad pulmonar se caracteriza por episodios de disnea aguda. La enfermedad empieza con una hipersensibilidad de tipo III, pero a veces se encuentran granulomas en los pulmones y no se asocia a adenomegalia. Las micobacterias atípicas producen granulomas caseificados, igual que *Mycobacterium*

tuberculosis. El tabaquismo provoca bronquitis crónica y enfisema.

35 **C** El pulmón del granjero es un tipo de neumonitis por hipersensibilidad causado por la inhalación de las esporas de actinomicetos en el heno mohoso. Estas esporas contienen el antígeno que induce la reacción de hipersensibilidad. Dado que participan reacciones inmunitarias de tipos III (precoz) y IV, pueden formarse granulomas. La enfermedad mejora cuando el paciente deja de exponerse al antígeno. La exposición crónica puede ser causa de una neumopatía intersticial más extensa. Los anticuerpos frente a la membrana basal pulmonar caracterizan al síndrome de Goodpasture, que produce principalmente hemorragias pulmonares. La silicosis puede ocasionar una neumopatía restrictiva con fibrosis, pero los nódulos fibrosos se desarrollan a lo largo de años con una inflamación mínima. La tuberculosis pulmonar puede asociarse a granulomas, pero el patrón sería miliar y es muy poco probable que persista durante 15 años. Las neumoconiosis con exposición a polvos, como la sílice, puede provocar una fibrosis intersticial a lo largo de muchos años y el riesgo de neoplasia aumenta ligeramente en la silicosis y, sobre todo, en la asbestosis.

36 **A** La neumonitis por hipersensibilidad se asocia a síntomas agudos que se producen tras la exposición a un antígeno, con frecuencia actinomicetos u hongos (levaduras) que crecen en sistemas de ventilación contaminados (aires acondicionados o conductos de ventilación). Los síntomas mejoran cuando el paciente sale del entorno en que se localiza el antígeno. Los cambios patológicos en los pulmones suelen ser mínimos, con presencia de infiltrados mononucleares intersticiales. Se corresponde principalmente con una reacción de hipersensibilidad de tipo III, pero cuando la exposición al antígeno es más crónica puede acompañarse de un componente de hipersensibilidad de tipo IV con inflamación granulomatosa y fibrosis. La unión de los anticuerpos a la membrana basal ocurre en el síndrome de Goodpasture. El ácido micólico es un componente de la pared celular de las micobacterias y las infecciones por estos microorganismos son crónicas, no episódicas. Las prostaglandinas se producen a través de la vía de

la ciclooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico durante la inflamación aguda y son mediadores en el dolor y la vasodilatación. La liberación de histamina es característica de las reacciones de hipersensibilidad de tipo I, que se asocian con más frecuencia a enfermedades alérgicas. La lesión tóxica es más típica de la inhalación de un gas tóxico, como el dióxido de azufre (la denominada enfermedad de los trabajadores de silos).

37 **B** Este paciente tiene una neumonitis intersticial descamativa (NID), un tipo de neumopatía intersticial vinculada con el tabaquismo. La mayor parte de los casos ceden cuando se abandona el consumo de tabaco y con el tratamiento con corticoesteroides. La atopia se relaciona clásicamente con asma, un proceso pulmonar obstructivo agudo. El síndrome de Kartagener es una variante de discinesia ciliar primaria, que produce bronquiectasias en relación con inflamación persistente por la infección. La inhalación de las esporas de hongos produce la neumonitis por hipersensibilidad propia del pulmón del granjero. La inhalación de silicatos durante años provoca fibrosis pulmonar, pero sin presencia de muchos macrófagos.

38 **E** La forma adquirida de proteinosis alveolar pulmonar (PAP) es un cuadro poco frecuente de etiología desconocida que se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos frente al factor estimulador de las colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF). El 10% de los casos de PAP se producen de forma congénita y secundaria a las mutaciones del gen *GM-CSF.* Ambos tipos de PAP se asocian a alteraciones en la eliminación del surfactante por los macrófagos alveolares, con la consiguiente acumulación de un exudado alveolar gelatinoso. La deficiencia de α_1-antitripsina ocasiona un enfisema panlobulillar con pulmones hiperclaros en las radiografías. Las mutaciones del gen *CFTR* originan fibrosis quística y bronquiectasias dispersas. Los anticuerpos anti-ADN topoisomerasa se asocian a la esclerodermia difusa, que provoca una fibrosis intersticial pulmonar. Los anticuerpos frente a la membrana basal glomerular se encuentran en el síndrome de Goodpasture con una hemorragia alveolar extensa. La mieloperoxidasa de los neutrófilos es una forma de autoanticuerpo frente al citoplasma de los neutrófilos que se encuentra en las vasculitis asociadas a

ANCA.

39 **D** La TC muestra extensos defectos de repleción con disminución de la atenuación en las arterias pulmonares de gran calibre. Esta lesión es típica de la tromboembolia pulmonar, que afecta a pacientes inmovilizados en el hospital, como sucede en la insuficiencia cardíaca congestiva. El origen de los émbolos suelen ser trombos de las venas pélvicas profundas o de las piernas afectadas por una flebotrombosis. Los pacientes con una enfermedad cardíaca o pulmonar de base que altera la circulación pulmonar tienen mayor riesgo de sufrir un infarto cuando presentan una tromboembolia. Esta no es una complicación del tabaquismo en los pacientes con enfisema o asma. La infección por el VIH aumenta el riesgo de infecciones pulmonares, pero no el de tromboembolia. Los pequeños émbolos originados en las pequeñas vegetaciones de la endocarditis trombótica no bacteriana no suelen producir defectos de repleción tan extensos, y la mayoría de ellos se originan en el lado izquierdo del corazón. Las vasculitis pulmonares afectan típicamente a las arteriolas, a los capilares o a las vénulas, de calibre insuficiente como para ocasionar defectos de repleción macroscópicamente evidentes en las arterias grandes. Las neumoconiosis con neumopatía restrictiva producen fibrosis pulmonar, pero no afectan a la vasculatura ni ocasionan tromboembolia.

40 **F** Los hallazgos de este estudio son sugestivos de una tromboembolia pulmonar, y la mayor parte de los émbolos pulmonares son pequeños y silentes clínicamente. Puede aparecer disnea cuando los émbolos son de tamaño mediano o grande. La hemoptisis es poco frecuente en la embolia pulmonar, aunque puede encontrarse en casos de tromboembolia asociados a infarto hemorrágico. El corazón pulmonar puede aparecer como consecuencia de embolizaciones repetidas con reducción del lecho vascular pulmonar, que se traduce en una insuficiencia cardíaca y arritmias con palpitaciones, aunque esta situación es infrecuente. Una tromboembolia con infarto de base en la pleura puede provocar dolor pleurítico. Es posible que se produzca la muerte súbita de pacientes con émbolos grandes que ocluyen las arterias

pulmonares principales antes de que se desarrollen otros cambios. La ortopnea causada por la ocupación de los espacios aéreos por líquido es más frecuente en la insuficiencia cardíaca.

41 **E** La figura corresponde a una tromboembolia pulmonar en silla de montar en las arterias pulmonares principales abiertas. La muerte súbita se produce, en estos casos, por hipoxemia o por un corazón pulmonar agudo con insuficiencia cardíaca derecha. Dado que las vías respiratorias no se obstruyen, los pulmones no se colapsan y no se observa efecto de masa sobre el parénquima pulmonar. No aparece broncoconstricción. Puesto que la evolución es muy aguda, no da tiempo a que se desarrolle un infarto pulmonar hemorrágico. La tromboembolia no se caracteriza por edema.

42 **D** Más de la mitad de los pacientes con una tromboembolia pulmonar crónica e hipertensión pulmonar no refieren antecedentes de embolias pulmonares de repetición. En general, más que por un émbolo único grande que suponga una amenaza para la vida, la tromboembolia crónica se produce por la presencia de múltiples émbolos pequeños que reducen el lecho vascular pulmonar y aumentan las presiones pulmonares, lo que ocasiona el corazón pulmonar. La recanalización de estos trombos genera unos canales estrechos, responsables de los soplos. Los anticuerpos antifosfolipídicos aumentan el riesgo de trombosis. Los factores de riesgo de la ateroesclerosis arterial sistémica no actúan sobre el lecho arterial pulmonar, y la ateroesclerosis pulmonar es consecuencia de la hipertensión pulmonar, no su causa. La neumonitis con inflamación parenquimatosa reduce la ventilación en mayor medida que la perfusión. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa idiopática que afecta, principalmente, al parénquima pulmonar. La vasculitis asociada a ANCA del árbol arterial pulmonar puede producir una oclusión vascular, pero en general también existe enfermedad parenquimatosa, además de afectación multisistémica.

43 **A** Los hallazgos en este paciente están asociados a una insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. La comunicación izquierda-derecha producida por la comunicación interauricular aumenta la presión de la arteria pulmonar, con engrosamiento

de las arterias pulmonares e incremento de la resistencia vascular pulmonar. Al final se puede producir una inversión de la comunicación, proceso que se denomina *complejo de Eisenmenger.* Los derrames pleurales son consecuencia de la insuficiencia cardíaca derecha asociada al corazón pulmonar. Las radiografías de tórax de este caso no muestran una enfermedad intersticial. La inflamación granulomatosa no se produce como consecuencia de un aumento de la presión arterial pulmonar, pero la inflamación granulomatosa extensa, como se observa en la sarcoidosis, puede conducir a una hipertensión pulmonar. En la embolia pulmonar puede producirse un infarto del pulmón. La fibrosis intersticial pulmonar puede ser consecuencia de enfermedades como las neumoconiosis, las enfermedades del tejido conjuntivo y la neumopatía intersticial granulomatosa; las neumopatías intersticiales pueden producir una hipertensión pulmonar. Es posible detectar una vasculitis pulmonar necrosante en enfermedades de mecanismo inmunitario, como las vasculitis asociadas a ANCA.

44 **B** La presencia de hipertensión pulmonar en una persona joven sin antecedentes de cardiopatía o enfermedad pulmonar conocida es típica en presencia de hipertensión pulmonar primaria. El aumento de la presión arterial pulmonar condiciona una hipertrofia del lado derecho del corazón. Las arterias pulmonares de gran calibre muestran ateroesclerosis, y las arteriolas presentan una arteriopatía plexógena con presencia de un ovillo de formaciones capilares que producen una trama o red que ocupa las luces de las arterias de pared delgada dilatadas. BMPR2, una proteína de la superficie celular miembro de la superfamilia del receptor de TGF-β, inhibe la proliferación de las células musculares lisas del vaso e induce la apoptosis. Cuando no existen señales de BMPR2, el músculo liso prolifera y se desarrolla hipertensión pulmonar. Las mutaciones en línea germinal con inactivación del gen de *BMPR2* se describen en el 50% de los casos de hipertensión pulmonar familiar (primaria) y en el 26% de los casos esporádicos. Ninguna de las demás moléculas mencionadas regula la estructura de la pared de la arteria pulmonar. El óxido nítrico endotelial controla el calibre vascular. El péptido natriurético de tipo B y la renina regulan la

homeostasis del sodio y del agua, la volemia y la presión arterial sistémica. La mutación del gen de la fibrilina 1 *(FBN1)* se produce en el síndrome de Marfan. La lisilo hidroxilasa es necesaria para que se produzca el entrecruzamiento del colágeno y su pérdida origina una variante del síndrome de Ehlers-Danlos.

45 **B** El síndrome de Goodpasture produce lesiones pulmonares y renales por un anticuerpo dirigido frente a un antígeno común a la membrana basal del glomérulo y al alvéolo. Este anticuerpo ocasiona una reacción de hipersensibilidad de tipo II. El anticuerpo anti-ADN topoisomerasa es un marcador de esclerodermia. Los anticuerpos antimitocondriales se asocian a cirrosis biliar primaria. C-ANCA y P-ANCA se consideran marcadores de las distintas formas de vasculitis sistémicas. Los ANA se emplean de forma general en la detección selectiva de diversos procesos autoinmunitarios, sobre todo de enfermedades del tejido conjuntivo, como el lupus eritematoso sistémico.

46 **D** La polivasculitis con granulomatosis, una variante de vasculitis asociada a ANCA, puede afectar a múltiples órganos, aunque los más frecuentes son los pulmones y los riñones. La prueba de C-ANCA (PR3) suele ser positiva en la granulomatosis con polivasculitis, mientras que la positividad de P-ANCA (MPO) es sugestiva de una polivasculitis microscópica. La afectación renal y pulmonar puede encontrarse en el síndrome de Goodpasture; los anticuerpos frente a la membrana basal glomerular pueden ser positivos, pero no se detectan C-ANCA ni P-ANCA. De las enfermedades del tejido conjuntivo, la esclerodermia es la que con más frecuencia provoca una enfermedad pulmonar significativa, pero la hemoptisis no es un rasgo prominente y es poco probable que C-ANCA sean positivos. En el lupus eritematoso sistémico la enfermedad renal es mucho más frecuente que la pulmonar y no cabe esperar que C-ANCA o P-ANCA sean positivos, sino que lo serán los anticuerpos anti-Smith y anti-ADNbc, que son más específicos del LES. Los anticuerpos frente a la MBG son una característica del síndrome de Goodpasture con extensa hemorragia intraalveolar. En la neumonitis por hipersensibilidad, que suele

ser consecuencia de la inhalación de actinomicetos termófilos, una respuesta de hipersensibilidad de tipo III inicial se sigue de una respuesta de tipo IV y no cabe esperar la afectación renal.

47 **A** Los gases anestésicos suelen reducir la función de los cilios del epitelio respiratorio que reviste los bronquios. El aparato mucociliar contribuye a eliminar los microorganismos y las partículas que se inhalan al interior del árbol respiratorio. La anestesia no influye de forma significativa sobre la función de los macrófagos. Las concentraciones de γ-globulinas séricas no se reducen por la anestesia. Los gases anestésicos y los fármacos de inducción no condicionan insuficiencia medular con neutropenia. La exposición a los gases anestésicos no es lo bastante prolongada como para ocasionar metaplasia escamosa, algo que se produce típicamente tanto en respuesta a la irritación crónica como en relación con el humo del tabaco. La región subglótica de la tráquea, donde se localiza el manguito del tubo endotraqueal, puede erosionarse, pero esta complicación es más probable cuando la intubación dura semanas.

48 **F** La tos con expectoración sugiere presencia de exudado alveolar con neutrófilos y la evolución es compatible con una infección aguda. Se debería sospechar presencia de bacterias. El neumococo es el microorganismo que es más probable encontrar en el cultivo de los pacientes con una neumonía adquirida en la comunidad, sobre todo cuando tienen un patrón de neumonía lobular, como en este caso. La neumonía atípica primaria por *Mycoplasma* no suele asociarse a esputos purulentos, salvo que se produzca una sobreinfección secundaria por bacterias, que es frecuente como complicación de las neumonías víricas o por *Mycoplasma*. Las infecciones por criptococos y micobacterias producen típicamente una enfermedad granulomatosa. La nocardiosis se describe también en pacientes inmunodeprimidos y produce una inflamación crónica con formación de abscesos. La neumonía por *Pneumocystis* se detecta en pacientes inmunodeprimidos y es poco probable que produzca una infección de patrón lobular.

49 **C** La corta evolución temporal y la respuesta inflamatoria aguda son compatibles con una neumonitis bacteriana.

Moraxella es la única bacteria recogida en la lista y se encuentra dentro del diagnóstico diferencial de las infecciones respiratorias altas y bajas, sobre todo en pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), como esta mujer. *Moraxella* es un diplococo gramnegativo que es positivo con oxidasa. La histoplasmosis es típicamente una enfermedad granulomatosa, que se produce en semanas. La infección por el virus de la gripe A es intersticial y no se asocia a neutrofilia. *M. kansasii* produce una enfermedad granulomatosa pulmonar parecida a la tuberculosis. La neumonía por *Pneumocystis* se suele encontrar en pacientes inmunodeprimidos.

50 **E** El absceso pulmonar a menudo es secundario a una aspiración, que puede producirse en personas con una depresión del reflejo tusígeno o en pacientes con trastornos neurológicos (p. ej., intoxicación alcohólica aguda, anestesia o enfermedad de Alzheimer). La aspiración es más frecuente en el pulmón derecho y el lóbulo inferior, dado que el bronquio principal del pulmón izquierdo crea un ángulo más agudo. Las bacterias suelen producir abscesos con más frecuencia, y la infección puede ser polimicrobiana. El patógeno más frecuente es *Staphylococcus aureus,* pero también pueden participar especies de *Bacteroides, Peptococcus* y *Fusobacterium.* Estos anaerobios se encuentran normalmente en la cavidad bucal y se aspiran con facilidad. El centro purulento y licuado de un absceso puede generar una imagen radiológica de un nivel hidroaéreo. Las infecciones por citomegalovirus, *Pneumocystis* y criptococos se producen en pacientes inmunodeprimidos y es típico que no se formen abscesos. La neumonía por *Candida* es infrecuente. Las infecciones por *Nocardia* y actinomices suelen producir abscesos crónicos sin una licuefacción significativa y afectan a pacientes inmunodeprimidos. La tuberculosis puede cursar con lesiones granulomatosas con cavitación central, que se pueden colonizar por *Aspergillus,* aunque no en unos días.

51 **C** Esta neumonía atípica primaria se debe a *Mycoplasma pneumoniae,* un microorganismo con una pared celular deficiente, que resulta difícil cultivar. Es frecuente realizar un diagnóstico empírico. Los hallazgos son parecidos a los encontrados en otras infecciones víricas, y las pruebas

serológicas demuestran el microorganismo específico. *Legionella* puede producir una neumonía extensa con exudados alveolares de neutrófilos, pero resulta difícil evidenciar los microorganismos –que pueden ponerse de manifiesto con la tinción de plata de Dieterle–. *Mycobacterium fortuitum* es una causa infrecuente de infección que suele observarse en pacientes muy enfermos o inmunodeprimidos. La nocardiosis produce inflamación crónica con formación de abscesos y se encuentra sobre todo en inmunodeprimidos. El virus sincitial respiratorio suele aparecer durante los primeros años de la infancia.

52 **A** El síndrome respiratorio agudo grave se debe a una cepa de coronavirus, que es mucho más virulenta que los coronavirus asociados al resfriado común. El citomegalovirus se encuentra en inmunodeprimidos y con frecuencia afecta a múltiples órganos. El virus del Ébola es virulento y no provoca síntomas respiratorios específicos. El virus del herpes simple es una causa muy poco frecuente de neumonía, incluso en inmunodeprimidos. El virus sincitial respiratorio provoca una enfermedad respiratoria aguda en niños pequeños.

53 **B** El desplazamiento antigénico de los virus de la gripe, por mutación con alteración menor de los genes de la hemaglutinina (H) o la neuraminidasa (N), les permite escapar de los anticuerpos del huésped. La deriva antigénica ocurre cuando aparece un cambio mayor de N, H o ambos, como sucedió con el H1N1 en este caso. Es fundamental que las proteasas del huésped degraden la hemaglutinina del virus de la gripe para que este penetre en las células. Los virus de la gripe menos virulentos son degradados por proteasas localizadas principalmente en los pulmones y, por eso, la enfermedad se suele limitar a estos. El virus H5N1 muestra un tropismo celular mucho más amplio porque su hemaglutinina puede ser degradada por proteasas presentes en muchos tejidos. Las respuestas del huésped frente a los virus de la gripe, como la respuesta por linfocitos T citotóxicos o el engullimiento por los macrófagos, no son determinantes clave de su capacidad patógena. La infección selectiva de los linfocitos T CD4+ es una tendencia del VIH. En este momento el virus de la gripe aviar no puede contagiarse de una persona a otra, pero, si llegara a

hacerlo, se produciría una pandemia de gripe aviar.

54 **F** El metaneumovirus humano es la segunda causa de infecciones respiratorias bajas en niños, después del virus sincitial respiratorio, y ambos resultan indistinguibles clínicamente. Esta paciente presenta principalmente una bronquiolitis. Igual que sucede en la mayor parte de las infecciones víricas, los infiltrados de células redondas son intersticiales y los pacientes de máximo riesgo son los muy jóvenes, los ancianos y los inmunodeprimidos. Las infecciones por estreptococos del grupo A provocan típicamente una faringitis. La infección por *Pertussis* es infrecuente cuando se vacuna a los niños; produce la tosferina cuando afecta a las vías respiratorias altas. Las infecciones por *Candida* de la vía respiratoria baja son infrecuentes, incluso en inmunodeprimidos. El citomegalovirus suele afectar a los pulmones de los inmunodeprimidos. *H. influenzae* normalmente ocasiona infiltrados parcheados de neutrófilos y tos con expectoración.

55 **C** La neumonía por el virus sincitial respiratorio (VSR) afecta más a los niños y puede producir epidemias. Las neumonías víricas, por clamidias y *Mycoplasma* suelen ser intersticiales, sin exudados de neutrófilos alveolares. El diagnóstico suele ser de presunción, porque el cultivo de los virus resulta difícil técnicamente y caro, como sucede con el análisis mediante PCR. La broncoconstricción en el asma puede asociarse a hiperinsuflación. La presencia de adenopatías marcadas es más típica de los procesos crónicos, como las enfermedades granulomatosas o las metástasis. La consolidación lobular es más típica de los procesos bacterianos, como, por ejemplo, las infecciones por *Streptococcus pneumoniae*. Los derrames pleurales pueden asociarse a los trastornos inflamatorios pulmonares, pero son más importantes en la insuficiencia cardíaca. La cavitación es más frecuente como complicación de una tuberculosis secundaria en adultos.

56 **D** Las infecciones por micobacterias no tuberculosas, como el complejo *Mycobacterium avium* (CMA), tienen más riesgo de diseminación en inmunodeprimidos. En los pacientes inmunocompetentes, estas infecciones suelen parecerse más a la

tuberculosis. Los microorganismos CMA acidorresistentes proliferan de forma intensa en los macrófagos del sistema mononuclear fagocítico. La aspergilosis y la candidiasis extensas y graves son más frecuentes en pacientes con una neutropenia grave, pero no cuando existe una linfopenia. *Legionella* provoca una neumonía bacteriana extensa, pero no enfermedad diseminada. La nocardiosis afecta a pacientes inmunodeprimidos y los microorganismos pueden mostrar una débil tinción acidorresistente, pero suelen asociarse a nódulos focales o una respuesta inflamatoria crónica con formación de abscesos.

57 **A** La figura muestra un tejido rosado y amorfo en el extremo inferior izquierdo, que corresponde a necrosis caseosa. El ribete del granuloma comprende células epitelioides y células gigantes de Langhans. La inflamación granulomatosa caseificada es más típica de la infección por *Mycobacterium tuberculosis*. La presencia de calcificaciones habría facilitado el reconocimiento de esta masa como un granuloma viejo, con menos posibilidad de corresponder a una neoplasia. Es poco probable que una vasculitis necrosante ocasione un nódulo solitario y puede asociarse a hemoptisis. El carcinoma puede presentar necrosis central, pero no caseificación y la masa estaría constituida por células pleomorfas y atípicas. En el infarto pulmonar se encontraría una hemorragia extensa. El absceso pulmonar presentaría un área de necrosis por licuefacción central llena de restos tisulares y neutrófilos.

58 **A** Esta «lesión numular» en las pruebas radiológicas pulmonares podría corresponder a un granuloma infeccioso, una neoplasia o un hamartoma. La fiebre es sugestiva de infección, y la presencia de una baja atenuación central en la TC del nódulo, de necrosis en una neoplasia o necrosis caseosa en un granuloma. La linfocitosis y la monocitosis orientan a una tuberculosis. Es poco probable que los no fumadores desarrollen neoplasias pulmonares primarias, aunque en estos casos el adenocarcinoma es la más frecuente. Los fumadores suelen sufrir carcinomas epidermoides y carcinomas anaplásicos de células pequeñas. En los pacientes inmunodeprimidos es más probable la aparición de infecciones por hongos, sobre todo por

especies de *Aspergillus,* que forman hifas tabicadas ramificadas. Los cristales de Charcot-Leyden se forman a partir de los gránulos de los eosinófilos en pacientes con un asma alérgica. Las células gigantes de cuerpo extraño pueden aparecer en las neumonías lipoideas. La tinción de Gram resulta muy útil para valorar la presencia de bacterias, y los bacilos gramnegativos, como las enterobacterias, provocan neumonías agudas y abscesos con neutrofilia.

59 **C** Estos hallazgos se corresponden con el denominado complejo de Ghon (o primario), que está constituido por un pequeño granuloma subpleural con extensos granulomas caseificados en los ganglios hiliares. El complejo de Ghon es una característica de la tuberculosis primaria, que suele ser una enfermedad subclínica de los individuos más jóvenes. La prueba de liberación de interferón γ es positiva cuando los linfocitos T se activan frente a los antígenos de *Mycobacterium tuberculosis* y es negativa en los pacientes vacunados contra el BCG. En los individuos inmunodeprimidos, como los infectados por el VIH, no se consigue montar una buena respuesta granulomatosa y presentan granulomas mal conformados más extensos, tuberculosis diseminada o ambos cuadros. Los anticuerpos anticentrómero son típicos de la esclerodermia localizada, que no se asocia a una afectación pulmonar importante, a diferencia de lo que sucede en la esclerodermia difusa. La prueba rápida de la reagina plasmática se emplea para el diagnóstico de la sífilis, que no se asocia a enfermedad pulmonar significativa. En la artritis reumatoide pueden encontrarse nódulos reumatoideos; estos pueden tener una localización subpleural, pero los pacientes típicamente presentan artritis. Los pacientes con fibrosis quística y aumento de la concentración de cloruro en el sudor (suele estar más elevada en los niños que en los adultos) presentan bronquiectasias diseminadas y desarrollan infecciones por bacterias, sobre todo por *Pseudomonas aeruginosa* y *Burkholderia cepacia*.

60 **B** La coccidioidomicosis es endémica en las regiones semiáridas de América. La especie *Coccidioides immitis* se encuentra en la región suroccidental de EE. UU., y *Coccidioides posadasii,* que es prácticamente idéntico, se encuentra desde

México hasta América del Sur. Los hongos dimorfos pueden producir infecciones granulomatosas, que se parecen a la tuberculosis. El patrón miliar descrito en este paciente se encuentra cuando la respuesta inmunitaria es mala. *Blastomyces dermatitidis* mide menos de 10 µm y tiene una gemación de base amplia. *Histoplasma capsulatum* mide 2-4 µm y a menudo se encuentra dentro de células fagocíticas. Las micobacterias son microorganismos acidorresistentes que solo miden 1 µm. *Nocardia* es una bacteria filamentosa larga que pueden teñirse de forma débil con la tinción acidorresistente. *Paracoccidioides brasiliensis* puede medir 20-30 µm y presenta múltiples gemaciones, con una configuración en «timón de barco».

61 **D** La radiografía de la imagen muestra una importante cavitación del lóbulo superior, típica de la reactivación-reinfección por tuberculosis en adultos. *Candida* es una causa infrecuente de infección pulmonar. Las infecciones por el virus de la gripe se asocian principalmente a inflamación intersticial por células mononucleares. Las bacterias, como *Legionella*, se asocian a un riesgo aumentado de bronconeumonía diseminada con exudados alveolares de neutrófilos. Las infecciones por *Mycoplasma* producen principalmente una inflamación intersticial por células mononucleares. Las nocardiosis pulmonares producen sobre todo una inflamación crónica con formación de abscesos.

62 **A** Existen varios patrones de afectación pulmonar por las distintas especies de *Aspergillus*. Los pacientes inmunodeprimidos con neutropenia pueden presentar una aspergilosis invasiva. Otros patrones son la aspergilosis broncopulmonar alérgica en pacientes asmáticos y el aspergiloma, o bola micótica, que coloniza una cavidad tuberculosa o una bronquiectasia. La candidiasis también puede asociarse a una neutropenia, pero es más raro que ocasione una afectación pulmonar extensa, aparece como células en gemación con seudohifas y es más habitual que provoque infecciones bucales, nasales o faríngeas. La criptococosis puede ocasionar infecciones pulmonares extensas, sobre todo cuando existe una pérdida de la inmunidad celular y los microorganismos tienen cápsulas mucoides gruesas y presentan una gemación de base

estrecha. *Moraxella* es una bacteria que suele ocasionar sinusitis, otitis e infecciones respiratorias altas. *Mucor* aparece como hifas no tabicadas amplias y suele ser una complicación de la cetoacidosis diabética, con afectación nasal.

63 **C** Dentro de los espacios aéreos se encuentran múltiples células grandes con prominentes inclusiones intranucleares de color morado, típicas de CMV. Es posible encontrar anticuerpos frente al CMV en la mayor parte de los pacientes inmunocompetentes, pero la infección es subclínica. Sin embargo, en los inmunodeprimidos, la infección por CMV puede ser grave y sistémica, y se asocia a una neumonitis intersticial grave. Los demás microorganismos que se enumeran son mucho más pequeños. *Candida* es una causa poco frecuente de neumonía y sus levaduras aparecen como células en gemación y seudohifas. Los criptococos tienen una gemación de base estrecha y cápsulas mucoides gruesas. *Klebsiella pneumoniae* son bacterias encapsuladas, pero su tamaño es demasiado pequeño para verlas con H-E. *Pneumocystis* se visualiza mejor con la tinción de plata metenamina de Gomori y tienen aspecto de quistes redondeados o con forma de copa.

64 **C** Aunque la neumonía por *Pneumocystis jiroveci* puede aparecer en pacientes con diversos tipos de inmunodepresión adquirida o congénita (sobre todo cuando se afecta la inmunidad celular), lo hace sobre todo asociada a sida y es diagnóstica de este en los individuos con infección por el VIH. Los diabéticos y los pacientes con enfisema pulmonar muestran una mayor tendencia a desarrollar infecciones bacterianas. Los pacientes con enfermedades autoinmunitarias pueden presentar citopenias, que les predisponen a sufrir infecciones y, si son tratados con inmunodepresores, pueden presentarlas de diverso tipo. También los pacientes con una sarcoidosis que reciben tratamiento con corticoesteroides pueden sufrir infecciones oportunistas. Un paciente con inmunodeficiencia combinada grave puede desarrollar una neumonía por *P. jiroveci,* pero es poco probable que sin tratamiento estos pacientes sobrevivan hasta los 40 años.

65 **G** Entre todos los carcinomas de pulmón, el epidermoide es el que se relaciona con mayor probabilidad con hipercalcemia

paraneoplásica y muestra una potente asociación al tabaquismo. Estos tumores también pueden sufrir una necrosis central y esto genera una cavidad. Los carcinomas epidermoides localizados, a diferencia de los carcinomas de células pequeñas, pueden curarse con cirugía. Los adenocarcinomas y los carcinomas de células grandes suelen producir masas periféricas y, en general, se asocian menos a síndromes paraneoplásicos. El sarcoma de Kaposi que afecta a los órganos viscerales se suele asociar a sida y a menudo es multifocal. Los carcinomas de células renales pueden asociarse a hipercalcemia, pero las metástasis suelen ocasionar masas múltiples (aunque, de todos los tumores metastásicos, el carcinoma de células renales es el que con más probabilidad causa metástasis solitarias). Los linfomas no hodgkinianos no suelen tener efectos paraneoplásicos; son poco frecuentes en el pulmón y no se asocian a tabaquismo. Los carcinomas de células pequeñas nunca están lo bastante localizados como para poder realizar una cirugía curativa (se suelen detectar en estadio avanzado), aunque a menudo producen distintos síndromes paraneoplásicos, si bien es menos probable que se asocien a hipercalcemia.

66 **A** La larga evolución y la pérdida de peso son sugestivas de un proceso crónico debilitante. La radiografía muestra múltiples masas. La naturaleza focal de las lesiones, con conservación de cierta capacidad de reserva pulmonar, indica que la función pulmonar medida sigue siendo normal. El proceso neoplásico más frecuente en el pulmón son las metástasis, dado que muchos tumores primarios extrapulmonares pueden extenderse a los vasos y diseminarse por vía hematógena y el pulmón tiene un rico lecho capilar para que lo colonicen los émbolos de células tumorales. Los marcadores inmunohistoquímicos de este adenocarcinoma podrían ayudar a identificar el origen primario, aunque a veces no lo hacen. Según los marcadores podría disponerse de tratamientos antineoplásicos específicos o no. La ausencia de fiebre o datos de inflamación condiciona que un proceso infeccioso sea poco probable. La vasculitis necrosante puede provocar una hemoptisis. La silicosis es poco probable cuando no existe exposición ambiental de tipo laboral y las lesiones provocan una neumopatía restrictiva.

67 **E** El gen *ALK* codifica un receptor de tirosina cinasa que se activa por fusión con el gen *EML*. La fusión *ALK-EML* (igual que *BCR-ABL* en la leucemia mieloide crónica) puede ser antagonizada por inhibidores de tirosina cinasa. Las mutaciones con ganancia de función en múltiples genes que codifican receptores de tirosina cinasa, incluidos *EGFR, ALK, ROS, MET* y *RET,* se encuentran en los adenocarcinomas con frecuencia. Estos tumores suelen ser masas periféricas. Además de las mutaciones de *EGFR,* es posible antagonizar las mutaciones del gen *ALK* en un subgrupo de adenocarcinomas de pulmón que presentan estos cambios moleculares. Todos los demás genes, aunque están mutados de forma más frecuente en diversos cánceres, no pueden ser antagonizados con ninguno de los fármacos existentes.

68 **A** Los cánceres que aparecen en pacientes no fumadores tienen una patogenia distinta de los que se producen en fumadores. Pueden presentar mutaciones en *EGFR* o *KRAS*. La mayoría son adenocarcinomas. El 25% de los cánceres de pulmón de todo el mundo afectan a pacientes no fumadores. Los adenocarcinomas pulmonares primarios suelen ser masas periféricas pequeñas, que pueden extirparse quirúrgicamente y muestran un pronóstico global mejor que otros tipos de cáncer pulmonar. En general son muchos más frecuentes los adenocarcinomas metastásicos en el pulmón que los adenocarcinomas primarios. Los carcinoides bronquiales son lesiones intrabronquiales poco frecuentes. Los hamartomas son masas pequeñas y periféricas que contienen elementos benignos de tipo epitelial y conjuntivo. Los carcinomas de células grandes son lesiones demasiado indiferenciadas como para considerarlas adenocarcinomas o carcinomas epidermoides. Los cánceres más frecuentes en fumadores son los carcinomas anaplásicos de células pequeñas y los carcinomas epidermoides.

69 **F** El síndrome de Cushing es un síndrome paraneoplásico que se debe a la producción ectópica de corticotropina (sobre todo en relación con un carcinoma de células pequeñas pulmonar), lo que condiciona que la corteza suprarrenal produzca una cantidad excesiva de cortisol. Los carcinomas de células pequeñas son tumores neuroendocrinos invasivos que suelen

producir metástasis de forma precoz. Aunque parezcan pequeños y localizados, en realidad no lo son o pronto dejarán de serlo. La cirugía no es una opción en estos pacientes. Son tratados como si presentaran una enfermedad sistémica; algunos protocolos de quimioterapia consiguen beneficios durante 1 año o más, aunque es raro que estos pacientes se curen. Los adenocarcinomas y los carcinomas de células grandes suelen ser neoplasias periféricas en el pulmón y es menos probable que produzcan un síndrome paraneoplásico. Los carcinoides bronquiales son el extremo más benigno del espectro de los tumores neuroendocrinos, suelen ser pequeños y no producen efectos paraneoplásicos; en raras ocasiones se asocian a un síndrome carcinoide. Los linfomas no hodgkinianos no suelen afectar a los pulmones, no se asocian a tabaquismo ni provocan un síndrome de Cushing. El carcinoma epidermoide puede ser central y afecta a fumadores, pero suelen asociarse más a hipercalcemia como síndrome paraneoplásico.

70 **A** El adenocarcinoma *in situ* (AIS), llamado antes *carcinoma bronquioloalveolar,* puede presentarse como un tumor periférico y confundirse con una neumonía. La mayor parte de estos tumores están bien diferenciados. Los adenocarcinomas y los carcinomas de células grandes suelen ser periféricos, pero los primeros producen una masa localizada, mientras que las células de los segundos suelen ser grandes y pleomorfas y forman láminas; a veces resulta difícil distinguirlos. Los mesoteliomas aparecen casi siempre en pacientes con antecedentes de exposición al asbesto; se trata de grandes masas pleurales. Las metástasis suelen producir nódulos múltiples. Los carcinomas epidermoides pueden ser periféricos (aunque la mayor parte de ellos son centrales) y están constituidos por células rosadas y poligonales con puentes intercelulares. Si están bien diferenciados, los carcinomas epidermoides presentan perlas córneas.

71 **D** Este paciente probablemente presente un carcinoma anaplásico de células pequeñas (células en avena) pulmonar que con mayor probabilidad se asocie a un síndrome paraneoplásico, como el síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH) con retención de agua libre e hiponatremia. Los carcinomas de

células en avena suelen ser masas centrales y se asocian de forma importante a tabaquismo. La cavitación del lóbulo superior sugiere una tuberculosis secundaria. Las placas en la pleura diafragmática pueden ser una característica de las neumoconiosis, sobre todo la asbestosis. Los infiltrados pueden sugerir un proceso inflamatorio. El neumotórax se suele asociar a un traumatismo torácico más que a una neoplasia. Un nódulo subpleural con adenopatía hiliar es el clásico complejo de Ghon de la tuberculosis primaria, que no suele cursar con hemoptisis. La presencia de un nivel hidroaéreo es sugestiva de licuefacción en un absceso.

72 **C** El síndrome de Horner es consecuencia de una afectación de los nervios simpáticos por un carcinoma pulmonar infiltrante. Una neoplasia de esta localización y con estos hallazgos asociados se denomina *tumor de Pancoast*. Los procesos infecciosos, como la neumonía, no suelen atrapar estructuras extrapulmonares. Las bronquiectasias destruyen los bronquios dentro del pulmón. La sarcoidosis puede asociarse a importantes adenopatías hiliares con efecto de masa, pero la afectación del sistema nervioso periférico es poco probable. La tuberculosis es una enfermedad granulomatosa que puede asociarse a adenopatías biliares, aunque en general no destruye tejidos extrapulmonares.

73 **B** Los hamartomas son lesiones pulmonares poco frecuentes, periféricas y benignas. Están constituidas por células epiteliales de aspecto benigno y tejido conjuntivo, en general con abundante cantidad de cartílago. Forman parte del diagnóstico diferencial de las «lesiones numulares», que incluye también granulomas y carcinomas. El adenocarcinoma es el tumor maligno pulmonar primario más frecuente en no fumadores y puede manifestarse como una lesión numular, pero está constituido por células malignas, que conforman glándulas sin cartílago. Suele ser periférico y esto condiciona que en muchos casos se pueda plantear la resección quirúrgica. Los carcinomas de células grandes tienen más probabilidades de ser periféricos, pero suelen ser masas de mayor tamaño con células poco diferenciadas. El mesotelioma maligno es una neoplasia poco frecuente, incluso en los pacientes expuestos al asbesto y se

origina en la pleura. Los linfomas no hodgkinianos primarios de pulmón son poco frecuentes, pero pueden afectar a los ganglios mediastínicos o hiliares. Algunos carcinomas epidermoides pueden ser periféricos, pero son más probables en pacientes fumadores.

74 **B** La mayor parte de los carcinoides pulmonares son masas obstructivas centrales, que afectan a un bronquio de calibre grande o intermedio. El comportamiento biológico de estos tumores neuroendocrinos resulta impredecible, pero muchos son localizados, resecables y de comportamiento benigno. Se manifiestan típicamente con hemoptisis y las consecuencias de una obstrucción bronquial. En este caso, la neumonía del lóbulo superior derecho se produjo posiblemente como consecuencia de la obstrucción del drenaje causada por el tumor. La obstrucción puede producir una atelectasia por reabsorción periférica. Los adenocarcinomas son tumores pulmonares frecuentes, pero típicamente son periféricos. El hamartoma es una lesión pulmonar infrecuente y benigna, que también tiene una localización periférica. El sarcoma de Kaposi puede afectar a los pulmones en algunos pacientes con sida y con frecuencia sigue una distribución broncovascular. No es frecuente que cause obstrucción, pero suele sangrar al tomar la biopsia. Los carcinomas de células grandes son típicamente masas grandes, periféricas y voluminosas.

75 **F** Los hallazgos en el líquido pleural son típicos de un quilotórax, que es infrecuente pero característico. La linfa es rica en linfocitos, proteínas y lípidos (quilomicrones). La rotura del conducto torácico en la parte posterior del tórax es la causa más probable de quilotórax, y las neoplasias malignas, como los linfomas no hodgkinianos, son el motivo más frecuente de esta situación. El empiema está constituido por pus formado por exudado de neutrófilos y podría tener un aspecto turbio y amarillento. Las cardiopatías congénitas pueden provocar una insuficiencia cardíaca congestiva con un derrame seroso. La disección aórtica es un proceso agudo, que puede provocar un hemotórax. La cirrosis se suelen asociar a ascitis o insuficiencia hepática con hipoalbuminemia que produce un hidrotórax. La tuberculosis miliar cursa con un patrón reticulonodular en la

radiografía de tórax; este cuadro puede producir derrames hemorrágicos.

76 **B** Hallazgos en el líquido pleural como concentraciones de proteínas y LDH bajas y un recuento celular disminuido son compatibles con un trasudado con hidrotórax. La hipertensión del paciente posiblemente haya ocasionado una insuficiencia cardíaca izquierda con edema pulmonar y esta insuficiencia prolongada del ventrículo izquierdo puede culminar en una insuficiencia ventricular derecha con aparición de derrames en las cavidades corporales y edema periférico. Las enfermedades granulomatosas, incluida la tuberculosis, junto con los carcinomas primarios o metastásicos en la pleura, suelen ocasionar derrames celulares con cifras elevadas de eritrocitos. El mesotelioma suele descamar muchas células hacia la cavidad pleural, aunque en la mayor parte de los casos se trata de un tumor denso que oblitera la cavidad pleural. Los linfomas pueden bloquear los linfáticos, incluido el conducto torácico, y producen un quilotórax lechoso con lípidos y leucocitos. Las neumonías bacterianas que afectan a la pleura suelen producir un exudado con numerosos leucocitos, sobre todo neutrófilos.

77 **A** El mesotelioma maligno es un tumor poco frecuente, incluso en personas con antecedentes de exposición al asbesto. El tumor puede debutar décadas después de la exposición y no se relaciona con su intensidad o duración. El carcinoma broncógeno es más frecuente en personas con antecedentes de exposición al asbesto, especialmente si también fumaban. La inhalación de polvo de los excrementos de aves puede producir una neumonitis por hipersensibilidad. La inhalación de polvo de carbón puede provocar una marcada antracosis, sin riesgo significativo de cáncer de pulmón. La inhalación de fibras de algodón (bisinosis) produce síntomas parecidos a los del asma por broncoconstricción. El ozono y los óxidos de nitrógeno del aire contaminado pueden ocasionar dificultades respiratorias agudas, pero, hasta donde se sabe, no promueven la aparición de neoplasias. La silicosis se caracteriza por fibrosis intersticial y determina un ligero aumento del riesgo de carcinoma broncógeno.

78 **F** El tumor fibroso solitario o mesotelioma localizado de la

pleura (o el peritoneo) es una neoplasia poco frecuente que aparece como una masa pediculada. No se relaciona con la exposición al asbesto u otros patógenos ambientales. Tras la resección, no se producen recidivas ni metástasis de muchos de estos tumores, aunque los grandes, con más mitosis y en pacientes de mayor edad (> 55 años) tienen un riesgo de metástasis más elevado. Los carcinomas bronquioloalveolares son masas periféricas (pero sí intraparenquimatosas) con crecimiento de células epiteliales siguiendo la estructura del pulmón. El hamartoma es una masa intraparenquimatosa periférica con un importante componente de tejido conjuntivo fibroso y presencia de cartílago. El linfoma de Hodgkin suele afectar a los ganglios mediastínicos. El mesotelioma maligno forma una masa pleural mal delimitada; las células son atípicas y se tiñen con citoqueratinas. Las metástasis suelen ser múltiples y producir derrames hemorrágicos.

CAPÍTULO
16

Cabeza y cuello

PEF9 Capítulo 16: Cabeza y cuello

PH9 Capítulo 14: Cavidad oral y tubo digestivo

1 Un hombre de 47 años consulta al odontólogo para una revisión habitual. Afirma que le sangran las encías con facilidad al cepillarse los dientes. En la exploración se observa una notable retracción gingival con eritema y también abundante presencia de placa y formación de sarro en las superficies dentales. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que se asocie al desarrollo de estas lesiones bucales?

A *Actinobacillus*
B *Candida*
C Virus de Epstein-Barr
D Virus del herpes simple
E Virus del papiloma humano
F *Mucor circinelloides*

2 Una chica de 17 años observa una zona de sensibilidad pequeña y de color blanco grisáceo en el margen lateral de su lengua 2 días antes de sus exámenes finales. La exploración revela que está afebril. Se reconoce una lesión poco profunda, ulcerada de 0,3 cm con un ribete eritematoso. No se administra tratamiento específico y esta lesión desaparece en 2 semanas. La anamnesis indica que la paciente no fuma ni bebe alcohol. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Úlcera aftosa
B Estomatitis por el virus del herpes simple
C Leucoplasia
D Muguet bucal
E Sialoadenitis

3 Una mujer de 55 años se nota un nódulo al frotar la lengua

contra la cara interna de la mejilla. En la exploración por parte del odontólogo se encuentra un nódulo firme indoloro de 0,6 cm recubierto por mucosa bucal rosada en la línea de mordida cerca del primer molar en el extremo inferior derecho. Se extirpa la lesión y no recidiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Candidiasis
B Fibroma
C Leucoplasia
D Granuloma piógeno
E Sialoadenitis

4 Una mujer de 23 años primigrávida observa un nódulo de crecimiento rápido cerca de un diente desde hace 16 días. En la exploración física se identifica una masa pediculada blanda y rojiza de 1 cm por encima del incisivo superior izquierdo. Se informa a la paciente de que posiblemente se produzca la regresión de esta lesión. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable que se encuentre en esta lesión?

A Tejido de granulación
B Proliferación linfoide
C Exudado de neutrófilos
D Rabdomiosarcoma
E Hiperplasia escamosa

5 Un hombre de 25 años nota varias vesículas claras de 0,3 cm en el labio superior después de tener un episodio de gripe. Cuando las vesículas se rompen dejan úlceras poco profundas y dolorosas que se curan en unos 10 días. A los 3 meses, después de viajar a la nieve, el paciente desarrolla vesículas parecidas con el mismo patrón de cicatrización. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que se asocie a estas lesiones?

A Células en gemación con seudohifas
B Infiltrados inflamatorios mononucleares
C Neutrófilos con abscesos
D Hiperqueratosis del epitelio escamoso
E Inclusiones intranucleares

6 Un hombre de 35 años positivo para el VIH refiere que le sabe «mal» la boca y que tiene una decoloración de la lengua desde hace 6 semanas. En la exploración física se reconocen placas adherentes, bien delimitadas, de color amarillento-grisáceo en las superficies

laterales de la lengua. Estas placas se pueden desprender como si fueran seudomembranas y muestran una base granular eritematosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Úlcera aftosa
B Queilosis
C Leucoplasia vellosa
D Estomatitis herpética
E Leucoplasia
F Muguet bucal

7 Un hombre de 42 años refiere sensación de mal sabor de boca constante durante el último mes. En la exploración física se observan placas algodonosas blancas en las caras laterales de la lengua que no se consigue desprender. Se obtiene una biopsia, y en el estudio histológico se identifican hiperqueratosis del epitelio escamoso, paraqueratosis y coilocitosis. La tinción inmunohistoquímica para el virus de Epstein-Barr (VEB) es positiva. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es el más probable en estas lesiones bucales?

A Alcoholismo crónico
B Diabetes mellitus
C Infección por el VIH
D Anemia perniciosa
E Síndrome de Sjögren



8 Un hombre de 58 años, fumador de puros, consultó al odontólogo para una revisión habitual. Este observó unas lesiones cuyo aspectos clínico *(A)* e histológico *(B)* se muestran en las figuras. En la anamnesis no se encontraron problemas médicos

importantes. ¿Cuál de los siguientes factores etiológicos es más probable que contribuyera al desarrollo de estas lesiones?

A Sialoadenitis crónica
B Caries dental
C Ingesta de alimentos ahumados
D Virus del herpes simple de tipo 1
E Consumo de tabaco

9 Un hombre de 51 años originario de Kolkata presenta una zona de depresión en la boca que ha aumentado de tamaño durante los últimos 7 meses. En la exploración bucal destaca una zona eritematosa aterciopelada de 1,5 × 0,7 cm, con erosiones focales en la superficie en la mucosa bucal izquierda. Se extirpa la lesión y el estudio histológico revela displasia del epitelio escamoso. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que contribuya al desarrollo de esta lesión?

A Candidiasis
B Mala oclusión dental
C Infección por el virus de Epstein-Barr
D Inmunodepresión
E Ingesta de alimentos calientes y especiados
F Mascar tabaco



10 Un hombre de 49 años ha mascado tabaco durante muchos

años. En la exploración se identifica una lesión, mostrada en la figura, en el paladar duro. No se puede desprender mediante raspado. Se realiza una biopsia y el estudio histológico muestra una mucosa escamosa engrosada. A los 4 años, una biopsia de una lesión parecida revela un carcinoma *in situ.* ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Muguet bucal
B Liquen plano
C Leucoplasia
D Granuloma piógeno
E Xerostomía

11 Un hombre de 54 años, no fumador, presenta una úlcera sin tendencia a cicatrizar en la base de la lengua en el lado derecho desde hace 2 meses. En la exploración, la lesión mide 1 cm de diámetro y tiene márgenes irregulares. Se biopsia la lesión y el estudio histológico muestra un carcinoma epidermoide infiltrante. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que se asocie a esta lesión?

A *Candida albicans*
B Virus del herpes simple (VHS)
C Virus del papiloma humano (VPH)
D *Prevotella intermedia*
E *Streptococcus* del grupo A

12 Una mujer de 19 años ha observado tumefacción en la parte posterior de su boca desde hace 2 meses. La exploración odontológica muestra una zona de tumefacción en la zona del tercer molar izquierdo. Las radiografías dentales revelan un quiste unilocular, radiotransparente y bien delimitado alrededor de la corona del tercer molar mandibular, que no ha erupcionado. Se extirpa la lesión y su estudio histológico muestra un quiste revestido por epitelio escamoso estratificado y rodeado de infiltrado inflamatorio crónico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Ameloblastoma
B Quiste dentígero
C Queratoquiste odontógeno
D Odontoma
E Quiste/granuloma periapical

13 Un hombre de 19 años refiere una tumefacción progresiva en el lado izquierdo de la cara desde hace 1 año. En la exploración física se confirma la presencia de una tumefacción indolora en la región de la mandíbula posterior izquierda. La TC craneal muestra un quiste multilocular delimitado en la rama mandibular izquierda. Se extirpa quirúrgicamente la lesión con márgenes óseos amplios. El estudio histológico de la lesión revela quistes revestidos por epitelio escamoso estratificado con una llamativa capa basal; no se identifica inflamación ni tejido de granulación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Ameloblastoma
B Quiste dentígero
C Queratoquiste odontógeno
D Odontoma
E Quiste/granuloma periapical

14 Un hombre de 26 años refiere dificultad para respirar a través de la nariz desde hace 3 años, pero su situación ha empeorado de forma progresiva en los últimos 2 meses. En la exploración física se identifican unas masas polipoideas brillantes y translúcidas que llenan las cavidades nasales. El estudio histológico de las masas extirpadas muestra mucosa respiratoria que recubre un estroma edematoso con aisladas células plasmáticas y eosinófilos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que muestre este paciente?

A Aumento de la concentración de hemoglobina A_{1c} sérica
B Aumento de la concentración de IgE sérica
C Tinción nuclear para los antígenos del virus de Epstein-Barr
D Resultados positivos en la prueba de ANA
E Cultivo tisular positivo para *Staphylococcus aureus*

15 Una mujer de 39 años ha presentado cefalea, opresión facial, obstrucción nasal con rinorrea y reducción del gusto durante los últimos 6 meses. En la exploración física se observan molestias a la palpación del seno maxilar izquierdo. No se identifican lesiones bucales. La rinoscopia revela eritema nasal, edema importante y secreción purulenta. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que suceda en este paciente?

A Mucocele
B Carcinoma nasofaríngeo

C Osteomielitis
D Papiloma nasosinusal
E Linfoma T

16 El día 13 de diciembre de 1799, George Washington, poco después de jubilarse como primer presidente de EE. UU., desarrolló un «catarro» con ligera ronquera. A la mañana siguiente tenía dificultad para respirar y deglutir, y odinofagia. Se trató de la forma habitual en esa época, con sangrías. Si se hubieran registrado sus constantes vitales, podría haberse encontrado una temperatura de 37,8 °C, un frecuencia cardíaca de 115 latidos/min, un frecuencia respiratoria de 24 respiraciones/min y una presión arterial de 90/60 mmHg. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que produjera su enfermedad?

A Coronavirus
B *Corynebacterium diphtheriae*
C *Haemophilus influenzae*
D Virus paragripal
E *Prevotella intermedia*
F *Streptococcus* del grupo A

17 Una niña de 3 años presenta dificultad respiratoria desde hace 24 h. En la exploración física está febril y presenta tos seca con un llamativo estridor inspiratorio. Los pulmones están limpios en el momento de realizar la auscultación pulmonar. La radiografía anteroposterior del cuello muestra el signo del campanario causado por un edema que condiciona la pérdida de los hombros normales de la porción subglótica de la laringe. La saturación de oxígeno del niño es normal en la pulsioximetría. La paciente mejora en los 3 días siguientes mientras recibe tratamiento con glucocorticoides nebulizados. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es la causa más probable del proceso de esta paciente?

A *Corynebacterium diphtheriae*
B Virus de Epstein-Barr
C *Haemophilus influenzae*
D Virus del papiloma humano
E Virus paragripal
F *Streptococcus* del grupo A

18 Una niña de 9 años refiere odinofagia de 2 días de evolución. En

la exploración física presenta eritema faríngeo con exudados amarillentos sobre unas amígdalas palatinas edematosas. La tinción con Gram del exudado muestra cadenas de cocos grampositivos. Se administra penicilina a la paciente. ¿Cuál es la complicación más frecuente que se puede evitar con el tratamiento precoz de esta paciente?

A Carditis
B Hepatitis
C Meningitis
D Otitis
E Neumonitis

19 Un hombre de 48 años procedente de Hong Kong lleva 4 meses con dificultad para respirar a través de la nariz y refiere dolor facial sordo. En la exploración física se reconoce una masa que ocupa la cavidad nasal derecha. La TC craneal muestra una masa nasofaríngea derecha de 5 cm que erosiona el hueso adyacente. Se extirpa la masa, y el estudio histológico muestra que está constituida por células epiteliales grandes con márgenes mal definidos y llamativos núcleos. Se observan linfocitos maduros dispersos en el seno de la neoplasia indiferenciada. ¿Cuál de los siguientes factores etiológicos es más probable que haya tenido una mayor implicación en la aparición de esta lesión?

A Rinitis alérgica
B Vasculitis asociada a ANCA
C Infección por el virus de Epstein-Barr
D Síndrome de Sjögren
E Tabaquismo

20 Un hombre de 28 años, cantante y compositor, está pasando dificultades desde hace 3 años. Ha tocado en un par de clubs alguna noche para ganar el dinero suficiente como para no caer en la indigencia. Acude al centro sanitario público gratuito porque ha observado que su voz es cada vez más ronca desde hace 1 año. En la exploración está afebril y no se palpan masas en la región de la cabeza y del cuello. No refiere tos ni expectoración relevante, pero en consultas previas se le había sugerido que dejara de fumar. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que produzca estos hallazgos?

A Crup

B Supraglotitis
C Nódulo reactivo
D Carcinoma epidermoide
E Papilomatosis escamosa

21 Un niño de 6 años ha presentado dificultad respiratoria progresiva y las características de su voz se han modificado durante los últimos 3 meses. La endoscopia muestra tres excrecencias rosadas blandas en las cuerdas vocales verdaderas y la región subglótica. Las masas miden 0,6-1 cm de diámetro. El estudio histológico de las masas extirpadas revela proyecciones digitiformes de epitelio escamoso ordenado que revisten unos ejes fibrovasculares centrales. La inmunotinción para antígenos del virus del papiloma humano 6 es positiva. En función de estos hallazgos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es lo mejor que podría decir a los padres de este niño?

A Es precisa la laringectomía total
B Puede tener una cardiopatía congénita
C El niño no debería utilizar excesivamente la voz
D Es probable que las lesiones recurran
E Está indicado el tratamiento con aciclovir



22 Un hombre de 58 años que estaba preocupado por una ronquera cada vez más importante de casi 6 meses de evolución ha presentado un episodio de hemoptisis. En la exploración no se encuentran lesiones en la cavidad nasal o bucal. Se identifica un ganglio cervical anterior firme e indoloro. La lesión que muestra esta figura se identificó en la endoscopia. Se hizo una biopsia al paciente, tras la cual se procedió a una laringectomía con disección cervical. ¿Cuál de los siguientes factores etiológicos es más probable que haya tenido la máxima implicación en la aparición de esta lesión?

A Infección por el virus de Epstein-Barr
B Infección por el virus del papiloma humano
C Brotes de aspiración repetidos
D Tabaquismo
E Hipersensibilidad de tipo I

23 Un niño de 5 años ha presentado brotes repetidos de otalgia durante 3 años. Cada vez que se explora al paciente, se identifica

durante los brotes una membrana timpánica enrojecida y abultada, de forma uni- o bilateral, a veces asociada a una pequeña cantidad de exudado amarillento. Las pruebas de laboratorio han incluido cultivos de *Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa* y *Moraxella catarrhalis.* La exploración más reciente muestra una perforación de la membrana timpánica derecha. El paciente responde a los antibióticos. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que sea consecuencia de estos episodios?

A Colesteatoma
B Granuloma eosinófilo
C Laberintitis
D Otoesclerosis
E Carcinoma epidermoide

24 Un hombre de 64 años ha presentado hipoacusia progresiva, sobre todo izquierda, durante los últimos 10 años. La audiometría muestra una hipoacusia de conducción ósea. La TC craneal no presenta alteraciones. La madre y un hermano del paciente tienen un cuadro parecido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Colesteatoma
B Condrosarcoma
C Otitis media
D Otoesclerosis
E Schwannoma

25 Una mujer de 25 años está preocupada por un bulto en el lado izquierdo del cuello que no ha cambiado de tamaño durante el último año. En la exploración física se detecta un nódulo subcutáneo indoloro y móvil de 3 cm en la parte lateral izquierda del cuello, justo por encima del nivel del cartílago tiroides. No se encuentran otras alteraciones significativas. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina de la masa. Su médica queda sorprendida por el informe de anatomía patológica, que afirma literalmente «restos celulares granulares y queratósicos». Por suerte, la médica conserva el libro sobre anatomía patológica de Robbins de cuando estudió la carrera de Medicina. Consulta el capítulo sobre cabeza y cuello usando los datos del informe para tratar de llegar al diagnóstico. ¿Cuál de los siguientes términos es el que mejor describe este nódulo?

A Quiste branquial

B Carcinoma de tiroides metastásico
C Mucocele
D Tumor mucoepidermoide
E Paraganglioma
F Quiste del conducto tirogloso

26 Una joven de 17 años está preocupada por un bulto en el cuello que ha notado desde hace unos meses. No le parece que haya aumentado de tamaño durante este período. En la exploración se identifica un nódulo delimitado y ligeramente móvil en la línea media cervical, adyacente a la región del hioides. Se extirpa el nódulo y el estudio histológico muestra una masa quística revestida por epitelio escamoso y respiratorio, rodeado por tejido fibroso con nódulos linfoides. ¿Cuál de los siguientes elementos histológicos adicionales sería más probable encontrar adyacente a este quiste?

A Linfoma maligno
B Granulomas no caseificados
C Glándulas salivales serosas
D Carcinoma epidermoide
E Folículos tiroideos

27 Una mujer de 56 años ha notado un bulto cada vez más grande en el lado derecho del cuello desde hace 7 meses. En la exploración física se identifica un nódulo de 3 cm en la parte superior derecha del cuello, medial al músculo esternocleidomastoideo y lateral a la tráquea en el ángulo mandibular. La TC muestra una masa delimitada sólida adyacente a la bifurcación de la carótida. El estudio histológico de la masa extirpada muestra nidos de células redondeadas con citoplasma granular rosado. Las pruebas inmunohistoquímicas revelan positividad con cromogranina y S-100. El estudio con microscopio electrónico muestra gránulos de neurosecreción en el citoplasma de las células neoplásicas. El tumor recidiva 1 año después y se vuelve a resecar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Carcinoma epidermoide metastásico
B Carcinoma medular de tiroides metastásico
C Carcinoma mucoepidermoide
D Paraganglioma
E Tumor de Warthin

28 Un hombre de 67 años con enfermedad de Parkinson ha presentado sequedad de boca progresiva que dificulta la ingesta y la deglución durante los últimos 3 meses. También refiere ojo seco. En la exploración física presenta un temblor de reposo mínimo, sin otras alteraciones. Las pruebas de laboratorio no identifican autoanticuerpos. ¿Cuál de los siguientes factores o procesos es la causa más probable de estos hallazgos?

A Ingesta de alcohol
B Uso de fármacos anticolinérgicos
C Candidiasis
D Sialoadenitis con obstrucción del conducto salival
E Síndrome de Sjögren
F Tabaquismo

29 Un hombre de 69 años sufre psicosis mayor. Está preocupado porque tiene dolor en el lado izquierdo de la cara desde hace 2 semanas. En la exploración física se identifica un área de dolor y tumefacción de 4 cm de diámetro por debajo de la piel, anterior al pabellón auricular izquierdo, por encima del ángulo mandibular. La TC craneal muestra áreas sólidas y quísticas en la región de la glándula parótida izquierda, que está aumentada de tamaño. Tras un ciclo de antibióticos, solo se observa una mejoría mínima. Se realiza una parotidectomía. El estudio histológico de la glándula extirpada muestra inflamación aguda y crónica, con fibrosis y formación de abscesos, litiasis en el conducto y atrofia acinar. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que se encuentre en esta glándula?

A Virus de Epstein-Barr
B Virus del papiloma humano
C *Prevotella intermedia*
D Virus de la rubéola
E *Staphylococcus aureus*

30 Un hombre de 95 años ha notado una tumefacción del labio inferior durante el último mes. En la exploración física se encuentra un nódulo de 1 cm fluctuante con un tono azul translúcido por debajo de la mucosa bucal de la parte interna del labio. Se extirpa esta lesión y el estudio histológico muestra tejido de granulación. ¿Cuál es la etiología más probable de esta lesión?

A Ingesta de pimienta de tipo chile

B Beso con lengua
C Infección por el VIH
D Traumatismo local
E Fumar en pipa

31 Una mujer de 65 años lleva 3 años observando un nódulo de lento crecimiento en la cara. La exploración revela una masa móvil y bien delimitada indolora de 3 cm que se palpa en la parte lateral de la cara, anterior a la oreja y superior a la mandíbula. La masa se extirpa por completo y el estudio histológico muestra células epiteliales ductales en un estroma mixoide, que contienen islotes de tejido condroide y hueso. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que tenga esta paciente?

A Tumor de células acinares
B Carcinoma mucoepidermoide
C Adenoma pleomorfo
D Tumor neuroectodérmico primitivo
E Carcinoma epidermoide
F Tumor de Warthin



32 Un hombre de 57 años refiere un bulto en el lado derecho de la cara, que ha aumentado de tamaño en el último año. En la exploración física, se palpa una masa indolora, móvil y firme de 3-4 cm en la región parotídea derecha. El aspecto de la mucosa bucal

es normal. No refiere dificultad para la masticación ni para hablar. Se realiza una extirpación completa de la masa y la figura muestra los hallazgos de su estudio histológico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Carcinoma mucoepidermoide
B Linfoma no hodgkiniano
C Adenoma pleomorfo
D Sialolitiasis
E Síndrome de Sjögren
F Tumor de Warthin

33 Una mujer de 60 años se nota un bulto cada vez más grande por debajo de la lengua desde hace 1 año. No fuma ni bebe alcohol. En la exploración física se identifica una masa móvil submucosa de 2,5 cm originada en las glándulas salivales menores de la mucosa bucal por debajo de la lengua, en el lado derecho. El estudio histológico de la masa extirpada revela que es maligna e infiltra localmente. El tumor recidiva en 1 año. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Linfoma no hodgkiniano
B Carcinoma mucoepidermoide
C Tumor neuroectodérmico primitivo
D Adenoma pleomorfo
E Carcinoma epidermoide
F Tumor de Warthin

Respuestas

1 **A** La prevalencia de la periodontitis aumenta con la edad y a menudo es consecuencia de los efectos de la formación de placa dental en relación con la flora bucal. La retracción de la encía aumenta el riesgo de caries dental. Una limpieza dental habitual para eliminar la placa y un cepillado suave y frecuente de los dientes ayudan a retrasar la progresión de la periodontitis. Algunos casos de periodontitis aparecen sobre una base de enfermedad sistémica. La candidiasis se describe en inmunodeprimidos y a menudo forma una membrana inflamatoria sobre la lengua. El virus de Epstein-Barr se asocia a la aparición de la leucoplasia vellosa. El virus del herpes simple provoca vesículas que pueden romperse y formar úlceras

superficiales en la mucosa bucal. El virus del papiloma humano puede ocasionar una hiperplasia del epitelio escamoso, con displasia y carcinoma. Los hongos *Mucor* forman hifas no tabicadas anchas y pueden provocar sinusitis, sobre todo en presencia de una cetoacidosis.

2 **A** Una úlcera aftosa es una lesión frecuente que también se denomina *aftas.* Las lesiones nunca son grandes, pero resultan molestas y suelen aparecer durante períodos de estrés. Las úlceras aftosas no son infecciosas; posiblemente tengan un origen autoinmunitario. Las lesiones herpéticas típicas son vesículas que se pueden romper. La leucoplasia son placas blanquecinas de mucosa engrosada por hiperqueratosis. Puede ser una lesión precursora del carcinoma epidermoide en unos pocos casos. Los datos sobre la ausencia de malas costumbres recogidos en la anamnesis son una nota de advertencia para todos los pacientes jóvenes. El muguet bucal es una infección superficial por *Candida* que afecta a pacientes diabéticos, neutropénicos e inmunodeprimidos. La inflamación de las glándulas salivales (sialoadenitis), típicamente de una glándula salival menor de la cavidad bucal, puede producir un nódulo doloroso localizado.

3 **B** La irritación crónica es la causa más probable de los fibromas «irritativos» de la mucosa bucal, que se producen por hiperplasia del tejido conjuntivo. El muguet bucal secundario a la candidiasis produce placas de color blanco grisáceo en la lengua. La leucoplasia es una hiperplasia del epitelio escamoso y aparece como una placa o parche blanquecino, que puede ser premaligno. El granuloma piógeno es un nódulo rojizo de tejido de granulación en la encía, que a menudo se ulcera. Una glándula salival menor puede obstruirse y provocar un mucocele o inflamarse y doler (sialoadenitis).

4 **A** El granuloma piógeno puede empezar a aumentar de tamaño de forma súbita y crecer con rapidez, algo que provoca alarma, aunque el proceso es benigno y con frecuencia remite o se convierte en tejido conjuntivo fibroso. Aunque en este tejido de granulación existen elementos inflamatorios agudos y crónicos, ninguno predomina. El rabdomiosarcoma suele ser un tumor infantil, y los sarcomas de adultos afectan más a los tejidos

blandos profundos. Este nódulo rojizo no es una leucoplasia, que sería una placa blanquecina por hiperplasia del epitelio escamoso.

5 **E** Las lesiones producidas por el virus del herpes simple de tipo 1 (VHS-1) se llaman también *calenturas* o *ampollas febriles* y son frecuentes. Muchas personas están infectadas por el VHS-1, que queda latente, y las lesiones bucales y perianales aparecen durante períodos de estrés. Los herpes labiales recaen siempre. Las células en gemación con seudohifas sugieren una infección por *Candida* con muguet bucal. El infiltrado mononuclear es inespecífico y puede encontrarse en las úlceras aftosas. Se encuentran linfocitos atípicos en la mononucleosis infecciosa y pueden asociarse a un exantema, pero no provocan vesículas cutáneas. Los abscesos de neutrófilos sugieren una infección bacteriana. La leucoplasia se caracteriza por hiperqueratosis.

6 **F** El muguet bucal es un trastorno frecuente, no supone una amenaza para la vida y es secundario a una candidiasis bucal en pacientes inmunodeprimidos. La lesión suele ser superficial. El estudio histológico revela las típicas células en gemación y las seudohifas de *Candida*. Las úlceras aftosas son muy frecuentes en los pacientes jóvenes, aunque pueden aparecer a cualquier edad; suelen ser úlceras superficiales de repetición. La queilosis es la aparición de fisuras o grietas en la mucosa, sobre todo en los ángulos de la boca, y puede asociarse a la deficiencia de vitamina B_2 (riboflavina). La leucoplasia vellosa puede encontrarse en la infección por el VIH, pero es mucho menos frecuente que el muguet bucal. Se debe a una hiperqueratosis importante que genera una superficie rugosa, como «peluda», y que se relaciona con la infección por el virus de Epstein-Barr. La presencia de células multinucleadas es sugestiva de una infección herpética, que típicamente cursa con vesículas que se ulceran. En las zonas de leucoplasia bucal suelen encontrarse células escamosas atípicas.

7 **C** La leucoplasia vellosa bucal aparece en pacientes inmunodeprimidos. Indica que los pacientes positivos para el VIH han desarrollado sida. El alcoholismo y/o el tabaquismo crónicos se asocian a la aparición de carcinomas epidermoides bucales. La diabetes mellitus de tipo 1 con cetoacidosis se asocia

a una sinusitis fúngica, sobre todo a mucormicosis. La anemia perniciosa secundaria a deficiencia de vitamina B_{12} se asocia a glositis, principalmente a la atrófica. El síndrome de Sjögren produce inflamación y atrofia de las glándulas salivales, que condicionan xerostomía con atrofia, formación de fisuras y ulceración en la mucosa de la cavidad bucal.

8 **E** Esta placa mucosa bien definida y blanquecina en la lengua muestra el aspecto típico de una leucoplasia, una lesión premaligna sobre la cual puede originarse un carcinoma epidermoide. El uso de derivados del tabaco está implicado en la aparición de las leucoplasias. El alcoholismo crónico también está implicado, pero esta asociación es menos potente que la establecida con el tabaquismo. Las dentaduras mal ajustadas pueden provocar una leucoplasia, aunque con mucha menos frecuencia que el consumo de tabaco. Las infecciones y la inflamación no se consideran factores de riesgo para el desarrollo de una leucoplasia o un carcinoma epidermoide bucal. La caries dental no es un factor de riesgo de leucoplasia, salvo que los dientes afectados se erosionen y desarrollen trastornos de forma. El tipo de alimentos que se ingiere guarda menos correlación con el cáncer de cavidad bucal que con el de esófago.

9 **F** La eritroplasia es una lesión premaligna que tiene más riesgo de progresar a carcinoma epidermoide que la leucoplasia, aunque ambas comparten los mismos factores de riesgo: tabaquismo, consumo de alcohol, ingesta insuficiente de frutas y consumo de nuez betel. Los países del subcontinente indio presentan la máxima incidencia y es responsable de hasta el 10% de todos los cánceres en esta población. En cuanto a las demás opciones, la mala oclusión dental puede producir leucoplasias. Las infecciones bucales que se recogen en la lista no son premalignas, pero pueden asociarse a inmunodepresión. La presencia de fruta en la dieta tiende a reducir el riesgo, pero las especias no tienen efecto alguno.

10 **C** Las placas blanquecinas y abultadas son sugestivas de leucoplasia. Se trata de un proceso premaligno. Entre los factores de riesgo están el tabaquismo, sobre todo la costumbre de mascar tabaco, y la irritación crónica. En algunos casos se ha

implicado la infección por el virus del papiloma humano. El muguet bucal se describe con mayor frecuencia en la lengua de pacientes inmunodeprimidos como una zona amarillenta a modo de placa. El estudio histológico revela células en gemación con seudohifas, características de la infección por *Candida.* El liquen plano de la cavidad bucal se suele asociar a lesiones cutáneas parecidas, con formación de placas blancas que pueden ulcerarse. Las lesiones presentan una intensa inflamación crónica en la submucosa. El granuloma piógeno forma un nódulo de tejido de granulación doloroso en la encía. En el síndrome de Sjögren se encuentra xerostomía, o «sequedad de boca».

11 **C** El tabaquismo y el consumo de alcohol son causas frecuentes de los carcinomas epidermoides bucales y a menudo se identifican mutaciones del gen *TP53.* Sin embargo, en los no fumadores puede estar implicada la infección por el VPH, además de la sobreexpresión de p16. La buena noticia es que el pronóstico de los carcinomas bucales asociados al VPH es mejor, a pesar de ser multifocales y recidivantes. Todavía mejor noticia es que la vacunación frente al VPH podría ayudar a prevenir esta enfermedad. Se puede encontrar una candidiasis bucal (muguet) en inmunodeprimidos. El VHS produce una gingivoestomatitis aguda autolimitada (calenturas). El género *Prevotella* incluye anaerobios que se asocian a periodontitis y a infecciones bucales, que se convierten en celulitis (angina de Ludwig). La faringitis por estreptococo es una faringitis exudativa aguda que se asocia a complicaciones inmunitarias, como cardiopatía reumática o glomerulonefritis postinfecciosa.

12 **B** El quiste dentígero aparece típicamente en personas jóvenes a las que les están saliendo los dientes, sobre todo los molares. Es benigno y no reaparece tras la extirpación completa. Los quistes dentígeros se originan alrededor de la corona de un diente que no ha salido todavía, sobre todo el tercer molar, y se revisten por una capa de epitelio escamoso no queratinizado delgada. Contienen un denso infiltrado inflamatorio crónico en el estroma. El queratoquiste odontógeno que se origina a partir de restos del epitelio odontógeno en el maxilar es benigno, pero puede recaer si se extirpa de forma inadecuada. El

ameloblastoma y el odontoma son tumores originados en el epitelio odontógeno. El odontoma, que es el tumor odontógeno más frecuente, muestra extensos depósitos de esmalte y dentina. Los quistes/granulomas periapicales son lesiones inflamatorias que se desarrollan en el vértice del diente como complicaciones de una pulpitis de larga evolución.

13 **C** El queratoquiste odontógeno se origina a partir de restos del epitelio odontógeno en el maxilar. Es benigno, pero puede recaer si se extirpa de forma inadecuada. El ameloblastoma y el odontoma son tumores originados en el epitelio odontógeno. El odontoma, que es la variante más frecuente de tumor odontógeno, muestra extensos depósitos de esmalte y dentina. Los quistes dentígeros aparecen alrededor de la corona de un diente que no ha erupcionado, típicamente el tercer molar, y se revisten por una capa de epitelio escamoso no queratinizado delgada. Contienen un denso infiltrado inflamatorio crónico en el estroma. Los quistes/granulomas periapicales son lesiones inflamatorias que se desarrollan en el vértice del diente como complicaciones de una pulpitis de larga evolución.

14 **B** Los pólipos inflamatorios nasales pueden asociarse a rinitis alérgica de repetición, una forma de hipersensibilidad de tipo I que con frecuencia se denomina *fiebre del heno.* La hipersensibilidad de tipo I se asocia a unas concentraciones de IgE sérica altas. La elevación de la concentración de hemoglobina A_{1c} es indicativa de diabetes mellitus. La diabetes no es un factor de riesgo para el desarrollo de pólipos, aunque la cetoacidosis puede ocasionar una mucormicosis nasofaríngea. La infección por el virus de Epstein-Barr puede encontrarse en los carcinomas nasofaríngeos. Las enfermedades autoinmunitarias no se asocian a formación de pólipos nasales. *Staphylococcus aureus* coloniza con frecuencia la cavidad nasal, aunque en general no ocasiona problemas.

15 **C** La sinusitis crónica es un proceso frecuente y puede complicarse con episodios de sinusitis aguda. La falta de sentido del olfato durante la inflamación de la cavidad nasal afecta al sentido del gusto. Cuando se establece un círculo vicioso de inflamación, obstrucción, estasis, lesión mucociliar e infección polimicrobiana, resulta difícil detenerlo. El aumento de la

presión con inflamación del seno puede erosionar el hueso adyacente y producir una osteomielitis. El mucocele lleno de secreciones no purulentas es más frecuente en los senos frontales y etmoidales. La sinusitis no es un factor de riesgo de tumores malignos. Los carcinomas nasofaríngeos se asocian a infección por el virus de Epstein-Barr (VEB). Los linfomas T son típicos de hombres y expresan el VEB. Los papilomas suelen afectar más también a los hombres y tienen un patrón de crecimiento exofítico, aunque los que crecen de forma endofítica se extienden de manera invasiva por los tejidos blandos y el hueso adyacentes, y es difícil extirparlos.

16 **C** George Washington posiblemente falleció por una supraglotitis bacteriana aguda, la cual, aunque es posible tratar en la actualidad, sigue suponiendo una amenaza para la vida de quien la padece, sobre todo en niños, en los que es más frecuente. La asistencia sanitaria ha mejorado desde 1799, pero hace poco más de 100 años que la asistencia causa más beneficios que perjuicios. *Haemophilus influenzae* puede producir inflamación con aparición súbita de dolor y obstrucción posible de la vía respiratoria, sobre todo en niños. En los adultos, la vía respiratoria suele ser lo bastante grande como para evitar una obstrucción importante. Por tanto, la enfermedad de Washington permitía sobrevivir, pero los tratamientos que se administraban entonces (sangrías, laxantes, sustancias urticariales) contribuyeron a su muerte. Esta historia nos confirma el dicho: si no sabes lo que haces, deja de hacerlo. Los coronavirus son la causa del resfriado común. *Corynebacterium diphtheriae* es la causa de la difteria, que produce una laringitis con una membrana gris sucia característica que puede desprenderse y aspirarse. Esta infección es actualmente infrecuente porque se vacuna de forma habitual a los niños. Otra causa de la supraglotitis es el virus paragripal, para el que no se dispone de vacunas y que es la causa del crup en niños. El género *Prevotella* incluye anaerobios que se asocian a periodontitis e infecciones bucales que dan lugar a celulitis (angina de Ludwig). Los estreptococos del grupo A provocan la faringitis estreptocócica, que es una faringitis aguda exudativa.

17 **E** Este niño presenta un crup, una laringotraqueobronquitis

que es causada en general por el virus paragripal. La inflamación puede tener suficiente gravedad como para provocar una obstrucción de la vía respiratoria. *Corynebacterium diphtheriae* es la causa de la difteria, que produce una laringitis con una membrana gris sucia característica que puede desprenderse y aspirarse. Esta infección es actualmente infrecuente porque se vacuna de forma habitual a los niños. El virus de Epstein-Barr puede asociarse a mononucleosis infecciosa y ocasionar una faringitis. El virus de Epstein-Barr se asocia también a carcinoma nasofaríngeo. *Haemophilus influenzae* puede producir una supraglotitis bacteriana aguda con aparición súbita de dolor y posible obstrucción de la vía respiratoria. El virus del papiloma humano se asocia a papilomatosis laríngea. Los estreptococos del grupo A provocan una faringitis exudativa.

18 **A** La paciente tiene faringitis por estreptococos β-hemolíticos del grupo A y la complicación más temida de esta es la respuesta autoinmunitaria por similitud molecular con las proteínas M del estreptococo. La fiebre reumática aparece a las 2-3 semanas por la formación de anticuerpos frente al endocardio, epicardio y/o miocardio (cardiopatía reumática). Puede producirse también glomerulonefritis postestreptocócica. Es poco probable que la faringitis se extienda a otras zonas o produzca septicemia. *Streptococcus pneumoniae* se asocia más a meningitis, otitis y neumonitis. Es poco probable que los estreptococos afecten al hígado.

19 **C** El carcinoma nasofaríngeo muestra una potente asociación a la infección por el virus de Epstein-Barr, que contribuye a la transformación de las células epiteliales escamosas. La rinitis alérgica se asocia a la aparición de pólipos nasales, pero estos no se malignizan. La vasculitis asociada a ANCA puede afectar a la vía respiratoria y producir inflamación granulomatosa y vasculitis necrosante, pero no tiene riesgo de malignizarse. El síndrome de Sjögren se asocia a linfoma maligno, pero es típico que estos se originen en la glándula salival, no en la cavidad nasal. El tabaquismo no se asocia a carcinoma nasofaríngeo, aunque contribuye a la aparición de carcinomas bucales y esofágicos.

20 **C** Los nódulos reactivos (pólipos de las cuerdas vocales o

nódulos de los cantantes) son más frecuentes en hombres muy fumadores o que sobrecargan las cuerdas vocales. Estos nódulos suelen medir pocos milímetros y están constituidos por un eje fibrovascular revestido por epitelio escamoso hiperplásico e hiperqueratósico. No se consideran premalignos. El crup es una laringotraqueobronquitis aguda que suele afectar a niños y producir estenosis de la vía respiratoria con estridor inspiratorio. La supraglotitis es un proceso inflamatorio agudo que puede ocasionar obstrucción de la vía respiratoria. Los carcinomas epidermoides de la laringe y la faringe dan lugar a masas irregulares y ulcerativas, son más frecuentes en fumadores y suelen afectar a pacientes mayores que este. La papilomatosis escamosa suele debutar en la infancia y, cuando es extensa, puede ocasionar obstrucción de la vía respiratoria.

21 **D** La papilomatosis respiratoria recidivante es producida por el virus del papiloma humano de los tipos 6 y 11. Estas lesiones suelen recidivar una vez extirpadas. Pueden remitir después de la pubertad. Los papilomas laríngeos que aparecen durante la edad adulta suelen ser solitarios y no recidivan. No se dispone de tratamiento antivírico eficaz para el virus del papiloma humano. Aunque estas lesiones pueden originarse en toda la vía respiratoria, son benignas y no se malignizan. La aparición de estas lesiones no guarda relación con el uso de la voz, a diferencia del nódulo laríngeo, que es bastante pequeño. No se trata de una lesión congénita ni forma parte de un síndrome.

22 **D** La figura muestra una neoplasia grande y fungosa que tiene el aspecto típico de un carcinoma epidermoide laríngeo. El factor de riesgo más frecuente es el tabaquismo, aunque el alcoholismo crónico también influye; algunos pacientes presentan secuencias del virus del papiloma humano. Los carcinomas infiltrantes se originan a partir de displasias del epitelio escamoso. La infección por el virus de Epstein-Barr se asocia a carcinoma nasofaríngeo. La aspiración puede producir inflamación aguda, pero no neoplasias. Las alergias con hipersensibilidad de tipo I pueden provocar edema laríngeo transitorio, pero no neoplasias.

23 **A** Los colesteatomas no son auténticas neoplasias sino masas quísticas revestidas por epitelio escamoso. El epitelio y la

queratina descamada degeneran, con la consiguiente formación de colesterol y la reacción de células gigantes. Aunque los hallazgos histológicos son benignos, los colesteatomas pueden aumentar de tamaño de forma gradual, y erosionar y destruir el oído medio y las estructuras circundantes. Se producen como complicación de una otitis media crónica. Aunque los colesteatomas presentan un revestimiento de epitelio escamoso, no se malignizan. En ocasiones se puede encontrar un granuloma eosinófilo óseo en la región del cráneo de niños pequeños, pero se caracteriza por la presencia de células de Langerhans. La laberintitis es causada típicamente por una infección vírica y es autolimitada. La otoesclerosis es un depósito anómalo de hueso en los huesecillos del oído medio y es origen de hipoacusia de conducción de origen óseo en adultos.

24 **D** La otoesclerosis puede ser familiar, sobre todo cuando es grave. Se debe a la anquilosis fibrosa seguida de sobrecrecimiento de hueso en los huesecillos (yunque, estribo y martillo) del oído medio. El colesteatoma suele ser un proceso unilateral que complica una otitis media crónica en un niño o adulto joven. La otitis media no complicada suele ser autolimitada y es poco frecuente en adultos. Los condrosarcomas pueden afectar al cráneo de adultos mayores, pero cursan con masas solitarias voluminosas en la región maxilar. El schwannoma afecta típicamente al nervio vestibulococlear y produce una hipoacusia de conducción de origen nervioso. Estas lesiones suelen ser unilaterales, aunque la neurofibromatosis familiar puede asociarse a schwannomas múltiples.

25 **A** Los quistes branquiales, llamados también *quistes linfoepiteliales,* pueden ser restos del arco branquial embrionario o una inclusión de una glándula salival en un ganglio linfático cervical. Se diferencian de los quistes del conducto tirogloso por su localización lateral, la ausencia de tejido tiroideo y su abundante tejido linfoide. El carcinoma de tiroides oculto, que con frecuencia es un carcinoma papilar, puede debutar como una metástasis ganglionar cervical, pero el patrón microscópico corresponde al de un carcinoma. Aproximadamente el 5% de

todos los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello se manifiestan inicialmente como metástasis ganglionares sin un origen primario evidente. Este paciente es demasiado joven para que se produzca esta situación. Los mucoceles se forman en las glándulas salivales menores; los tumores mucoepidermoides en las glándulas salivales. El nódulo de este paciente se encuentra situado en el cuello. Los paragangliomas son tumores sólidos que pueden originarse en la región del cuerpo carotídeo cerca de la bifurcación de la arteria carótida común.

26 **E** El quiste del conducto tirogloso es una malformación congénita originada en elementos del conducto tirogloso embrionario, que va desde el agujero ciego de la lengua hasta la glándula tiroides. Uno o más restos de este conducto pueden aumentar de tamaño y dar lugar a una masa quística. Aunque estos quistes se rodean a menudo de tejido linfoide, no se malignizan. Es más probable que la enfermedad granulomatosa afecte a los ganglios linfáticos en las localizaciones típicas de la región lateral del cuello. Los coristomas de glándula salival son muy poco probables en esta localización. Los quistes pueden contener epitelio escamoso, pero este tipo de quistes no dan origen a un carcinoma epidermoide. Si se encuentra una lesión quística con tejido linfoide y un carcinoma epidermoide en el cuello, lo probable es que se trate de una metástasis de un tumor primario oculto de la región de cabeza y cuello.

27 **D** Los paragangliomas son tumores neuroendocrinos que no suelen producir una cantidad suficiente de catecolaminas como para influir sobre la presión arterial, a diferencia de lo que sucede a su equivalente originado en la médula suprarrenal, el feocromocitoma. El aspecto histológico de estas lesiones no siempre se correlaciona con su comportamiento biológico. Muestran tendencia a recidivar y metastatizar independientemente de su aspecto «inocente». En pacientes de esta edad siempre se deben tener en consideración las metástasis. Aproximadamente el 5% de los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello debutan como metástasis ganglionares sin un origen primario evidente, aunque el patrón histológico de la imagen no se corresponde a este tipo de neoplasia. Algunos carcinomas de tiroides pueden debutar

como metástasis ganglionares, pero la imagen histológica de este caso se corresponde más a la del paraganglioma. El carcinoma mucoepidermoide o el tumor de Warthin se originan sobre una glándula salival.

28 **B** La causa más frecuente de sequedad de boca (xerostomía) y ojos (xeroftalmía) es un efecto secundario de los fármacos. Los anticolinérgicos, como el trihexifenidilo empleado en el tratamiento del temblor parkinsoniano, es uno de los posibles fármacos implicados, junto con los antidepresivos, los antipsicóticos y los antihistamínicos. El consumo de alcohol y tabaco es un factor de riesgo de lesiones precancerosas y carcinomas epidermoides de la cavidad bucal. Es poco probable que la falta de saliva se asocie a infecciones, que suelen ser focales. La sialoadenitis no afecta, en general, a todas las glándulas salivales, salvo en pacientes con síndrome de Sjögren, que se asocia a autoanticuerpos SS-A y SS-B y que puede cursar con algo de dolor e inflamación.

29 **E** La sialoadenitis es más frecuente en ancianos, y los pacientes tratados por una esquizofrenia con antipsicóticos «típicos», como el haloperidol, pueden tener una menor cantidad de secreciones salivales, lo que fomenta la aparición de estasis y su infección. La mayor parte de los fármacos neurolépticos son inhibidores del receptor de dopamina, pero tienen efectos secundarios de tipo extrapiramidal y anticolinérgico. La sequedad de boca, junto con la deshidratación, facilita el aumento de densidad de las secreciones de las glándulas salivales y la formación de cálculos que bloquean los conductos y aumentan el riesgo de inflamación e infección. *S. aureus* es el microorganismo que más probablemente cause infecciones con inflamación supurativa. El virus de Epstein-Barr se puede asociar a leucoplasia vellosa. La infección por el virus del papiloma humano puede conducir a la aparición de displasia y carcinomas epidermoides. *Prevotella* puede asociarse a periodontitis. La rubéola puede relacionarse con manchas de Koplik en el conducto de Stensen.

30 **D** Las características clínicas e histológicas sugieren un mucocele originado en una glándula salival menor, que suele ser consecuencia de un traumatismo local en pacientes muy jóvenes

o muy ancianos. Se puede encontrar la rotura o el bloqueo del conducto de una glándula salival. El chile contiene capsaicina, que induce una sensación de parestesias y dolor urente mediante la activación de un canal catiónico no selectivo, llamado *VR1*, o de los receptores vainilloides de las terminaciones nerviosas sensitivas; no existe una lesión tisular significativa. El comportamiento social puede ser un factor de riesgo de infecciones, como las provocadas por el virus del herpes simple. La infección por el VIH se suele asociar a muguet bucal (candidiasis) y a la infección por el virus del herpes simple. La leucoplasia bucal puede desarrollarse en diversas localizaciones intrabucales y en el margen del labio inferior, y el consumo de tabaco en pipa o mascar tabaco se relacionan con la aparición de estas placas blanquecinas. La irritación causada por dientes mal alineados o dentaduras mal ajustadas también puede ocasionar leucoplasias. En algunas regiones del planeta, el consumo de nuez betel es un factor de riesgo de cáncer bucal.

31 **C** El adenoma pleomorfo es el tumor más frecuente en la parótida. Estos tumores no suelen ser malignos, aunque pueden infiltrar localmente. El tumor de células acinares está constituido por las células serosas de la glándula salival; en general son pequeños, pero una sexta parte de ellos producen metástasis en los ganglios regionales. Los tumores mucoepidermoides son menos frecuentes que los adenomas pleomorfos en las glándulas salivales mayores. Estos tumores pueden ser de alto grado e invasivos. El tumor neuroectodérmico periférico, conocido también como *neuroblastoma olfatorio,* es un tumor de células pequeñas azules y redondas que se origina en la infancia. Es probable que surja en la región nasofaríngea. Los carcinomas epidermoides aparecen en la mucosa bucal y son infiltrantes. Los tumores de Warthin son neoplasias poco frecuentes y de comportamiento indolente, aunque pueden ser bilaterales o multicéntricos.

32 **F** El tumor de Warthin es el segundo tumor más frecuente de la glándula salival y casi siempre aparece en la parótida. Suelen ser lesiones de lento crecimiento e histológicamente se caracterizan por espacios revestidos por una doble hilera de células epiteliales cilíndricas superficiales y cúbicas basales,

rodeadas por un estroma linfoide. Los carcinomas mucoepidermoides son infiltrantes y forman quistes mucosos, acompañados de una población de células escamoides. El linfoma no hodgkiniano puede afectar a pacientes con síndrome de Sjögren de larga evolución. Los adenomas pleomorfos son más frecuentes que los tumores de Warthin, pero el aspecto histológico se caracteriza por la presencia de células epiteliales ductales en el seno de un estroma mixoide que contiene islotes de material condroide y hueso. La sialolitiasis se suele asociar a sialoadenitis y es bastante dolorosa. Puede observarse cierto aumento de tamaño glandular, aunque en general sin efecto de masa. El síndrome de Sjögren puede ocasionar algo de hipertrofia de la glándula salival, pero el proceso es típicamente bilateral.

33 **B** Los carcinomas mucoepidermoides pueden originarse en las glándulas salivales mayores y menores. Son responsables de la mayor parte de las neoplasias originadas en las glándulas menores, sobre todo de las formas malignas. Los carcinomas mucoepidermoides de bajo grado pueden ser infiltrantes, aunque el pronóstico suele ser bueno y la supervivencia a los 5 años alcanza el 90%. Los carcinomas mucoepidermoides de alto grado pueden ocasionar metástasis y tienen una supervivencia a los 5 años de solo el 50%. El linfoma no hodgkiniano afecta a los ganglios cervicales adyacentes o al tejido linfoide del anillo de Waldeyer. El tumor neuroectodérmico primitivo, también llamado *neuroblastoma olfatorio,* es un tumor de células pequeñas, azules y redondas de la infancia; puede aparecer en la región nasofaríngea. Los adenomas pleomorfos son más frecuentes en las glándulas salivales mayores que los carcinomas mucoepidermoides y suelen ser indolentes. Los carcinomas epidermoides son infiltrantes y se originan en la mucosa bucal. Los tumores de Warthin son infrecuentes e indolentes.

CAPÍTULO

17

Tubo digestivo

PEF9 Capítulo 17: Tubo digestivo

PH9 Capítulo 14: Cavidad oral y tubo digestivo

1 Una mujer de 23 años primigrávida da a luz un varón. La ecografía previa al parto mostraba un polihidramnios. En el momento del parto se observa una arteria umbilical única. El lactante vomita todas las tomas, y a los 2 días desarrolla fiebre y dificultad respiratoria. La radiografía muestra que los dos pulmones y el corazón tienen un tamaño normal, pero se identifican infiltrados pulmonares y no se observa la burbuja gástrica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Acalasia
B Hernia diafragmática
C Atresia esofágica
D Hernia de hiato
E Estenosis pilórica
F Divertículo de Zenker

2 Un hombre de 24 años ha desarrollado dolor abdominal y fatiga progresiva durante los últimos 6 meses. En la exploración física está afebril y pálido. La palpación revela un leve dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen. No se identifican masas, y existen ruidos intestinales conservados. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de hemoglobina de 8,9 g/dl; de hematocrito del 26,7%; de VCM de 74 μm^3; de recuento plaquetario de 225.000/mm^3, y de recuento leucocítico de 7780/mm^3. Se identifica presencia de sangre oculta en heces. La endoscopia digestiva alta y la colonoscopia no demostraron lesiones. Un mes después, el paciente sigue presentando el mismo dolor abdominal. ¿Cuál de los siguientes trastornos es la causa más probable de la enfermedad de este paciente?

A Apendicitis aguda
B Angiodisplasia
C Enfermedad celíaca
D Diverticulosis
E Infección por *Giardia lamblia*
F Divertículo de Meckel

3 Una mujer de 23 años, G2, P1, dio a luz a término un niño de peso y talla normales tras un embarazo no complicado. Inicialmente la evolución del lactante fue buena, pero a las 6 semanas empezó a comer mal durante 1 semana y la madre observó que vomitaba con fuerza gran parte de la leche que tomaba en la hora siguiente a la ingesta. Ahora, en la exploración física, el lactante está afebril y no se observan malformaciones externas. Se palpa una masa en la parte media del abdomen. Los ruidos intestinales están conservados. Los antecedentes médicos indican que tanto la madre como el hermano mayor del niño presentaron los mismos síntomas durante la lactancia. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que explique estos hallazgos?

A Páncreas anular
B Hernia diafragmática
C Atresia duodenal
D Estenosis de píloro
E Fístula traqueoesofágica

4 Una mujer de 24 años da a luz a término un lactante tras un embarazo no complicado. El niño tiene un índice de Apgar de 9 y 10 al cabo de 1 y 5 min tras el nacimiento. Su talla y su peso se encuentran en el percentil 55. El niño no ha expulsado una cantidad significativa de meconio. A los 3 días de nacer, el lactante vomita todas las tomas. En la exploración física se encuentra afebril, pero tiene un abdomen distendido y doloroso con reducción de los ruidos intestinales. La ecografía revela una marcada dilatación del colon por encima de un segmento estenosado en la región del sigma distal. La biopsia de esta región muestra ausencia de células ganglionares en la pared muscular y en la submucosa. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que ocasione estos hallazgos?

A Atresia de colon

B Enfermedad de Hirschsprung
C Invaginación
D Enterocolitis necrosante
E Trisomía 21
F Vólvulo

5 Un niño de 3 años ha adquirido un grado suficiente de movilidad, curiosidad y destreza como para explorar espacios en su hogar a los que no debería tener acceso. El niño encuentra una botella con un líquido en el fregadero de la cocina y se la bebe. En pocos minutos presenta dolor torácico y su madre lo traslada a urgencias; lleva la botella. El análisis de su contenido informa de un pH de 12. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que suceda tras esta lesión?

A Divertículo faríngeo
B Estenosis esofágica
C Linfoma gástrico
D Úlcera duodenal
E Megacolon

6 Una mujer de 22 años refiere múltiples episodios de aspiración de alimento asociados a dificultad para la deglución durante el año previo. A la auscultación torácica se identifican crepitantes en la base del pulmón derecho. Una esofagografía muestra una marcada dilatación del esófago por encima del esfínter esofágico inferior. En la biopsia del tercio distal del esófago se evidencia la ausencia de ganglios mientéricos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Acalasia
B Esófago de Barrett
C Síndrome de Plummer-Vinson
D Hernia de hiato por deslizamiento
E Esclerosis sistémica

7 Una mujer de 24 años residente en la región oriental de Bolivia ha presentado dificultad progresiva para la deglución de líquidos y sólidos durante el último año. Refiere molestias subesternales y sensación de que la comida se «atasca». En la exploración destaca un IMC de 18. Una esofagografía revela una marcada dilatación del esófago. Se realiza una biopsia endoscópica que muestra una reducción del número de células ganglionares en el plexo mientérico con infiltrados linfocíticos. ¿Cuál de los siguientes

microorganismos es más probable que haya infectado a esta paciente?

A *Bordetella pertussis*
B *Candida albicans*
C *Corynebacterium diphtheriae*
D Virus del herpes simple
E *Trypanosoma cruzi*

8 Un hombre de 53 años ingiere una comida muy copiosa junto con abundantes cantidades de alcohol. Las molestias que esto le provoca lo llevan a emplear un fármaco para inducir el vómito, pero al poco tiempo desarrolla dolor en la parte inferior del tórax. La exploración física muestra crepitantes en el tejido subcutáneo del tórax, además de taquicardia y taquipnea. ¿Cuál de las siguientes alteraciones esofágicas es más probable que tenga este paciente?

A Estenosis
B Acalasia
C Ectopia
D Rotura
E Varices

9 Un hombre de 30 años presenta una hematemesis súbita tras un fin de semana durante el cual ha consumido una gran cantidad de alcohol. La hemorragia se detiene, pero al mes vuelve a presentar un episodio parecido en circunstancias similares. La endoscopia digestiva alta muestra desgarros longitudinales en la unión gastroesofágica. ¿Qué mecanismo es más probable que haya causado su hematemesis?

A Falta de los ganglios mientéricos
B Inflamación autoinmunitaria
C Infección por el virus del herpes simple
D Hipertensión portal
E Vómitos
F Ensanchamiento de los pilares diafragmáticos

10 Un joven de 16 años que está en tratamiento quimioterápico por una leucemia linfoblástica aguda refiere dolor de 1 semana de evolución durante la deglución. La exploración no revela alteraciones. La endoscopia digestiva alta muestra úlceras mucosas de 0,5-0,8 cm de diámetro en la región del tercio medio a distal del

esófago. Las úlceras son poco profundas, redondeadas y bien delimitadas, y tienen una base eritematosa. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que ocasione estos hallazgos?

A Úlceras aftosas
B Esofagitis por reflujo
C Esofagitis por el virus del herpes simple
D Enfermedad por reflujo gastroesofágico
E Síndrome de Mallory-Weiss

11 Una mujer de 44 años ha referido dificultad progresiva para la deglución de sólidos y líquidos durante los últimos 6 meses. En la exploración física tiene una reducción de la movilidad de los dedos porque la piel está rígida y no se deforma. Una esofagografía muestra una marcada dilatación del esófago con «afilamiento» de la porción distal, donde se encuentra una marcada estenosis luminal. La biopsia de la parte distal del esófago muestra una fibrosis submucosa llamativa con escasa inflamación. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que produzca estos hallazgos?

A Esófago de Barrett
B Hernia de hiato
C Deficiencia de hierro
D Hipertensión portal
E Esclerosis sistémica

12 Una mujer de 57 años presenta desde hace más de 1 año dolor epigástrico urente después de las comidas. La exploración física es normal. La endoscopia digestiva alta muestra una placa eritematosa en la mucosa esofágica distal. La biopsia revela hiperplasia del epitelio escamoso de la zona basal, elongación de las papilas de la lámina propia y presencia de neutrófilos intraepiteliales dispersos con algunos eosinófilos. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Esófago de Barrett
B Varices esofágicas
C Deficiencia de hierro
D Esofagitis por reflujo
E Esclerosis sistémica

13 Un hombre de 51 años presenta de forma súbita vómitos masivos de sangre roja brillante. En la exploración física, la

temperatura es de 36,9 °C; la frecuencia cardíaca, de 103 latidos/min; la frecuencia respiratoria, de 23 respiraciones/min, y la presión arterial, es de 85/50 mmHg. La punta del bazo es palpable. Las pruebas de laboratorio revelan un nivel de hematocrito del 21%. La prueba serológica de HBsAg es positiva. No refiere antecedentes de hematemesis. ¿De cuál de los siguientes procesos es más probable que la hematemesis sea una consecuencia?

A Esófago de Barrett
B Infección por *Candida albicans*
C Varices esofágicas
D Esofagitis por reflujo
E Carcinoma epidermoide
F Divertículo de Zenker



14 Un hombre de 55 años ha presentado dificultad progresiva para la deglución durante los últimos 6 meses. No se encuentran alteraciones significativas en la exploración física. La endoscopia digestiva alta revela áreas de mucosa eritematosa 3 cm por encima de la línea Z. La biopsia del esófago distal presenta los cambios del epitelio mucoso que muestra la figura. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que se produzca como consecuencia del trastorno que presenta este paciente?

A Acalasia

B Adenocarcinoma
C Formación de divertículos
D Laceraciones (síndrome de Mallory-Weiss)
E Carcinoma epidermoide

15 Un hombre de 68 años originario de Birmingham, Inglaterra, refiere pirosis y dolor subesternal después de las comidas desde hace 25 años. Durante el último año ha presentado dolor progresivo con dificultad para la deglución de líquidos y sólidos. En la exploración física no se encuentran alteraciones significativas. La endoscopia digestiva alta muestra una masa ulcerada en el esófago distal que casi ocluye por completo la luz esofágica. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que se encuentre en la biopsia de esta masa?

A Adenocarcinoma
B Carcinoide
C Leiomiosarcoma
D Linfoma no hodgkiniano
E Carcinoma epidermoide



16 Un hombre de 73 años con antecedentes de alcoholismo crónico refiere dificultad progresiva para la deglución y una pérdida de 3 kg de peso en los últimos 2 meses. En la exploración física no se encuentran alteraciones significativas. La endoscopia digestiva alta revela una masa ulcerada de 3 cm en el tercio medio del esófago con oclusión parcial de la luz. Se realiza una esofagectomía; en la figura se muestra el aspecto macroscópico de la lesión. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que se encuentre en un corte histológico de esta masa?

A Adenocarcinoma
B Cicatriz colágena densa
C Canales vasculares dilatados
D Células multinucleadas con inclusiones intranucleares
E Carcinoma epidermoide

17 Un hombre de 66 años residente en Teherán, Irán, está preocupado porque sufre dificultad para la deglución desde hace 1 año. Actualmente ingiere alimentos líquidos. Ayer regurgitó el

alimento teñido de sangre. La esofagoscopia muestra una lesión obstructiva ulcerada a 20 cm de los labios. Se realizan biopsias de ella; en el microscopio corresponden a nidos de células queratinizadas con límites bien delimitados y núcleos hipercromáticos angulados. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que esté implicado en esta enfermedad?

A Susceptibilidad genética
B Autoinmunidad
C Dieta
D Infección
E Reflujo

18 Una mujer de 38 años presenta náuseas desde hace 6 meses. No refiere diarrea ni vómitos. La exploración física no revela alteraciones significativas. La endoscopia digestiva alta muestra eritema difuso de la mucosa gástrica con erosiones focales, pero sin ulceraciones. Las mucosas esofágica y duodenal son normales. Se obtienen muestras de biopsias gástricas, cuyo estudio histológico revela hemorragia focal de la mucosa, pérdida del epitelio de superficie y aumento del número de neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas en una mucosa edematosa. No se identifica presencia de *Helicobacter pylori*. Las pruebas de laboratorio revelan una concentración de gastrina sérica normal. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más probable que ocasione estas alteraciones?

A Ácido acetilsalicílico
B Clorpromacina
C Cimetidina
D Clindamicina
E Omeprazol

19 Un hombre de 72 años recibe gran cantidad de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) por una artrosis crónica de la cadera y la rodilla. Durante las últimas 2 semanas ha presentado dolor epigástrico con náuseas y vómitos, y un episodio de hematemesis. En la exploración física no se encuentran alteraciones significativas. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más probable que se encuentre en la biopsia gástrica?

A Gastritis aguda
B Adenocarcinoma

C Displasia epitelial
D Infección por *Helicobacter pylori*
E Pólipo hiperplásico

20 Un hombre de 54 años previamente sano sufrió quemaduras térmicas extensas con afectación cutánea en el 70% de su superficie corporal. Ingresó en el hospital en situación estable, pero a las 3 semanas de las lesiones iniciales presentó heces melanóticas. La presión arterial disminuyó a 80/40 mmHg y el nivel de hematocrito se redujo hasta el 18%. ¿Dónde es más probable que se encuentren ulceraciones digestivas en este paciente?

A Colon
B Duodeno
C Esófago
D Íleon
E Estómago

21 Una mujer de 51 años refiere cansancio progresivo durante los últimos 7 meses. La exploración física no revela alteraciones importantes. Entre las pruebas de laboratorio destacan cifras de hemoglobina de 9,5 g/dl; de hematocrito del 29,1%; de VCM de 124 μm^3; de recuento plaquetario de 268.000/mm^3, y de recuento leucocítico de 8.350/mm^3. El índice de reticulocitos es bajo. En un frotis de sangre periférica se identifican leucocitos polimorfonucleares hipersegmentados. La concentración de gastrina sérica está muy aumentada. ¿Qué anticuerpos es más probable que se encuentren en esta paciente?

A H^+,K^+-ATPasa gástrica
B Gliadina
C *Helicobacter pylori*
D Receptor del factor intrínseco
E *Tropheryma whippelli*



22 Un hombre de 59 años refiere náuseas y vómitos de 5 meses de evolución. No ha presentado hematemesis. La exploración física no muestra sensibilidad abdominal, y se conservan los ruidos intestinales. La endoscopia digestiva alta revela áreas eritematosas en la mucosa con engrosamiento de las rugosidades del antro. La figura muestra el aspecto histológico de la biopsia gástrica teñida con una técnica de plata de Steiner. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que sea responsable de esta patología de la mucosa gástrica?

A Cisteína proteinasa
B Gen *A* asociado a citotoxina
C Enterotoxina termoestable
D Toxina de Shiga
E Verocitotoxina

23 Una mujer de 47 años con antecedentes de pirosis y dispepsia de larga evolución presenta dolor abdominal de forma súbita. En la exploración física se confirma la existencia de dolor epigástrico intenso con defensa en la zona media. Los ruidos intestinales están atenuados. La radiografía simple de abdomen muestra aire libre por debajo de la hoja izquierda del diafragma. Se lleva a la paciente a quirófano de forma inmediata y se repara una úlcera duodenal perforada. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que ocasione estos hallazgos?

A *Campylobacter jejuni*
B *Cryptosporidium parvum*

C *Giardia lamblia*
D *Helicobacter pylori*
E *Salmonella typhi*
F *Shigella flexneri*
G *Yersinia enterocolitica*

24 Un hombre de 35 años refiere dolor epigástrico de más de 1 año de evolución. Suele producirse 2-3 h después de las comidas y se alivia mediante la ingesta de más alimento o con antiácidos. Refiere también un aumento de 4 kg de peso durante el último año. No fuma, y bebe un vaso diario de vino blanco. La prueba de ureasa en el aliento es positiva, y la muestra de biopsia gástrica contiene ureasa. Empieza un ciclo de tratamiento antibiótico de 2 semanas, pero al cuarto día se siente mejor y lo interrumpe. A las 3 semanas el dolor epigástrico reaparece. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que desarrolle este paciente si no mantiene el tratamiento?

A Síndrome carcinoide
B Malabsorción de grasas
C Hematemesis
D Tromboflebitis migratoria
E Deficiencia de vitamina B_{12}

25 Un hombre de 52 años presenta náuseas con dolor abdominal tras las comidas. En la exploración no se encuentran alteraciones. Se realiza una endoscopia alta y se identifican tres nódulos ovoideos en el fondo y en el antro cuyo calibre oscila entre 0,3 y 1,2 cm. Muestran superficies lisas y redondeadas. Se obtienen muestras de biopsias, cuyo estudio revela fovéolas irregulares alargadas y con dilatación quística. ¿Cuál de las siguientes estrategias terapéuticas es la más adecuada para estas lesiones gástricas?

A Antibióticos
B Quimioterapia
C Corticoesteroides
D Multivitamínicos
E Gastrectomía total
F Vagotomía

26 Una mujer de 49 años con antecedentes de enfermedad ulcerosa péptica por la que ha recibido inhibidores de la bomba de

protones refiere que presenta náuseas y vómitos desde hace 2 meses. La endoscopia digestiva alta muestra tres lesiones lisas, redondeadas y bien delimitadas en el cuerpo gástrico de 1-2 cm de diámetro. Se realizan biopsias que revelan unas glándulas irregulares con dilatación quística, y revestidas por células parietales y principales aplanadas. No se observan inflamación, ni presencia de *Helicobacter pylori,* ni metaplasia ni displasia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Pólipos de glándulas fúndicas
B Adenomas gástricos
C Pólipos hiperplásicos
D Gastropatía hipertrófica

27 Una mujer de 53 años presenta náuseas, vómitos y dolor epigástrico medio desde hace 5 meses. En la exploración física no se encuentran alteraciones significativas. La TC abdominal revela una obstrucción al tracto de salida gástrico. La endoscopia digestiva alta muestra una voluminosa masa de 2 × 4 cm ulcerada en el antro en la zona del píloro. La prueba de la ureasa es positiva. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que se encuentre en la muestra de biopsia de esta masa?

A Adenocarcinoma
B Leiomiosarcoma
C Carcinoma neuroendocrino
D Linfoma no hodgkiniano
E Carcinoma epidermoide

28 Una mujer de 67 años refiere náuseas importantes, con vómitos, sensación de saciedad precoz y pérdida de 9 kg de peso de 4 meses de evolución. En la exploración física tiene atrofia muscular. La endoscopia digestiva alta revela que toda la mucosa gástrica está erosionada y con aspecto eritematoso y empedrado. La TC muestra un estómago pequeño y retraído. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que se encuentre en el estudio histológico de una muestra de biopsia gástrica de esta paciente?

A Gastritis crónica atrófica
B Linfoma primario gástrico
C Tumor del estroma gastrointestinal
D Inflamación granulomatosa
E Adenocarcinoma de células en anillo de sello

29 Un hombre de 52 años refiere pérdida de 4 kg de peso y náuseas en los últimos 6 meses. No ha presentado vómitos ni diarrea. En la exploración física no se encuentran alteraciones significativas. La endoscopia digestiva alta muestra un área irregular de 6 cm, una mucosa fúndica pálida y pérdida de las rugosidades gástricas. La biopsia revela un infiltrado monomorfo de células linfoides. En el moco que reviste la mucosa adyacente se identifica presencia de *Helicobacter pylori.* El análisis citogenético muestra t(11;18)(q21;q21). El paciente recibe antibioterapia frente a *H. pylori,* y la biopsia repetida confirma que se ha resuelto el infiltrado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Gastritis autoinmunitaria
B Gastritis crónica
C Enfermedad de Crohn
D Linfoma B difuso de células grandes
E Tumor del estroma gastrointestinal
F Tumor del tejido linfoide asociado a las mucosas



30 Un hombre de 26 años es trasladado a urgencias tras sufrir heridas por arma de fuego en el abdomen. En la laparotomía y mientras se repara el intestino delgado, el cirujano identifica una masa de 1 cm en la punta apendicular. Se extirpa la masa submucosa de color amarillo parduzco, y en la figura se muestra

su aspecto microscópico. La tinción inmunohistoquímica es positiva para cromogranina y sinaptofisina, pero negativa para Ki-67. ¿Cuál de las siguientes células es el origen más probable de esta lesión?

A Lipoblasto
B Célula ganglionar
C Célula caliciforme
D Célula neuroendocrina
E Célula muscular lisa

31 Un hombre de 55 años sufre episodios de diaforesis, disnea y diarrea desde hace 10 meses. En la exploración física presenta dolor abdominal medio a la palpación profunda, con disminución de los sonidos intestinales. La endoscopia alta no revela alteraciones. La TC muestra tres nódulos hepáticos, de entre 1 y 3 cm de diámetro. Las pruebas de laboratorio indican una concentración elevada de 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) sérico. Se realiza una endoscopia con cámara y, al revisar las imágenes, se identifica una masa en el tercio medio del yeyuno que obstruye parcialmente la luz. En la laparotomía se resecó una masa yeyunal de 5 cm submucosa, y su estudio histológico demostró nidos y trabéculas de células redondeadas con un citoplasma granular rosado. ¿Con cuál de los siguientes derivados embriológicos es más probable que estén relacionadas las células de esta masa?

A Endodermo
B Ectodermo
C Cresta neural
D Notocordio
E Mesodermo esplácnico

32 Un hombre de 61 años que llevaba 5 meses con fatiga progresiva, saciedad precoz y náuseas sufrió ayer un vómito de material granular oscuro. La endoscopia encontró una gran masa ulcerada en el fondo gástrico. Se realizaron biopsias, y el estudio histológico reveló una masa constituida por células fusiformes positivas para c-Kit en el estudio inmunohistoquímico. Las mitosis eran frecuentes. Se hizo una gastrectomía y se encontró una masa de 10 cm originada en la pared gástrica. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más probable que sea útil para esta enfermedad?

A Amoxicilina

B Azatioprina
C Ciclofosfamida
D Imatinib
E Prednisona
F Radioterapia

33 Un hombre de 57 años originario de Innsbruck, Austria, acude a urgencias por presentar dolor abdominal progresivo con distensión de 24 h de evolución. En la exploración física presenta una hipersensibilidad difusa en el abdomen. Se encuentra timpanismo, sin oleada ascítica, y prácticamente no se auscultan ruidos intestinales. Presenta una cicatriz transversal bien curada de 5 cm en el cuadrante inferior derecho del abdomen. No se observa cabeza de medusa. El análisis de sangre oculta en heces es negativo. La radiografía simple abdominal muestra asas de intestino delgado dilatadas con niveles hidroaéreos, sin presencia de aire libre. En la laparotomía, el cirujano identifica una zona de 20 cm de longitud de íleon de color negro vinoso, que se sigue de forma abrupta de un intestino de aspecto rosado en los márgenes distal y proximal. Entre sus antecedentes médicos solo destaca una apendicectomía a los 25 años de edad. ¿Cuál de los siguientes cuadros es más probable que haya ocasionado estos hallazgos?

A Adenocarcinoma de íleon
B Adherencias
C Enfermedad de Crohn
D Hernia inguinal indirecta
E Invaginación
F Tuberculosis
G Vólvulo

34 Un lactante de 11 meses de edad previamente sano lleva 1 día sin defecar. La madre observa que tiene el abdomen distendido. En la exploración física, el abdomen está muy doloroso y prácticamente no se auscultan ruidos intestinales. La radiografía simple de abdomen no muestra aire libre, pero se reconocen asas de intestino delgado con niveles hidroaéreos distendidas. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que produzca estos hallazgos?

A Atresia duodenal
B Enfermedad de Hirschsprung

C Invaginación
D Divertículo de Meckel
E Estenosis pilórica

35 Un hombre de 61 años presenta dolor abdominal y diarrea sanguinolenta durante las últimas 24 h. En la exploración física muestra dolor difuso en el abdomen y no se reconocen ruidos intestinales. En la radiografía simple de abdomen no se identifica aire libre. Las pruebas de laboratorio indican un recuento leucocítico normal y concentraciones normales de amilasa, lipasa y bilirrubina séricas. La HbA_{1c} es del 10%. Desarrolla un shock. Hace 1 año había sufrido un infarto agudo de miocardio. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más probable que se encuentre en este paciente?

A Apendicitis
B Colecistitis
C Pancreatitis
D Infarto intestinal
E Colitis seudomembranosa

36 Una mujer de 71 años con antecedentes de cardiopatía reumática es ingresada en el hospital con una insuficiencia cardíaca congestiva grave. A los 4 días del ingreso presenta dolor cólico en la parte inferior del abdomen. En la exploración física se encuentra afebril. El abdomen está distendido y timpánico sin oleada ascítica, y no se auscultan ruidos intestinales. La muestra de heces es positiva para sangre oculta. La radiografía simple de abdomen no muestra aire libre. La colonoscopia revela áreas parcheadas de eritema mucoso con algo de exudado parduzco por encima de las secciones ascendente y descendente del colon. No se reconocen pólipos ni masas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Colitis isquémica
B Vasculitis mesentérica
C Shigelosis
D Colitis ulcerosa
E Vólvulo

37 Un hombre de 60 años ha presentado fatiga progresiva durante los últimos 8 meses. En la exploración física está pálido. El tacto rectal no identifica masas, pero la prueba de sangre oculta en heces es positiva. La auscultación del abdomen demuestra ruidos

intestinales activos y a la palpación no se observan masas ni áreas dolorosas. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de hemoglobina de 8,3 g/dl; de hematocrito del 24,6%; de VCM de 73 μm^3; de recuento plaquetario de $226.000/\mu m^3$, y de recuento leucocítico de $7.640/\mu m^3$. En la colonoscopia no se encuentra una fuente de hemorragia identificable. La angiografía revela un foco de 1 cm de canales vasculares dilatados y tortuosos en la mucosa y en la submucosa del ciego. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Angiodisplasia
B Colitis colágena
C Diverticulosis
D Hemorroides internas
E Trombosis de la vena mesentérica

38 Un hombre de 21 años presenta heces cada vez más voluminosas y malolientes con pérdida de 7 kg de peso desde hace 1 año. No tiene antecedentes de hematemesis o melena. Describe algo de flatulencia, pero sin dolor abdominal. En la exploración física no se palpan masas abdominales y se confirma la presencia de ruidos intestinales. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que se encuentre en el análisis de las heces de este paciente?

A Trofozoítos de *Entamoeba histolytica*
B Quistes de *Giardia lamblia*
C Aumento de grasa en las heces
D Sangre oculta
E Presencia de *Vibrio cholerae*

39 Una mujer de 34 años está preocupada por presentar una diarrea de escaso volumen, principalmente acuosa, asociada a flatulencia. Los síntomas aparecen de forma episódica, pero durante el último año han sido persistentes. Refiere una pérdida de 4 kg de peso. No tiene fiebre, náuseas, vómitos ni dolor abdominal. La exploración física no revela alteraciones significativas. La prueba de sangre oculta en heces y el análisis de huevos y parásitos en heces son negativos, y tampoco se observan patógenos en el coprocultivo. Se realiza una endoscopia digestiva alta, y la biopsia de la parte proximal del intestino delgado revela un importante aplanamiento difuso de las vellosidades con infiltrado inflamatorio crónico en la lámina propia. ¿Cuál de las

siguientes pruebas serológicas es más probable que sea positiva en esta paciente?

A Anticuerpos anticentrómero
B Anticuerpo anti-ADN topoisomerasa I
C Anticuerpos antimitocondriales
D Anticuerpos antinucleares
E Anticuerpos antitransglutaminasa

40 Una mujer de 41 años refiere diarrea y fatiga con pérdida de 3 kg de peso en los últimos 6 meses. En la exploración física está afebril y tiene una ligera atrofia muscular, pero la potencia motora es normal. Las pruebas de laboratorio no revelan sangre, huevos ni parásitos en heces. Se realiza una biopsia de la porción proximal del yeyuno y se revisan los hallazgos histológicos. La paciente comienza una dieta especial sin trigo ni centeno. El cambio de dieta consigue una mejoría espectacular. ¿Cuál de las siguientes características microscópicas es más probable que se encuentre en la biopsia?

A Abscesos crípticos y úlceras mucosas
B Macrófagos espumosos en la lámina propia
C Obstrucción linfática
D Granulomas no caseificados
E Achatamiento y aplanamiento de las vellosidades

41 En Guatemala se realiza un estudio epidemiológico sobre niños con retraso del crecimiento. Algunos de estos niños, de entre 1 y 3 años, presentan brotes de diarrea repetidos, pero no mejoran al tomar suplementos dietéticos. Las biopsias del yeyuno muestran unas vellosidades aplanadas y atróficas con elongación de criptas e infiltrados inflamatorios crónicos. ¿Qué factor es más probable que contribuya a la diarrea de repetición en estos niños?

A Abetalipoproteinemia
B Infección bacteriana
C Disfunción del canal de iones cloruro
D Deficiencia de disacaridasa
E Mutaciones del gen *NOD2*

42 Un hombre de 40 años refiere episodios de flatulencia abdominal y diarrea explosiva. Estos síntomas parecen relacionarse con el consumo de unos batidos que le encantan. La exploración no revela alteraciones significativas. Las pruebas de

laboratorio no muestran aumento de la grasa fecal ni presencia de sangre oculta, huevos ni parásitos en las heces. Un coprocultivo no encuentra patógenos. Cuando no consume batidos o sorbetes, no presenta síntomas. ¿Cuál de los siguientes trastornos es el que mejor explica estos hallazgos?

A Gastritis autoinmunitaria
B Enfermedad celíaca
C Colelitiasis
D Fibrosis quística
E Deficiencia de disacaridasa

43 Se celebra un almuerzo informal en la empresa a mediodía. Se sirven carnes, ensaladas, panes y postres que habían sido traídos a primera hora de la mañana. Todo el mundo se divierte y se consume gran parte de la comida. A media tarde, muchos empleados tienen que acudir al único aseo de la oficina porque tienen vómitos y diarrea explosiva asociada a un dolor cólico abdominal. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que ocasione esta serie de episodios?

A *Bacillus cereus*
B *Clostridium difficile*
C *Escherichia coli*
D *Salmonella enterica*
E *Staphylococcus aureus*
F *Vibrio parahaemolyticus*

44 Una mujer sana de 21 años desarrolla una diarrea profusa y acuosa al día siguiente de comer ostras crudas. En la exploración física tiene una temperatura de 37,5 °C. La muestra de heces no revela sangre oculta. No presenta distensión ni dolor abdominal y se auscultan ruidos intestinales. La diarrea cede en los 3 días siguientes. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que produzca estos hallazgos?

A *Cryptosporidium parvum*
B *Entamoeba histolytica*
C *Staphylococcus aureus*
D *Vibrio parahaemolyticus*
E *Yersinia enterocolitica*

45 Un hombre de 26 años que está de viaje en Chiang Mai, Tailandia, presenta fiebre, cefalea y dolor muscular durante 24 h,

seguidos de diarrea acuosa con 5-10 deposiciones diarias durante 4 días. Durante las últimas 24 h la diarrea ha sido sanguinolenta y se acompaña de tenesmo. La exploración física revela dolor abdominal difuso. El estudio histológico de las heces muestra numerosos leucocitos y bacilos curvos gramnegativos. La diarrea cede, pero a las 2 semanas presenta una progresiva debilidad de las extremidades inferiores. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que produzca esta enfermedad?

A *Bacillus cereus*
B *Campylobacter jejuni*
C *Clostridium perfringens*
D *Giardia lamblia*
E *Rotavirus*

46 Un hombre de 36 años presenta dolor cólico abdominal con fiebre y diarrea acuosa durante 2 días después de comer un bocadillo vegetal con pollo. La exploración revela leve dolor abdominal difuso a la palpación, sin presencia de masas. Se conservan los ruidos intestinales. La muestra de heces no identifica presencia de sangre oculta. Se recupera por completo a los 5 días sin tratamiento. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que produzca esta enfermedad?

A *Bacillus cereus*
B *Entamoeba histolytica*
C *Escherichia coli*
D Rotavirus
E *Salmonella enterica*
F *Staphylococcus aureus*
G *Yersinia enterocolitica*

47 En un estudio epidemiológico sobre las infecciones del tubo digestivo se obtuvieron muestras de pacientes residentes en Haití en las que se realizaron cultivos definitivos y se valoraron los hallazgos clínicos y patológicos. Se identificó un grupo de pacientes que tenían dolor abdominal y diarrea durante la primera semana de evolución. A la segunda semana estos pacientes desarrollaban una esplenomegalia con elevación de las concentraciones de AST y ALT, y a la tercera semana estaban sépticos y tenían leucopenia. En la autopsia de los pacientes fallecidos se encontraban úlceras de las placas de Peyer. ¿Cuál de

los siguientes microorganismos es más probable que produzca estos hallazgos?

A *Campylobacter jejuni*
B *Clostridium perfringens*
C *Mycobacterium bovis*
D *Salmonella typhi*
E *Shigella sonnei*
F *Yersinia enterocolitica*



48 Una mujer de 65 años está recibiendo tratamiento hospitalario por una neumonía complicada por una septicemia. Ha necesitado múltiples antibióticos y en las fases iniciales del cuadro tuvo que ser intubada para recibir ventilación mecánica. El día 20 del ingreso presenta distensión abdominal. No se auscultan ruidos intestinales, y la radiografía de abdomen revela asas de intestino delgado dilatadas, sugestivas de un íleo. Presenta heces sanguinolentas de escaso volumen, positivas para la toxina de *Clostridium difficile.* Las pruebas de laboratorio revelan leucocitosis e hipoalbuminemia. Durante la laparotomía se extirpan la porción distal del íleon y el ciego. La figura se corresponde con el aspecto macroscópico de la superficie mucosa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Gangrena gaseosa con mionecrosis

B Enfermedad inflamatoria intestinal
C Isquemia intestinal
D Enterocolitis seudomembranosa
E Megacolon tóxico

49 Durante un viaje de vacaciones, más de 100 personas adultas de un hotel desarrollan una enfermedad diarreica caracterizada por abundantes heces acuosas, con más de 10 deposiciones diarias. También presentan cefalea, dolor cólico abdominal y mialgias. En la exploración física tienen signos de deshidratación y febrícula. Las pruebas de laboratorio de las muestras de heces no revelan leucocitosis o un aumento del nivel de grasa, ni tampoco presencia de eritrocitos. El cuadro dura solo 1-3 días y se resuelve sin secuelas. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que produzca esta enfermedad?

A Citomegalovirus
B *Clostridium botulinum*
C Norovirus
D *Staphylococcus aureus*
E *Strongyloides stercoralis*
F *Vibrio cholerae*

50 Una niña de 5 meses previamente sana de Bangladesh desarrolla una diarrea acuosa que persiste durante 1 semana. La niña muestra febrícula durante la enfermedad, sin dolor o distensión abdominal. En la exploración física presenta una temperatura de 37,7 °C. La muestra de heces resulta negativa para sangre oculta, huevos y parásitos. Se dice a los padres que le den muchos líquidos y se recupera por completo. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que produzca estos hallazgos?

A *Campylobacter jejuni*
B *Cryptosporidium parvum*
C *Escherichia coli*
D *Listeria monocytogenes*
E Virus de Norwalk
F Rotavirus
G *Shigella flexneri*

51 Un estudio sobre niños residentes en el área rural de Malawi, en África, revela una elevada prevalencia de anemia ferropénica. En

las muestras de heces se encuentra sangre oculta. Muchos de estos niños sufren, además, prurito de la piel de los pies y tos. ¿Cuál de los siguientes parásitos es más probable que produzca estos hallazgos?

A *Ancylostoma duodenale*
B *Ascaris lumbricoides*
C *Cryptosporidium parvum*
D *Enterobius vermicularis*
E *Schistosoma mansoni*

52 Una mujer de 31 años refiere diarrea cada vez más grave durante la semana siguiente a la vuelta de un viaje a Centroamérica. El estudio macroscópico de las heces revela presencia de moco y hebras de sangre. La diarrea cede en 4 semanas, pero ahora tiene fiebre y presenta dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. La ecografía abdominal muestra una masa irregular parcialmente quística de 10 cm en el lóbulo hepático derecho. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que produzca estos hallazgos?

A *Clostridium difficile*
B *Cryptosporidium parvum*
C *Giardia lamblia*
D *Entamoeba histolytica*
E *Strongyloides stercoralis*



53 Un hombre de 27 años presenta de forma súbita intenso dolor abdominal. En la exploración física tiene dolor y distensión abdominales difusos, y no se identifican ruidos intestinales. Es llevado a quirófano, donde se le extirpa un segmento de íleon terminal de 27 cm con una superficie serosa firme y eritematosa. La figura corresponde al aspecto histológico de un corte del íleon extirpado. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que desarrolle este paciente como consecuencia de su enfermedad?

A Adenocarcinoma
B Fístula enterocutánea
C Invaginación

D Absceso hepático
E Trombosis de la arteria mesentérica

54 Una mujer de 30 años refiere antecedentes de episodios repetidos de flatulencia con alternancia de diarrea y estreñimiento durante los últimos 5 años. Presenta heces duras y ahusadas, diarrea mucosa de bajo calibre y dolor en el cuadrante inferior izquierdo. Los síntomas se alivian con la defecación, que ahora se produce de forma más frecuente. La exploración no revela alteraciones significativas. Las pruebas de laboratorio, incluidos el análisis de huevos y parásitos, la búsqueda de patógenos bacterianos y la determinación de grasa en heces, no muestran alteraciones. La TC abdominal es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Fibrosis quística
B Diverticulosis
C Enfermedad inflamatoria intestinal
D Síndrome del intestino irritable
E Gastroenteritis vírica



55 Una mujer de 49 años ha tenido dolor cólico abdominal y diarrea con seis deposiciones diarias durante el último mes. Refiere antecedentes de episodios de dolor y diarrea autolimitados similares, que se han producido múltiples veces durante los 20

años previos. Cada uno de estos episodios dura unas 2 semanas y se resuelve sin tratamiento. La exploración física no revela alteraciones, pero en una muestra de heces se identifica sangre oculta. Las pruebas de laboratorio no evidencian huevos ni parásitos en las heces. La colonoscopia muestra inflamación difusa y continua de la mucosa con úlceras superficiales desde el recto hasta el colon ascendente. La biopsia de esta zona muestra los hallazgos que se reflejan en la figura. ¿De cuál de las siguientes complicaciones tiene más riesgo esta paciente?

A Adenocarcinoma
B Diverticulitis
C Malabsorción de grasas
D Formación de fístula perirrectal
E Cirrosis biliar primaria
F Colitis seudomembranosa



56 Una mujer de 35 años refiere lumbalgia progresiva de 5 años de evolución. Durante el último año también ha presentado dolor artrítico en las rodillas, caderas y muñecas. La muestra de heces revela sangre oculta. La radiografía de pelvis identifica cambios compatibles con una sacroilitis. Se realiza una colonoscopia y se somete a la paciente a una colectomía total. En la figura se muestra

el aspecto macroscópico de la pieza de colectomía. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que subyazca al cuadro representado?

A Desarrollo de autoanticuerpos frente a la tropomiosina
B Desarrollo de anticuerpos frente a los microbios que reaccionan de forma cruzada con la mucosa del colon
C Aparición de una respuesta inmunitaria por T_H17
D Herencia en línea germinal de la mutación del gen *APC*
E Mutaciones del gen *NOD2*

57 Una mujer de 30 años ha presentado brotes intermitentes de dolor en la parte inferior del abdomen con diarrea de escaso volumen durante los últimos 2 años. La colonoscopia muestra una mucosa friable desde el recto hasta el colon ascendente y una fístula perianal. Se realizan biopsias y su estudio histológico revela inflamación crónica y aguda de la mucosa con erosiones focales. No se identifican huevos, parásitos o bacterias en las heces. ¿Cuál de las siguientes pruebas es la más útil para el seguimiento a largo plazo de esta paciente?

A TC abdominal
B Biopsia para la detección selectiva de la displasia
C Análisis de mutaciones genéticas de *NOD2*
D Títulos serológicos de *Saccharomyces*
E Coprocultivos de microbios

58 Un hombre de 26 años ha presentado dolor cólico abdominal intermitente y diarrea de escaso volumen durante 3 semanas. En la exploración física está afebril y presenta una ligera hipersensibilidad en la parte inferior del abdomen, sin masas y con ruidos intestinales conservados. La muestra de heces revela la presencia de sangre oculta. Los síntomas ceden en 1 semana. A los 6 meses vuelve a tener dolor abdominal, asociado a dolor perianal. La exploración física en este episodio muestra una fístula perirrectal. La colonoscopia identifica muchas áreas de edema mucoso con ulceraciones y algunas áreas de aspecto normal. El estudio histológico de una biopsia de la zona ulcerada revela infiltrados inflamatorios agudos y crónicos parcheados, abscesos crípticos y granulomas no caseificados. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos explica mejor estos hallazgos?

A Amebiasis

B Enfermedad de Crohn
C Sarcoidosis
D Shigelosis
E Colitis ulcerosa

59 Se realiza un estudio clínico sobre pacientes adultos con diarrea sanguinolenta crónica. Se observa que un grupo de pacientes tiene una probabilidad estadísticamente aumentada de presentar anticuerpos frente a *Saccharomyces cerevisiae,* pero no autoanticuerpos frente a los neutrófilos citoplásmicos, polimorfismos del gen *NOD2,* activación de las células inmunitarias T_H1 y T_H17, deficiencia de vitamina K, anemia megaloblástica y cálculos. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que tengan estos pacientes?

A Angiodisplasia
B Enfermedad de Crohn
C Diverticulitis
D Enteritis isquémica
E Colitis ulcerosa

60 Una mujer de 65 años se somete a una revisión médica rutinaria. Se encuentra sangre oculta en una muestra de heces. La TC abdominal revela numerosas evaginaciones llenas de aire de 1 cm en el sigma y en el colon descendente. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que se desarrolle en esta paciente?

A Adenocarcinoma
B Obstrucción intestinal
C Absceso pericólico
D Malabsorción
E Megacolon tóxico

61 Una madre encuentra sangre en la ropa interior de su hijo de 4 años al lavarla. La exploración física del niño revela la presencia de una masa rectal. La rectoscopia identifica un pólipo de superficie lisa y pediculado de 1,5 cm de diámetro. Se extirpa y el estudio histológico muestra criptas enquistadas llenas de mucina y restos inflamatorios, sin displasia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Poliposis adenomatosa familiar
B Síndrome de Gardner
C Pólipo juvenil

D Síndrome de Lynch
E Síndrome de Peutz-Jeghers



62 Una mujer de 53 años se somete a una revisión médica

rutinaria. La única alteración es una muestra de heces con sangre oculta. La colonoscopia identifica un pólipo eritematoso solitario redondeado de 1,5 cm que asienta en un tallo de 0,5 cm en el ángulo esplénico. Se extirpa el pólipo; en la figura se muestra su aspecto histológico a pequeño *(A)* y gran aumento *(B).* ¿Con cuál de las siguientes opciones es más probable que se asocie la lesión cólica de esta mujer?

A Bajo riesgo de aparición de un carcinoma
B Herencia de un gen supresor de tumores anómalo
C Presencia de lesiones similares en el intestino delgado
D Antecedentes de anemia ferropénica
E Riesgo de desarrollo de un adenocarcinoma endometrial



63 Un hombre de 70 años se somete a una revisión médica rutinaria. La exploración física no identifica alteraciones valorables, pero la muestra de heces es positiva para sangre oculta. Se realiza la colonoscopia y se observa una masa sésil de 5 cm en la parte proximal del colon descendente a 50 cm del margen anal. La figura se corresponde con el aspecto histológico a pequeño

aumento de una biopsia de la lesión. El paciente se niega a realizarse más estudios o a recibir tratamiento. A los 5 años presenta estreñimiento, anemia microcítica y pérdida de 5 kg de peso en 6 meses. La exploración quirúrgica revela una masa de 7 cm que rodea toda la circunferencia del colon descendente. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que tenga este paciente?

A Adenocarcinoma
B Linfoma no hodgkiniano
C Tumor carcinoide
D Leiomiosarcoma
E Cistoadenoma mucinoso
F Adenoma velloso



64 A un hombre de 19 años se le recomienda que consulte a su médico porque una prueba de detección selectiva genética ha observado una enfermedad en algunos familiares. Se encuentra sangre oculta en una muestra de heces. Se realizan una colonoscopia y, posteriormente, una colectomía. La figura muestra el aspecto macroscópico de la mucosa de la pieza de colectomía. El estudio histológico revela que estas lesiones corresponden a

adenomas tubulares. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que tenga mutaciones en el análisis molecular de los fibroblastos normales de este paciente?

A *APC*
B *MLH1*
C *KRAS*
D *NOD2*
E *p53*

65 Una mujer de 44 años presenta distensión abdominal progresiva desde hace 6 semanas. En la exploración física se identifican una oleada ascítica y la presencia de ruidos intestinales. La paracentesis obtiene 1.000 ml de líquido seroso algo turbio. El estudio citológico del líquido muestra células malignas sugestivas de adenocarcinoma. El análisis molecular de estas células identifica una mutación del gen *MSH2* con inestabilidad de microsatélites. La anamnesis no revela antecedentes médicos importantes ni intervenciones quirúrgicas previas. La hermana de la paciente fue diagnosticada de cáncer endometrial, y su hermano, de cáncer gástrico. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que cause los síntomas de esta paciente?

A Angiodisplasia
B Enfermedad de Crohn
C Diverticulosis
D Síndrome de Lynch
E Enfermedad ulcerosa péptica



66 Un hombre de 33 años se somete a una revisión médica rutinaria. Se encuentra sangre oculta en heces. La colonoscopia muestra una lesión ulcerada de 6 cm en la zona del ciego. Se observan tres lesiones sésiles más pequeñas, de entre 1 y 3 cm de diámetro. La figura muestra el aspecto histológico de un corte de la lesión ulcerada. Las lesiones de menor calibre son informadas como adenomas serrados sésiles. ¿Cuál de las siguientes alteraciones moleculares se considera más importante para que se desarrollen estas lesiones?

A Amplificación del gen *ERBB2*

B Defectos en los genes de reparación de errores del ADN

C Transmisión en la línea germinal de un gen *RB1* defectuoso

D Sobreexpresión del gen de la E-cadherina

E Translocación del gen α del receptor del ácido retinoico



67 Un hombre de 73 años ha observado un cambio en sus hábitos intestinales durante el último año. La defecación es más dificultosa y el calibre de las heces se ha reducido. En la exploración no se encuentran alteraciones, pero hay sangre oculta en heces. Se realiza una colonoscopia al paciente por primera vez y después se procede a la resección del colon, cuyo aspecto recoge la figura. ¿Cuál de las siguientes alteraciones moleculares es más probable que haya culminado en estos hallazgos?

A Mutación adquirida del gen *APC*
B Pérdida homocigota del gen *PTEN*
C Inactivación de la proteína RB1 por el VPH-16
D Mutación de un gen de reparación de errores del ADN
E Activación de tirosina cinasa por mutación de *KIT*

68 Una mujer de 20 años que se encuentra en el noveno mes de gestación refiere dolor progresivo durante la defecación y observa la presencia de sangre roja en el papel higiénico. No refiere antecedentes de problemas digestivos. Tras el parto, el dolor rectal desaparece y deja de sangrar. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que ocasiones estos hallazgos?

A Angiodisplasia
B Hemorroides
C Invaginación
D Colitis isquémica
E Vólvulo

69 Una mujer de 20 años lleva 24 h con náuseas y un dolor

abdominal bajo vago, pero ahora el dolor es más intenso. En la exploración física, el dolor es más intenso en el cuadrante inferior derecho y se observa hipersensibilidad de rebote. La sangre oculta en heces es negativa. Las radiografías simples de abdomen no identifican presencia de aire libre. La prueba de embarazo en suero resulta negativa. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más útil para el diagnóstico de esta paciente?

A Quistes de *Entamoeba histolytica* en heces
B Hiperamilasemia
C Hipernatremia
D Aumento de la concentración de fosfatasa alcalina sérica
E Aumento del título del antígeno carcinoembrionario sérico
F Neutrofilia con desviación a la izquierda

70 Una mujer de 53 años refiere aumento del perímetro abdominal durante los últimos 2 años. En la exploración física presenta distensión del abdomen. La TC abdominal muestra múltiples nódulos peritoneales con ascitis mucinosa de baja atenuación. Se realiza una paracentesis, y el estudio citológico del líquido revela la presencia de células cilíndricas bien diferenciadas con mínima atipia nuclear. ¿En qué lugar es más probable que se haya originado el proceso proliferativo de esta paciente?

A Apéndice
B Yeyuno
C Íleon
D Páncreas
E Estómago

71 Un hombre de 59 años con antecedentes de alcoholismo crónico de larga evolución refiere un aumento de su perímetro abdominal durante los últimos 6 meses. En los últimos 2 días ha notado dolor abdominal progresivo. En la exploración física tiene una temperatura de 38,2 °C. La exploración del abdomen revela una oleada ascítica y una llamativa cabeza de medusa en la piel. Se observa hipersensibilidad abdominal difusa. La radiografía simple de abdomen no muestra presencia de aire libre. Se realiza una paracentesis, con la que extraen 500 ml de líquido amarillento turbio. La tinción con Gram del líquido identifica bacilos gramnegativos. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Apendicitis
B Colitis colágena
C Diverticulitis
D Colitis isquémica
E Colitis seudomembranosa
F Peritonitis bacteriana espontánea

Respuestas

1 **C** La atresia esofágica se suele asociar a una fístula entre el esófago y la tráquea. La obstrucción digestiva intrauterina podría ocasionar un polihidramnios. La presencia de una arteria umbilical única es indicativa de riesgo de presencia de otras malformaciones. Los vómitos en los lactantes producen riesgo de aspiración con desarrollo de una neumonía. La acalasia es una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y no suele manifestarse en el momento del nacimiento. La ausencia de una hoja del diafragma, normalmente en el lado izquierdo, produce la herniación del contenido abdominal hacia el tórax con obstrucción funcional del tubo digestivo, pero la presencia de pulmones de tamaño normal en este caso sugiere que no hay herniación. La hernia de hiato secundaria a un ensanchamiento de los pilares musculares del diafragma predispone al reflujo gastroesofágico y la obstrucción no es una complicación típica. La estenosis pilórica es causa de obstrucción al tracto de salida gástrico en un lactante, pero suele debutar en la segunda o tercera semana de vida. El divertículo faringoesofágico (de Zenker) por encima del esfínter esofágico superior suele afectar a adultos.

2 **F** Aproximadamente el 2% de los individuos presentan un divertículo de Meckel, un resto embriológico del conducto onfalomesentérico, pero solo un pequeño grupo de estos individuos tienen una mucosa gástrica ectópica en su seno, lo que produce una ulceración intestinal. Los síntomas pueden recordar a una apendicitis aguda, pero la apendicitis no debería persistir durante 1 mes ni ocasionar una hemorragia significativa. Puede ser difícil detectar una angiodisplasia, pero casi siempre se encuentra en pacientes mayores de 70 años, aunque puede ocasionar una pérdida significativa de sangre. La

enfermedad celíaca puede afectar a individuos jóvenes, pero no ocasiona una hemorragia significativa. La diverticulosis puede asociarse a una hemorragia, pero los divertículos casi siempre se localizan en el colon de ancianos. La giardiasis es origen de una diarrea autolimitada acuosa, sin hemorragia.

3 **D** El trastorno de este lactante se produjo varias semanas después de su nacimiento por la hipertrofia del músculo liso del píloro. La estenosis pilórica tiene rasgos de herencia multifactorial con un «umbral de susceptibilidad» por encima del cual la enfermedad se manifiesta cuando existen más riesgos genéticos, como antecedentes familiares y gestación gemelar. La incidencia es de 1 por cada 200 niños y de 1 por cada 1.000 niñas, lo que refleja que en estas últimas deben existir más factores de riesgo para que se desarrolle la enfermedad. El páncreas anular es una malformación infrecuente que puede producir obstrucción duodenal y aparece a edades variables, aunque no cabría esperar la presencia de una masa palpable. La fístula traqueoesofágica, la hernia diafragmática y la atresia duodenal son trastornos graves, que se manifiestan en el momento del nacimiento y suelen asociarse a múltiples malformaciones. La estenosis pilórica es un cuadro aislado que no se relaciona con otras malformaciones en los casos típicos.

4 **B** En la enfermedad de Hirschsprung, que afecta a 1 de cada 5.000 nacidos vivos, el segmento aganglionar (puede ser largo o corto) de la pared intestinal ocasiona una obstrucción funcional con distensión proximal. La mayor parte de los casos familiares y algunos de los esporádicos presentan mutaciones del gen *RET* que afectan a la migración de las células de la cresta neural. Las atresias son segmentos con estenosis congénitas del intestino (en general del delgado) que se asocian a otras malformaciones. Los pacientes con una trisomía 21 pueden tener atresias intestinales (sobre todo duodenales). La ausencia completa de la luz del colon en un punto de atresia es una malformación congénita poco frecuente y no se asocia a pérdida de células ganglionares. La invaginación es otra causa de obstrucción intestinal en lactantes, pero no se asocia a un segmento de intestino aganglionar. La enterocolitis necrosante es una complicación de la prematuridad. El vólvulo es una forma de

obstrucción mecánica que se produce por la torsión del intestino delgado en el mesenterio o de un segmento de colon (sigma o ciego).

5 **B** Las soluciones por cáusticos alcalinos suelen producir lesiones en el esófago y pueden no llegar a alcanzar el estómago. Cuando se perfora el esófago, puede desarrollarse una mediastinitis grave. La inflamación puede resolverse mediante cicatrización y estenosis, y suele afectar a la deglución de los sólidos más que de los líquidos, algo típico de la obstrucción mecánica. El divertículo de Zenker faríngeo se produce en un punto de debilidad de la hipofaringe, situado principalmente entre los músculos constrictor inferior y cricofaríngeo; se trata de un divertículo formado por tracción y secundario a problemas de motilidad. Los linfomas gástricos (MALTomas) pueden guardar relación con la infección por *Helicobacter pylori* y con la desregulación inmunitaria. Las úlceras duodenales se relacionan, principalmente, con la infección por *H. pylori.* El megacolon se produce por una inflamación importante del colon o por trastornos motores, y es poco probable que las sustancias deglutidas lleguen al colon sin sufrir cambios.

6 **A** En la acalasia se produce una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior con ausencia de peristaltismo. La mayor parte de los casos se consideran «primarios» o de origen desconocido. Pueden deberse a cambios degenerativos en la inervación neural; suelen faltar los ganglios mientéricos del cuerpo del esófago. Estos pacientes tienen riesgo de desarrollar un carcinoma epidermoide a largo plazo. En el esófago de Barrett hay metaplasia de células epiteliales cilíndricas, pero el plexo mientérico está intacto. La esofagitis por reflujo puede asociarse a una hernia de hiato, pero los ganglios mientéricos permanecen intactos. El síndrome de Plummer-Vinson es un proceso infrecuente causado por la anemia secundaria a deficiencia de hierro; se asocia a la presencia de «redes» en la parte superior del esófago. La esclerosis sistémica (esclerodermia) se caracteriza por fibrosis con estenosis.

7 **E** La enfermedad de Chagas crónica puede ocasionar lesiones no solo del miocardio sino también de las estructuras tubulares del tubo digestivo, sobre todo del esófago con acalasia

secundaria. Es difícil identificar los microorganismos histológicamente, pero inducen una respuesta inflamatoria, que lesiona las neuronas y desencadena los trastornos de motilidad. *Pertussis* causa tosferina, un cuadro típico de la infancia con afectación de las vías respiratorias altas. La candidiasis suele producir placas superficiales con erosiones mínimas en inmunodeprimidos. La difteria es un proceso sobre todo infantil y que afecta a las vías respiratorias altas, aunque puede provocar una enfermedad sistémica inducida por toxinas, que incluye miocarditis; sin embargo, no es una infección crónica. Las úlceras herpéticas son delimitadas y suelen afectar a pacientes inmunodeprimidos.

8 **D** El gran almirante y barón Jan Gerrit van Wassenaer fue atendido en 1724 por el Dr. Herman Boerhaave, quien posteriormente describió la rotura del esófago. El síndrome de Boerhaave puede producirse después de vómitos forzados o como complicación de una instrumentación. La disección de aire secundaria a la rotura se extiende a los tejidos blandos y provoca un enfisema subcutáneo. No existe barrera serosa por encima del diafragma, de forma que el contenido del esófago se extiende hacia la cavidad torácica y produce una mediastinitis importante que resulta difícil de tratar. Es posible que una estenosis sea secundaria a una inflamación prolongada o a la fibrosis asociada a esclerosis sistémica (esclerodermia). La acalasia es una obstrucción funcional secundaria a insuficiencia de las neuronas inhibidoras que relajan el esfínter esofágico inferior. La ectopia es la presencia de tejido fuera de su lugar, sobre todo de mucosa gástrica en el esófago, lo que puede ocasionar una esofagitis. Las varices se asocian a riesgo de hemorragia importante.

9 **E** El síndrome de Mallory-Weiss por desgarro esofágico se asocia a vómitos enérgicos. La mayor parte de los casos se producen en pacientes alcohólicos. La hemorragia no suele suponer una amenaza para la vida tan importante como las varices. La acalasia se asocia a ausencia de los ganglios mientéricos. La esclerodermia con fibrosis y obstrucción esofágica es un cuadro autoinmunitario, pero típicamente no asocia hemorragia. La infección por el virus del herpes simple provoca ulceraciones, que suelen ser superficiales y dolorosas,

pero no inducen una hemorragia significativa. La hipertensión portal provoca la dilatación de las venas de la submucosa esofágica, que pueden sangrar de forma importante. En este caso, la edad del paciente es un argumento en contra de la presencia de una cirrosis alcohólica. La separación de los pilares del diafragma se asocia a hernia de hiato, que predispone al reflujo gastroesofágico y no se relaciona con el alcoholismo.

10 **C** Las úlceras «excavadas» descritas se deben a la rotura de vesículas herpéticas. Las infecciones por el virus del herpes y *Candida* son típicas de pacientes inmunodeprimidos y pueden afectar al esófago. Las úlceras aftosas (aftas) también pueden afectar a inmunodeprimidos, pero son más frecuentes en la cavidad bucal. La candidiasis cursa con placas de pardas a amarillentas macroscópicamente. La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) puede producir inflamación aguda y crónica con algunas erosiones, aunque no suele aparecer un patrón de úlceras delimitadas; la ERGE no guarda relación alguna con la situación inmunitaria. El síndrome de Mallory-Weiss se produce por desgarros mucosos del esófago, y la laceración del esófago puede encontrarse en pacientes con vómitos y arcadas intensos.

11 **E** La dismotilidad esofágica es la *E* de CREST, una regla nemotécnica para recordar los hallazgos más importantes, en la forma limitada de la esclerosis sistémica (esclerodermia): C = calcinosis; R = fenómeno de Raynaud; E = dismotilidad esofágica; S = esclerodactilia *(sclerodactyly)*; T = telangiectasias. Aunque la esclerodermia es un proceso autoinmunitario que suele asociarse a presencia de anticuerpos frente al centrómero, cuando el paciente consulta por primera vez suele haber poca inflamación. Se observa un aumento del depósito de colágeno en la submucosa y la muscular del tubo digestivo. La fibrosis puede afectar a cualquier región del tubo digestivo, aunque la más afectada es el esófago. Para poder establecer el diagnóstico de esófago de Barrett, se debe identificar metaplasia cilíndrica en el estudio histológico, y con frecuencia el paciente refiere antecedentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico. La hernia de hiato se diagnostica con frecuencia en pacientes con una esofagitis por reflujo y puede producir inflamación, úlceras

y hemorragia, pero es poco frecuente que se formen estenosis. La aparición de una malla o red esofágica proximal asociada a anemia ferropénica puede dificultar la deglución, pero es un cuadro infrecuente. La hipertensión portal origina varices esofágicas, pero no fibrosis.

12 **D** Su proceso inflamatorio mantenido se debe al reflujo del contenido ácido del estómago hacia el tercio distal del esófago. La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es un problema frecuente con distintas causas, incluida la hernia de hiato por deslizamiento, el menor tono del esfínter esofágico inferior y el retraso del vaciamiento gástrico. Los pacientes pueden referir antecedentes de pirosis tras las comidas. El esófago de Barrett es una complicación de la ERGE de larga evolución y se caracteriza por una metaplasia cilíndrica del epitelio escamoso que normalmente reviste el esófago. Pueden existir inflamación y úlceras en la mucosa que recubre las varices, pero este trastorno no suele caracterizarse por pirosis. Las varices esofágicas secundarias a hipertensión portal pueden ser causa de una hematemesis grave. Una complicación infrecuente de la deficiencia de hierro es la aparición de una «red» esofágica proximal (síndrome de Plummer-Vinson). En la esclerodermia se encuentra una fibrosis progresiva con estenosis.

13 **C** La hemorragia por varices es una complicación frecuente de la cirrosis hepática, que puede ser consecuencia final de una infección crónica por el virus de la hepatitis B. La hipertensión portal se asocia a dilatación de las venas submucosas del esófago, que pueden erosionarse y sangrar de forma abundante. El esófago de Barrett es una metaplasia cilíndrica secundaria a la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). La hemorragia no caracteriza a esta enfermedad. La candidiasis esofágica puede afectar a inmunodeprimidos, pero suele cursar como placas abultadas en la mucosa y no suele ser infiltrante. La ERGE puede producir inflamación aguda y crónica y, en menos ocasiones, una hemorragia masiva. Los carcinomas de esófago pueden sangrar, pero no lo bastante como para producir una hematemesis masiva. El divertículo de Zenker se localiza en la parte superior del esófago y se debe a una disfunción motora del

músculo cricofaríngeo; se asocia a riesgo de aspiración, pero no produce hematemesis.

14 **B** La biopsia muestra restos de un epitelio escamoso ulcerado con metaplasia cilíndrica y displasia focal, típicos del esófago de Barrett. Los pacientes con un foco de esófago de Barrett tienen un riesgo aumentado de adenocarcinoma en comparación con la población general, sobre todo cuando existe una displasia de alto grado. La acalasia consiste en la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, con la consiguiente dilatación de la porción proximal del esófago. El divertículo epifrénico de la parte distal del esófago no se asocia a la mucosa de Barrett, sino que se produce por un aumento de la presión intraluminal contra una obstrucción del esfínter esofágico inferior. El síndrome de Mallory-Weiss se asocia a laceraciones verticales del esófago y puede encontrarse en pacientes con vómitos y arcadas intensos. El carcinoma epidermoide se localiza en el tercio medio del esófago y no se origina sobre un esófago de Barrett, sino que se relaciona con el consumo de tabaco y alcohol.

15 **A** Los adenocarcinomas de esófago se localizan típicamente en la parte distal del esófago, donde se desarrolla el esófago de Barrett sobre áreas de enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga evolución. El esófago de Barrett se asocia a un aumento del riesgo de adenocarcinoma, sobre todo cuando existe una displasia de alto riesgo. La metaplasia cilíndrica puede evolucionar a displasia y, posteriormente, a adenocarcinoma. Los tumores carcinoides se localizan en distintas regiones del tubo digestivo, como el apéndice, el íleon, el recto, el estómago y el colon. Los leiomiosarcomas de esófago son poco frecuentes y no se relacionan con antecedentes de pirosis. Los linfomas del tubo digestivo no suelen afectar al esófago y no guardan relación con la esofagitis por reflujo. Los carcinomas epidermoides de esófago suelen asociarse a antecedentes de alcoholismo y tabaquismo crónico.

16 **E** Esta gran lesión ulcerada de márgenes abultados es un tumor maligno de la mucosa esofágica. Existen dos tipos fundamentales de carcinomas de esófago: los epidermoides y el adenocarcinoma, que se asocian a factores de riesgo distintos. El tabaquismo y el consumo de alcohol son los principales factores

de riesgo de carcinoma epidermoide de esófago en los países occidentales. El adenocarcinoma se localiza sobre todo en el tercio distal del esófago y suele asociarse a esófago de Barrett. La inflamación crónica puede ocasionar estenosis y no una masa localizada. En las varices esofágicas se encuentran venas dilatadas, que no producen una masa ulcerada. Las cicatrices colágenas densas del tercio medio esofágico son infrecuentes, aunque pueden aparecer tras lesiones secundarias a la ingesta de cáusticos. Las inclusiones intranucleares son sugestivas de una infección por el virus del herpes simple o citomegalovirus, cuadros ambos que suelen producir ulceraciones sin presencia de una masa; estos dos procesos afectan a pacientes inmunodeprimidos.

17 **C** La población turca del área del mar Caspio muestra la frecuencia de cáncer de esófago más elevada del planeta, y la mayoría de estos tumores son carcinomas epidermoides originados en el tercio medio del esófago. El consumo de tés calientes, la contaminación de los alimentos que se consumen por silicatos, las deficiencias de micronutrientes y los antecedentes familiares son factores que están implicados, como también lo está la infección por el virus del papiloma humano. No se conoce ninguna mutación genética específica asociada a cáncer de esófago en esta población. Por el contrario, en los carcinomas de esófago de Europa y Norteamérica los factores de riesgo son el consumo de tabaco y de alcohol. La principal enfermedad autoinmunitaria que afecta al esófago, la esclerosis sistémica (esclerodermia), no es un factor de riesgo para que se desarrolle un cáncer. Los agentes infecciosos, como *Candida* o el virus del herpes simple, no se asocian a un aumento del riesgo de cáncer; no está bien establecida la implicación del virus del papiloma humano en este proceso. La esofagitis por reflujo es un factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinomas en el tercio distal del esófago.

18 **A** Estos hallazgos son compatibles con una gastritis aguda. Cuando no existe una inflamación significativa, se emplea el término *gastropatía.* El consumo importante de alcohol posiblemente sea la causa más frecuente, aunque el uso de ácido acetilsalicílico y de fármacos antiinflamatorios no esteroideos

(AINE), el tabaquismo y la quimioterapia pueden provocar hallazgos similares. Los AINE pueden ser cofactores en la enfermedad ulcerosa péptica. La clorpromacina (empleada en el tratamiento de las náuseas) no muestra la misma asociación. La cimetidina y el omeprazol se usan en el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica porque reducen la producción de ácido gástrico y aumentan así la concentración de gastrina sérica. La cimetidina es un antagonista del receptor H_2, y el omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones. La clindamicina es un antibiótico de amplio espectro que puede alterar la flora del tubo digestivo distal.

19 **A** El uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) es una causa importante de gastritis aguda. Los AINE inhiben la síntesis dependiente de la ciclooxigenasa de las prostaglandinas E_2 e I_2, que estimulan casi todos los mecanismos defensivos. Un consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo son también posibles causas. La gastritis aguda suele ser difusa y, cuando es grave, puede producir una hemorragia mucosa importante y difícil de controlar. Puede encontrarse displasia epitelial en las áreas de gastritis crónica, que es una lesión precursora de un cáncer gástrico. La infección por *Helicobacter pylori* no se asocia a gastritis aguda. Los pólipos hiperplásicos gástricos no se producen por una gastritis aguda, aunque pueden asociarse a la forma crónica. La gastritis aguda no incrementa el riesgo de adenocarcinoma gástrico.

20 **E** Las denominadas úlceras de estrés, o *úlceras de Curling,* pueden afectar a pacientes con quemaduras. Estas úlceras suelen ser pequeñas (< 1 cm) y poco profundas y nunca atraviesan la muscular, aunque pueden sangrar de forma importante. Pueden producirse lesiones parecidas tras un traumatismo o una lesión quirúrgica del sistema nervioso central (úlceras de Cushing). Las úlceras duodenales son típicamente úlceras pépticas en pacientes con una infección por *Helicobacter pylori.* Las varices esofágicas pueden ser causa de una hematemesis masiva, pero se describen en pacientes con hipertensión portal, secundaria, en general, a una cirrosis. La presencia de un epitelio cilíndrico metaplásico en el tercio distal del esófago caracteriza al esófago de Barrett, que se relaciona

con una enfermedad por reflujo gastroesofágico crónica. Las úlceras ileales y cólicas se deben, sobre todo, a una enfermedad inflamatoria intestinal, que puede tener una causa infecciosa, como la shigelosis, o idiopática, como la enfermedad de Crohn.

21 **A** El VCM alto es sugestivo de una anemia megaloblástica, posiblemente una anemia perniciosa en relación con una gastritis crónica atrófica autoinmunitaria. El retraso en la maduración de las células mieloides condiciona la hipersegmentación de los leucocitos polimorfonucleares. La pérdida de células parietales gástricas por una lesión autoinmunitaria produce una deficiencia de factor intrínseco y ácido. Cuando no se dispone de este factor, no es posible absorber la vitamina B_{12} en el íleon distal. Entre los diversos anticuerpos frente a las células parietales se encuentran los que antagonizan la enzima H^+,K^+-ATPasa de la bomba de protones productora de ácido. Los anticuerpos frente a la gliadina se describen en la enfermedad celíaca, que no afecta a la mucosa gástrica. *H. pylori* produce una gastritis crónica y la enfermedad ulcerosa péptica, pero no daña las células parietales. En la anemia perniciosa no se encuentran anticuerpos frente al receptor del factor intrínseco en las células de la mucosa ileal. La infección por *Tropheryma whippelli* es responsable de la enfermedad de Whipple, que puede afectar a cualquier órgano, aunque suele hacerlo a los intestinos, al sistema nervioso central y a las articulaciones; en esta enfermedad es frecuente la malabsorción.

22 **B** La figura muestra *Helicobacter pylori,* que reside en la capa de moco situado por encima del moco gástrico y se asocia a diversos trastornos gástricos, que van desde la gastritis crónica con eritema y engrosamiento de las rugosidades, como sucede en este paciente, hasta las úlceras pépticas y el adenocarcinoma. *H. pylori* puede elaborar varias sustancias tóxicas que lesionan el epitelio. El gen del islote de patogenicidad de *H. pylori* codifica el antígeno asociado a la citotoxina (CagA) y está presente en muchos pacientes con gastritis crónica y úlceras pépticas; aumenta el riesgo de sufrir un cáncer gástrico. Las proteinasas de cisteína que elabora *Entamoeba histolytica* facilitan la infiltración de los tejidos. La enterotoxina termoestable se

produce por cepas de *Escherichia coli* y provoca la diarrea del viajero. La toxina de Shiga es elaborada por los microorganismos *Shigella flexneri*, responsables de una variante de disentería bacilar. La verocitotoxina producida por algunas cepas de *E. coli* se asocia a síndrome hemolítico urémico mediado por el daño endotelial.

23 **D** Aunque no se encuentra en el duodeno, *H. pylori* modifica el microambiente del estómago y condiciona que tanto el estómago como el duodeno sean sensibles a la enfermedad ulcerosa péptica. Prácticamente todas las úlceras pépticas duodenales se asocian a infección por *H. pylori.* Las úlceras pueden alcanzar la capa muscular y asociarse a perforación, como se vio en este caso. Los demás microorganismos de la lista se relacionan con la formación no de úlceras pépticas sino de diarreas de origen infeccioso. *Salmonella typhi* puede provocar la fiebre tifoidea con más síntomas sistémicos; la notable ulceración de las placas de Peyer puede culminar en una perforación.

24 **C** Los síntomas clínicos de este caso sugieren una enfermedad ulcerosa péptica. En la mayoría de los casos, las úlceras pépticas guardan relación con la infección por *Helicobacter pylori.* Estas bacterias secretan ureasa, que se puede detectar mediante la administración oral de urea ^{14}C. Tras beber la solución de urea marcada, el paciente sopla dentro de un tubo. Cuando existe ureasa de *H. pylori* en el estómago, la urea se hidroliza y se detecta dióxido de carbono marcado en la muestra de aliento. En la prueba de ureasa en biopsia, se introduce la muestra antral en un gel que contiene urea y un indicador y, cuando existe *H. pylori*, el color cambia en pocos minutos. Si no se tratan de forma adecuada, las úlceras pépticas pueden provocar muchas complicaciones, incluida una hemorragia masiva, que puede ocasionar la muerte. Los tumores carcinoides pueden originarse en el estómago, pero son infrecuentes y no guardan relación con la enfermedad ulcerosa péptica que padece este paciente. No presenta malabsorción de las grasas porque dicha absorción no ocurre en el estómago. Las úlceras pépticas no suelen evolucionar a carcinoma gástrico. El estómago presenta numerosas arterias y es poco probable que resulte afectado por

una trombosis focal. La deficiencia de vitamina B_{12} puede asociase a gastritis atrófica autoinmunitaria, porque las células parietales gástricas son las responsables de la producción del factor intrínseco, que es necesario para la absorción de la vitamina B_{12}.

25 **A** Los pólipos inflamatorios/hiperplásicos gástricos pueden originarse en pacientes con una infección por *Helicobacter pylori.* Se trata del tipo más frecuente de pólipo gástrico. Puede ser un precursor de los adenocarcinomas gástricos, sobre todo cuando las lesiones miden más de 1,5 cm y tienen una displasia de alto grado. Las demás opciones no son adecuadas para una etiología infecciosa.

26 **A** Existe una asociación entre los pólipos de glándulas fúndicas y la utilización de inhibidores de la bomba de protones y la poliposis adenomatosa familiar (PAF); el aumento de la concentración de gastrina puede provocar hiperplasia glandular. Los adenomas gástricos son más frecuentes en el antro, presentan metaplasia intestinal con displasia y son precursores del adenocarcinoma. Pueden asociarse a PAF. Los pólipos hiperplásicos se asocian a gastritis crónica, a menudo secundaria a una infección por *H. pylori.* Una variante de gastropatía hipertrófica es la enfermedad de Ménétrier, que se debe a una secreción excesiva del factor de crecimiento transformante α (TGF-α) con hiperplasia difusa de las rugosidades gástricas y enteropatía con pérdida de proteínas.

27 **A** La causa más probable de esta gran masa gástrica es un carcinoma, y esta lesión corresponde a un adenocarcinoma, posiblemente la variante intestinal presente en la región del antro. Los adenocarcinomas se relacionan con la infección por *Helicobacter pylori* con mutación de β-catenina. La incidencia de este tipo de cáncer lleva disminuyendo varias décadas en áreas donde han mejorado las técnicas de procesamiento de los alimentos. Los linfomas malignos y los leiomiosarcomas son menos frecuentes y forman grandes masas en el fondo. Los carcinomas neuroendocrinos son infrecuentes. Los carcinomas epidermoides aparecen típicamente en el esófago.

28 **E** El aspecto endoscópico y radiológico se corresponde con una linitis plástica («estómago en bota de cuero») del carcinoma

gástrico difuso. Histológicamente, estos carcinomas están constituidos por células mucinosas de tipo gástrico que infiltran la pared gástrica de forma difusa. Las células neoplásicas adoptan una morfología de anillo de sello, debido a que la mucina citoplásmica empuja al núcleo hacia un lado. En la gastritis crónica atrófica, se pierden las rugosidades, pero no existen cicatrices ni retracción significativas. Los linfomas primarios gástricos son menos frecuentes que los adenocarcinomas; un linfoma puede alcanzar gran tamaño, pero no afecta al estómago de forma difusa. Los tumores del estroma gastrointestinal suelen ser masas voluminosas. En esta localización son infrecuentes los granulomas.

29 **F** Algunos linfomas digestivos se originan en el tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT) y se llaman *linfomas MALT.* Los linfomas gástricos asociados a la infección por *Helicobacter pylori* están constituidos por linfocitos B monoclonales, cuyo crecimiento y proliferación dependen de citocinas elaboradas por linfocitos T sensibilizados frente a los antígenos de *H. pylori.* El tratamiento antibiótico elimina *H. pylori* y el estímulo para el crecimiento de los linfocitos B. Sin embargo, las lesiones que adquieren mutaciones adicionales, como *p53,* pueden volverse más invasivas. Las lesiones de tipo MALT pueden originarse en cualquier parte del tubo digestivo, pero son poco frecuentes en el esófago y el apéndice. En la gastritis crónica por *H. pylori,* que puede preceder al desarrollo de un linfoma, se reconocen infiltrados linfoplasmocíticos en la mucosa. Los linfomas B difusos de células grandes y otros linfomas no hodgkinianos distintos de los linfomas MALT no remiten con el tratamiento antibiótico. La gastritis autoinmunitaria es un factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma gástrico. La enfermedad de Crohn es infrecuente en el estómago y no guarda relación con la infección por *H. pylori.* Los tumores del estroma gastrointestinal son poco frecuentes; estos voluminosos tumores son proliferaciones de las células intersticiales de Cajal, células del plexo mientérico que son consideradas el «marcapasos» intestinal.

30 **D** La figura muestra que el citoplasma del tumor contiene gránulos pequeños oscuros y redondeados, con un núcleo denso

(gránulos de neurosecreción), característicos de las células neuroendocrinas. El aspecto macroscópico de este tumor y su localización son también característicos de los tumores carcinoides. Muchos tumores neuroendocrinos bien diferenciados (carcinoides) y otros tumores intestinales benignos pequeños se descubren de forma incidental; la mayoría miden 2 cm o menos. Con este tamaño no es probable que se comporten de forma invasiva. Los otros tipos de células enumerados no contienen gránulos neurosecretores.

31 **C** El síndrome carcinoide es poco frecuente. Se necesita un tumor carcinoide maligno (carcinoma neuroendocrino) lo suficientemente grande (posiblemente metastásico) como para producir aminas biógenas y derivados como el 5-HIAA (metabolito de la serotonina). Los tumores originados en el intestino medio (yeyuno, íleon) tienen más riesgo de ser malignos. Las células neuroendocrinas aparecen dispersas por toda la mucosa del tubo digestivo y son derivados de la cresta neural. La propia mucosa intestinal es un derivado del endodermo, en el que los tejidos conjuntivos son de origen mesodérmico.

32 **D** Este tumor del estroma gastrointestinal (GIST) deriva de las células intersticiales de Cajal y por eso es de origen mesenquimatoso. Los tumores de este tipo originados en el estómago pueden ser menos invasivos que los intestinales, aunque la mayor parte son positivos para c-Kit y pueden ser tratados con inhibidores de tirosina cinasa. Algunos GIST presentan mutaciones en el receptor A del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGFRA). El tratamiento antibiótico orientado a la erradicación de la infección por *Helicobacter pylori* puede ser útil en los MALTomas. La azatioprina y los corticoesteroides pueden usarse en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, aunque el máximo riesgo de malignidad en este proceso es el adenocarcinoma, sobre todo de colon. La ciclofosfamida es un quimioterápico que no se utiliza como tratamiento del GIST. La radioterapia no suele ser eficaz frente a los tumores malignos mesenquimatosos.

33 **B** Este paciente presenta una obstrucción intestinal aguda, y los hallazgos durante la cirugía muestran un infarto intestinal.

La causa más frecuente en los países desarrollados son las adherencias, las hernias y las metástasis. Las adherencias suelen producirse como consecuencia de una cirugía previa, como sucede en este paciente, y producen hernias «internas», dentro de las cuales quedan atrapadas asas de intestino (incarceración), con el consiguiente compromiso de su flujo. Las asas intestinales que quedan atrapadas en las hernias inguinales directas o indirectas también pueden infartarse. Cuando la causa es una metástasis, normalmente se conoce el origen del tumor primario y se trata de estadios avanzados de la neoplasia. Los adenocarcinomas primarios de intestino delgado son infrecuentes. La enfermedad de Crohn puede ser focal y originar una obstrucción intestinal, pero no es habitual en pacientes de esta edad. La invaginación puede ser focal, pero es poco frecuente. La tuberculosis abdominal puede producir una estenosis circunferencial del intestino y se debe incluir en el diagnóstico diferencial en regiones con alta prevalencia de esta infección. El vólvulo puede afectar al ciego o al sigma (por su movilidad). Cuando se produce un vólvulo de intestino delgado, se suele encontrar una torsión alrededor del mesenterio y se produce un infarto extenso (no segmentario) del intestino delgado.

34 **C** Este lactante presenta signos y síntomas de una obstrucción aguda del intestino. La invaginación ocurre cuando un pequeño segmento del intestino delgado se pliega hacia el segmento inmediatamente distal. Este proceso puede producirse de forma súbita en los lactantes y no tiene por qué asociarse a ninguna malformación anatómica. La atresia duodenal (que se relaciona de forma característica con otras malformaciones, sobre todo en la trisomía 21) y la enfermedad de Hirschsprung (por un segmento de colon aganglionar) suelen manifestarse poco después del nacimiento. Casi todos los casos de divertículo de Meckel son asintomáticos, aunque en algunos individuos existe mucosa gástrica funcional y puede ocasionar ulceraciones y hemorragias. La estenosis pilórica aparece en fases mucho más tempranas de la vida y se caracteriza por vómitos en escopetazo.

35 **D** Los antecedentes de infarto de miocardio de este paciente son sugestivos de una ateroesclerosis coronaria grave, y el

aumento de HbA_{1c}, de diabetes mellitus. La enfermedad ateromatosa sistémica suele afectar a los vasos mientéricos, con la consiguiente oclusión trombótica de los vasos responsables de la irrigación del intestino. Los síntomas y signos son indicativos de un infarto intestinal. La apendicitis aguda no suele provocar un cuadro catastrófico, salvo que se perfore. (La ausencia de aire libre en la radiografía es un argumento contrario a la presencia de una perforación visceral.) La pancreatitis aguda puede ser una urgencia abdominal, pero las concentraciones normales de amilasa y lipasa parecen descartarla. La colecistitis aguda puede ser causa de dolor abdominal intenso, pero la diarrea sanguinolenta y la ausencia de ruidos intestinales (íleo paralítico) son poco probables. La colitis seudomembranosa afecta a pacientes tratados con antibióticos de amplio espectro.

36 **A** La hipotensión con hipoperfusión secundaria a insuficiencia cardíaca es una causa frecuente de isquemia intestinal en los pacientes hospitalizados. Los cambios isquémicos se inician en áreas dispersas de la mucosa y con el tiempo confluyen y se hacen transmurales. Este cuadro puede asociarse a íleo paralítico y hemorragia en las regiones afectadas de la mucosa. La vasculitis mesentérica es poco frecuente, pero también podría producir un infarto intestinal. La shigelosis es una diarrea infecciosa que cursa con una erosión difusa de la mucosa cólica y hemorragia. La colitis ulcerosa suele provocar una marcada inflamación mucosa con necrosis, que suele adoptar una distribución continua desde el recto en sentido proximal. El vólvulo es una variante de obstrucción mecánica provocada por la torsión del intestino delgado sobre su mesenterio, o del ciego o del sigma, con el consiguiente compromiso del riego, lo que puede ocasionar un infarto del segmento en torsión.

37 **A** La angiodisplasia es la presencia de dilataciones tortuosas de los vasos mucosos y submucosos, y suele localizarse en el ciego de pacientes mayores de 50 años. Estas lesiones, aunque infrecuentes, son responsables del 20% de los casos de hemorragia digestiva baja importante. La hemorragia no suele ser masiva, pero puede producirse de forma intermitente durante meses o años. Es difícil diagnosticar esta lesión y con

frecuencia se identifica radiológicamente. Los focos de vasos anómalos pueden ser extirpados. La colitis colágena es una causa infrecuente de diarrea acuosa, pero típicamente no sanguinolenta. La diverticulosis cólica puede asociarse a una hemorragia, pero en general la colonoscopia revela las evaginaciones. Las hemorroides en la unión anorrectal pueden ser causa de una hemorragia rectal de sangre roja, pero se suelen ver o palpar en el tacto rectal. La trombosis de la vena mesentérica es poco frecuente y puede producir un infarto intestinal con dolor abdominal importante.

38 **C** Puede producirse una malabsorción de la grasa por alteraciones en la digestión intraluminal de la misma. Son típicas las heces voluminosas y malolientes, con gran cantidad de grasa (esteatorrea). Las enfermedades pancreáticas o biliares son causa importante de malabsorción de la grasa. La amebiasis puede ocasionar una serie de alteraciones, que van desde la diarrea acuosa a la disentería con presencia de moco y sangre en las heces. La giardiasis produce una diarrea acuosa. La malabsorción con esteatorrea no suele asociarse a hemorragia. El cólera produce una diarrea acuosa masiva.

39 **E** Entre los datos serológicos característicos de la enfermedad celíaca se incluye el resultado positivo de los anticuerpos frente a la transglutaminasa, la gliadina y el endomisio. Esta enfermedad crónica puede debutar en los primeros años adultos, pero puede ser difícil diagnosticarla. Las mujeres se afectan más que los hombres. La enfermedad celíaca se produce por una hipersensibilidad al gluten. La exposición a la proteína de la gliadina presente en el trigo, el centeno, la cebada y la avena (pero no en el arroz) provoca inflamación en el intestino. La hipersensibilidad a la gliadina condiciona que las células epiteliales elaboren IL-15, lo que a su vez se traduce en la acumulación de linfocitos T CD8+ activados, que expresan el receptor de los linfocitos NK NKG2D y lesionan los enterocitos que expresan MIC-A. La opción terapéutica más lógica es una dieta de prueba exenta de gluten. Los pacientes suelen quedar asintomáticos y se recupera el aspecto normal de la mucosa. Algunos pacientes presentan una dermatitis herpetiforme y unos pocos desarrollan un linfoma T asociado a enteropatía. Los

anticuerpos frente al centrómero son más específicos de la esclerodermia limitada (llamada antes síndrome CREST) con trastornos de la motilidad esofágica. Los anticuerpos frente a la ADN topoisomerasa I son más específicos de la esclerodermia difusa, en la que se produce afectación del tubo digestivo por fibrosis de la submucosa, que puede ser más extensa y asociarse a malabsorción. Los anticuerpos antimitocondriales son más específicos de la cirrosis biliar primaria. Existen anticuerpos antinucleares en diversos procesos autoinmunitarios, pero no son típicos del esprúe celíaco.

40 **E** La malabsorción respondió al tratamiento dietético. Posiblemente esta paciente tenga una enfermedad celíaca (hipersensibilidad al gluten) con los correspondientes rasgos histológicos, entre los que están el aplanamiento de la mucosa, la atrofia difusa y grave de las vellosidades, la hiperplasia de las criptas y la inflamación crónica de la lámina propia. Se observa un aumento de las cifras de los linfocitos intraepiteliales, CD4+ y CD8+. Los pacientes son positivos para HLA-DQ2 o HLA-DQ8. Los abscesos crípticos son inespecíficos y pueden encontrarse en la enfermedad inflamatoria intestinal. En la enfermedad de Whipple se produce una obstrucción linfática y, además, se acumulan macrófagos espumosos en la lámina propia. Los macrófagos contienen gránulos positivos para el PAS, que con microscopia electrónica contienen un actinomiceto llamado *Tropheryma whippelli.* En la enfermedad de Crohn se encuentran granulomas no caseificados en la pared intestinal.

41 **B** La enteropatía ambiental afecta a millones de niños en todo el mundo. La infección de repetición da origen a un ciclo de lesión mucosa y respuesta inflamatoria que ocasiona una imagen parecida a la de una enfermedad celíaca. No está implicado un agente infeccioso concreto, sino que posiblemente muchos patógenos contribuyan de forma acumulada a la lesión mucosa. La abetalipoproteinemia es un cuadro poco frecuente asociado a mutaciones en la proteína de transferencia de triglicéridos microsómicos, lo que altera la capacidad de transporte de las lipoproteínas en los enterocitos. La fibrosis quística se relaciona con mutaciones del gen *CFTR,* que afecta a los canales de ión cloruro, pero la diarrea asociada es

consecuencia, sobre todo, de la pérdida de la función pancreática. La deficiencia de disacaridasa más frecuente es la de lactasa, con intolerancia a la leche. Las mutaciones del gen *NOD2* pueden participar en la enfermedad de Crohn.

42 **E** La deficiencia de disacaridasa (lactasa), congénita o adquirida, es sintomática cuando la lactosa de los productos lácteos no se digiere a glucosa y galactosa mediante digestión terminal y, en consecuencia, aparece diarrea osmótica y se produce gas por la flora intestinal. Los individuos afectados no siempre vinculan la dieta con los síntomas o no consumen una cantidad suficiente de lácteos como para desarrollar síntomas. La gastritis autoinmunitaria suele producir malabsorción de vitamina B_{12}. La enfermedad celíaca también se vincula con la dieta y se debe a la sensibilidad frente al gluten de algunos cereales. La colelitiasis puede producir una obstrucción de la vía biliar con malabsorción de las grasas y dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. La fibrosis quística afecta al páncreas y provoca, principalmente, malabsorción de las grasas.

43 **E** Las características clínicas son sugestivas de una intoxicación alimentaria secundaria a la ingesta de alguna enterotoxina preformada. *Staphylococcus aureus* crece en los alimentos (sus favoritos son los lácteos y los productos grasos) y elabora una enterotoxina, cuya ingesta provoca diarrea en pocas horas. *Bacillus cereus* se conoce porque crece en el arroz frito recalentado; produce una enterotoxina que ocasiona náuseas agudas, vómitos y dolor cólico abdominal. *Clostridium difficile* puede ocasionar una colitis seudomembranosa en los pacientes tratados con antibióticos de amplio espectro. Algunas cepas de *Escherichia coli* pueden ocasionar diversos tipos de diarrea, pero sin una toxina preformada. *Salmonella enterica* suele encontrarse en los productos avícolas, pero la diarrea se desarrolla en 2 días. *Vibrio parahaemolyticus* se encuentra en el marisco.

44 **D** El marisco crudo o poco cocinado puede ser la fuente de *Vibrio parahaemolyticus,* que suele ocasionar una diarrea más leve que *Vibrio cholerae.* Los microorganismos *Vibrio* producen una toxina que aumenta la concentración de adenilato ciclasa, con la consiguiente secreción de ión cloruro y diarrea osmótica. *Cryptosporidium* es una causa de diarrea acuosa, que afecta

principalmente a individuos inmunodeprimidos. *Entamoeba histolytica* produce infiltración de la mucosa con exudación y ulceraciones; en las heces se reconocen sangre y moco. *Staphylococcus aureus* puede provocar una intoxicación alimentaria mediante la elaboración de una enterotoxina, que produce vómitos y diarrea explosivos a las 2 h de la ingesta. *Yersinia enterocolitica* es enteroinvasiva y puede ocasionar una infección extraintestinal.

45 **B** Entre las fuentes de *Campylobacter jejuni* pueden incluirse el agua contaminada, la leche no pasteurizada y las aves mal cocinadas. La diarrea sanguinolenta (disentería) y los leucocitos son sugestivos de invasión de la mucosa intestinal por una bacteria. La parálisis ascendente (síndrome de Guillain-Barré) puede complicar algunas infecciones por *Campylobacter,* dado que existe una reactividad cruzada entre el gangliósido G_{M1} humano y el lipopolisacárido bacteriano. La intoxicación alimentaria por *Bacillus cereus* suele producir vómitos de aparición abrupta. *Clostridium perfringens* es causa, sobre todo, de gangrena gaseosa. La giardiasis cursa con una diarrea acuosa sin disentería ni complicaciones extraintestinales. Las infecciones por rotavirus son más frecuentes en los niños.

46 **E** La infección por alguna de las distintas cepas de *Salmonella enterica* (distintas de la cepa *S. typhi*) produce una diarrea autolimitada. Se trata de una forma de intoxicación alimentaria, asociada típicamente a productos avícolas contaminados. *Bacillus cereus* crece en alimentos, como el arroz frito recalentado, y produce una exotoxina que, una vez ingerida, puede producir de forma aguda náuseas, vómitos y dolor abdominal. La amebiasis causada por *Entamoeba histolytica* puede cursar con una infección invasiva y exudativa. Las heces contienen sangre y moco. Diversas enfermedades se deben a la contaminación por distintas cepas de *Escherichia coli,* en función de las características de los microorganismos y de su capacidad de invadir o producir una enterotoxina. Los productos avícolas no se suelen contaminar por *E. coli.* Los rotavirus suelen producir una diarrea acuosa sintomática en niños, sin relación con la dieta. *Staphylococcus aureus* ocasiona un dolor abdominal agudo con flatulencia y diarrea, pero no por infección directa del

tubo digestivo sino por la elaboración de una exotoxina mientras crece en los alimentos que luego son ingeridos. *Yersinia enterocolitica* se suele encontrar en leche o productos del cerdo contaminados y puede diseminarse y causar linfoadenitis e infecciones extraintestinales.

47 **D** La fiebre tifoidea debuta como una infección intestinal, pero se convierte en una enfermedad sistémica. Puede producirse un estado de portador crónico en algunos individuos infectados con colonización de la vesícula biliar. *Campylobacter jejuni* puede ocasionar una disentería, pero en general no una enfermedad sistémica. *Clostridium perfringens* puede provocar gangrena gaseosa. En la actualidad, la infección por *Mycobacterium bovis* es rara, dado que se pasteurizan los productos lácteos; esta bacteria era una causa conocida de obstrucción intestinal por ulceración circunferencial y cicatrización del intestino delgado. La shigelosis puede producir una disentería, pero en general la infección se limita al colon. La infección por *Yersinia enterocolitica* puede causar una infección extraintestinal con linfoadenitis, pero, en general, no disentería.

48 **D** El colon abierto muestra seudomembranas, que son parches de restos fibrinopurulentos unidos a la mucosa. La enterocolitis seudomembranosa es una complicación del tratamiento con antibióticos de amplio espectro, que altera la flora intestinal y permite que sobrecrezca *Clostridium difficile* u otros microorganismos capaces de producir lesiones mucosas. La infección por *Clostridium septicum* suele producir mionecrosis, a menudo asociada a tumores malignos o inmunodepresión. La enfermedad inflamatoria intestinal no ocasiona en los casos típicos un exudado llamativo ni se asocia a *C. difficile.* Este patrón macroscópico también puede deberse a una lesión isquémica, vascular o mecánica, pero la anamnesis y la evolución temporal de este paciente son sugestivas de una causa yatrógena. La colitis isquémica secundaria a una trombosis de la arteria mesentérica podría ser similar, pero no se asocia a *C. difficile.* El megacolon tóxico dilatado y adelgazado es una complicación poco frecuente de la colitis ulcerosa.

49 **C** Los brotes de infección por norovirus se deben a la contaminación de agua o alimentos, sobre todo en lugares en los

que se congregan múltiples personas. ¿Fue el origen la piscina del recinto? Los norovirus, igual que el parásito *Giardia,* resisten a la cloración. ¿Fue el bufé? A menudo están implicados las ensaladas, el marisco y la carne. La diarrea voluminosa es sugestiva de afectación del intestino delgado. La ausencia de leucocitos hace menos probable la infección bacteriana. Las infecciones por citomegalovirus son más probables en personas inmunodeprimidas. El botulismo ocasiona una parálisis por una neurotoxina. La intoxicación alimentaria por estafilococos suele debutar de forma abrupta y durar poco tiempo. La estrongiloidosis suele durar meses o años. El cólera produce una pérdida de líquido que supone una amenaza para la vida.

50 **F** Los rotavirus son la causa más frecuente de gastroenteritis vírica en los niños. Se trata de un cuadro autolimitado que afecta, fundamentalmente, a lactantes y niños pequeños, que pueden perder una cantidad de líquido significativa en relación con su tamaño y desarrollar con rapidez deshidratación. La mortalidad es inferior al 1%. *Campylobacter jejuni* suele afectar a niños y adultos como causa transmitida por alimentos de fiebre, dolor abdominal y diarrea. La criptosporidiosis suele producir diarrea acuosa en adultos inmunodeprimidos. Las cepas enterohemorrágicas de *Escherichia coli* pueden causar el síndrome hemolítico urémico en niños pequeños. La listeriosis puede ser una infección congénita, que cursa con meningitis y sepsis desde el parto; en los lactantes, niños y adultos se trata de una infección transmitida por agua o alimentos, que suele ocasionar epidemias. El virus de Norwalk es una causa frecuente de diarrea en adultos. La shigelosis provoca disentería con diarrea sanguinolenta.

51 **A** Las infecciones por gusanos pueden deberse a *Ancylostoma duodenale* (Viejo Mundo), *Necator americanus* (Nuevo Mundo) o ambos, porque las distribuciones geográficas se pueden solapar, sobre todo en África y Asia. Los afilados ganchos de estos gusanos penetran la mucosa del intestino delgado y ocasionan hemorragia. Los gusanos viven durante meses o años. La infección ocurre a través de la piel y las larvas se desarrollan en los pulmones hasta que migran a la tráquea y se degluten, con la consiguiente llegada de estos gusanos al duodeno. Los

microorganismos que se recogen como opciones alternativas no suelen producir una hemorragia digestiva importante.

52 **D** La diarrea con moco y sangre en las heces se puede deber a varios microorganismos enteroinvasivos, como *Shigella dysenteriae* y *Entamoeba histolytica*. En la mayor parte de los casos la diarrea es autolimitada. El episodio inicial de diarrea podría haber sido causado por distintos microorganismos; sin embargo, la aparición de un absceso hepático tras un episodio de diarrea suele deberse a la infección por *E. histolytica*. La invasión de la mucosa y submucosa del colon por este protozoo le permite acceder a las venas submucosas que drenan el sistema porta y el hígado. *Clostridium difficile* causa la colitis seudomembranosa tras el tratamiento antibiótico. La diseminación de *Cryptosporidium* y *Strongyloides* puede producirse en pacientes inmunodeprimidos. *Giardia* ocasiona una diarrea acuosa autolimitada.

53 **B** El íleon presenta inflamación crónica con agregados linfoides. La inflamación es transmural, con afectación de la mucosa, la submucosa y la muscular propia, como muestra la figura. Durante la cirugía se observa también inflamación en la serosa. Se identifica una fisura profunda, que alcanza la muscular. Estos rasgos histológicos son muy sugestivos de enfermedad de Crohn. La extensión de las fisuras hacia la piel suprayacente puede provocar fístulas enterocutáneas, aunque las fístulas enteroentéricas entre las asas intestinales son más frecuentes. Aunque en la enfermedad de Crohn aumenta el riesgo de adenocarcinoma, esta complicación es menos frecuente que las secuelas de la inflamación. La invaginación puede encontrarse en pacientes con una obstrucción congénita o adquirida del intestino. Los abscesos hepáticos se producen tras la colitis amebiana u otras infecciones. La trombosis de la arteria mesentérica, que típicamente es una complicación de la ateroesclerosis, es poco probable al tratarse de un hombre de 27 años.

54 **D** Puede resultar difícil diagnosticar un síndrome del intestino irritable (SII) porque muestra características variables presentes en muchos otros trastornos. No es posible asociar ninguna alteración patológica o fisiológica de forma fiable con el

SII. Los pacientes pueden beneficiarse de la terapia conductual. Los placebos pueden funcionar igual de bien que los fármacos activos. La ausencia de aumento de la grasa en heces en este caso indica que la pancreatitis crónica y la fibrosis quística son poco probables. La diverticulosis suele afectar a ancianos. La enfermedad inflamatoria intestinal presenta rasgos patológicos y radiológicos. Es poco probable que una gastroenteritis vírica persista durante 5 años.

55 **A** La figura muestra un infiltrado difuso, principalmente mononuclear en la lámina propia, además de un absceso críptico. La colitis ulcerosa puede ocasionar episodios recidivantes con recuperación de diarrea de escaso volumen con sangre y moco e inflamación difusa con ulceración de la mucosa rectal y cólica. Una de las complicaciones más temidas de la colitis ulcerosa es el desarrollo de un adenocarcinoma de colon. Los pacientes que sufren esta enfermedad durante 10 años o más tienen un riesgo entre 20 y 30 veces más alto de desarrollarlo comparados con la población control. La diverticulitis puede producir dolor abdominal y presencia de sangre en las heces, pero no se asocia a colitis ulcerosa. La malabsorción de la grasa no se suele encontrar en la colitis ulcerosa, porque con frecuencia no se afecta el íleon. La formación de fístulas perirrectales es más típica de la enfermedad de Crohn, en la que existe inflamación transmural. La colitis ulcerosa se asocia a varias manifestaciones extraintestinales, como la colangitis esclerosante, pero no se relaciona con la cirrosis biliar primaria. La colitis seudomembranosa se debe a las infecciones por *Clostridium difficile* en relación con el tratamiento antibiótico de amplio espectro.

56 **C** Este segmento de colon muestra las ulceraciones difusas y graves características de una colitis ulcerosa. La inflamación que muestra la imagen es tan grave que las áreas de ulceración de la mucosa han dado origen a seudopólipos o islotes de mucosa residual. La colitis ulcerosa es una enfermedad sistémica; en algunos pacientes se asocia a poliartritis migratoria, espondilitis anquilosante y colangitis esclerosante primaria. La patogenia de la colitis ulcerosa no está clara, pero posiblemente sea una

respuesta mediada por linfocitos T frente a un antígeno desconocido (pero no una infección intestinal), que se traduce en un desequilibrio entre la activación y la regulación de los linfocitos T. La respuesta inmunitaria T_H17 implica la presencia de linfocitos T CD4+ en las lesiones, con secreción de sustancias lesivas. Existen autoanticuerpos frente a la tropomiosina, pero no tienen un papel patógeno en la colitis ulcerosa. Posiblemente las mutaciones del gen *NOD2* se relacionen con la enfermedad de Crohn, pero no lo hacen con la colitis ulcerosa. La herencia de una mutación en la línea germinal de *APC* produce poliposis adenomatosa familiar, con un riesgo muy elevado de cáncer de colon. La colitis ulcerosa también aumenta el riesgo de cáncer de colon, pero no de forma secundaria a la mutación del gen *APC.*

57 **B** Los hallazgos de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa se solapan y al menos en el 10% de los casos puede resultar imposible distinguir ambos cuadros –situación llamada colitis indeterminada–. Independientemente del diagnóstico exacto, existe un importante aumento del riesgo de aparición de un carcinoma a los 8-10 años de comenzar la enfermedad. Los controles de vigilancia pueden detectar la displasia como lesión precursora de carcinoma, pero ¿resecaría el colon afectado por el problema de forma mantenida y evitar, de este modo, que se le escape un posible cáncer? Si se extirpa el colon y resulta ser una enfermedad de Crohn, el paciente podría recaer, pero las manifestaciones extraintestinales pueden producirse aunque se realice esta cirugía. A los médicos les gusta jugar a caballo ganador y conseguir la «curación», pero los pacientes quieren evitar la pérdida potencial de vida o función. Los médicos tratan de evitar cualquier evolución posible, pero el paciente no. A menudo en medicina las respuestas no son sencillas.

58 **B** Las características clínicas e histológicas se corresponden con una enfermedad de Crohn, una de las enfermedades inflamatorias intestinales idiopáticas. Se caracteriza por la afectación intestinal segmentaria con inflamación transmural, que produce estenosis, adherencias y fístulas. La colitis ulcerosa se asocia a inflamación mucosa, que se inicia en el recto y alcanza una longitud variable. A diferencia de lo que sucede en la enfermedad de Crohn, la afectación de la mucosa es difusa y

no respeta «áreas parcheadas». En la colitis ulcerosa no es frecuente encontrar fisuras ni fístulas. Los hallazgos de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa se solapan y al menos en el 10% de los casos puede resultar imposible distinguir estos dos procesos –situación conocida como colitis indeterminada–. En general, la presencia de abscesos crípticos se considera más típica de una colitis ulcerosa y los granulomas de la enfermedad de Crohn, pero estos rasgos no se identifican en la mayor parte de las biopsias de pacientes con cualquiera de estos trastornos. Se dice que un médico de un hospital universitario abroncaba a los residentes y alumnos porque no diagnosticaban de forma definitiva a los pacientes como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Cuando se jubiló, en su despacho se encontraron informes incompletos de pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal idiopática que representaban una sexta parte de todos los casos de enfermedad inflamatoria intestinal que había tenido en su práctica clínica. La amebiasis y la shigelosis son procesos infecciosos que pueden ocasionar úlceras mucosas, pero no granulomas ni fisuras. La sarcoidosis puede afectar a muchos órganos y se asocia a granulomas no caseificados; sin embargo, la afectación intestinal es poco frecuente y la sarcoidosis no produce enfermedad ulcerosa.

59 **B** Estos hallazgos se corresponden con una enfermedad inflamatoria intestinal idiopática, posiblemente con una enfermedad de Crohn. La afectación del íleon explica las deficiencias de vitaminas K y B_{12}, así como la alteración de la circulación enterohepática de sales biliares, que predispone a la formación de cálculos. La respuesta inflamatoria en la enfermedad de Crohn puede ser consecuencia de una respuesta inmunitaria innata inadecuada frente a la flora intestinal, como se comenta en el texto. La angiodisplasia cursa con hemorragia originada en los vasos anómalos de la submucosa, sobre todo en el ciego de ancianos. La diverticulosis es frecuente en personas de edad avanzada, pero su mecanismo es mecánico, no inmunitario. La ateroesclerosis periférica grave puede causar isquemia intestinal, pero en general se trata de un proceso agudo.

60 **C** La diverticulosis cólica puede asociarse a una hemorragia

intermitente mínima y, en casos poco frecuentes, grave. Uno o más divertículos pueden inflamarse (diverticulitis) o, con menos frecuencia, perforarse y causar un absceso, peritonitis o ambos. La diverticulosis no es un cuadro premaligno. Los divertículos protruyen hacia fuera e, incluso con inflamación, la obstrucción de la luz es poco probable. La malabsorción no es una característica de la diverticulosis. El megacolon tóxico es una complicación infrecuente de la enfermedad inflamatoria intestinal.

61 **C** Los pólipos juveniles son la variante más frecuente de pólipo hamartomatoso. Los solitarios suelen ser esporádicos y la única complicación es el prolapso rectal, pero cuando existen pólipos múltiples pueden ser consecuencia de un síndrome autosómico dominante con riesgo de aparición de un adenocarcinoma. Las demás opciones son síndromes de poliposis, que no suelen aparecer a esta edad.

62 **A** La figura muestra un adenoma pediculado solitario del colon sin evidencia de neoplasia. Con gran aumento se observa un foco pequeño de células epiteliales displásicas no secretoras de moco, que revisten una cripta cólica y dan lugar a una arquitectura «tubular». Es poco probable que un adenoma tubular pequeño (< 2 cm) y solitario tenga un foco de neoplasia, y no está justificado hacer el estudio para descartar metástasis. Este tipo de adenomas cólicos ocurren con más frecuencia en ancianos; de ahí la recomendación de realizar una colonoscopia de detección selectiva a partir de los 50 años. La extirpación de estos adenomas impide que estos sigan creciendo y que los pacientes puedan desarrollar, al final, un adenocarcinoma. Los individuos que heredan un gen *APC* mutante suelen presentar cientos de pólipos a edades tempranas; no es preciso realizar pruebas genéticas para detectar una mutación somática del gen *APC*. Los pacientes con un síndrome de cáncer colorrectal hereditario no poliposo que presentan múltiples pólipos presentan un riesgo aumentado de cáncer de endometrio y también desarrollan un cáncer de colon a edades tempranas. Es poco probable que la pérdida de sangre secundaria a un pólipo pequeño sea suficiente como para ocasionar una deficiencia de hierro, aunque la pequeña cantidad de sangre originada en los

pólipos y en los cánceres de colon es la base para la realización de la prueba de sangre oculta en heces. El síndrome de Peutz-Jeghers se asocia a la aparición de pólipos hamartomatosos en el intestino delgado.

63 **A** La figura muestra un gran adenoma velloso. Existe una elevada probabilidad de que este tipo de lesiones evolucionen a adenocarcinoma infiltrante. Cuando se localizan en el colon descendente, estas lesiones son anulares y producen una obstrucción. En el colon, los linfomas no hodgkinianos son mucho menos frecuentes que los adenocarcinomas y no producen masas sésiles en la mucosa. Los tumores carcinoides suelen ser pequeños y amarillentos, y la mayoría de ellos crecen lentamente. Los leiomiosarcomas son infrecuentes; producen grandes masas voluminosas, pero no se originan en la mucosa. Los cistoadenomas mucinosos son quísticos y suelen originarse más en el ovario y el páncreas. La lesión original de este paciente era un adenoma velloso.

64 **A** Este joven paciente presenta cientos de pólipos en el colon. Posiblemente se trate de un caso de síndrome de poliposis adenomatosa familiar (PAF), que se debe a la herencia de una copia mutada del gen supresor de tumores *APC* (unos pocos casos de PAF se asocian a los genes de reparación de errores del ADN). Todas las células somáticas de este paciente presentan una copia defectuosa del gen *APC.* Los pólipos se forman cuando se pierde la segunda copia de dicho gen en muchas células epiteliales del colon. Sin tratamiento, el 100% de estos pacientes desarrollan cáncer de colon por la acumulación de mutaciones adicionales en uno o más pólipos, típicamente antes de los 30 años de edad. Los pacientes con un gen del carcinoma colorrectal hereditario no poliposo, como *MLH1* o *MSH2,* también muestran una susceptibilidad hereditaria a sufrir un cáncer de colon, pero, a diferencia de los que sufren una PAF, no presentan numerosos pólipos. Los cánceres de colon esporádicos pueden tener una hipermetilación del islote CpG, además de mutaciones en *KRAS,* mientras que otros tienen mutaciones en *p53,* pero las células somáticas de estos pacientes con cáncer no muestran alteraciones en estos genes. Las mutaciones *NOD2* se asocian a la enfermedad de Crohn.

65 **D** De todos los trastornos enumerados, el que con más probabilidad produce adenocarcinoma a la edad de este paciente es el cáncer colorrectal hereditario no poliposo, o síndrome de Lynch. La enfermedad de Crohn es poco probable, dado que este paciente no refiere antecedentes de enfermedades importantes y es poco probable que una enfermedad de Crohn de larga evolución esté asintomática. Aunque el adenocarcinoma puede complicar la enfermedad de Crohn, no es tan frecuente esta asociación como en la colitis ulcerosa. Esto explica por qué en esta última se realiza con frecuencia la colectomía, mientras que en la enfermedad de Crohn se evitan, en la medida de lo posible, las resecciones intestinales. Los demás procesos que se mencionan no son premalignos.

66 **B** Esta lesión es un adenocarcinoma, que muestra glándulas irregulares que infiltran la capa muscular. Esta lesión en un hombre de 30 años es muy sugestiva de predisposición hereditaria. Una variante de cáncer hereditario es el *cáncer colorrectal hereditario no poliposo* (CCRHNP), que se debe a un defecto en los genes de reparación de errores de emparejamiento del ADN. Esto permite que se acumulen mutaciones en los microsatélites (inestabilidad de microsatélites), con la consiguiente pérdida del control mediado por el receptor del factor de crecimiento transformante β (TGF-β) de la proliferación de las células epiteliales cólicas y la pérdida de la proteína proapoptósica BAX, que favorece la supervivencia de las células transformadas. Este paciente podría haber tomado AINE para inhibir la COX-2 expresada en la mayor parte de los adenomas y carcinomas de colon. A diferencia de lo que sucede en el síndrome de la poliposis adenomatosa familiar, los pacientes con CCRHNP no suelen desarrollar cientos de pólipos en el colon. La determinación de *ERBB2 (HER2/NEU)* es importante en el cáncer de mama. La herencia en línea germinal del gen supresor de tumores *RB1* predispone al retinoblastoma y al osteosarcoma, pero no al carcinoma de colon. La E-cadherina es necesaria para la adhesión intercelular; sus concentraciones están reducidas, no aumentadas, en las células tumorales. La translocación del gen del receptor α del ácido retinoico es característica de la leucemia

promielocítica aguda.

67 **D** La figura muestra una masa circunferencial típica de un adenocarcinoma del colon descendente. Estos tumores pueden causar una obstrucción, pero también pueden sangrar en pequeña cuantía durante meses o años y causar una anemia ferropénica. El gen *APC,* un regulador negativo de la β-catenina en la vía de transmisión de señales WNT, se asocia al síndrome de poliposis adenomatosa familiar y a la mayor parte de los carcinomas de colon esporádicos, como sucede en este caso. Esta vía se denomina también *secuencia adenoma-carcinoma,* dado que los carcinomas se desarrollan a través de una serie identificable de pasos moleculares y morfológicos. La pérdida del gen supresor de tumores *PTEN* se describe en los carcinomas endometriales no asociados a cáncer de colon y en algunos pólipos hamartomatosos cólicos. La presencia de un cáncer adicional, como el endometrial, debería hacer sospechar una mutación hereditaria de alguno de los genes de reparación de errores del ADN, como *MSH2* o *MLH1.* La pérdida homocigota de estos genes puede ser origen de cáncer de colon derecho y de cáncer endometrial. Esta mutación se asocia típicamente a la inestabilidad de microsatélites. La infección por algunas cepas del virus del papiloma humano determina la inactivación de la proteína RB1 con aparición de un carcinoma de cérvix. La mutación con activación de la actividad tirosina cinasa de *KIT* se produce en los tumores del estroma gastrointestinal, que responden bien al tratamiento con mesilato de imatinib, un inhibidor de tirosina cinasa empleado también como tratamiento de la leucemia mieloide crónica.

68 **B** Las hemorroides son un trastorno frecuente que se puede asociar a cualquier situación que aumente la presión venosa y determine la dilatación de las venas hemorroidales internas o externas por encima o debajo de la unión anorrectal. La angiodisplasia de colon provoca una hemorragia intermitente, sobre todo en ancianos. La colitis isquémica es infrecuente en los jóvenes, porque la causa más habitual (ateroesclerosis grave con afectación de los vasos mesentéricos) se produce en ancianos. La invaginación y el vólvulo son causas infrecuentes de obstrucción intestinal mecánica, que se producen de forma

súbita en adultos y son urgencias quirúrgicas.

69 **F** La apendicitis aguda puede asociarse a leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda. Este dato es útil, pero no es decisivo, y la decisión de operar al paciente se establece en función de un criterio clínico. La amebiasis se suele asociar a antecedentes de diarrea, a menudo con sangre en las heces. Los pacientes con pancreatitis aguda tienen hiperamilasemia. La diarrea con pérdida de líquidos y deshidratación puede producir hipernatremia. La concentración de antígeno carcinoembrionario sérico puede aumentar en el cáncer de colon, pero no es una prueba específica de este tipo de tumor. La concentración de fosfatasa alcalina puede ser alta en la obstrucción biliar.

70 **A** Este caso describe un seudomixoma peritoneal (SP). Puede asociarse a un adenocarcinoma mucinoso de bajo grado de apéndice, que puede ser tan bien diferenciado que recuerde a un mucocele apendicular. Sin embargo, el SP tiende a recidivar. En las mujeres es preciso distinguir el SP de los tumores mucinosos de ovario. Los tumores mucinosos también pueden ser de origen pancreático, pero es menos probable que estos se diseminen por la cavidad peritoneal. Los tumores malignos del intestino delgado son infrecuentes. Los tumores malignos mucosecretores de origen gástrico suelen tener un patrón en anillo de sello e infiltran de forma difusa la pared gástrica.

71 **F** La peritonitis bacteriana espontánea es una complicación infrecuente presente en aproximadamente el 10% de los adultos con cirrosis hepática y ascitis. El líquido ascítico es un medio de cultivo excelente para las bacterias, que pueden infiltrar la pared intestinal o sembrar por vía hematógena la serosa. La peritonitis bacteriana espontánea también se describe en niños, sobre todo con síndrome nefrótico y ascitis. El microorganismo que se cultiva con más frecuencia es *Escherichia coli.* La apendicitis tiene una incidencia máxima en jóvenes. El dolor suele localizarse en el cuadrante inferior derecho (aunque no siempre) y no suele asociarse a ascitis. La apendicitis no se relaciona con el alcoholismo. La colitis colágena es infrecuente y suele cursar con diarrea acuosa en mujeres de mediana edad. La diverticulitis perforada podría provocar una peritonitis, pero no se asocia a

ascitis y, además, la diverticulitis no se asocia a alcoholismo. La colitis isquémica puede producir un infarto con perforación y peritonitis, pero no se asocia a ascitis y es poco probable que los alcohólicos crónicos presenten ateroesclerosis grave. La colitis seudomembranosa es una complicación del tratamiento antibiótico.

CAPÍTULO

18

Hígado y vía biliar

PEF9 Capítulo 18: Hígado y vesícula biliar

PH9 Capítulo 15: Hígado, vesícula biliar y vía biliar

1 Una mujer de 38 años previamente sana ha desarrollado obnubilación progresiva durante los últimos 4 días. En la exploración destacan ictericia de las escleróticas, oleada ascítica y asterixis. Está afebril y la presión arterial es de 110/55 mmHg. Entre los hallazgos de laboratorio destacan un tiempo de protrombina de 38 s (INR 3,1), y cifras de ALT de 1.854 U/l, de AST de 1.621 U/l, de albúmina de 1,8 g/dl y de proteínas totales de 4,8 g/dl. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que esté alterada en la sangre o el suero de esta paciente?

A Fosfatasa alcalina
B Amoníaco
C Amilasa
D Anti-VHC
E Anticuerpos antinucleares (ANA)

2 Se realiza un estudio patológico sobre la cirrosis hepática. Se observa depósito de la trama de reticulina con fibrosis en puentes secundario al depósito de colágeno en el espacio de Disse, con formación de tabiques fibrosos. ¿Cuál de las siguientes células se activa por influencia de las citocinas para convertirse en célula productora de colágeno?

A Célula del conducto biliar
B Célula endotelial
C Hepatocito
D Macrófago
E Célula estrellada

3 Una mujer de 54 años refiere antecedentes de larga evolución de infección por hepatitis B crónica y presenta malestar progresivo

durante el último año. Fue ingresada en el hospital 1 año antes por una hemorragia digestiva alta. La exploración actual revela un hígado nodular y firme. Los hallazgos de laboratorio muestran una concentración de una albúmina sérica de 2,5 g/dl y un tiempo de protrombina de 28 s. ¿Cuál de los siguientes datos adicionales de la exploración física es más probable que se encuentre en esta paciente?

A Cabeza de medusa
B Disminución de los reflejos tendinosos profundos
C Distensión de las venas yugulares
D Edema de papila
E Hemorragia en astilla



4 Una mujer de 57 años ha tenido un aumento progresivo del perímetro abdominal durante los últimos 6 meses. En los últimos 2 días presenta fiebre elevada. En la exploración física tiene una temperatura de 38,5 °C. El abdomen está aumentado de tamaño y tiene hipersensibilidad difusa, con presencia de oleada ascítica. Con la paracentesis se obtienen 500 ml de líquido amarillento turbio. El recuento celular es de 532/µl con un 98% de neutrófilos y un 2% de mononucleares. El hemocultivo revela presencia de *Escherichia coli*. En la figura se muestra el aspecto macroscópico representativo del hígado de esta paciente. ¿Cuál de las siguientes

enfermedades es más probable que explique estos hallazgos?

A Deficiencia de α_1-antitripsina

B Alcoholismo crónico

C Infección por el virus de la hepatitis E

D Hemocromatosis hereditaria

E Colangitis esclerosante primaria

5 En un estudio sobre pacientes con ascitis se miden las concentraciones de proteínas en el suero y el líquido ascítico. Se calcula el gradiente de albúmina en suero-ascitis (GASA). En algunos casos se encuentra un gradiente elevado, además de esplenomegalia. Estos pacientes tienen una albúmina sérica inferior a 2,5 g/dl. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que se asocie a un GASA superior a 1,1?

A Síndrome de Budd-Chiari

B Cirrosis

C Síndrome nefrótico

D Pancreatitis

E Peritonitis

6 Un hombre de 65 años con antecedentes de alcoholismo lleva 1 día con hematemesis. La exploración física revela ictericia leve, angiomas en araña y ginecomastia. Presenta un edema leve en los pies, pulsación de la vena yugular (PVY) normal y distensión abdominal masiva. Se procede a la paracentesis y se obtiene un líquido acumulado pobre en proteínas y sin células inflamatorias. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que ocasione la acumulación de líquido abdominal en este paciente?

A Insuficiencia cardíaca congestiva

B Síndrome hepatopulmonar

C Hiperbilirrubinemia

D Derivación portosistémica

E Vasodilatación de las arterias esplácnicas

7 Un hombre de 59 años presenta disnea de esfuerzo cada vez más grave desde hace 1 año. La disnea empeora en posición de bipedestación y mejora en decúbito. En la exploración se identifican acropaquias. El esfuerzo induce una reducción de la Po_2, que mejora cuando se detiene y se tumba. ¿Cuál de las siguientes alteraciones hepáticas es más probable que sufra este paciente?

A Obstrucción biliar
B Inflamación crónica
C Cirrosis
D Metástasis
E Esteatosis

8 Un hombre de 50 años tiene antecedentes de alcoholismo crónico, aunque abandonó el alcohol hace 10 años. No recibe fármacos. En la exploración física se encuentra afebril. El abdomen no está aumentado de tamaño ni presenta hipersensibilidad. El tamaño del hígado es normal. Las pruebas serológicas para la hepatitis A, B y C son negativas. Muestra un nivel de hematocrito del 35%. ¿Cuál de las siguientes características morfológicas es más probable que tenga en el hígado?

A Fibrosis de los conductos biliares concéntrica en «capas de cebolla»
B Trombosis de la vena hepática
C Hepatitis de interfase
D Necrosis hepatocelular masiva
E Depósito de glóbulos positivos con PAS y periportales
F Fibrosis portal con nódulos regenerativos



9 Una mujer de 58 años ha presentado durante los últimos 6 meses malestar, ictericia y anorexia progresivos. En la exploración física

muestra ictericia generalizada con afectación de las escleróticas. Presenta una leve hipersensibilidad del cuadrante superior derecho; el tamaño del hígado es normal. Las pruebas de laboratorio revelan unas cifras de bilirrubina sérica total de 7,8 mg/dl; de AST de 190 U/l; de ALT de 220 U/l y de fosfatasa alcalina de 26 U/l. Se realiza una biopsia hepática, cuyo estudio histológico revela los hallazgos mostrados en la figura, además de fibrosis portal con formación de puentes. ¿De cuál de los siguientes trastornos son más característicos estos hallazgos?

A Coledocolitiasis
B Insuficiencia cardíaca congestiva
C Infección por el VHA
D Infección por el VHC
E Hemocromatosis
F Colangitis esclerosante

10 Un hombre de 27 años presenta malestar, fatiga y anorexia a las 3 semanas de comer en un café de camioneros. Observa que la orina está oscura. En la exploración se encuentra leve ictericia de la esclerótica e hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho. Las pruebas de laboratorio revelan unas cifras de AST de 62 U/l y de ALT de 58 U/l. La concentración de bilirrubina total es de 3,9 mg/dl, y la de bilirrubina directa, de 2,8 mg/dl. Los síntomas desaparecen en las 3 semanas siguientes. Al volver al café, se encuentra con que el departamento de salud de la ciudad lo ha clausurado. ¿Cuál de las siguientes pruebas serológicas es más probable que tenga positiva este paciente?

A Anti-VHA
B Anti-HBc
C Anti-HBs
D Anti-VHC
E Anti-VHD

11 En un estudio clínico se sigue a pacientes con una hepatitis infecciosa, incluidas las causadas por los virus A, B, C, D, E, F y G, durante 5 años. Durante este tiempo se miden el tiempo de protrombina y las cifras de AST, ALT, fosfatasa alcalina, bilirrubina total y amoníaco séricos de forma periódica. Cada año se realiza una biopsia hepática y se registran los hallazgos histológicos. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que prediga bien

si un paciente con hepatitis vírica va a desarrollar una hepatopatía crónica con evolución a cirrosis?

A Grado de elevación de concentración de las transaminasas hepáticas
B Tiempo durante el cual se elevan las cifras de enzimas hepáticas
C Presencia de células inflamatorias crónicas en el espacio porta
D Presencia de células inflamatorias en los sinusoides hepáticos
E Forma específica del virus de la hepatitis responsable de la infección

12 Un hombre de 30 años tuvo un episodio de 2 semanas de duración con malestar, fiebre e ictericia hace 7 años. En la exploración física presenta trayectos de aguja en la fosa antecubital izquierda. Las pruebas serológicas fueron positivas para HBsAg, ADN del VHB e IgG anti-HBc. A los 2 años acudió a urgencias por hematemesis y ascitis. Las pruebas serológicas fueron similares a las descritas antes. A los 5 años de ese episodio, en el momento actual, refiere una pérdida de 5 kg de peso, deterioro del dolor abdominal y rápido aumento del perímetro abdominal durante el último mes. La exploración física revela un incremento del tamaño del hígado. ¿Cuál de los siguientes datos es más probable que sea diagnóstico en esta fase terminal de la enfermedad?

A Concentración de alanina aminotransferasa sérica (ALT)
B Concentración de fosfatasa alcalina sérica
C Concentración de α-fetoproteína sérica
D Concentración de amoníaco sérico
E Concentración de ferritina sérica
F Tiempo de protrombina

13 Un hombre de 42 años sufre malestar e ictericia progresiva durante las últimas 2 semanas. La exploración física revela ictericia, sin otras alteraciones significativas. Las pruebas serológicas son positivas para IgM frente al VHA y negativas para los anticuerpos frente al VHC, al HBsAg y a IgM frente a HBc. ¿Cuál de las siguientes evoluciones es más probable que se produzca en este paciente?

A Hepatitis crónica activa
B Recuperación completa
C Hepatitis fulminante

D Carcinoma hepatocelular
E Resultados negativos de las pruebas serológicas

14 Se está realizando un estudio epidemiológico en Singapur sobre pacientes infectados por el VHB. Estos pacientes son seguidos durante 10 años desde el momento del diagnóstico. Se recogen datos históricos para determinar la vía de transmisión del VHB. Se realizan a los pacientes pruebas serológicas periódicas para HBsAg, anti-HBs y anti-HBc, y se miden en el suero las concentraciones de bilirrubina total, AST, ALT y fosfatasa alcalina, y el tiempo de protrombina. El estudio identifica una pequeña cohorte de pacientes portadores crónicos del VHB. ¿Cuál de los siguientes modos de transmisión del VHB es más probable que se asocie a la aparición del estadio de portador?

A Transfusión de sangre
B Relaciones heterosexuales
C Lesión por pinchazo con aguja
D Ingesta oral
E Transmisión vertical

15 Una mujer de 40 años desea donar sangre para aumentar la cantidad de esta disponible para transfusión. Se encuentra que es positiva para HBsAg y es excluida como donante de sangre. Ella se encuentra bien. No presenta alteraciones físicas significativas en la exploración. Las pruebas de laboratorio muestran que las cifras de bilirrubina sérica total, AST, ALT, fosfatasa alcalina y albúmina son normales. Las pruebas serológicas adicionales realizadas para IgM frente al VHA, anti-HBc y anti-VHC son negativas. A los 6 meses se repite el estudio con idénticos resultados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más apropiada en relación con la fisiopatología del trastorno de esta paciente?

A Portadora crónica sin necesidad de tratamiento
B Va a desarrollar una hepatitis clínica en 1 año
C Resultados erróneos que deben ser repetidos
D Necesita una serie vacunal frente a la hepatitis B
E Adquirió la infección por consumo intravenoso de drogas

16 Una mujer de 41 años que trabaja como tatuadora refiere malestar y náuseas progresivas desde hace 2 semanas. En la exploración física presenta ictericia y una ligera hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho. Las pruebas de laboratorio

revelan cifras de AST de 79 U/l, de ALT de 85 U/l, de bilirrubina total de 3,3 mg/dl y de bilirrubina directa de 2,5 mg/dl. Durante el año siguiente se mantiene con malestar. Se realiza una biopsia hepática, y el estudio histológico de esta revela mínima necrosis de hepatocitos, esteatosis leve y mínima fibrosis portal con formación de puentes. ¿Cuál de los siguientes virus es más probable que ocasione estos hallazgos?

A VHA
B VHB
C VHC
D VHD
E VHE

17 Se realiza un estudio en pacientes infectados por los virus de las hepatitis A, B, C, D, E o G. Los pacientes son clasificados en función del tipo de virus y seguidos durante los 10 años siguientes. Se realizan pruebas serológicas periódicas para determinar si están elaborando anticuerpos frente a los virus con los que están infectados. El análisis de los datos muestra que una cohorte de estos pacientes desarrollaron anticuerpos, pero posteriormente no eliminaron el virus hasta recibir tratamiento con interferón pegilado y ribavirina. ¿Cuál de las siguientes formas de hepatitis víricas es más probable que infecte a esta subpoblación de pacientes?

A VHA
B VHB
C VHC
D VHD
E VHE
F VHG

18 Una mujer de 52 años ha presentado malestar progresivo durante el último año. En la exploración física presenta una leve ictericia de la esclerótica. No se encuentra ascitis ni esplenomegalia. Las pruebas serológicas son positivas para IgG frente al VHC y para ARN del VHC y negativas para los anticuerpos frente al VHA, al HBsAg, a ANA y a anticuerpos antimitocondriales. La concentración de AST sérica es de 88 U/l y la ALT es de 94 U/l. La paciente sigue estable durante meses. ¿Cuál de los siguientes hallazgos morfológicos es más probable que se

encuentre en el hígado de esta paciente?

A Fibrosis concéntrica en «capas de cebolla» de los conductos biliares
B Depósito de cobre en los hepatocitos
C Destrucción granulomatosa del conducto biliar
D Trombosis de la vena hepática
E Hepatitis de interfase
F Necrosis hepatocelular masiva
G Esteatosis microvesicular

19 Un hombre de 27 años con antecedentes de consumo de drogas por vía intravenosa está infectado por el virus de la hepatitis B desde hace 6 años y no ha estado enfermo. Acude a urgencias porque tiene náuseas y vómitos, y ha tenido orinas oscuras durante la última semana. La exploración física revela ictericia de las escleróticas y generalizada leve. En la exploración neurológica se muestra confuso y somnoliento, y orientado solo en persona. Muestra asterixis. Los hallazgos de laboratorio encuentran cifras de proteínas totales de 5 g/dl; de albúmina de 2,7 g/dl; de AST de 2.342 U/l; de ALT de 2.150 U/l; de fosfatasa alcalina de 233 U/l; de bilirrubina total de 8,3 mg/dl, y de bilirrubina directa de 4,5 mg/dl. ¿Cuál es los siguientes virus es más probable que haya sobreinfectado a este paciente?

A VHA
B VHC
C VHD
D VHE
E VHG

20 Una mujer de 36 años G3, P2, que reside en Nueva Delhi, India, refiere náuseas y malestar progresivos desde hace 1 semana. La exploración física revela ictericia en las escleróticas. El hígado está aumentado de tamaño y tiene un reborde doloroso. Actualmente está en la semana 16 de gestación. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de AST sérica de 495 U/l y de ALT de 538 U/l. Se recupera y su función hepática se normaliza, pero a las 18 semanas sufre un aborto espontáneo. Los estudios epidemiológicos identifican una fuente de agua contaminada con riesgo de infección. ¿Cuál de los siguientes virus es más probable que infectara a esta paciente?

A Citomegalovirus (CMV)
B Virus de Epstein-Barr (VEB)
C Virus de la hepatitis E (VHE)
D Virus del herpes simple (VHS)
E Virus de la fiebre amarilla

21 Un hombre de 29 años ha desarrollado malestar y náuseas a los 2 meses de mantener relaciones sexuales con una pareja nueva. Diez días después observa ictericia de las escleróticas. Actualmente tiene dos parejas nuevas, que posteriormente han enfermado. Las pruebas serológicas revelan que es positivo para HBsAg, negativo para IgM frente al VHA y negativo para el VHC. La concentración de ALT es de 77 UI/l, y la de AST, de 95 UI/l. Al mes el anticuerpo frente a HBs es positivo. ¿Cuál de las siguientes evoluciones es más probable que tenga su enfermedad?

A Enfermedad asintomática
B Hepatitis crónica
C Insuficiencia hepática fulminante
D Hepatitis con recuperación
E Cirrosis macronodular

22 Una mujer de 53 años del sur de China ha presentado fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho e ictericia durante los últimos 6 meses. En la exploración presenta un aumento de tamaño del hígado. La TC abdominal identifica un tumor hepático derecho de 5 cm con aspecto infiltrante arborescente. Se realiza una biopsia hepática, y el estudio histológico de esta muestra glándulas infiltrantes irregulares en el seno de un estroma desmoplásico. ¿Cuál de las siguientes infecciones crónicas es más probable que tenga esta paciente?

A *Clonorchis sinensis*
B *Echinococcus granulosus*
C *Plasmodium vivax*
D *Mycobacterium tuberculosis*
E *Salmonella typhi*

23 Una mujer de 31 años ha presentado un malestar progresivo durante los últimos 4 meses. La exploración física no revela alteraciones significativas. Entre las pruebas de laboratorio destacan cifras de proteína sérica total de 6,4 g/dl, de albúmina de 3,6 g/dl, de bilirrubina total de 1,4 mg/dl, de AST de 67 U/l, de ALT

de 91 U/l y de fosfatasa alcalina de 99 U/l. Los resultados de la serología del VHA, del VHB y del VHC son negativos. Los anticuerpos frente al ADN, frente a los microsomas 1 del hígado y el riñón y frente al músculo liso son positivos. Se realiza una biopsia hepática y su estudio microscópico muestra mínimos infiltrados mononucleares portales con una hepatitis de interfase mínima y leve fibrosis portal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Deficiencia de α_1-antitripsina
B Hepatitis autoinmunitaria
C Alcoholismo crónico
D Infección por el VHD
E Ingesta de isoniacida
F Cirrosis biliar primaria

24 Se realiza un estudio sobre lesiones hepáticas. Se observa que los pacientes con insuficiencia hepática fulminante tienen datos histológicos en las biopsias de degeneración balonizante de los hepatocitos, tapones biliares en los canalículos, necrosis en puentes e inflamación mínima. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que ocasione este patrón de lesión hepática?

A Deficiencia de α_1-antitripsina
B Alcoholismo crónico
C Infección por el virus de la hepatitis C
D Toxicidad de isoniacida
E Enfermedad de Wilson

25 Una mujer de 66 años con antecedentes de alcoholismo crónico lleva 4 días con cefaleas y náuseas. Muestra una creciente obnubilación. En la exploración física presenta hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho, taquicardia, taquipnea e hipotensión. En las pruebas de laboratorio destacan una concentración de AST de 475 U/l, de ALT de 509 U/l, de fosfatasa alcalina de 23 U/l, de bilirrubina total de 0,9 mg/dl, de albúmina de 3,8 g/dl y de proteínas totales de 6,1 g/dl. Recibe tratamiento con *N*-acetilcisteína. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más probable que haya consumido en exceso?

A Paracetamol
B Ácido acetilsalicílico
C Ibuprofeno

D Meperidina
E Oxicodona

26 Un hombre de 63 años con antecedentes de alcoholismo desde hace 30 años ha presentado hematemesis el día anterior. En la exploración física refiere ascitis, ictericia leve y esplenomegalia. También tiene ginecomastia, telangiectasias en araña de la piel y atrofia testicular. El tacto rectal muestra prominentes hemorroides y una próstata de tamaño normal. La endoscopia digestiva alta de urgencia identifica vasos submucosos dilatados y sangrantes en el esófago. Las pruebas de laboratorio muestran unas cifras de proteínas totales de 5,9 g/dl; de albúmina de 3,2 g/dl; de AST de 137 U/l; de ALT de 108 U/l; de bilirrubina total de 5,4 mg/dl; de tiempo de protrombina de 20 s; de amoníaco de 76 μmol/l, y de hematocrito del 21%. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos en el hígado es más probable que explique esta hematemesis?

A Colangitis
B Colestasis
C Cirrosis
D Hepatitis
E Esteatosis



27 Un hombre de 52 años refiere malestar progresivo con edema de la parte distal de las extremidades inferiores desde hace 4

meses. En la exploración física está afebril y normotenso. Se encuentra edema con fóvea hasta las rodillas. El abdomen aparece ligeramente distendido con oleada ascítica, pero no es doloroso. El hígado está aumentado de tamaño. Las pruebas de laboratorio muestran unas cifras de proteínas totales en suero de 5 g/dl; de albúmina de 2,2 g/dl; de AST de 65 U/l; de ALT de 65 U/l; de fosfatasa alcalina de 93 U/l, y de bilirrubina total de 1,8 mg/dl. Se obtiene una biopsia hepática, cuyo estudio histológico con tinción de tricrómico se muestra en la figura. ¿Cuál de los siguientes compuestos es más probable que haya ocasionado este cuadro tras ser ingerido?

A Paracetamol
B Alopurinol
C Ácido acetilsalicílico
D Clorpromacina
E Etanol
F Isoniacida

28 Un hombre de 48 años ha observado un incremento de su perímetro abdominal con coloración amarillenta de la piel durante los últimos 5 meses. En la exploración física presenta ictericia esclerótica y generalizada. El abdomen se encuentra distendido y se identifica una oleada ascítica. Entre las pruebas de laboratorio destacan cifras de bilirrubina sérica total de 5,2 mg/dl; de bilirrubina directa de 4,2 mg/dl; de AST de 380 U/l; de ALT de 158 U/l; de fosfatasa alcalina de 95 U/l; de proteínas totales de 6,4 g/dl, y de albúmina de 2,2 g/dl. El tiempo de protrombina es de 18 s, y el de tromboplastina parcial, de 30 s. La concentración de amoníaco sérico es de 105 mmol/l. ¿Cuál es la causa más probable de estos hallazgos?

A Infección aguda por el VHA
B Hepatopatía alcohólica
C Coledocolitiasis
D Adenocarcinoma metastásico
E Cirrosis biliar primaria



29 Un hombre de 38 años se siente enfermo de forma aguda, con náuseas, dolor abdominal alto e ictericia tras una borrachera muy importante durante el fin de semana. En la exploración destaca hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho. Entre las pruebas de laboratorio destaca un recuento leucocítico de 16.120/mm^3 con un 82% de segmentados, un 8% de cayados, un 8% de linfocitos y un 2% de monocitos. La concentración de bilirrubina sérica total es de 4,9 mg/dl; la de AST, de 542 U/l; la de ALT, de 393 U/l, y la de fosfatasa alcalina, de 118 U/l. Se realiza una biopsia hepática, cuya imagen histológica se muestra en la figura. ¿Cuál es la naturaleza de las acumulaciones presentes en la biopsia?

A Glóbulos de α_1-antitripsina
B Eritrocitos lisados
C Pigmento biliar
D Depósito de hemosiderina
E Cuerpo de Mallory-Denk
F Inclusiones víricas (HBsAg)

30 Se realiza un estudio longitudinal en pacientes no alcohólicos con diabetes mellitus de tipo 2, dislipidemia e IMC > 30. La prevalencia de hepatopatía aumenta en estos pacientes con el tiempo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más característico del hígado de estos pacientes?

A Apoptosis

B Colestasis
C Cirrosis
D Hemosiderosis
E Inflamación
F Esteatosis

31 Un estudio sobre pacientes con aumento del riesgo de cardiopatía isquémica revela que algunos también sufren una hepatopatía. Entre los factores de riesgo destacan la falta de ejercicio y el aumento del consumo de alimentos de comida rápida ricos en jarabe de maíz rico en fructosa. Los hallazgos de laboratorio muestran una glucemia media de 117 mg/dl. Las cifras de AST y ALT séricas están elevadas. La TC abdominal revela hepatomegalia con una disminución difusa de la atenuación, pero sin lesiones focales. Algunos de estos pacientes acaban desarrollando un adenoma hepatocelular. ¿Cuál de los siguientes trastornos de base es más probable que tengan estos pacientes?

A Diabetes mellitus de tipo 1
B Hipercolesterolemia familiar
C Infección por el virus de la hepatitis C
D Hemocromatosis hereditaria
E Síndrome metabólico

32 Una niña de 4 años desarrolla de forma abrupta vómitos, que persisten durante 24 h. Al llegar a urgencias, la niña está letárgica y febril, con una temperatura de 37,7 °C. Los padres dicen que hace 3 días tuvo una enfermedad respiratoria alta leve, pero que estaba mejorando y solo le han administrado ácido acetilsalicílico. En la exploración física presenta una piel poco turgente, los pulmones están limpios, el abdomen es indoloro y la frecuencia cardíaca es regular. Los hallazgos de laboratorio indican cifras de Na^+ de 150 mmol/l; de K^+ de 4,5 mmol/l; de Cl^- de 93 mmol/l; de CO_2 de 30 mmol/l; de glucosa de 60 mg/dl; de creatinina de 1,1 mg/dl; de amilasa de 25 U/l; de AST de 386 U/l; de ALT de 409 U/l; de fosfatasa alcalina de 120 U/l; de bilirrubina total de 1,1 mg/dl; de amoníaco de 80 µmol/l, y de tiempo de protrombina de 26 s con un INR de 2. La niña entra en situación comatosa. ¿Qué hallazgo patológico es más probable que se encuentre en el hígado de esta niña?

A Atresia del colédoco

B Trombosis de la vena hepática
C Hepatoblastoma
D Litiasis de los conductos intrahepáticos
E Esteatosis microvesicular
F Hepatitis por células gigantes multinucleadas

33 Un hombre de 23 años ha notado una coloración amarillenta de las escleróticas durante las últimas 2 semanas. En la exploración presenta una ictericia generalizada. Físicamente parece un culturista. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de bilirrubina sérica total de 5,6 mg/dl; de AST de 103 U/l; de ALT de 117 U/l; de fosfatasa alcalina de 148 U/l; de albúmina de 5,5 g/dl, y de proteínas de 7,9 g/dl. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que esté consumiendo?
A Paracetamol
B Esteroides anabolizantes
C Clorpromacina
D Alcohol etílico
E Isoniacida

34 Una mujer de 68 años refiere cansancio progresivo y pérdida involuntaria de 3 kg de peso en los últimos 6 meses. La exploración física revela una muestra de sangre oculta en heces positiva. Las pruebas de laboratorio revelan una cifras de unas proteínas séricas totales de 6,1 g/dl; de albúmina de 3,9 g/dl; de bilirrubina total de 1,1 g/dl; de AST de 38 U/l; de ALT de 44 U/l; de fosfatasa alcalina de 294 U/l; de glucosa de 70 mg/dl, y de creatinina de 0,9 mg/dl. El hemograma encuentra niveles de hemoglobina de 8,9 g/dl; de hematocrito del 26,7% y de VCM de 75 mm^3; un recuento plaquetario de 198.400/mm^3, y un recuento leucocítico de 5.520/mm^3. El tiempo de protrombina es de 13 s, y el tiempo de tromboplastina parcial, 25 s. Los estudios serológicos para el VHA, el VHC y el VHB son negativos. La radiografía de tórax no muestra alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A Síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos
B Colangitis ascendente
C Alcoholismo crónico
D Adenocarcinoma metastásico
E Colangitis esclerosante

35 Una mujer de 20 años primigrávida da a luz a término, tras una

gestación no complicada, un niño de peso y longitud normales. En la exploración física no se encuentran alteraciones. En la primera semana, el lactante desarrolla una ictericia leve. Se trata con fototerapia y la ictericia desaparece pasada la segunda semana de vida. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que condujera a la aparición de ictericia en este recién nacido?

A Atresia del conducto colédoco
B Infección congénita por citomegalovirus
C Deficiencia hereditaria de un transportador canalicular
D Baja actividad de la glucuroniltransferasa hepática
E Hemólisis mediada por anticuerpos de origen materno

36 Una mujer de 35 años ha observado que su piel está cada vez más amarillenta desde hace 1 semana. En la exploración física no presenta dolor o hipersensibilidad abdominal y el hígado tiene un tamaño normal. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 11,7 g/dl; hematocrito del 35,2%; VCM de 98 μm^3; recuento plaquetario de 207.600/mm^3; recuento leucocítico de 6.360/mm^3; proteínas totales de 5,5 g/dl; albúmina de 3,5 g/dl; bilirrubina total de 8,7 mg/dl; bilirrubina directa de 0,6 mg/dl; AST de 39 U/l; ALT de 24 U/l, y fosfatasa alcalina de 35 U/l. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Colelitiasis
B Anemia hemolítica
C Infección por el virus de la hepatitis A
D Cirrosis micronodular
E Uso de anticonceptivos orales

37 Un estudiante de Medicina de 25 años originario de Mozambique nota que sus escleróticas tienen un ligero tinte amarillento el día de su examen de graduación. Nunca ha sufrido enfermedades graves. En la exploración física no se encuentra ninguna alteración relevante, salvo la ligera ictericia de las escleróticas. Las pruebas de laboratorio muestran unas cifras de proteínas séricas totales de 7,9 g/dl; de albúmina de 4,8 g/dl; de AST de 48 U/l; de ALT de 19 U/l; de fosfatasa alcalina de 32 U/l; de bilirrubina total de 4,9 mg/dl, y de bilirrubina directa de 0,8 mg/dl. La ictericia de las escleróticas se resuelve en 2 días. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que tenga este paciente?

A Ingesta de paracetamol

B Quiste de colédoco
C Síndrome de Dubin-Johnson
D Síndrome de Gilbert
E Infección por el virus de la hepatitis A
F Cirrosis biliar primaria

38 Una mujer de 42 años originaria de Lisboa, Portugal, presenta fiebre, escalofríos y episodios de dolor cólico en el cuadrante superior derecho desde hace 1 semana. En la exploración física tiene ictericia cutánea y de las escleróticas. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de bilirrubina total sérica de 7,1 mg/dl con una bilirrubina directa de 6,7 mg/dl. La ecografía abdominal encuentra una colelitiasis, con dilatación del colédoco y presencia de dos lesiones quísticas de 0,8 y 1,5 cm, respectivamente, en el lóbulo hepático derecho. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que haya ocasionado este cuadro?

A *Clonorchis sinensis*
B *Cryptosporidium parvum*
C Citomegalovirus
D *Entamoeba histolytica*
E *Escherichia coli*

39 Una mujer de 17 años, G2, P1, da a luz a término un niño tras un embarazo no complicado. La evolución del lactante es buena durante 3 semanas, pero posteriormente empieza a desarrollar un aumento del perímetro abdominal, con heces pálidas y orina oscura. En la exploración física presenta también ictericia. Se observa hepatomegalia, pero no esplenomegalia o linfoadenopatías. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de AST de 101 U/l; de ALT de 123 U/l; de fosfatasa alcalina de 20 U/l; de glucosa de 81 mg/dl, y de creatinina de 0,4 mg/dl. Se obtiene una biopsia hepática y su estudio microscópico muestra una desorganización del lobulillo con necrosis focal de hepatocitos, transformación a células gigantes, colestasis, infiltrados mononucleares en el porta, hiperplasia de células de Kupffer y hematopoyesis extramedular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Eritroblastosis fetal
B Atresia biliar extrahepática

C Galactosemia
D Hepatitis neonatal idiopática
E Cirrosis biliar primaria
F Enfermedad de von Gierke

40 Una madre de 19 años observa que su recién nacido de 3 semanas presenta una ictericia progresiva. Tanto el embarazo como el parto fueron normales. En la exploración física actual el lactante tiene ictericia generalizada, hepatomegalia y heces acólicas. Las pruebas de laboratorio indican cifras de bilirrubina total de 10,1 mg/dl; de AST de 123 U/l; de ALT de 140 U/l; de glucosa de 77 mg/dl, y de creatinina de 0,4 mg/dl. La concentración de fosfatasa alcalina es normal. Se realiza una biopsia hepática y se observa una marcada proliferación de conductos biliares, edema y fibrosis del espacio porta, así como una extensa estasis biliar intrahepática y canalicular. El lactante desarrolla una ictericia progresiva y fallece por insuficiencia hepática a los 9 meses de vida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Deficiencia de α_1-antitripsina
B Quiste de colédoco
C Toxoplasmosis congénita
D Atresia biliar extrahepática
E Hepatoblastoma

41 Una mujer de 45 años refiere prurito e ictericia progresivos desde hace 7 meses. En la exploración muestra ictericia generalizada. Las pruebas de laboratorio muestran unas cifras de proteínas séricas totales de 6,3 g/dl; de albúmina de 2,7 g/dl; de bilirrubina total de 5,7 mg/dl; de bilirrubina directa de 4,6 mg/dl; de AST de 77 U/l; de ALT de 81 U/l, y de fosfatasa alcalina de 221 U/l. La biopsia hepática revela destrucción de los espacios porta, pérdida de conductos biliares e infiltrados leucocíticos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio adicionales es más probable que se encuentre en esta paciente?

A Disminución de la concentración de α_1-antitripsina
B Aumento de la concentración de cloruro en el sudor
C Aumento de la concentración de ferritina sérica
D Anti-VHC positivo
E Anticuerpos antimitocondriales positivos

42 Un hombre de 43 años refiere prurito, fatiga e ictericia

progresivos durante los últimos 4 meses. Hace 5 años se le sometió a una colectomía por una colitis ulcerosa. En la exploración actual se observa una ictericia generalizada. El abdomen no se encuentra distendido; a la palpación no se identifican masas abdominales ni dolor. Las pruebas de laboratorio encuentran una concentración de fosfatasa alcalina de 285 U/l y un título alto de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. La colangiografía muestra una obliteración generalizada del árbol biliar intrahepático con aspecto arrosariado del resto de los conductos. ¿Cuál de las siguientes características morfológicas es más probable que se encuentre en el hígado de este paciente?

A Fibrosis concéntrica de los conductillos en «capas de cebolla»
B Depósito de cobre en los hepatocitos
C Destrucción granulomatosa del conducto biliar
D Hepatitis de interfase
E Glóbulos positivos con PAS y periportales
F Fibrosis portal con formación de puentes



43 Un hombre de 44 años ha sufrido un dolor articular progresivo con edema de pies y disminución de la tolerancia al ejercicio durante los últimos 3 años. Las pruebas de laboratorio indican cifras de glucemia de 201 mg/dl; de creatinina de 1,1 mg/dl, y de ferritina de 893 ng/ml. La radiografía de tórax evidencia derrames

pleurales bilaterales, edema pulmonar y cardiomegalia. Se le realiza una biopsia hepática, cuyo aspecto histológico se muestra la figura (imagen derecha con H-E e imagen izquierda con azul de Prusia). ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado para este paciente según estos datos?

A Colecistectomía
B Interferón α
C Flebotomía
D Prednisona
E Disminución del consumo de alcohol

44 Un hombre de 46 años ha presentado una distensión abdominal progresiva con disminución de la libido durante los últimos 7 meses. La exploración física muestra una pigmentación excesiva de la piel en áreas expuestas. Presenta oleada ascítica y esplenomegalia leve. Los hallazgos de laboratorio en ayunas indican cifras de glucemia de 200 mg/dl; de creatinina de 0,8 g/dl; de ferritina de 650 ng/ml; de proteínas totales de 6,3 g/dl, y de albúmina de 2,2 g/dl. Las concentraciones de bilirrubina total, AST, ALT y fosfatasa alcalina son normales. Tiene un nivel de hemoglobina de 13,5 g/dl; de hematocrito del 40,6%, y de VCM de 94 μm^3; un recuento plaquetario de 200.000/mm^3, y un recuento leucocítico de 6.570/mm^3. El tiempo de protrombina es de 20 s, y el tiempo de tromboplastina parcial, de 65 s. ¿Cuál de las siguientes mutaciones de los genes es más probable que explique las alteraciones moleculares que producen esta enfermedad?

A Gen de la β_2-microglobulina, que impide la unión de la β_2-microglobulina a *HFE*
B Gen de la β-globina, con eritropoyesis ineficaz y excesiva absorción de hierro
C Gen del transportador de metales bivalentes 1, que aumenta la unión al hierro en la luz intestinal
D Gen *HFE*, que reduce la síntesis de hepcidina y aumenta la absorción de hierro
E Gen de la transferrina con secuestro hepático de hierro

45 Un hombre de 23 años ha desarrollado una insuficiencia cardíaca congestiva progresiva con artritis parecida a una seudogota durante los últimos 6 años. En la exploración muestra un color gris metálico de la piel, la frecuencia cardíaca es irregular,

tiene un hígado grande y el bazo es palpable. Ambos testículos son pequeños y tienen aspecto atrófico. Las pruebas de laboratorio indican un incremento de las cifras de hemoglobina A_{1c} y ferritina sérica. ¿Cuál de las siguientes mutaciones de los genes es más probable que se encuentre en este paciente?

A *CPH* de clase I
B *ATP7B*
C *HAMP*
D *HNF1-α*
E *DMT1*

46 Una mujer de 19 años está preocupada porque presenta un temblor de reposo que empeora en los 6 meses siguientes de forma progresiva. Tiene también ideación paranoide con alucinaciones auditivas y es diagnosticada de psicosis aguda. La exploración física revela ictericia de las escleróticas, y con lámpara de hendidura se observan anillos de Kayser-Fleischer corneales. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de proteínas totales de 5,9 g/dl; de albúmina de 3,1 g/dl; de bilirrubina total de 4,9 mg/dl; de bilirrubina directa de 3,1 mg/dl; de AST de 128 U/l; de ALT de 157 U/l, y de fosfatasa alcalina de 56 U/l. ¿Cuál de las siguientes pruebas serológicas es más probable encontrar en esta paciente?

A Concentración de α_1-antitripsina reducida
B Concentración de ceruloplasmina reducida
C Aumento de la concentración de α-fetoproteína
D Aumento de la concentración de ferritina
E Anticuerpos antimitocondriales positivos
F Títulos de HbsAg positivos



47 Un hombre de 28 años refiere disnea progresiva durante el último año. En la exploración física se encuentra afebril y normotenso. El murmullo vesicular está reducido en todos los campos pulmonares. Entre sus antecedentes personales destaca que presentó ictericia grave durante el período neonatal, pero luego ha estado sano. Tiene antecedentes familiares de hepatopatía. Se realiza una biopsia hepática, cuyo aspecto histológico teñido con PAS se muestra en la figura. ¿Cuál de los siguientes trastornos tiene alto riesgo de desarrollar este paciente?

A Hepatitis aguda fulminante
B Diabetes mellitus
C Enfisema pulmonar
D Lupus eritematoso sistémico
E Colitis ulcerosa

48 Una mujer de 39 años ha presentado un incremento progresivo del perímetro abdominal durante el último mes y desde el día previo también dolor. En la exploración física destacan hepatomegalia y cabeza de medusa. Entre los hallazgos de laboratorio hay cifras de hemoglobina de 20,5 g/dl y de hematocrito del 61,7%; recuento plaquetario de 411.000 mm^3; concentración de AST de 333 U/l y de ALT de 358 U/l. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que se encuentre en la ecografía abdominal de esta paciente?

A Coledocolitiasis
B Cirrosis

C Trombosis de la vena hepática
D Carcinoma hepatocelular
E Esteatosis macrovesicular
F Absceso subfrénico



49 Un hombre de 50 años presenta disnea progresiva con fibrosis pulmonar idiopática, que fue diagnosticada hace 18 meses. La exploración física revela un aumento de la presión venosa yugular con edema de los pies. En las pruebas de laboratorio destacan una concentración de AST sérica de 221 U/l; de ALT de 234 U/l; de fosfatasa alcalina de 48 U/l; de lactato deshidrogenasa de 710 U/l; de bilirrubina total de 1,2 mg/dl; de albúmina de 3,5 g/dl, y de proteínas totales de 5,4 g/dl. La figura se corresponde con el aspecto histológico de una muestra de biopsia hepática del paciente. ¿Cuál de los siguientes términos describe mejor estos hallazgos?

A Apoptosis
B Congestión centrolobulillar
C Colestasis
D Depósito de hemosiderina
E Esteatosis macrovesicular
F Cuerpos de Mallory-Denk
G Fibrosis portal

50 Una mujer de 26 años primigrávida que se encuentra en el tercer trimestre de gestación ha desarrollado edema periférico progresivo durante el último mes. En la exploración está afebril, pero tiene una presión arterial de 165/105 mmHg. Se confirma la presencia de edema con fóvea hasta los muslos. En las pruebas de laboratorio se observan cifras de hemoglobina de 11,7 g/dl; de recuento de plaquetas de 46.000/mm^3; de recuento leucocítico de 7210/mm^3; de albúmina de 3,2 g/dl; de proteínas totales de 5,8 g/dl; de bilirrubina total de 1,2 mg/dl; de AST de 208 U/l; de ALT de 241 U/l; de fosfatasa alcalina de 32 U/l, y de haptoglobina de 5 mg/dl. En el análisis de orina destaca la presencia de proteinuria 4+, sin glucosuria. El tiempo de protrombina es de 30 s. ¿Cuál es el mejor tratamiento de este cuadro?

A Corticoesteroides
B Inmunoglobulina intravenosa
C Trasplante de hígado
D Plasmaféresis
E Inducción del parto
F Derivación portocava
G Ribavirina e interferón

51 Una mujer de 28 años, G3, P2, en la semana 35 de gestación de un embarazo sin complicaciones, presenta letargo progresivo con náuseas, vómitos e ictericia desde hace 10 días. En la exploración física se objetivan ictericia generalizada y equimosis dispersas por el tronco y las extremidades. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de bilirrubina total de 5,8 mg/dl; de AST de 122 U/l; de ALT de 131 U/l, y de fosfatasa alcalina de 125 U/l. ¿Cuál de las siguientes alteraciones histológicas es más probable que se encuentre en una muestra de biopsia hepática de esta paciente?

A Fibrosis concéntrica del conducto biliar
B Depósito intrahepático extenso de hemosiderina
C Inflamación con pérdida de conductos biliares intrahepáticos
D Esteatosis microvesicular grave
E Células gigantes multinucleadas
F Glóbulos hepáticos periportales positivos con PAS

52 Una mujer de 41 años previamente sana refiere molestias abdominales desde hace 1 mes. Los hallazgos de laboratorio indican una concentración sérica normal de proteínas totales,

albúmina, AST, ALT y bilirrubina, pero la de fosfatasa alcalina está elevada. Serológicamente, los virus de la hepatitis A, B y C son negativos. La TC abdominal muestra una masa de 9 cm de diámetro en el lóbulo hepático derecho, de márgenes irregulares. Se extirpa la lesión y su estudio macroscópico revela una cicatriz estrellada central de la que irradian tabiques fibrosos, que se introducen en el parénquima hepático circundante, con el que se confunden. El estudio microscópico muestra prominentes arterias en el seno de un tejido conjuntivo denso con infiltrados leucocíticos y proliferación de conductos biliares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Colangiocarcinoma
B Hiperplasia nodular focal
C Adenoma hepático
D Carcinoma hepatocelular
E Cirrosis macronodular
F Adenocarcinoma metastásico

53 Una mujer de 36 años se encuentra en el sexto mes de su primer embarazo, pero no está segura de la fecha real porque cuando se quedó embarazada estaba tomando anticonceptivos orales. La paciente presenta un dolor súbito e intenso en la zona del abdomen. En la exploración física se encuentra afebril y normotensa. Presenta hipersensibilidad a la palpación del cuadrante superior derecho. La ecografía abdominal identifica una masa hepática subcapsular, bien delimitada, de 7 cm de diámetro. En la paracentesis se obtiene líquido sanguinolento. En la laparotomía se extirpa una masa del lóbulo hepático derecho, que se había roto a través de la cápsula hepática. El resto del parénquima hepático parece tener una consistencia uniforme y la cápsula es lisa. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?

A Colangiocarcinoma
B Quiste de colédoco
C Coriocarcinoma
D Hiperplasia nodular focal
E Adenoma hepático
F Hepatoblastoma
G Carcinoma hepatocelular



54 Un hombre de 79 años refiere dolor abdominal y malestar progresivos desde hace 1 año. En la exploración física se observa hepatomegalia. Se identifica sangre oculta en heces. En las pruebas de laboratorio destacan cifras de hemoglobina de 8 g/dl; de hematocrito del 22%; de VCM de 72 μm^3; de proteínas totales de 5,6 g/dl; de albúmina de 3,7 g/dl, y de fosfatasa alcalina de 209 U/l. La figura muestra el aspecto representativo de su hígado. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que sufra este paciente?

A Alcoholismo crónico
B Adenocarcinoma de colon
C Síndrome de Gilbert
D Infección por el virus de la hepatitis B
E Síndrome metabólico

55 Un estudio clínico sobre pacientes con cirrosis incluye una RM. Se observa que los pacientes con un nódulo intrahepático mayor de 2 cm con flujo arterial de sangre tienen un riesgo aumentado de desarrollar un carcinoma hepatocelular. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable que caracterice estos nódulos?

A Adenoma
B Displasia

C Regeneración
D Siderosis
E Esteatosis

56 Un hombre de 38 años originario de Shanghái, China, refiere fatiga y una pérdida de 10 kg de peso en los últimos 3 meses. La exploración física no revela alteraciones. Las pruebas de laboratorio muestran que el HBsAg es positivo y los anticuerpos frente al VHC y al VHA son negativos. La TC identifica una masa de 10 cm sólida en el lóbulo izquierdo de un hígado nodular. Se obtiene una muestra de biopsia de la lesión y se diagnostica un carcinoma hepatocelular. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que haya causado esta lesión?

A Coinfección por *Clonorchis sinensis*
B Desarrollo de un adenoma hepático que acumula mutaciones
C Inserción de ADN vírico en la proximidad del oncogén *NMYC*
D Mutación hereditaria en los genes de reparación de errores del ADN
E Infección persistente con necrosis y regeneración de hepatocitos



57 Una mujer de 41 años refiere malestar progresivo y pérdida de 10 kg de peso durante el último año. Desarrolla obnubilación creciente y acaba entrando en coma. La concentración de α-fetoproteína sérica está aumentada. La figura muestra el aspecto

representativo del hígado de esta paciente. ¿La ingestión por la paciente de cuál de las siguientes sustancias es más probable que haya influido en la aparición de este cuadro?

A Paracetamol
B Aflatoxina
C Ácido acetilsalicílico
D Sulfato ferroso
E Nitritos
F Ostras crudas

58 Una mujer de 36 años presenta desde hace 1 mes ictericia progresiva. Refiere varios brotes de dolor abdominal cólico durante los últimos 3 años. En la exploración física se observa ictericia generalizada con afectación de la esclerótica. El IMC de la paciente es de 32. Hay hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho y el hígado tiene un tamaño normal. Se obtiene una biopsia hepática y el estudio histológico muestra proliferación de conductos biliares y estasis de bilis intracanalicular, sin inflamación o necrosis de hepatocitos. ¿La concentración de cuál de las siguientes sustancias es probable que esté aumentada en el suero?

A Fosfatasa alcalina
B Amoníaco
C Anticuerpos antimitocondriales
D Anticuerpos frente a la hepatitis C
E Concentración de bilirrubina indirecta

59 Una mujer de 34 años natural de Kobe, Japón, refiere dolor abdominal alto intermitente desde hace 3 semanas. La exploración física no muestra alteraciones. Los hallazgos de laboratorio indican una concentración de proteínas séricas totales de 7,3 g/dl; de albúmina de 5,2 mg/dl; de bilirrubina total de 7,5 mg/dl; de bilirrubina directa de 6,8 mg/dl; de AST de 35 U/l; de ALT de 40 U/l, y de fosfatasa alcalina de 207 U/l. Entre los hallazgos histológicos significativos en el hígado destacan colestasis intracanalicular en las regiones centrolobulillares y edema de los hepatocitos y en el espacio porta, sin necrosis ni fibrosis. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que presente esta paciente?

A Miocardiopatía

B Quiste de colédoco
C Hemoglobinopatía
D Infección por el virus de la hepatitis B
E Colitis ulcerosa
F Enfermedad venooclusiva



60 Una mujer nativa americana de 54 años refiere dolor cólico en el cuadrante superior derecho durante la última semana. Se asocia a náuseas pero no a diarrea o vómitos. En la exploración física se encuentra afebril. Se observa una marcada hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho. El hígado tiene un tamaño normal. La paciente mide 160 cm y pesa 90 kg (IMC, 33). La ecografía abdominal identifica cálculos en la luz de la vesícula, y la pared de esta se encuentra engrosada. Los conductos biliares intra- y extrahepáticos son normales. Se extirpa la vesícula de la paciente mediante colecistectomía laparoscópica y muestra el aspecto que refleja la figura. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que haya influido en la aparición de esta enfermedad?

A Lisis de los eritrocitos mediada por anticuerpos
B *Ascaris lumbricoides* dentro de los conductos biliares
C Hipersecreción biliar de colesterol
D Reducción de la excreción renal de fosfato
E Infección de los hepatocitos por el VHB

F Ingesta de alimentos ricos en grasas
G Afectación del íleon terminal por la enfermedad de Crohn

61 Un hombre de 78 años refiere dolor abdominal desde hace 1 semana. En la exploración física tiene una temperatura de 37 °C, con una frecuencia cardíaca de 106 latidos/min y una presión arterial de 85/50 mmHg. Destaca dolor en los cuadrantes inferior izquierdo y superior derecho. La TC abdominal identifica divertículos en el sigma, además de dilatación de la vesícula biliar y barro biliar. El hemocultivo muestra flora polimicrobiana. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que sea la causa de esta enfermedad?

A Hemólisis
B Carcinoma
C Reacción frente a fármacos
D Litiasis
E Sepsis

62 Un hombre de 55 años ha desarrollado dolor abdominal e ictericia durante las últimas 5 semanas. En la exploración física refiere dolor en el cuadrante superior derecho, sin distensión abdominal. La TC muestra una vesícula marcadamente engrosada. Se realiza una colecistectomía y al corte se identifica una masa fungosa firme de 4 × 7 cm, lobulada y parda. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que se asocie a esta masa?

A Alcoholismo
B Colelitiasis
C Infección por *Clonorchis sinensis*
D Colangitis esclerosante primaria
E Colitis ulcerosa

Respuestas

1 **B** La anamnesis es sugestiva de una insuficiencia hepática aguda secundaria a una hepatitis fulminante con necrosis hepática masiva. La pérdida de función hepática tras la destrucción del 80-90% del hígado produce una hiperamoniemia por las alteraciones en el ciclo de la urea de los hepatocitos, y esto se traduce en una encefalopatía hepática a las 2 semanas de aparecer la ictericia. El aumento de la concentración de fosfatasa

alcalina es indicativo de una obstrucción de la vía biliar intra- o extrahepática. El aumento de la amilasa sugiere pancreatitis. La hepatitis fulminante secundaria al VHC es infrecuente. La hepatitis autoinmunitaria con títulos de ANA positivos no suele asociarse a una hepatitis fulminante.

2 **E** Las células estrelladas (llamadas antes células de Ito) pueden transformarse en miofibroblastos secretores de colágeno cuando se lesionan los hepatocitos y elaboran radicales libres y citocinas. Este proceso se desarrolla a lo largo de años, pero puede ser reversible en cierta medida si se elimina el estímulo lesivo. Si se conserva suficiente cantidad de parénquima hepático funcionante, la cirrosis puede estar bien compensada. Las demás células que se mencionan no elaboran colágeno. En el espacio de Disse normal solo existe una pequeña cantidad de colágeno de tipo IV. Advertencia: La ingesta de hígado de oso polar, que contiene grandes cantidades de vitamina A, puede producir toxicidad por esta.

3 **A** La cirrosis con hipertensión portal aumenta el flujo colateral venoso en las venas submucosas esofágicas, con lo que produce varices, y en la pared abdominal, con desarrollo de una cabeza de medusa. La hiperreflexia puede aparecer cuando se produce una encefalopatía hepática por cirrosis descompensada, pero no la disminución de los reflejos tendinosos profundos. La insuficiencia cardíaca derecha, en la que el hígado puede estar aumentado de tamaño por congestión pasiva, se asocia a distensión de las venas yugulares. La insuficiencia hepática con cirrosis puede producir un coma hepático, pero el edema cerebral con edema de papila no es una característica importante. La coagulopatía secundaria a la disminución de la función hepática puede cursar con hemorragias purpúricas, pero las hemorragias en astilla de las uñas son más características de la embolización secundaria a una endocarditis infecciosa.

4 **B** La nodularidad difusa con cicatrices deprimidas entre los nódulos es característica de la cirrosis, lo que produjo la ascitis complicada con una peritonitis bacteriana espontánea y septicemia. La cirrosis puede estar parcialmente descompensada hasta que aparece la infección. Una causa frecuente de cirrosis en los países occidentales es el alcoholismo. La deficiencia de

α1-antitripsina y la hemocromatosis hereditaria también pueden producir una cirrosis, pero ambos procesos son infrecuentes. En la hemocromatosis hereditaria, el hígado tiene un aspecto macroscópico pardo oscuro por el extenso depósito de hierro. De las diversas formas de hepatitis vírica, las causadas por el VHB o el VHC son las que tienen más riesgo de ocasionar cirrosis. Esta complicación es infrecuente o no aparece nunca en relación con las infecciones por el VHA, el VHG y el VHE. En la colangitis esclerosante se produce fibrosis portal, pero no regeneración nodular, de forma que el hígado es verde y duro, y tiene un aspecto finamente granular.

5 **B** El GASA se calcula restando a la concentración de albúmina sérica la concentración de albúmina en el líquido ascítico y se correlaciona con la presión portal. Cuando se produce el remodelado arquitectural de la cirrosis, aparece hipertensión portal y aumenta la pérdida de líquido intersticial hepático con proteínas hacia la cavidad peritoneal. Este cuadro es una ascitis de tipo trasudado. Es probable que la albúmina sérica esté baja en la hepatopatía crónica por la menor capacidad sintética. Las demás opciones son trastornos que producen una ascitis de tipo exudativo, con un GASA inferior a 1,1.

6 **E** Es probable que este paciente tenga una cirrosis alcohólica con insuficiencia hepática e hipertensión portal. La ascitis se debe a la hipertensión portal, que se relaciona con dos cambios fundamentales: 1) obstrucción mecánica al flujo de sangre en el hígado en relación con la cicatrización y compresión de los sinusoides por los nódulos regenerativos, y 2) dilatación de los vasos esplácnicos, que se traduce en una circulación hiperdinámica con aumento del flujo venoso portal. Este último es un factor importante en la patogenia de la hipertensión portal y la consiguiente aparición de ascitis. Esta vasodilatación arterial esplácnica se debe a un aumento de la producción de óxido nítrico (NO) en el lecho arterial esplácnico. Este paciente no presenta signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva –obsérvese que la PVY es normal–. La hiperbilirrubinemia de este paciente se debe a la insuficiencia hepática. En el síndrome hepatopulmonar se produce dilatación intravascular pulmonar en relación con la síntesis de NO en el pulmón, no en el hígado.

Las comunicaciones portosistémicas producen varices esofágicas que sangran y provocan hematemesis.

7 **C** Se describe un síndrome hepatopulmonar (hipertensión portopulmonar). La causa no está clara, pero su consecuencia es una vasoconstricción arterial pulmonar con desequilibrio ventilación-perfusión (V·/Q·), que determinan hipoxemia. Las demás opciones son procesos que no causan hipertensión portal. La cirrosis puede asociarse a inflamación crónica y esteatosis, pero por sí solas no pueden explicar la hipertensión portopulmonar. Las metástasis suelen ser focales y dejar parénquima hepático funcionante residual. La obstrucción biliar ocasiona ictericia.

8 **F** La fibrosis portal con formación de puentes y la regeneración nodular de los hepatocitos son características de la cirrosis. Si las células madre hepáticas permiten la regeneración de los hepatocitos y las reacciones ductales son mínimas, la cirrosis puede progresar menos, y los tabiques finos son sugestivos de cierto grado de remisión. La hemorragia digestiva alta masiva es indicativa de varices esofágicas como consecuencia de la hipertensión portal secundaria a la cirrosis. Si el paciente en este momento no bebe alcohol, no presentará cambio graso (esteatosis). Los cambios arquitecturales de la cirrosis persisten durante décadas tras el desarrollo de la enfermedad. La fibrosis concéntrica de los conductos biliares se encuentra en la colangitis esclerosante primaria, que puede ser idiopática o asociarse a enfermedad inflamatoria intestinal. El síndrome de Budd-Chiari en la trombosis de la vena suprahepática produce hepatomegalia y es poco frecuente. La hepatitis de interfase es característica de la infección crónica activa por el VHC o el VHB. La necrosis hepatocelular masiva puede producirse en pocos casos como una complicación de una infección por el VHA o tras la ingesta de cantidades elevadas de paracetamol. La deficiencia de α_1-antitripsina con presencia de glóbulos periportales positivos con PAS se asocia al desarrollo de cirrosis, aunque es mucho menos frecuente que la cirrosis alcohólica.

9 **D** La figura muestra una hepatitis de interfase (llamada antes *necrosis en sacabocados,* pero que se debería llamar mejor *apoptosis de hepatocitos*) en la placa limitante, con un infiltrado

mononuclear y cuerpos de Councilman. La hepatopatía que persiste durante más de 6 meses y la evidencia histológica de necrosis de hepatocitos con inflamación y fibrosis portal son características de la hepatitis crónica. Dentro de los virus de la hepatitis, el VHC es el que más probablemente produzca hepatitis crónica, y el VHA, el que menos riesgo de enfermedad crónica tiene. La coledocolitiasis produce una obstrucción biliar extrahepática y un aumento de la concentración de fosfatasa alcalina, pero no suele ocasionar necrosis hepatocelular. La congestión hepática con insuficiencia cardíaca derecha ocasiona necrosis centrolobulillar, pero no fibrosis portal. La hemocromatosis puede producir fibrosis portal y cirrosis, pero en los hepatocitos se observa una acumulación prominente de pigmento de color pardo amarillento, que corresponde a hemosiderina. La colangitis esclerosante produce inflamación y fibrosis obliterante de los conductos biliares.

10 **A** Lo más probable es que este paciente haya desarrollado una hepatopatía leve autolimitada por infección por el VHA tras consumir alimentos o agua contaminados en un restaurante. La presencia de IgM frente al VHA es sugestiva de una infección reciente. El anticuerpo IgM es sustituido en unos meses por anticuerpos IgG, que dotan de inmunidad frente a la reinfección. El período de incubación del VHA es corto, y la enfermedad, breve y leve, sin tendencia significativa al desarrollo de una hepatitis crónica. La forma de infección más frecuente para el VHA es la vía fecal-oral. Las infecciones por el VHB y el VHC suelen tener períodos de incubación más largos y se suelen adquirir por vía parenteral. La infección por el VHD se desarrolla mediante la coinfección con el VHB o la sobreinfección de un portador de hepatitis B.

11 **E** El factor predictor más importante de si un paciente con hepatitis vírica va a desarrollar una hepatopatía crónica es el agente etiológico responsable de la hepatitis. Entre todos los virus hepatótropos, la infección por el VHC es la que con más probabilidad da lugar a hepatitis crónica que culmina en cirrosis. El VHA, el VHE y el VHG casi nunca provocan hepatitis crónica. El patrón de cambio histológico, el grado de aumento de las transaminasas y la duración de este último son malos

predictores de cronicidad.

12 **C** Este adicto a drogas por vía intravenosa desarrolló una infección crónica por el VHB, lo que se manifiesta por la persistencia de HBsAg, ADN del VHB y anticuerpos IgG frente a HBc. El 80-90% de los pacientes adictos a drogas por vía intravenosa presentan evidencias serológicas de infección por el VHB o el VHC. La rotura de varices y la presencia de ascitis sugieren que este paciente ha desarrollado cirrosis e hipertensión portal. La presentación final con pérdida de peso y aumento de perímetro abdominal de rápida evolución es sugestiva de que se ha desarrollado un carcinoma hepatocelular, algo que en la mayor parte de los casos se confirma mediante el incremento de la concentración de α-fetoproteína. Las demás pruebas de laboratorio, incluido el tiempo de protrombina prolongado y el incremento de las concentraciones de AST y ferritina, indican una hepatopatía crónica. Cualquier masa hepática se asocia a un incremento de la cifra de fosfatasa alcalina. El aumento progresivo de la concentración de amoníaco en sangre es indicativo de una insuficiencia hepática grave.

13 **B** La detección de IgM frente al VHA es indicativa de una infección aguda. No está descrita la progresión de la infección por el VHA a hepatitis crónica, pero unos pocos casos se complican con una hepatitis fulminante. La viremia por el VHA es transitoria, de forma que la transmisión por vía hematógena de este virus es infrecuente. El VHA se transmite por la vía fecal-oral, como por la ingesta de marisco crudo pescado en áreas donde se vierten residuos.

14 **E** En las regiones en las que el VHB es endémico, la transmisión vertical determina estado de portador en el 90-95% de los casos. Sin embargo, el éxito en la implantación de una campaña de vacunación infantil frente al VHB a escala nacional puede reducir la prevalencia de HBsAg entre los niños y adolescentes. Singapur alcanzó el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud de reducir la prevalencia de infección crónica por el VHB. Para que se desarrolle una hepatitis vírica es precisa una respuesta inmunitaria frente a las células infectadas por el virus. En los pacientes inmunocompetentes, el VHB induce la apoptosis de los

hepatocitos infectados, mediada por linfocitos T específicos frente a HBsAg. Durante el período neonatal, las respuestas inmunitarias no están totalmente desarrolladas y no se produce hepatitis. La elevada frecuencia de portadores tiene importancia médica, porque aumenta el riesgo de carcinoma hepatocelular 200 veces. En las poblaciones con una frecuencia de portadores alta, puede no aparecer una cirrosis coexistente en el 50% de los pacientes. Por el contrario, en áreas en las que el VHB no es endémico, existe cirrosis en el 80-90% de los pacientes que desarrollan un cáncer de hígado. La infección secundaria a una transfusión de sangre es poco frecuente por la detección selectiva del virus en los hemoderivados. La transmisión del VHB por vía sexual es infrecuente y conduce a un estado de portador en unos pocos casos, mientras que en la mayor parte de los pacientes induce una respuesta inmunitaria. La transmisión oral del VHA es frecuente (algo que no sucede con el VHB o el VHC). El riesgo de infección por el VHB en relación con un pinchazo con aguja es del 1-6%.

15 **A** La persistencia de HBsAg en el suero durante 6 meses o más después de la detección inicial es indicativa de un estado de portador. La mayor parte de los portadores crónicos del VHB de todo el mundo adquirieron la infección de forma intrauterina o durante el parto. Solo el 1-10% de las infecciones por el VHB en adultos culminan en un estado de portador. Este es estable en la mayor parte de los casos y se denomina estado de portador «inactivo», sin incremento de las enzimas hepáticas, y en algunos pacientes infectados incluso se llega a eliminar el virus. Actualmente no se dispone de tratamientos para favorecer la eliminación del virus. La vacunación es útil para prevenir la infección, pero no para eliminar el virus, aunque los portadores se convierten en un reservorio de infección para otras personas.

16 **C** La necrosis con formación de puentes portales es sugestiva de una hepatitis crónica. En la infección por el VHC se produce una esteatosis leve. La incidencia de hepatitis crónica es máxima en la infección por el VHC. Más del 50% de los pacientes infectados por este virus desarrollan hepatitis crónica y muchos evolucionan a cirrosis. Esto se debe, en parte, a que los anticuerpos IgG frente al VHC, que se desarrollan tras la

infección aguda, no son protectores.

17 **C** Los anticuerpos frente a la hepatitis C no protegen frente a la reinfección. El ARN del VHC sigue en la circulación, a pesar de la existencia de anticuerpos neutralizantes. Las estrategias de tratamiento pueden tratar de antagonizar la polimerasa y la proteasa víricas, igual que en los regímenes con antirretrovíricos frente al VIH. En las infecciones por el VHA, el VHB, el VHD, el VHE o el VHG, la aparición de anticuerpos IgG representa inmunidad para toda la vida. Existe una vacuna frente al VHB para la misma finalidad.

18 **E** Esta paciente tiene evidencia de infección por el VHC con síntomas de hepatopatía desde hace 1 año. Clínicamente, presenta hepatitis crónica (> 6 meses), que puede haber aparecido tras una fase asintomática de infección aguda por el VHC. Los anticuerpos IgG frente al VHC no son protectores, algo que se demuestra por la persistencia de la viremia. Aproximadamente el 85% de los casos de VHC evolucionan a una hepatitis crónica, pero la hepatitis fulminante es infrecuente. La hepatitis crónica se caracteriza por apoptosis de hepatocitos en la interfase entre los espacios porta y el lobulillo hepático. Esto acaba provocando una cirrosis con fibrosis portal con formación de puentes y regeneración nodular en algunos casos. Sin embargo, en este momento la paciente no presenta síntomas ni signos de cirrosis. La fibrosis concéntrica de los conductos biliares se encuentra en la colangitis esclerosante, que puede ser idiopática o, con más frecuencia, asociarse a enfermedad inflamatoria intestinal. El depósito de cobre es típico de la enfermedad de Wilson, que puede asociarse a hepatitis crónica y cirrosis, pero no guarda relación con la infección por el VHC, que es mucho más frecuente. La destrucción granulomatosa de los conductos biliares es sugestiva de cirrosis biliar primaria. El síndrome de Budd-Chiari en la trombosis de la vena suprahepática provoca hepatomegalia con necrosis hepática y ascitis.

19 **C** El VHD no se puede replicar en ausencia del VHC; la infección aislada por el VHD no existe. La evidencia de hepatitis crónica B es la presencia de HBsAg y anticuerpos IgG frente a HBc en ausencia de anticuerpos IgM frente a HBc. La

confirmación serológica de una infección reciente por el VHD es la presencia de anticuerpos IgM frente al VHD. Las infecciones por el VHB y VHD son frecuentes en adictos a drogas por vía parenteral. Cuando la infección por el VHD se superpone a una infección crónica por el VHB, se pueden encontrar tres evoluciones: evolución fulminante de la hepatitis B leve; desarrollo de una hepatitis aguda en un portador de VHB asintomático, o desarrollo de una enfermedad crónica progresiva que culmina en una cirrosis. Los demás virus que se recogen pueden producir infección por sí mismos.

20 **C** Las infecciones por el VHE son más frecuente en el este y sur de Asia. Este virus se contagia por vía fecal-oral. La mayor parte de los pacientes tienen una infección subclínica, aunque uno de cada siete sufre una hepatitis aguda; la muerte es infrecuente, salvo en gestantes. El VHE no evoluciona a hepatitis crónica. Las infecciones por CMV y el VHS pueden ser congénitas, pero es poco probable que afecten de forma significativa al hígado de la madre; el CMV es una causa importante de insuficiencia hepática en los trasplantes ortotópicos y ambos virus pueden afectar a pacientes inmunodeprimidos. El VEB puede afectar al hígado como parte de una mononucleosis infecciosa, pero se trata de un proceso típicamente leve. La fiebre amarilla se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales de África y América del Sur, y se contagia a través de los mosquitos.

21 **D** Este paciente tiene una infección por el virus de la hepatitis B (VHB). La evolución más frecuente de esta infección es la recuperación. El paciente estaba sintomático, dado que tenía ictericia, malestar y náuseas. Las concentraciones de AST y ALT no estaban muy elevadas. La presencia de anticuerpos frente a HBs es compatible con recuperación. Sin embargo, aunque se produzca esta, en la fase aguda de la enfermedad después de la incubación, el paciente resulta muy infectivo para los demás. La hepatitis fulminante es poco frecuente con el VHB y sucede en < 1% de los casos. Solo el 10% de los casos progresan a hepatitis crónica, y un subgrupo de estos desarrollan una cirrosis.

22 **A** Las duelas hepáticas parasitarias son endémicas en el este y el sureste asiáticos. La infección puede permanecer asintomática

durante años, aunque también puede progresar a una fase crónica complicada por colangitis piógena de repetición con ictericia. Estos pacientes tienen riesgo de desarrollar un colangiocarcinoma, el segundo tumor hepático primario maligno más frecuente. Los demás microorganismos enumerados no se asocian a riesgo de neoplasia. Los equinococos provocan hidatidosis, pero no determinan el desarrollo de tumores malignos. La fase extraeritrocítica del paludismo por plasmodios afecta al hígado. La tuberculosis diseminada produce granulomas, que en general son pequeños y multifocales. La fiebre tifoidea puede ser un proceso sistémico con afectación hepática.

23 **B** La hepatitis autoinmunitaria es una hepatopatía crónica de causa desconocida en la que los anticuerpos frente a componentes estructurales de los hepatocitos producen la necrosis progresiva de estos, con cirrosis e insuficiencia hepática. Los pacientes suelen mejorar con glucocorticoides. La deficiencia de α_1-antitripsina y la enfermedad de Wilson pueden causar hepatitis crónica y cirrosis, pero no se encuentran marcadores de autoinmunidad. El alcoholismo crónico no se asocia a formación de autoanticuerpos. Dado que este paciente no tiene datos de infección por el VHB, no puede tratarse de una sobreinfección por el VHD. La isoniacida puede producir una hepatitis aguda o crónica, pero no se asocia a autoanticuerpos. Los pacientes con cirrosis biliar primaria a menudo tienen anticuerpos antimitocondriales (que también pueden encontrarse en la hepatitis autoinmunitaria), pero las concentraciones de bilirrubina y fosfatasa alcalina serían mucho más elevadas en la cirrosis biliar primaria.

24 **D** Se describe una lesión hepática aguda. La isoniacida se emplea como tratamiento de la tuberculosis y puede producir hepatotoxicidad, que en la mayoría de los casos es leve, aunque en ocasiones provoca una necrosis hepática masiva. Pueden existir síntomas mínimos hasta que se encuentra una lesión grave. Las demás opciones son cuadros que suelen producir con más frecuencia un patrón de hepatopatía crónica.

25 **A** En pacientes con una hepatopatía crónica, la ingesta de paracetamol se asocia a un mayor riesgo de hepatotoxicidad

porque se supera la capacidad de desintoxicación por conjugación. Esto condiciona que el paracetamol sea metabolizado por la citocromo P-450 con producción del metabolito tóxico *N*-acetil-*p*-benzoquinineimina (NAPQI), que se acumula hasta superar la capacidad del glutatión. La *N*-acetilcisteína aumenta la disponibilidad de glutatión. La ingesta de ácido acetilsalicílico produce el síndrome de Reye en niños. La hepatotoxicidad del ibuprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), de la meperidina y de la oxicodona no es significativa.

26 **C** La fibrosis portal y la regeneración nodular de los hepatocitos son rasgos típicos del alcoholismo crónico. Las telangiectasias en araña (angiomas) son lesiones vasculares cutáneas caracterizadas por una arteriola central dilatada pulsátil, de la cual se irradian pequeños vasos. Estas lesiones se deben al hiperestrogenismo (que también contribuye a la atrofia testicular). El hígado que fracasa no consigue metabolizar los estrógenos con normalidad. Los angiomas en araña son una manifestación de la insuficiencia hepática. La ascitis, la esplenomegalia, las hemorroides y las varices esofágicas se producen como consecuencia de la hipertensión portal secundaria a la cirrosis y por la consiguiente congestión y dilatación de las venas colaterales. Los demás hallazgos que se enumeran no explican la hipertensión portal.

27 **E** La figura muestra una esteatosis (hígado graso) macrovesicular con fibrosis inicial. La causa más frecuente de hígado graso con fibrosis es el alcoholismo crónico. En los pacientes sin antecedentes de ingesta significativa de alcohol se puede plantear una esteatohepatitis no alcohólica, entre cuyas causas destacan la diabetes mellitus, la obesidad o ambas. Una ingesta excesiva de paracetamol puede ocasionar una necrosis centrolobulillar o difusa. La toxicidad por alopurinol puede asociarse a la formación de granulomas. El ácido acetilsalicílico puede provocar una esteatosis microvesicular y síndrome de Reye en los niños. La clorpromacina puede causar colestasis. La administración de clorpromacina puede culminar en colestasis. La administración de isoniacida puede complicarse con una lesión aguda con formación de granulomas.

28 **B** El aumento de las concentraciones de transaminasas, la pérdida parcial de función hepática con una alteración del tiempo de protrombina y la colestasis no son específicos de ninguna hepatopatía concreta. Sin embargo, el aumento de la concentración de AST por encima de la de ALT es característico de las lesiones hepáticas secundarias al alcoholismo crónico. En este paciente la enfermedad se está descompensando, algo que se traduce en un aumento de la concentración de amoníaco en sangre. La infección por el VHA suele ser leve, sin predominio de la bilirrubina directa. La coledocolitiasis produce una hiperbilirrubinemia conjugada, pero sin las elevadas concentraciones de amoníaco, que son indicativas de insuficiencia hepática. Es poco probable que las metástasis obstruyan todo el drenaje biliar o produzcan un grado de insuficiencia hepática suficiente como para aumentar las concentraciones de amoníaco en sangre. La cirrosis biliar primaria es poco frecuente, especialmente en hombres, y las concentraciones de fosfatasa alcalina deberían ser mucho más elevadas.

29 **E** Se trata de una hepatitis alcohólica aguda. La figura muestra inclusiones citoplásmicas eosinófilas de aspecto globular, que se denominan *cuerpos de Mallory-Denk.* Estas inclusiones de citoqueratina son características, aunque no específicas, de la hepatitis alcohólica. Además, existen áreas de necrosis de hepatocitos, rodeadas por neutrófilos. En la figura se reconocen algunos neutrófilos. La congestión centrolobulillar puede producir necrosis centrolobulillar sin inflamación o cuerpos de Mallory-Denk. La colestasis se caracteriza por tapones de bilis verdosa-amarillenta en los canalículos. La hemosiderina se ve granular y parda con tinción con H-E, pero con azul de Prusia se ve azul. Los glóbulos periportales positivos con PAS son característicos de la deficiencia de α_1-antitripsina; los glóbulos suelen ser más pequeños que los cuerpos de Mallory-Denk y no se asocian a inflamación aguda.

30 **F** La esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) se produce en pacientes con síndrome metabólico/diabetes mellitus de tipo 2, con alteraciones del metabolismo de los ácidos grasos y las lipoproteínas. Algunos casos evolucionan a una esteatohepatitis

con fibrosis e incluso cirrosis (la denominada cirrosis criptógena cuando no se puede demostrar el consumo de alcohol, pero recuerde aplicar el cuestionario CAGE). Aunque pueden perderse hepatocitos con inflamación, estas características no son llamativas. La liberación del factor de necrosis tumoral α (TNF-α) y la interleucina 6 (IL-6) por los adipocitos disfuncionales puede producir apoptosis de los hepatocitos que inicia este proceso. Es poco probable que en la EHNA haya estasis biliar, y la ictericia no es una característica clave. El depósito de hemosiderina depende de la absorción de hierro por la dieta o por motivos genéticos.

31 **E** La esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) puede evolucionar a una esteatohepatitis no alcohólica (ENA) e incluso a cirrosis. Los factores de riesgo del síndrome metabólico y la diabetes mellitus de tipo 2 se vinculan con la obesidad. Se puede encontrar una EHNA en un tercio de los adultos, cifra que es paralela a la prevalencia de obesidad. Los rasgos patológicos de la EHNA y la ENA son parecidos a los de la hepatopatía alcohólica. La diabetes mellitus de tipo 1 produce un estado catabólico con pérdida de peso. La hipercolesterolemia familiar produce, principalmente, ateroesclerosis, sin hepatopatía. La hepatitis vírica crónica puede tener un elemento de esteatosis, pero no es importante, y no se asocia a enfermedad vascular. La acumulación de hierro en la hemocromatosis puede producir una miocardiopatía, además de la hepatopatía crónica, sin mucha esteatosis.

32 **E** La esteatosis microvesicular característica del síndrome de Reye es poco frecuente en la actualidad porque se conoce la relación entre la administración de ácido acetilsalicílico a niños con fiebre y la lesión hepática; se debe a una disfunción mitocondrial grave cerebral y hepática. La atresia biliar con una notable hiperbilirrubinemia se pone de manifiesto durante el período neonatal. La trombosis de la vena suprahepática produce el síndrome de Budd-Chiari, que es típicamente una enfermedad de adultos que complica procesos como la policitemia o el embarazo. Los hepatoblastomas pueden ser congénitos, pero son masas que no suelen asociarse a aumentos tan grandes de las concentraciones de las enzimas hepáticas. La

litiasis intrahepática es poco probable en los niños y es raro que se asocie a grandes elevaciones de las cifras de las enzimas hepáticas. La hepatitis de células gigantes neonatal puede producir los hallazgos de una hepatitis aguda en neonatos, pero no en niños.

33 **B** Los esteroides anabolizantes andrógenos se inyectan con la intención de aumentar la masa muscular para mejorar el rendimiento atlético. Dado que este se correlaciona, principalmente, con la habilidad y el entrenamiento, el posible aumento de masa muscular es problemático, sobre todo dados sus efectos perniciosos, como la hepatitis colestásica. El paracetamol puede producir necrosis hepática, pero la ictericia es menos probable. La clorpromacina suele asociarse a una colestasis pura como reacción idiosincrásica (no predecible). El etanol puede ocasionar esteatosis y el incremento de la concentración de AST es superior al de la de ALT. La isoniacida puede ocasionar necrosis hepática en personas tratadas por tuberculosis.

34 **D** El aumento de la cifra de fosfatasa alcalina sérica es sugestivo de una obstrucción de la vía biliar, pero en este caso debe ser focal, porque la concentración de bilirrubina no está aumentada. La anemia microcítica y la presencia de sangre en heces sugiere una hemorragia digestiva, y se debería sospechar un adenocarcinoma de colon como origen primario de las metástasis hepáticas en este caso. Las metástasis hepáticas de cáncer de colon son frecuentes. Aparecen como masas múltiples en el seno del parénquima hepático. El síndrome antifosfolipídico predispone a la trombosis con obstrucción venosa, en cuyo caso la cifra de enzimas hepáticas debería ser más elevada y el tiempo de tromboplastina parcial tendría que estar prolongado. La colangitis ascendente se debe típicamente a bacterias, como *Escherichia coli* o *Klebsiella*, y los pacientes desarrollan de forma aguda fiebre, escalofríos, ictericia y dolor abdominal. El alcoholismo crónico no se asocia a un aumento de la concentración de fosfatasa alcalina y a menudo existe anemia microcítica. La colangitis esclerosante debería aumentar la concentración de bilirrubina y de fosfatasa alcalina.

35 **D** Se trata de una ictericia fisiológica neonatal, leve y

transitoria, que se debe a una disminución de la capacidad de conjugación y excreción hepática de la bilirrubina, que no es totalmente funcional hasta las 2 semanas de vida. La atresia biliar con obstrucción produce una ictericia más grave y se ha de tratar con cirugía. La hepatitis neonatal se puede deber a infecciones congénitas, que provocan una ictericia más grave y que persiste durante más de 2 semanas. El infrecuente síndrome de Dubin-Johnson puede aparecer por la mutación autosómica recesiva de un gen que codifica la proteína transportadora canalicular, lo que altera la excreción de bilirrubina. La eritroblastosis fetal secundaria a la sensibilización materna frente a los antígenos de los eritrocitos fetales no suele aparecer durante el primer embarazo.

36 **B** La hiperbilirrubinemia no conjugada puede ser consecuencia de una hemólisis. Al aumentar la destrucción de eritrocitos, se dispone de más bilirrubina para ser conjugada por los hepatocitos. La ictericia obstructiva con litiasis de la vía biliar produce una hiperbilirrubinemia principalmente conjugada. La concentración de bilirrubina total puede estar aumentada en pacientes con hepatitis o cirrosis vírica y en pacientes que reciben fármacos, como anticonceptivos orales. Aunque en estos cuadros puede aparecer hiperbilirrubinemia directa e indirecta, predomina la conjugada.

37 **D** El síndrome de Gilbert se debe a una reducción de la concentración de uridina difosfato glucuronosiltransferasa (UDPGT), algo que puede ocurrir en el 3-7% de la población general en EE. UU. Unas concentraciones más bajas son más frecuentes en África, pero menos en Asia. Este cuadro con frecuencia no se diagnostica nunca. El estrés puede producir una hiperbilirrubinemia no conjugada transitoria, y esta puede llegar a provocar la ictericia de las escleróticas cuando las concentraciones de bilirrubina sérica alcanzan los 2-2,5 mg/dl. El paracetamol en dosis bajas puede eliminarse bien, pero la ingesta de una gran cantidad puede ocasionar necrosis de hepatocitos. Los quistes de colédoco son una malformación congénita poco frecuente, que produce una obstrucción de la vía biliar extrahepática con hiperbilirrubinemia conjugada. La cirrosis biliar primaria origina una hiperbilirrubinemia

conjugada, igual que el síndrome de Dubin-Johnson, poco frecuente. La infección por el VHA suele ser leve, pero no tan transitoria; puede asociarse a un ligero aumento de bilirrubina conjugada y no conjugada.

38 **E** Esta paciente tiene antecedentes de cálculos biliares y ha desarrollado una colangitis ascendente por *Escherichia coli*. Estas bacterias alcanzan el hígado ascendiendo por la vía biliar. La obstrucción secundaria a litiasis es el factor de riesgo más frecuente. La aparición de lesiones quísticas en el lóbulo hepático derecho sugiere que la paciente ha desarrollado abscesos hepáticos. *Clonorchis sinensis* es una duela hepática endémica de los países del este de Asia y es un factor de riesgo para el desarrollo de un carcinoma de la vía biliar. La criptosporidiosis puede afectar a la vía biliar, entre otras localizaciones, en pacientes inmunodeprimidos. En estos también se encuentra infección por citomegalovirus, que produce un cuadro clínico similar a una hepatitis pero que no afecta a la vía biliar. Un paciente con amebiasis y afectación hepática suele presentar diarrea con sangre y moco.

39 **D** La colestasis neonatal es una ictericia del recién nacido que persiste durante más de 2 semanas tras el parto. Una causa es la hepatitis neonatal, que suele ser idiopática, y la mayor parte de estos lactantes se recuperan sin tratamiento específico. Algunos casos se producen por la deficiencia de α1-antitripsina y otros se deben a una atresia biliar extrahepática. Los pacientes con atresia biliar extrahepática presentarán una cifra de fosfatasa alcalina elevada y necesitarán que se les realice la anastomosis de los conductos extrahepáticos para así evitar una hepatopatía progresiva. Los pacientes con eritroblastosis fetal desarrollan hidropesía e ictericia al nacer por la presencia de anticuerpos maternos de tipo IgG frente a los eritrocitos fetales, con la consiguiente hemólisis. La galactosemia es un error congénito del metabolismo, en el cual la deficiencia de galactosa-1-fosfato uridiltransferasa provoca lesiones en las células renales, hepáticas y encefálicas; se producen hepatomegalia, esplenomegalia, hipoglucemia y, finalmente, cirrosis. La cirrosis biliar primaria afecta a los adultos. La enfermedad de von Gierke se debe a una deficiencia de glucosa-6-fosfatasa y los

lactantes afectados sufren hipoglucemia, con acidosis láctica, hiperuricemia e hiperlipidemia.

40 **D** La atresia biliar extrahepática es un cuadro poco frecuente en el que se destruyen todos o algunos conductos biliares. Si la enfermedad respeta un conducto biliar de calibre suficiente como para que pueda ser anastomosado con objeto de evitar la obstrucción, el problema se podrá corregir. En muchos casos, como sucede en este, la obstrucción de los conductos biliares se localiza por encima de la porta hepática y la única opción de tratamiento es el trasplante hepático. La deficiencia de $\alpha 1$-antitripsina puede producir una hepatitis neonatal, que se parece clínicamente a una atresia biliar extrahepática, pero la mayor parte de los lactantes se recuperan. Los quistes de colédoco pueden ocasionar cólicos biliares en niños; es un cuadro congénito que produce dilataciones en el colédoco. Las infecciones congénitas pueden afectar al hígado, pero también suelen afectar a otros órganos; los lactantes con estas infecciones están enfermos desde el nacimiento. Los hepatoblastomas son infrecuentes y pueden encontrarse en lactantes, pero las masas en el seno del parénquima hepático no suelen obstruir por completo la vía biliar.

41 **E** La cirrosis biliar primaria es un trastorno autoinmunitario poco frecuente que produce una destrucción progresiva de la vía biliar intrahepática. La presencia de prurito, hiperbilirrubinemia conjugada y el aumento de las concentraciones de fosfatasa alcalina sugieren una ictericia obstructiva secundaria a la destrucción de los conductos biliares. Aproximadamente el 90% de los pacientes con esta enfermedad tienen anticuerpos antimitocondriales en el suero. La deficiencia de $\alpha 1$-antitripsina puede afectar al hígado y causar una hepatitis crónica con cirrosis y, además, enfisema panlobulillar. En la fibrosis quística se encuentra aumentada la concentración de cloruro en el sudor y este proceso también puede cursar como una ictericia neonatal. El aumento de la concentración de ferritina sérica se encuentra en los pacientes con hemocromatosis hereditaria. La hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C se caracteriza por necrosis de hepatocitos, pero no se destruye el conducto biliar.

42 **A** Las principales dianas de la colangitis esclerosante primaria

son los conductos biliares intrahepáticos y la colitis ulcerosa coexiste en el 70% de los casos. Los conductos sufren una colangitis destructiva que culmina en una fibrosis periductal con ictericia colestásica. Al final puede desarrollarse cirrosis con insuficiencia hepática. El depósito de cobre es típico de la enfermedad de Wilson, asociada a hepatitis crónica y cirrosis. En la cirrosis biliar primaria se produce una destrucción granulomatosa de los conductos biliares. La hepatitis de interfase es característica de la hepatitis vírica crónica activa. La deficiencia de α1-antitripsina con glóbulos periportales positivos con PAS se asocia a cirrosis. La fibrosis portal con formación de puentes y la regeneración nodular caracterizan a la cirrosis.

43 **C** Este paciente tiene rasgos clínicos, histológicos y analíticos de hemocromatosis genética. En este proceso se produce una sobrecarga de hierro por excesiva absorción del hierro de la dieta. Este hierro absorbido se deposita en muchos tejidos, incluidos el corazón, el páncreas y el hígado, con la consiguiente aparición de insuficiencia cardíaca, diabetes y cirrosis. El hierro se tiñe de azul con la tinción con azul de Prusia, como muestra la figura. Una concentración elevada de ferritina sérica es sugestiva de un aumento importante del hierro corporal. La hemocromatosis genética es una enfermedad autosómica recesiva y los hermanos tienen riesgo de desarrollar la misma enfermedad. Una flebotomía elimina 250 mg de hierro por unidad de sangre y con el tiempo permite reducir los depósitos de hierro.

44 **D** Este paciente presenta una hemocromatosis hereditaria por excesivo depósito de hierro, lo que produce ascitis, esplenomegalia, trastornos de la función hepática, diabetes mellitus, pigmentación cutánea y elevación de la ferritina. Dado que no existen causas predisponentes para el aumento de la absorción de hierro, el diagnóstico más probable es hemocromatosis primaria o genética. Esta enfermedad se debe a una mutación del gen *HFE*, que codifica una molécula parecida al CPH de clase I, que se une a la β2-microglobulina. La *HFE* mutante reduce la síntesis de hepcidina y de este modo disminuye la hepcidina circulante. La consiguiente disminución

de la interacción entre la hepcidina y la ferroportina permite que aumente la actividad de esta última, con mayor salida de hierro de los enterocitos y aparición de una sobrecarga sistémica de hierro en la hemocromatosis hereditaria. Dado que este paciente no presenta anemia y tiene un VCM normal, es poco probable que tenga una mutación del gen de la β-globina con una β-talasemia. Ninguna de las restantes mutaciones que se enumeran afecta a la absorción del hierro.

45 **C** Aunque la mayor parte de los casos de hemocromatosis hereditaria se deben a mutaciones del gen *HFE*, algunos se producen por mutaciones en los genes que codifican los receptores para la transferrina, la hemojuvenilina y, con menos frecuencia, la hepcidina (codificada por el gen *HAMP*). Sin embargo, el principal regulador de la absorción de hierro es la proteína hepcidina y todas las causas genéticas de hemocromatosis hereditaria se asocian a una menor concentración de esta proteína. Las mutaciones del gen *HAMP* provocan una forma extremadamente grave de la enfermedad en edad temprana (hemocromatosis juvenil) con miocardiopatía e hipogonadismo. Normalmente el hígado aumenta la producción de hepcidina cuando las reservas de hierro son adecuadas e impide la liberación de hierro por los enterocitos intestinales y los macrófagos. Las proteínas del CPH de clase I están implicadas en el reconocimiento de los antígenos peptídicos en la inmunidad mediada por los linfocitos T. Las mutaciones del gen *ATP7B* se asocian a enfermedad de Wilson, un trastorno del metabolismo del cobre. Las mutaciones de *HNF1-α* aparecen en la diabetes mellitus del joven de inicio en la madurez (MODY) y pueden asociarse al desarrollo de adenomas hepáticos. *DMT1* está implicado en la absorción de hierro por los enterocitos.

46 **B** La enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario en el que se acumulan concentraciones tóxicas de cobre en los tejidos, sobre todo en el encéfalo, los ojos y el hígado. El gen *ATP7B* de la enfermedad de Wilson codifica una ATPasa transportadora de cobre en los hepatocitos. Cuando existen mutaciones de este gen, no resulta posible secretar el cobre hacia el plasma. La ceruloplasmina es una α2-globulina, que transporta el cobre en el plasma. Dado que el cobre no se puede secretar hacia el

plasma, las concentraciones de ceruloplasmina son bajas. La hepatopatía crónica y el enfisema panlobulillar pueden asociarse a deficiencia de α1-antitripsina. El incremento de la concentración de α-fetoproteína es un marcador de carcinoma hepatocelular. El aumento de la ferritina sérica puede indicar una hemocromatosis hereditaria. La positividad para los anticuerpos antimitocondriales se describe en la cirrosis biliar primaria. El HBsAg positivo es indicativo de presencia del VHB, que solo infecta el hígado.

47 **C** Los glóbulos positivos con PAS en el hígado que muestra la imagen son característicos de la deficiencia de α1-antitripsina (AAT). Aproximadamente el 10% de los individuos con una deficiencia homocigota (fenotipo PiZZ) de la deficiencia de AAT presentan una hepatopatía relevante, incluidas hepatitis neonatal y cirrosis progresiva. La deficiencia de AAT permite también la actividad sin control de las elastasas pulmonares, que destruye el tejido elástico y provoca enfisema. La AAT puede producir un cuadro de hepatitis crónica en adultos y también puede ser origen de una hepatitis neonatal con una lesión hepática aguda, pero a menudo transitoria. La diabetes mellitus y la insuficiencia cardíaca son características de la hemocromatosis, proceso en el que existe una sobrecarga de hierro. El depósito de hierro en el hígado se puede detectar con azul de Prusia. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad por inmunocomplejos que puede afectar a muchos órganos. La afectación hepática es poco frecuente. La colitis ulcerosa se asocia de forma importante a colangitis esclerosante primaria, trastorno que cursa con inflamación y fibrosis obliterante de los conductos biliares.

48 **C** Se trata de un síndrome de Budd-Chiari, secundario a la obstrucción al flujo de salida por la vena suprahepática. La elevada concentración de hemoglobina y plaquetas en esta mujer es compatible con policitemia vera, que forma parte de un síndrome mieloproliferativo, y posiblemente esta sea la causa. La coledocolitiasis debería producir ictericia. La cirrosis puede ser origen de una cabeza de medusa con aumento del perímetro abdominal en relación con la ascitis, pero en la cirrosis no se encuentra policitemia. Algunos carcinomas hepatocelulares

originados en el contexto de una cirrosis pueden producir un síndrome de Budd-Chiari, pero sin policitemia. El cambio graso por sí mismo no produce obstrucción al flujo de salida hepático. Es poco probable que un absceso por debajo del diafragma comprima la vena hepática.

49 **B** El aspecto microscópico es una intensa congestión centrolobulillar. El área que rodea el espacio porta está menos congestionada. La neumopatía restrictiva ocasiona corazón pulmonar con insuficiencia cardíaca congestiva derecha, lo que determina una congestión venosa pasiva del hígado, más llamativa en las regiones centrolobulillares. Cuando la congestión es grave, la anoxia puede producir una necrosis centrolobulillar con aumento de las transaminasas. La apoptosis no ocasiona necrosis generalizada, porque se afectan células aisladas y este cuadro es más típico de la hepatitis vírica. La colestasis se caracteriza por tapones de bilis de color verde amarillento en los canalículos. La hemosiderina tiene un aspecto granular y pardo con la tinción con H-E, pero se tiñe de azul con azul de Prusia. Las gotículas grandes de lípidos llenan el citoplasma de los hepatocitos en la esteatosis macrovesicular. Los cuerpos de Mallory son estructuras citoplásmicas globulares rojas, más típicas del alcoholismo y, en concreto, de la hepatitis alcohólica aguda. La fibrosis portal inicia el proceso de cirrosis.

50 **E** Esta paciente tiene un síndrome HELLP materno (hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y trombocitopenia *[hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets]*), que es una complicación grave de la preeclampsia y, cuando se identifica una coagulopatía por el incremento del tiempo de protrombina, se debería proceder a un parto urgente para salvar la vida de la madre y del feto. El tratamiento con corticoesteroides se emplea para los procesos inflamatorios, en concreto para los de base autoinmunitaria. La inmunoglobulina intravenosa puede ayudar en el tratamiento de las infecciones, como la inmunoglobulina para la hepatitis B. El trasplante hepático está indicado en pacientes con insuficiencia hepática sin opciones de recuperación. La plasmaféresis ayuda a tratar procesos como la púrpura trombocitopénica trombótica en los que existen anticuerpos, proteínas o toxinas circulantes, que pueden ser

eliminados de forma urgente. La derivación portocava se emplea como tratamiento de la cirrosis con encefalopatía hepática. La ribavirina y el interferón se utilizan como tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C.

51 **D** Esta paciente presenta un hígado graso agudo del embarazo, un cuadro poco frecuente de gravedad variable, que se caracteriza histológicamente por la acumulación de pequeñas gotículas de grasa en los hepatocitos (esteatosis microvesicular). Esta característica no se encuentra en ninguno de los demás procesos enumerados. La enfermedad puede deberse a un defecto en la oxidación de ácidos grasos dentro de las mitocondrias. La fibrosis concéntrica alrededor de los conductos biliares caracteriza a la colangitis esclerosante. La hemocromatosis hereditaria se manifiesta con complicaciones en pacientes de mediana edad por la presencia de depósitos extensos de hierro. La atresia biliar extrahepática es una enfermedad neonatal infrecuente. La pérdida de conductos biliares intrahepáticos en la cirrosis biliar primaria es también una enfermedad infrecuente de pacientes de mediana edad. Pueden identificarse células gigantes multinucleadas en la hepatitis de células gigantes neonatal. Los glóbulos positivos con PAS se encuentran en la deficiencia de αl-antitripsina, proceso que afecta a adultos.

52 **B** La hiperplasia nodular focal es una lesión bien delimitada, pero no encapsulada, benigna que se caracteriza por una cicatriz central. Los colangiocarcinomas tienen extensos depósitos de colágeno, pero son malignos y a menudo se asocian a factores de riesgo, incluida la hepatitis vírica. Los adenomas hepáticos pueden asociarse al uso de anticonceptivos orales. Los carcinomas hepatocelulares se producen sobre hígados con lesiones previas, como hepatitis víricas o daño alcohólico y con frecuencia son multifocales. La cirrosis afecta a todo el hígado, no a una parte. Las metástasis pueden ser solitarias o múltiples y pueden mostrar necrosis central cuando son grandes.

53 **E** La masa hepática delimitada sugiere un tumor benigno, como un adenoma hepático. Estos tumores, que pueden aparecer en mujeres jóvenes que han empleado anticonceptivos orales, pueden aumentar de tamaño y romperse por una

estimulación estrogénica durante el embarazo. Estos adenomas pueden presentar mutaciones de los genes *HFN1-α* o de la β-catenina. Los colangiocarcinomas y los carcinomas hepatocelulares pueden relacionarse con una infección por el virus de la hepatitis y con el alcoholismo; producen masas irregulares grandes, que suelen aparecer en pacientes mayores que esta mujer. Los quistes del colédoco de la vía biliar son restos embrionarios poco frecuentes que producen síntomas típicamente durante la infancia, además de cólicos biliares. El embarazo molar puede incluir el coriocarcinoma, que puede dar lugar a metástasis y romperse, pero es poco probable que ocasione una metástasis solitaria y delimitada. Los hepatoblastomas son neoplasias infantiles poco frecuentes.

54 **B** La presencia de masas múltiples, como refleja la figura, es compatible con un carcinoma metastásico. Las metástasis hepáticas son mucho más frecuentes que las neoplasias hepáticas primarias. La anemia microcítica y la presencia de sangre oculta en heces son sugestivas de cáncer de colon. Las masas pueden producir una obstrucción biliar intrahepática y aumentar la concentración de fosfatasa alcalina. El parénquima hepático tiene un riego rico, de forma que es diana para la siembra hematógena de los tumores malignos. La cirrosis y el carcinoma hepatocelular pueden aparecer como consecuencia del alcoholismo crónico o de una hepatitis por el virus de la hepatitis B, pero en estos casos suele aparecer una masa dominante. El síndrome de Gilbert y otras hiperbilirrubinemias hereditarias no suelen producir tumores malignos. El síndrome metabólico y la diabetes mellitus incrementan el riesgo de EHNA, ENA, cirrosis y carcinoma hepatocelular.

55 **B** Los nódulos displásicos son lesiones precursoras del carcinoma hepatocelular. Los nódulos regenerativos de la cirrosis suelen medir menos de 2 cm, con frecuencia menos de 1 cm, y tienen riego por la vena porta. Cuando la displasia aumenta de grado, se incrementa la angiogenia con arterialización. Los adenomas hepáticos no suelen malignizarse. Los nódulos sideróticos pueden asociarse a hemocromatosis. La esteatosis es característica de muchas hepatopatías y no es un dato premaligno.

56 **E** Los pacientes con infección por el VHB tienen riesgo a largo plazo de desarrollar un carcinoma hepatocelular. Esta infección es más frecuente en Asia (a menudo por transmisión vertical) que en América del Norte y Europa y produce más casos de carcinoma hepático primario en todo el mundo que las demás causas, como el alcoholismo crónico. El VHB no codifica ningún oncogén y tampoco se integra cerca de ningún oncogén conocido, como *NMYC*. Parece probable que la transformación neoplásica se produzca porque el VHB induce ciclos repetidos de muerte y regeneración de los hepatocitos, los cuales aumentan el riesgo de que se acumulen mutaciones durante las distintas rondas de replicación celular. La infección por la duela hepática *Clonorchis sinensis* predispone al carcinoma de conductos biliares hepáticos. A diferencia del carcinoma de colon, no se sabe si el carcinoma hepatocelular se origina sobre un adenoma. El síndrome de carcinoma de colon hereditario no poliposo se asocia a trastornos hereditarios en los genes de reparación de errores del ADN.

57 **B** La aflatoxina es una hepatotoxina producto del hongo *Aspergillus flavus*, que crece en el cereal mohoso. La aflatoxina puede ser un carcinógeno y producir el carcinoma hepatocelular, como muestra la figura. La ingesta de grandes cantidades de paracetamol ocasiona necrosis hepatocelular. El ácido acetilsalicílico se ha implicado como causa del síndrome de Reye en niños. Este síndrome se asocia a una esteatosis microvesicular extensa. Una ingesta prolongada y excesiva de hierro oral raramente puede producir una hemocromatosis secundaria. Los nitritos se han vinculado como causa de cáncer de la vía digestiva alta. Las ostras pueden concentrar el virus de la hepatitis A (VHA) procedente de agua de mar contaminada con residuos, por lo que la ingesta de ostras crudas puede ocasionar una infección por el VHA.

58 **A** Estos hallazgos sugieren una ictericia obstructiva por enfermedad de la vía biliar (p. ej., cálculos). El aumento de la concentración de fosfatasa alcalina sérica es característico de la colestasis secundaria a una obstrucción biliar. La fosfatasa alcalina se produce en el epitelio del conducto biliar y la membrana canalicular del hepatocito. La concentración de

amoníaco en sangre aumenta al agravarse la insuficiencia hepática. Cuando la insuficiencia hepática es lo bastante grave como para asociarse a una hiperamoniemia, se produce obnubilación mental. En este caso, la paciente solo tiene ictericia. La cirrosis biliar primaria con aumento de los títulos de anticuerpos antimitocondriales es mucho menos frecuente y la CBP acaba produciendo la destrucción de los conductos biliares. La mayor parte de los casos de infección activa por el VHC se asocian a cierto grado de inflamación con fibrosis. En la enfermedad obstructiva de la vía biliar debería elevarse la bilirrubina directa, no la indirecta.

59 **B** El dolor intermitente en la parte superior del abdomen, sobre todo en el lado derecho, es un síntoma inespecífico que se encuentra a menudo en pacientes con cálculos. Cuando el cálculo se elimina por el conducto cístico y llega al colédoco o se forma dentro de este último, aparece una colestasis intrahepática. Esto explica la hiperbilirrubinemia conjugada y la elevación de la concentración de fosfatasa alcalina. La mayor parte de los casos de quistes del colédoco, que son mucho menos frecuentes que los cálculos biliares, están descritos en Japón; la estasis biliar fomenta la infección con hidrólisis de los diglucurónidos de bilirrubina y formación de cálculos pardos. La congestión pasiva crónica secundaria a una insuficiencia cardíaca no produce hiperbilirrubinemia. Las hemoglobinopatías con riesgo de hemólisis se asocian sobre todo a hiperbilirrubinemia no conjugada. La hepatitis vírica activa se debería asociar a cierto grado de necrosis hepatocelular con elevación de las enzimas hepáticas. La colitis ulcerosa se asocia a colangitis esclerosante. La enfermedad venooclusiva es infrecuente y se manifiesta con hiperbilirrubinemia y colestasis, pero no con obstrucción de la vía biliar.

60 **C** La figura muestra cálculos de colesterol. Estos son de color amarillo pálido, pero su aspecto varía en función de los pigmentos biliares que atrapan. En comparación, los cálculos pigmentarios son oscuros de forma uniforme. Entre los factores de riesgo para el desarrollo de estos cálculos de colesterol están ser nativo americano, el sexo femenino, la obesidad y la edad. Estos factores determinan que la bilis secretada esté

sobresaturada de colesterol. Los pacientes con hemólisis de eritrocitos desarrollan cálculos pigmentarios, tanto si se trata de una hemólisis mediada por anticuerpos (anemia hemolítica autoinmunitaria) como si es una causada por alteraciones intrínsecas de los eritrocitos (hemoglobinopatías como la drepanocitosis). La infección de la vía biliar (*Escherichia coli, Ascaris* o duelas hepáticas) puede incrementar la liberación de β-glucuronidasas, que hidrolizan los glucurónidos de bilirrubina, lo que favorece la formación de cálculos pigmentarios. La insuficiencia renal con retención de fosfatos puede ser causa de un hiperparatiroidismo secundario con hipercalcemia, lo que incrementa el riesgo de formación de cálculos. Estos serán de tipo mixto. La hepatitis vírica no es un factor de riesgo para la litiasis. Los alimentos ricos en grasas pueden desencadenar un cólico biliar, pero la dieta no participa de forma directa en la formación de cálculos. La disfunción grave del íleon, como se describe en la enfermedad de Crohn, también puede predisponer a la aparición de cálculos pigmentarios.

61 **E** Este paciente presenta una colecistitis alitiásica. La taquicardia, la hipotensión y la sepsis secundaria a su reciente enfermedad sugieren que ha tomado pocos líquidos y se ha deshidratado, lo que ha condicionado la concentración de la bilis y facilitado su estasis. La sepsis favorece la hipotensión, con aumento de la isquemia de la vesícula biliar. Sin embargo, un incremento aislado *de novo* de la bilirrubina en un paciente hospitalizado debería plantear la posibilidad de una sepsis. El adenocarcinoma de páncreas puede obstruir la vía biliar, pero la TC de este paciente no identificó ninguna masa. La TC debería también identificar posibles cálculos presentes. La colestasis intrahepática suele ser una reacción adversa frente a un fármaco.

62 **B** Casi todos los carcinomas de vesícula biliar son adenocarcinomas y la mayor parte afectan a vesículas que albergan cálculos. Aunque el alcoholismo crónico se asocia a hepatopatía, no es un antecedente importante para la enfermedad vesicular. La infección por la duela de la vía biliar *Clonorchis sinensis* es un factor de riesgo de carcinoma de la propia vía, pero no de la vesícula biliar. La colangitis esclerosante primaria también aumenta el riesgo de desarrollar

un colangiocarcinoma. La colitis ulcerosa se asocia a colangitis esclerosante primaria.

CAPÍTULO

19

Páncreas

PEF9 Capítulo 19: Páncreas

PH9 Capítulo 16: Páncreas



1 Una mujer de 24 años, G2, P1001, se somete a una ecografía de control en la semana 17 de gestación y muestra polihidramnios. Da a luz un niño a término sin alteraciones en la exploración. Desde su nacimiento ha vomitado con frecuencia tras las tomas. La figura corresponde a los hallazgos de la radiografía con contraste realizada al lactante. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de sodio de 130 mmol/l; de potasio de 3,4 mmol/l; de cloruro de 85 mmol/l; de CO_2 de 32 mmol/l; de glucosa de 65 mg/dl, y de amilasa de 15 UI/l. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Pancreatitis aguda
B Páncreas anular
C Pancreatitis crónica
D Adenoma de células de los islotes
E Adenocarcinoma de páncreas
F Estenosis pilórica

2 Un chico de 16 años sufre una herida por arma de fuego en el abdomen durante un tiroteo. En la laparotomía exploradora, la cirujana encuentra una perforación de yeyuno. Procede a extirparla y palpa una masa en la submucosa del yeyuno. Al corte se observa que la lesión es una masa bien delimitada, sólida y parduzca de 1,5 cm de diámetro. Se envía para su estudio intraoperatorio. ¿Qué es más probable que encuentre la patóloga en el estudio histológico?

A Adenocarcinoma
B Médula suprarrenal
C Mucosa gástrica
D Linfoma no hodgkiniano
E Ácinos pancreáticos

3 Se realiza una TC abdominal a una mujer de 33 años para la estadificación del linfoma de Hodgkin de los ganglios cervicales que sufre. En la TC se identifica un quiste solitario de 4 cm en la cabeza del páncreas. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina y se obtiene líquido seroso claro, que, microscópicamente, contiene células cúbicas bajas sin atipias. ¿Qué es más probable que sea este quiste?

A Adenocarcinoma
B Un componente de la poliquistosis renal autosómica dominante
C Malformación congénita
D Cistoadenoma seroso
E Seudoquiste

4 Se realiza un estudio clínico sobre pacientes con un abdomen agudo. Se identifica a pacientes con aumento de la concentración de la lipasa sérica. ¿Cuál de los siguientes valores analíticos es más probable que prediga mal pronóstico cuando su concentración sea baja?

A Albúmina
B Bilirrubina

C Calcio
D Fibrinógeno
E Haptoglobina

5 Un hombre de 35 años refiere brotes de dolor abdominal sordo de 1 año de evolución. Durante los 5 años siguientes desarrolla también esteatorrea y leve intolerancia a la glucosa. No presenta ictericia. La TC abdominal revela calcificación moteada en el tercio medio del abdomen, sobre todo cerca del duodeno. Una de sus hermanas presenta un cuadro clínico parecido, aunque los dos padres no. ¿La pérdida de inhibición de cuál de los siguientes factores es más probable que cause la enfermedad en estos pacientes?

A Amilasa
B Complemento
C Lipasa
D Factor de crecimiento transformante β (TGF-β)
E Tripsina



6 Un hombre de 52 años lleva 2 días con dolor abdominal intenso. La exploración física revela rigidez en tabla de los músculos abdominales, lo que dificulta la exploración. No muestra distensión abdominal. La figura se corresponde con el aspecto macroscópico representativo de este proceso patológico. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que produzca este aspecto?

A Mutación del gen *CFTR*
B Infección por el virus de Coxsackie B
C Desregulación de la inactivación del tripsinógeno
D Hipertrigliceridemia marcada
E Vasculitis con isquemia aguda
F Traumatismo abdominal cerrado enérgico

7 Un niño de 11 años ha presentado brotes múltiples de dolor abdominal intenso durante los últimos 6 años, sin otros problemas médicos. Su padre y su abuelo presentan un proceso parecido. En la exploración realizada durante el último episodio no se identificaron ruidos intestinales y el paciente presentaba dolor abdominal difuso intenso con rigidez de la pared abdominal. La radiografía revela asas intestinales dilatadas con niveles hidroaéreos. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de amilasa sérica de 3.320 U/l. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que esté afectado por una mutación hereditaria en este paciente?

A *CFTR*
B *KRAS*
C *PRSS1*
D *SMAD4*
E *SPINK1*

8 Una mujer de 38 años con antecedentes de enfermedad vesicular de larga evolución desarrolla de forma súbita un intenso dolor abdominal medio. En la exploración física presenta marcada hipersensibilidad abdominal, sobre todo en la parte superior del abdomen, con reducción de los sonidos intestinales. La radiografía abdominal simple no revela aire libre, pero se identifica un marcado edema de tejidos blandos. La TC abdominal muestra una reducción de la atenuación con densidad líquida que afecta al páncreas. Se le administran líquidos intravenosos y se le coloca una sonda nasogástrica, tras lo cual se recupera de forma gradual. ¿La determinación en suero de cuál de las siguientes sustancias es más útil para establecer el diagnóstico de su enfermedad?

A Alanina aminotransferasa
B Amoníaco
C Bicarbonato
D Bilirrubina

E Glucosa
F Amilasa

9 Un hombre de 63 años que había sufrido insuficiencia cardíaca congestiva progresiva con arritmias durante el último año de vida falleció por una neumonía. En la autopsia, el páncreas parece pequeño y con fibrosis densa. Su estudio histológico revela extensa atrofia acinar con inflamación crónica residual, fibrosis y tapones de proteínas densos en unos conductos pancreáticos pequeños y obstruidos. Algunos de los tapones de proteínas muestran calcificaciones. Los islotes de Langerhans son normales. El corazón pesa 500 g y las cuatro cámaras están dilatadas. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que explique estos hallazgos?

A Deficiencia de α_1-antitripsina
B Traumatismo abdominal cerrado
C Colelitiasis
D Alcoholismo crónico
E Fibrosis quística
F Hipercolesterolemia

10 Un hombre de 39 años ha sufrido numerosos brotes de neumonía por *Pseudomonas aeruginosa* y *Burkholderia cepacia* durante los últimos 35 años. Actualmente presenta una diarrea de volumen de escaso a moderado. En la exploración física destaca una reducción del murmullo vesicular con matidez a la percusión de ambos pulmones. La prueba de sangre oculta en heces con guayacol es negativa. Las pruebas de laboratorio revelan la mutación ΔF508. En heces se detectan 7,5 g/día de grasa. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable que se encuentre en el páncreas de este paciente?

A Inflamación aguda
B Atrofia acinar
C Adenocarcinoma
D Amiloidosis
E Seudoquiste

11 Una mujer de 36 años con antecedentes de infecciones pulmonares desde la infancia refiere dolor abdominal crónico desde hace 4 años y una pérdida de 6 kg de peso. En la exploración física su IMC es de 18. Se identifica edema con fóvea en la parte

distal de la extremidad inferior. Las pruebas de laboratorio indican cifras de albúmina sérica de 3 g/dl, de proteínas totales de 5,2 g/dl y de glucosa de 155 mg/dl. La TC abdominal revela calcificaciones en la parte superior del abdomen, posteriores al estómago. No se identifican masas. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que tenga una mutación?

A *CFTR*
B *KRAS*
C *PRSS1*
D *SPINK1*
E *VHL*

12 Una mujer de 65 años refiere dolor abdominal alto desde hace 1 mes. A la palpación, el dolor se localiza en la región epigástrica. La TC abdominal muestra una masa bien delimitada de 8 cm en la cola del páncreas con muchas áreas pequeñas llenas de líquido. Durante la laparotomía se extirpa una masa y el estudio histológico muestra células cúbicas bajas ricas en glucógeno que rodean unos espacios llenos de líquido claro. La lesión no recidiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Adenocarcinoma
B Poliquistosis renal autosómica dominante
C Pancreatitis crónica
D Fibrosis quística
E Seudoquiste
F Cistoadenoma seroso

13 Una mujer de 46 años presenta dolor abdominal intenso desde hace 2 días. En la exploración física se identifica dolor epigástrico intenso con reducción de los ruidos abdominales. Las pruebas de laboratorio indican una elevación de la concentración de lipasa sérica. Se realiza tratamiento de mantenimiento y el cuadro agudo cede en 7 días. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que presente esta paciente?

A Ulceración gástrica
B Hemoperitoneo
C Coma hiperosmolar
D Cetoacidosis
E Formación de seudoquistes
F Infarto del intestino delgado



14 Una mujer de 58 años tiene dolor abdominal durante el último año. A la palpación se observa hipersensibilidad en el tercio medio epigástrico. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de lipasa sérica normal. La figura corresponde a su TC abdominal. Se extirpa la lesión y el estudio histológico revela células con atipia citológica y arquitectural pero que no infiltran el parénquima pancreático adyacente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Adenocarcinoma
B Poliquistosis renal autosómica dominante
C Neoplasia mucinosa quística
D Fibrosis quística
E Tumor de células de los islotes no funcionante
F Seudoquiste



15 Una mujer de 79 años pertenece a una secta religiosa que sigue el lema «Evita todo lo que suene a diversión» y al seguirlo ha evitado muchos factores de riesgo de enfermedad y ha estado sana. Durante los últimos 7 meses ha presentado un vago dolor abdominal y ayer presentó dolor torácico agudo con disnea. La TC torácica y abdominal muestra una embolia pulmonar. La figura corresponde a la TC abdominal. Las pruebas de laboratorio revelan un incremento de CEA y de CA19-9. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que esté mutado para el desarrollo de esta masa?

A *APC*
B *BRCA2*
C *CFTR*
D *KRAS*
E *PRSS1*
F *SPINK1*

16 Una mujer de 73 años ha observado una pérdida de 10 kg de peso en los últimos 3 meses. Presenta una ictericia progresiva y refiere un dolor epigástrico vago constante, con náuseas y episodios de diarrea y flatulencia. En la exploración física se encuentra afebril. Hay una ligera hipersensibilidad a la palpación de la parte superior del abdomen, pero los ruidos intestinales se conservan. No se encuentra sangre oculta en heces. En las pruebas de laboratorio destacan una concentración de bilirrubina sérica

total de 11,6 mg/dl y de bilirrubina directa de 10,5 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes trastornos pancreáticos es más probable que se encuentre en este paciente?

A Adenocarcinoma
B Pancreatitis crónica
C Fibrosis quística
D Adenoma de células de los islotes
E Seudoquiste

17 Un hombre de 68 años refiere un dolor abdominal sordo pero constante que se asocia a náuseas y vómitos desde hace 8 meses. En la exploración física destaca hipersensibilidad a la palpación de la parte superior del abdomen. La TC abdominal revela una masa delimitada de 2 cm en el cuerpo del páncreas. Se realiza una pancreatectomía y el estudio histológico de la masa muestra células epiteliales cilíndricas altas mucinosas, que revisten unas excrecencias papilares dentro del conducto pancreático principal. Se observa mínima atipia y no se identifican fenómenos de infiltración. ¿Cuál es la evolución más probable de este paciente en el futuro?

A Neoplasias digestivas adicionales
B Remisión completa
C Desarrollo de tumores malignos extraabdominales
D Recidivas locales
E Formación de seudoquistes

18 Un hombre de 80 años presenta ictericia progresiva con dolor abdominal desde hace 2 semanas. Ha perdido 4 kg de peso en los últimos 5 meses. En la exploración física destaca hipersensibilidad con vesícula palpable en el cuadrante superior derecho. La TC abdominal revela dilatación de la vesícula y del colédoco, además de una masa de 3 cm en la cabeza del páncreas. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más probable que sea precursora de esta masa?

A Carcinoma neuroendocrino de colon
B Adenocarcinoma de duodeno
C Tumor neuroendocrino
D Neoplasia intraepitelial pancreática
E Cistoadenoma seroso

Respuestas

1 **B** Cuando las yemas ventral y dorsal del páncreas embrionario no rotan ni se fusionan de forma adecuada, el duodeno puede quedar rodeado por tejido pancreático, lo que se traduce en su obstrucción, cuadro que se llama *páncreas anular.* Según el grado de obstrucción, este puede manifestarse desde el nacimiento, durante la infancia o en la edad adulta. La presencia de polihidramnios sugiere una obstrucción digestiva alta intrauterina. La radiografía muestra una región de estenosis duodenal provocada por el páncreas circundante. La ecografía podría identificar el signo de la doble burbuja con distensión gástrica y del bulbo duodenal con presencia de aire proximal a la región de obstrucción duodenal. La pancreatitis aguda y crónica se debería asociar a dolor abdominal y a un aumento de la concentración de amilasa sérica; en general no produce una obstrucción mecánica del intestino, aunque la inflamación podría provocar íleo paralítico. Las neoplasias son lesiones focales que pueden obstruir la vía biliar y el conducto pancreático, pero en general no obstruyen el duodeno. La estenosis pilórica se encuentra en neonatos y lactantes pequeños, pero en general a las 2-3 semanas del parto y produce vómitos en proyectil y una masa epigástrica palpable.

2 **E** Este hallazgo incidental es compatible con un páncreas ectópico, que puede encontrarse en el intestino hasta en el 2% de los individuos. Puede asociarse a divertículo de Meckel, aunque en este paciente no se encontró ningún divertículo, el cual debería estar localizado en el íleon distal como resto del conducto vitelino. El adenocarcinoma es poco probable en un niño adolescente, y el adenocarcinoma primario de intestino delgado es poco frecuente. Pueden encontrarse restos de corteza suprarrenal en la pelvis, pero en general no en los intestinos. La mucosa gástrica ectópica también se asocia, sobre todo, a un divertículo de Meckel. Los linfomas no hodgkinianos intestinales producen masas más grandes y, en general, afectan a ancianos.

3 **C** Se trata de un *incidentaloma,* o hallazgo sin más importancia clínica que la necesidad de reconocerlo para no hacer nada. La realización de más pruebas diagnósticas aportará más datos sin

importancia para la salud del paciente. Siga la norma de los pescadores: pesque y suelte la presa. La poliquistosis se caracteriza por múltiples quistes, que también son benignos, pero muestran tendencia a sangrar o infectarse. Si no existen características proliferativas adicionales, posiblemente no se trate de una neoplasia. Un seudoquiste es una complicación de una pancreatitis y se reviste de tejido de granulación.

4 **C** La pancreatitis aguda se caracteriza por la liberación de enzimas, lo que produce áreas de necrosis grasa que son parecidas al yeso, con precipitación de calcio y con la consiguiente disminución de la calcemia. Cuanto más grave sea la inflamación, menor será la calcemia. La hipoalbuminemia más probablemente se desarrolle como una complicación de la pancreatitis crónica con malabsorción. Puede producirse una hiperbilirrubinemia en casos de pancreatitis inducida por cálculos, aunque la concentración de bilirrubina no orienta sobre la gravedad de la pancreatitis. El fibrinógeno es un reactante de fase aguda cuya concentración aumenta con la inflamación, pero no se correlaciona bien con su localización o extensión. La haptoglobina sérica disminuye con la hemólisis.

5 **E** Esta forma de pancreatitis hereditaria autosómica recesiva se debe a una activación anómala de la tripsina, que genera una cascada de episodios que culmina en una pancreatitis aguda. El gen del *inhibidor de la proteasa de serina Kazal de tipo 1 (SPINK1)* codifica un inhibidor de la tripsina secretora pancreática. La activación de la tripsina también condiciona la activación del factor de Hageman, la calicreína y el complemento, que inducen las alteraciones vasculares en la pancreatitis. Las mutaciones de *SPINK1* y *PRSS1* se asocian a un aumento muy importante del riesgo de cáncer de páncreas. En la pancreatitis se liberan amilasa y lipasa como consecuencia de la activación de la tripsina. El TGF-β interviene en la fibrogenia de la pancreatitis crónica.

6 **C** La figura muestra una pancreatitis hemorrágica aguda con focos de necrosis grasa con un aspecto blanquecino parecido al yeso. Una causa fundamental de la pancreatitis aguda es la activación inadecuada de las enzimas digestivas en los ácinos y la consiguiente autodigestión del páncreas. Estas enzimas

existen como proenzimas en los ácinos y son activadas por la tripsina. Esta deriva del tripsinógeno, y cualquier alteración que impide una inactivación regulada del tripsinógeno puede condicionar una activación excesiva mediada por la tripsina de otras enzimas digestivas, como la lipasa, la amilasa y la elastasa. La evidencia de este mecanismo deriva de la observación de que la infrecuente pancreatitis hereditaria, producida por mutaciones en la línea germinal que afectan a un lugar de la molécula del tripsinógeno catiónico esencial para la degradación de la tripsina por la propia tripsina, se caracteriza porque el tripsinógeno y la tripsina se vuelven resistentes a la inactivación y la tripsina activada de forma anómala activa a su vez a otras proenzimas digestivas, con la consiguiente aparición de la pancreatitis. La obstrucción del conducto pancreático por cálculos es el episodio que con más frecuencia precipita la activación del tripsinógeno. La mutación del gen *CFTR* puede producir una pancreatitis crónica, incluso en ausencia de fibrosis quística. Las infecciones víricas, la hipertrigliceridemia, la vasculitis y los traumatismos son causas menos frecuentes de pancreatitis.

7 **C** Este chico tiene evidencias de pancreatitis de repetición, caracterizada por dolor abdominal intenso, íleo paralítico e hiperamilasemia. La aparición de pancreatitis en un niño sugiere una base genética, y los antecedentes familiares de afectación de un padre y un abuelo son sugestivos de transmisión autosómica dominante. El gen *PRSS1* codifica el tripsinógeno catiónico, cuya mutación determina la resistencia de la tripsina a la inactivación. El gen *SPINK1* codifica un inhibidor de la tripsina, y su mutación puede ocasionar pancreatitis, pero la herencia es autosómica recesiva. La mutación del gen *CFTR* puede producir fibrosis quística, pero a los 11 años ya deberían existir problemas pulmonares y los brotes de pancreatitis no suelen ser tan graves. *KRAS* (un oncogén) y *SMAD4* (un gen supresor de tumor) están implicados en el desarrollo de adenocarcinomas de páncreas.

8 **F** Las características clínicas y la enfermedad previa de la vesícula biliar son sugestivas de pancreatitis aguda. Este diagnóstico se confirma por el aspecto del páncreas en los

estudios radiológicos. La amilasa sérica y la lipasa en suero y orina aumentan con rapidez tras un ataque de pancreatitis aguda. Estas enzimas son liberadas por los ácinos pancreáticos necróticos. Pueden producirse alteraciones de las pruebas de función hepática en los pacientes con una pancreatitis secundaria a cálculos, pero no permiten confirmar la afectación del páncreas. Una concentración de ALT elevada es más característica de lesión celular hepática. La hiperamoniemia es una característica de la insuficiencia hepática. Aunque las células acinares pancreáticas pueden producir bicarbonato, sus concentraciones no se correlacionan bien con la pancreatitis. La bilirrubina puede estar elevada cuando se expulsa un cálculo por la vía biliar, pero no confirma la existencia de enfermedad pancreática. En la pancreatitis aguda, los islotes de Langerhans siguen funcionando, pero es típico que no sean hiperactivos.

9 **D** Este paciente presenta pancreatitis crónica. El alcohol induce la activación intracelular de las proenzimas, lo que condiciona una lesión de las células acinares. Aunque se desconoce el mecanismo exacto para el desarrollo de pancreatitis con el alcoholismo, en muchos casos se observa producción de una secreción pancreática rica en proteínas con formación de tapones densos y obstrucción ductal. Esta última predispone a la lesión acinar, y las lesiones persistentes o repetidas conducen a pancreatitis crónica. Los pacientes con antecedentes de alcoholismo crónico pueden sufrir brotes de pancreatitis crónica que no se detectan y solo sufrir una pancreatitis aguda superpuesta con repercusión clínica. El alcohol, los fármacos, los traumatismos y los virus pueden ejercer un efecto lesivo directo sobre las células acinares exocrinas pancreáticas. En el alcoholismo crónico también se produce una miocardiopatía dilatada, como ocurre en este caso. La deficiencia de α_1-antitripsina puede ocasionar una hepatopatía con hepatitis crónica, cirrosis o ambos. Los traumatismos abdominales cerrados pueden producir hemorragia, en ocasiones asociada a componentes de pancreatitis aguda. La fibrosis quística reduce la excreción de bicarbonato y estimula la formación de tapones de proteínas en los conductos, pero suele cursar como una pancreatitis crónica subclínica, con malabsorción de grasas y

vitaminas liposolubles y, en función de la mutación de *CFTR,* en estos pacientes pueden faltar otros rasgos de la fibrosis quística. La hipercolesterolemia (normalmente de al menos 1.000 mg/dl o más) puede ocasionar pancreatitis aguda, igual que la colelitiasis.

10 **B** La fibrosis quística es un proceso autosómico recesivo que se debe a una alteración del gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística *(CFTR).* La mutación más frecuente es ΔF508. Se producen unas secreciones anómalamente viscosas que afectan al páncreas y determinan una obstrucción de los conductos, con aparición de una pancreatitis crónicos con atrofia acinar. Finalmente, se pierde la función exocrina. La pancreatitis aguda y crónica florida con clínica y la complicación de la inflamación denominada *seudoquiste* no se producen típicamente en este contexto. La fibrosis quística no es un factor de riesgo para el desarrollo de adenoma o carcinoma de páncreas. Puede producirse un depósito de material amiloide en los islotes de Langerhans de los diabéticos de tipo 2, pero el depósito generalizado de amiloide en el páncreas es poco frecuente.

11 **A** La paciente tiene una pancreatitis crónica. Este cuadro se podría atribuir al alcoholismo, pero la causa verdadera puede no estar clara y muchos casos de pancreatitis se han llamado idiopáticos. Las pruebas genéticas pueden mostrar una mutación del gen *CFTR.* Existen cientos de mutaciones de este tipo y no todas se asocian a neumopatía, pero pueden producir otras manifestaciones clínicas, como pancreatitis. En los adenocarcinomas existen mutaciones de *KRAS.* Las mutaciones de *PRSS1* y *SPINK1* se asocian a pancreatitis hereditaria y también aumentan el riesgo de carcinoma de páncreas, pero ninguno se asocia a neumopatía. Las mutaciones de *VHL* pueden encontrarse en el cistoadenoma seroso.

12 **F** La mayor parte de los quistes pancreáticos no son neoplásicos, como sucede en los seudoquistes y en los quistes aislados que se asocian a poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD). Es poco probable que la PQRAD afecte al páncreas en ausencia de cambios poliquísticos en unos riñones aumentados de tamaño. Esta mujer tiene una masa solitaria con

características de un cistoadenoma seroso benigno. Los adenocarcinomas son neoplasias más invasivas que raras veces se curan mediante cirugía porque suelen ser grandes e infiltrantes cuando se diagnostican. Se trata, en general, de masas sólidas, aunque pueden mostrar áreas de necrosis. La pancreatitis crónica produce fibrosis. La fibrosis quística puede ocasionar una pancreatitis crónica. El páncreas suele ser pequeño y fibrótico en la pancreatitis crónica. El seudoquiste se forma, en general, en pacientes con una extensa destrucción del páncreas con inflamación aguda, típicamente en la pancreatitis aguda, o con inflamación aguda superpuesta sobre inflamación crónica, como sucede en el alcoholismo crónico.

13 **E** Durante la pancreatitis aguda, la extensión de la necrosis puede ser tan grave que el área de licuefacción se rodee de tejido de granulación con formación de una masa quística. Sin embargo, como el quiste no tiene ningún revestimiento epitelial, se debería hablar mejor de *seudoquiste.* Aunque el páncreas es inferior y posterior al estómago, es típico que la inflamación no se extienda a dicho órgano. Si bien la pancreatitis aguda puede ser hemorrágica, la hemorragia se limita al cuerpo del páncreas y al tejido fibroadiposo circundante. Los islotes de Langerhans suelen conservar su función a pesar de la intensa inflamación parenquimatosa. La falta de insulina no es una característica de la pancreatitis. Es poco probable que la inflamación comprometa la irrigación de los órganos abdominales y ocasione un infarto.

14 **C** La TC muestra una masa quística multilocular delimitada. Los tumores mucinosos pancreáticos pueden ser completamente benignos, intermedios *(borderline)* o malignos. La presencia de atipia citológica y arquitectural (displasia de bajo grado) es indicativa de que la lesión no es totalmente benigna, pero cuando no existen rasgos claramente malignos, como infiltración o metástasis, la lesión se debe incluir dentro de la categoría *borderline.* Esta terminología «indefinida» resulta frustrante para los profesionales sanitarios y los pacientes, pero con frecuencia no existen respuestas sencillas a la hora de abordar estas neoplasias. Sin embargo, con el tiempo puede aparecer un adenocarcinoma sobre una neoplasia mucinosa quística. Los adenocarcinomas de páncreas son neoplasias sólidas más

invasivas, de mal pronóstico en general. Los quistes de la PQRAD son benignos y aparecen dispersos por todo el páncreas sin condicionar un efecto de masa; la TC de este caso no muestra quistes renales. La fibrosis quística puede producir una pancreatitis crónica, pero no una neoplasia pancreática. Los tumores de las células de los islotes son masas sólidas, en general, bastante pequeñas cuando son benignas y en ocasiones se asocian a producción hormonal. Un seudoquiste es una estructura inflamatoria originada sobre una pancreatitis con necrosis extensa y no se trata de una neoplasia.

15 **D** La mortalidad es inexorable. La prevalencia de cáncer esporádico (sin factores de riesgo hereditario identificables) aumenta con la edad. La figura muestra una masa irregular que ocupa la mayor parte del cuerpo y la cola del páncreas, además de metástasis hepáticas. Esta paciente presenta un adenocarcinoma de páncreas con síndrome de Trousseau (situación de hipercoagulabilidad paraneoplásica), con aparición de una tromboembolia pulmonar. Los marcadores tumorales CEA y CA19-9 suelen estar aumentados, pero resultan insensibles para establecer un diagnóstico precoz del cáncer de páncreas. Las mutaciones de *KRAS* se encuentran en más del 90% de los adenocarcinomas de páncreas. Las mutaciones del gen *APC* aparecen en las formas hereditarias y esporádicas de adenocarcinoma de colon. Las mutaciones de *BRCA2* están descritas en algunos cánceres pancreáticos, pero en general existen antecedentes familiares de cáncer de ovario y mama. Las mutaciones de *CFTR* se asocian a fibrosis quística, que no es un riesgo de cáncer de páncreas. Las mutaciones de *PRSS1* determinan riesgo de adenocarcinoma de páncreas, pero el paciente debería tener antecedentes de pancreatitis crónica de aparición en edades tempranas de la vida. Las mutaciones de *SPINK1* se asocian también a pancreatitis hereditaria y a un riesgo significativo de cáncer de páncreas.

16 **A** La pérdida de peso y el dolor son sugestivos de una neoplasia maligna. La ictericia (hiperbilirrubinemia conjugada) aparece por la obstrucción biliar ocasionada por una masa en la cabeza del páncreas. Este carcinoma puede también cursar como una «ictericia indolora», pero es más probable que infiltre los

nervios que rodean al páncreas y produzca dolor. El adenoma de las células de los islotes no es tan frecuente como el carcinoma de páncreas. Un adenoma localizado cerca de la ampolla podría tener un efecto parecido a un carcinoma, aunque es poco probable que este tipo de lesiones condicione pérdida de peso. La pancreatitis crónica no suele obstruir la vía biliar. En la fibrosis quística se produce una atrofia progresiva de los ácinos pancreáticos sin efecto de masa. La mayor parte de los seudoquistes asociados a pancreatitis se localizan en la región del cuerpo del páncreas o en su cola, pero no en su cabeza, y no se trata de neoplasias.

17 **B** Este paciente presenta una neoplasia mucinosa papilar intraductal (NMPI) del páncreas. Si se descubren de forma temprana y cuando son lesiones pequeñas, pueden no ser infiltrantes y curarse mediante cirugía sin recidiva. Con el tiempo pueden progresar y mostrar displasia más grave, con aparición de un adenocarcinoma. No es probable que sea parte de un síndrome con aparición de otras neoplasias. Si se reseca el páncreas, no hay opciones de que se forme un seudoquiste.

18 **D** Este paciente tiene más probabilidades de presentar un adenocarcinoma de páncreas. El diagnóstico de una neoplasia intraepitelial pancreática (NIPan) en este estadio es casi imposible. La presencia de una vesícula biliar dilatada y palpable se denomina signo de Courvoisier y se debe a una obstrucción de la vía biliar por una neoplasia. A pesar de este signo, el cáncer ha tenido tiempo para infiltrar y es poco probable curarlo, por lo que el pronóstico del adenocarcinoma de páncreas es malo. A pesar de todo, existen algunos quimioterápicos y tratamientos con fármacos biológicos monoclonales que podrían retrasar la evolución del tumor y prolongar la supervivencia. Es poco probable que esta masa solitaria sea una metástasis. Los carcinomas primarios de intestino delgado son infrecuentes. Los tumores neuroendocrinos que pueden originarse en los islotes de Langerhans suelen ser benignos cuando son pequeños y no evolucionan a adenocarcinoma. Los cistoadenomas serosos pancreáticos son casi todos benignos y posiblemente sean quísticos.

CAPÍTULO

20

Riñón

PEF9 Capítulo 20: Riñón

PH9 Capítulo 13: Riñón y sistema colector

1 Un hombre de 71 años ha notado una disminución de la diuresis < 500 ml/día durante los últimos 3 días. La exploración física revela unas constantes vitales con temperatura de 37 °C, frecuencia cardíaca de 88 latidos/min, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones/min y presión arterial de 85/60 mmHg. Muestra edema periférico y estertores difusos a la auscultación torácica. El análisis de orina revela una densidad de 1,019, sin presencia de proteínas, sangre, glucosa, cetonas, eritrocitos, leucocitos o cilindros. La concentración de creatinina sérica es de 3,3 mg/dl, y la de nitrógeno ureico, de 62 mg/dl. La excreción fraccionada de sodio (EF_{Na}) es < 1%. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que tenga?

A Miocardiopatía dilatada
B Nefropatía membranosa
C Hiperplasia prostática
D Lupus eritematoso sistémico
E Carcinoma urotelial

2 Una mujer de 36 años ha observado un malestar creciente desde hace 3 semanas y una diuresis < 500 ml/día durante los últimos 4 días. La exploración revela una presión arterial de 170/112 mmHg y edema periférico. El análisis de orina encuentra proteínas 1+ y sangre 3+, sin glucosa o cetonas. El análisis microscópico de la orina revela eritrocitos y cilindros de eritrocitos. La concentración de nitrógeno ureico en suero es de 39 mg/dl, y la de creatinina, de 4,3 mg/dl. Se encuentra una disminución de los componentes C1q, C3 y C4 del complemento en el suero. Se realiza una biopsia renal, cuya inmunofluorescencia confirma un patrón granular de tinción

con el anticuerpo frente a C3. ¿Cuál de los siguientes tipos de reacciones de hipersensibilidad es más probable que cause la nefropatía de esta paciente?

A I (anafilaxia sistémica mediada por IgE)
B II (citotoxicidad dependiente de anticuerpos mediada por células)
C III (formación de inmunocomplejos)
D IV (hipersensibilidad tardía)

3 Un hombre de 29 años con infección crónica por el virus de la hepatitis C ha observado el oscurecimiento de su orina en las últimas 2 semanas. En la exploración se observa hipertensión, sin fiebre. Las pruebas de laboratorio revelan una concentración de creatinina sérica de 3,8 mg/dl y de nitrógeno ureico de 35 mg/dl. Se detectan crioglobulinas. El análisis de orina encuentra eritrocitos y cilindros de eritrocitos. Se realiza una biopsia renal, y su estudio histológico identifica glomérulos hipercelulares lobulados con imagen en doble contorno por separación de las membranas basales adyacentes a los inmunocomplejos subendoteliales. ¿Cuál de las siguientes células es más probable que haya proliferado en estos glomérulos?

A Células yuxtaglomerulares
B Células mesangiales
C Células epiteliales parietales
D Podocitos
E Células endoteliales

4 Un estudio sobre las enfermedades renales identifica a los pacientes que tienen más de 3,5 g de proteínas en una muestra de orina de 24 h, pero no eritrocitos o leucocitos. ¿La disfunción de cuál de las siguientes células es más probable que produzca proteinuria?

A Endotelio
B Mácula densa
C Mesangio
D Epitelio parietal
E Podocitos

5 Un niño de 7 años se está recuperando de impétigo. La exploración física revela cinco costras de color miel en la cara. Se retiran las costras y se cultivan las lesiones, con crecimiento de

Streptococcus pyogenes. Recibe tratamiento antibiótico. Una semana después desarrolla malestar con náuseas y febrícula, y presenta orina parda oscura. Las pruebas de laboratorio revelan un título de antiestreptolisina O sérica de 1:1.024. ¿Cuál de las siguientes evoluciones es más probable en esta nefropatía?

A Insuficiencia renal crónica
B Recuperación completa
C Glomerulonefritis con semilunas
D Cardiopatía reumática
E Infección de la vía urinaria por estreptococos

6 Una chica de 17 años que reside en el Congo lleva 2 años con una enfermedad febril crónica. Durante los últimos 2 días observa que su orina es de color pardo claro. La exploración física revela una presión arterial de 145/95 mmHg. Las pruebas de laboratorio muestran concentraciones de creatinina sérica de 3,7 mg/dl y de nitrógeno ureico de 35 mg/dl. En el análisis de orina se identifica sangre 4+ y proteínas 1+, sin presencia de glucosa, cetonas o leucocitos. La cifra de haptoglobina está baja y la prueba de Coombs es negativa. La concentración de hemoglobina es de 8,5 g/dl. El frotis de sangre periférica identifica escasos trofozoítos en anillo. La inmunofluorescencia de la biopsia renal revela depósitos granulares de IgG y C3 en las membranas basales de los capilares glomerulares. El estudio con microscopia electrónica revela «jorobas» subepiteliales electrodensas. ¿Cuál de las siguientes enfermedades renales es más probable que tenga?

A Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
B Nefritis hereditaria
C Nefropatía IgA
D Nefritis lúpica
E Nefropatía membranosa
F Glomerulonefritis aguda proliferativa



7 Un hombre de 45 años ha notado malestar progresivo, con náuseas y reducción de la diuresis durante los últimos 3 días. La exploración física revela que está afebril y normotenso. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de creatinina sérica de 7,5 mg/dl. En el análisis de orina se encuentra hematuria pero no piuria ni glucosuria. Se realiza una biopsia renal, cuya imagen con microscopio óptico muestra la figura. ¿Cuál de las siguientes pruebas complementarias resulta más útil para clasificar y tratar esta enfermedad?

A Anticuerpos antinucleares
B Anticuerpos frente a la membrana basal glomerular
C Cantidad de copias de ARN del VIH-1
D Inmunoglobulinas cuantitativas séricas
E Factor reumatoide
F Inmunoelectroforesis en orina



8 Un hombre de 21 años previamente sano ha observado la presencia de sangre en su orina desde hace 2 días. No refiere disuria, frecuencia ni dificultades para iniciar el chorro miccional. En la exploración física no se encuentran alteraciones. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de nitrógeno ureico en sangre de 39 mg/dl y de creatinina de 4,1 mg/dl. Se obtiene una biopsia renal; la figura se corresponde con el patrón de la inmunofluorescencia con anticuerpo frente a IgG humana. ¿Cuál de los siguientes hallazgos serológicos es más probable encontrar en este paciente?

A Anticuerpos frente a la membrana basal glomerular
B Anticuerpos antiestreptolisina O
C Factor nefrítico C3
D Anticuerpo de superficie de la hepatitis B
E Anticuerpos frente al VIH

9 Una mujer de 46 años ha presentado malestar progresivo desde hace 36 h. La diuresis se ha reducido de forma notable y la orina tiene un aspecto turbio pardo. En la exploración física presenta edema periorbitario. Entre los hallazgos de laboratorio destacan cifras de creatinina sérica de 2,8 mg/dl y de nitrógeno ureico de 30 mg/dl. Se realiza una biopsia renal, y el estudio histológico revela necrosis focal de los glomérulos con roturas en la membrana basal glomerular y formación de semilunas. No se reconocen depósitos inmunitarios con la inmunofluorescencia. ¿Cuál de los siguientes

autoanticuerpos es más probable detectar en el suero de esta paciente?

A Anticuerpos frente a la ADN topoisomerasa
B Anticuerpos frente a la membrana basal glomerular
C Autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos
D Anticuerpos antinucleares
E Frente a HBsAg

10 Una mujer de 44 años ha desarrollado fiebre, tos sin expectoración y reducción de la diuresis durante los últimos 3 días. En la exploración física tiene una temperatura de 37,7 °C y una presión arterial de 145/95 mmHg. Presenta sinusitis. A la auscultación se identifican crepitantes en todos los campos pulmonares. La radiografía de tórax revela infiltrados y nódulos parcheados bilaterales. La cifra de creatinina sérica es de 4,1 mg/dl, y la de nitrógeno ureico en sangre, de 43 mg/dl. Los resultados serológicos son indicativos de presencia de C-ANCA pero no de ANA. La biopsia renal muestra semilunas glomerulares con lesiones en las arterias pequeñas. Los resultados de la inmunofluorescencia con anticuerpos frente a IgG y C3 son negativos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos es más probable encontrar en esta biopsia?

A Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
B Engrosamiento de la membrana basal glomerular
C Arterioloesclerosis hiperplásica
D Infiltración por neutrófilos
E Proliferación mesangial
F Vasculitis granulomatosa necrotizante

11 Un hombre de 48 años había notado edema progresivo en las extremidades desde hacía 2 meses. La exploración encontró edema generalizado. La muestra de orina de 24 h contenía 4,1 g de proteínas (albúmina y globulinas). El paciente no respondió a un ciclo de tratamiento esteroideo. Se realizó una biopsia renal, y el estudio histológico reveló un engrosamiento difuso de la membrana basal. La tinción de inmunofluorescencia con el anticuerpo frente al componente C3 del complemento resultó positiva con un patrón granular en las asas capilares glomerulares. A los 2 años el paciente presenta malestar progresivo. Las pruebas de laboratorio actuales indican una cifra de creatinina sérica de 4,5

mg/dl y de nitrógeno ureico de 44 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes mecanismos inmunitarios fue el responsable más probable de los cambios glomerulares observados en esta muestra de biopsia?

A Anticuerpos que reaccionan con el colágeno de la membrana basal
B Anticuerpos frente a los estreptococos que determinan una reacción cruzada con la membrana basal
C Linfocitos T citotóxicos frente a antígenos renales
D Depósito de inmunocomplejos en la membrana basal
E Liberación de citocinas por las células inflamatorias

12 Un niño de 7 años se ha vuelvo menos activo en los últimos 10 días. En la exploración física presenta edema facial. El análisis de orina no encuentra sangre, glucosa ni cetonas y el estudio microscópico no identifica cilindros o cristales. La cifra de creatinina sérica es normal. La orina de 24 h contiene 3,8 g de proteínas. Mejora con corticoesteroides. En los 4 años siguientes presenta dos episodios más de proteinuria y ambos responden al tratamiento con corticoesteroides. ¿Qué mecanismo es más probable que produzca esta enfermedad?

A Lesión de las células del epitelio visceral mediada por citocinas
B Lesión de las células del epitelio tubular mediadas por linfocitos T citotóxicos
C Lesión de células mesangiales mediada por IgA
D Lesión glomerular mediada por inmunocomplejos
E Lesión de las células endoteliales inducida por verocitotoxina



13 Un hombre de 44 años refiere malestar progresivo desde hace 1 mes y en este momento se muestra preocupado porque tiene edema creciente en las manos y las piernas. La exploración revela edema generalizado. Está afebril y la presión arterial es de 140/90 mmHg. El análisis de orina revela un pH de 6,5 con una densidad de 1,017, proteinuria 4+ y ausencia de sangre, glucosa o cetonas. El estudio microscópico de la orina no identifica cilindros ni eritrocitos y se encuentran 2 leucocitos por campo de gran aumento. La concentración de proteínas en orina de 24 h es de 4,2 g. Se realiza una biopsia renal, y la tinción mediante inmunofluorescencia con anticuerpos frente al componente C3 del complemento produce el patrón que muestra la figura. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable en este paciente?

A Infección crónica por el virus de la hepatitis B
B Infección por el VIH
C Mieloma múltiple
D Infecciones urinarias de repetición
E Nefrolitiasis

14 Una niña de 6 años está cada vez más letárgica desde hace 2 semanas. En la exploración tiene tumefacción periocular. La temperatura es de 36,9 °C, y la presión arterial, de 100/60 mmHg. Entre los hallazgos de laboratorio destacan cifras de creatinina

sérica de 0,7 mg/dl, de nitrógeno ureico de 12 mg/dl y de colesterol de 217 mg/dl. El análisis de orina revela un pH de 6,5 con densidad de 1,011, proteinuria 4+ y lipiduria, sin sangre o glucosa. La concentración de proteínas en orina de 24 h es de 3,8 g. La situación de la niña mejora tras la administración de glucocorticoides. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de microscopia electrónica es más probable que caracterice este proceso patológico?

A Áreas de engrosamiento y adelgazamiento de la membrana basal
B Borramiento de los pies de los podocitos
C Aumento de la matriz mesangial
D Reduplicación de la membrana basal glomerular
E Jorobas subepiteliales electrodensas



15 Una chica de 12 años refiere malestar progresivo desde hace 2 semanas. En la exploración física se observe edema periorbitario. La niña se encuentra afebril. Las pruebas de laboratorio revelan proteinuria con la tira reactiva, sin hematuria o glucosuria. El estudio microscópico de la orina identifica numerosos cuerpos grasos ovales. La concentración de creatinina sérica es de 2,3 mg/dl. Recibe un ciclo de tratamiento con corticoesteroides, pero no mejora. Se realiza una biopsia renal, y el estudio histológico

muestra que aproximadamente el 50% de los glomérulos están afectados por la lesión que refleja esta figura. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Enfermedad por depósitos densos
B Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
C Enfermedad de cambios mínimos
D Glomeruloesclerosis nodular
E Glomerulonefritis postinfecciosa
F Glomerulonefritis rápidamente progresiva

16 Un hombre de 46 años hispano presenta malestar progresivo con cefaleas y fatigabilidad fácil desde hace 3 meses. La exploración física muestra una presión arterial de 200/100 mmHg. No se palpan masas abdominales ni se identifica hipersensibilidad costovertebral. En las pruebas de laboratorio destacan cifras de hemoglobina de 9,5 g/dl; de hematocrito del 28,3%; de VCM de 92 μm^3; de creatinina de 4,5 mg/dl, y de nitrógeno ureico de 42 mg/dl. El análisis de la orina identifica una hematuria 3+ y una proteinuria 3+, sin glucosa o leucocitos. Se realiza una biopsia renal; su estudio con microscopio de luz muestra que aproximadamente el 50% de los glomérulos son normales, pero el resto tienen una parte del penacho glomerular esclerosada. La tinción con inmunofluorescencia muestra depósito de IgM y C3 en estas áreas escleróticas. Entre sus antecedentes destacan episodios repetidos de orinas oscuras, sin respuesta al tratamiento con corticoesteroides. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que sea responsable de esta enfermedad?

A Unión de anticuerpos frente a la membrana basal glomerular
B Depósito de inmunocomplejos que contienen antígenos microbianos
C Depósito de factor nefrítico C3 (C3NeF)
D Disfunción del aparato del diafragma en hendidura de los podocitos
E Defecto hereditario del colágeno de la membrana basal

17 Una mujer de 38 años se ha sentido cada vez más letárgica durante los últimos 4 meses. En la exploración física está afebril y la presión arterial es de 140/90 mmHg. Los hallazgos de laboratorio indican una concentración de creatinina sérica de 5,8 mg/dl. Se encuentra el factor nefrítico C3 en suero, con la

consiguiente hipocomplementemia, y la determinación de ANA es negativa. El análisis de orina identifica sangre 2+ y proteínas 1+. Se realiza una biopsia renal, cuyo estudio histológico muestra glomérulos hipercelulares con llamativos depósitos a modo de lazos que siguen la lámina densa de la membrana basal glomerular. ¿Cuál de las siguientes formas de glomerulonefritis es más probable que tenga este paciente?

A Glomerulonefritis crónica
B Enfermedad por depósitos densos
C Nefropatía membranosa
D Glomerulonefritis postinfecciosa
E Glomerulonefritis rápidamente progresiva

18 Un hombre de 25 años refiere antecedentes de esprúe celíaco desde hace 5 años. Cuatro días después de una infección respiratoria alta leve, empieza a presentar micciones oscuras de color pardo rojizo. La orina permanece oscura durante los 3 días siguientes y luego se vuelve clara y amarillenta, aunque 1 mes más tarde vuelve a ser de color pardo rojizo. La exploración física no revela alteraciones significativas. El análisis de orina identifica un pH de 6,5; una densidad de 1,018; una hematuria de 3+; una proteinuria de 1+, y ausencia de glucosa o cetonas. El estudio microscópico de la misma revela eritrocitos, sin presencia de leucocitos, cilindros o cristales. La concentración de proteínas en la orina de 24 h es de 200 mg. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable encontrar en los glomérulos de la biopsia renal de esta paciente?

A Proliferación celular difusa y engrosamiento de la membrana basal
B Tinción granular de la membrana basal por anticuerpos frente a IgG
C Tinción mesangial con IgA en la inmunofluorescencia
D Depósitos subepiteliales electrodensos
E Trombosis en los capilares glomerulares

19 Una semana después de sufrir un proceso seudogripal leve, un niño de 9 años presenta un episodio de hematuria, que cede en 2 días. Un mes más tarde les dice a sus padres que tiene de nuevo orina roja. En la exploración física no se encuentran alteraciones significativas. El análisis de orina revela un pH de 7; densidad de

1015; proteinuria de 1+; hematuria de 1+, y ausencia de cetonas, glucosa o urobilinógeno. La concentración de nitrógeno ureico en suero es de 36 mg/dl, y la de creatinina, de 3,2 mg/dl. La electroforesis sérica muestra un aumento de IgA1. ¿Cuál de las siguientes estructuras glomerulares es más probable que esté alterada en este chico?

A Membranas basales
B Capilares
C Mesangio
D Epitelio parietal
E Podocitos

20 Un chico de 15 años refiere orina oscura desde hace 1 mes. En la exploración física tiene hipoacusia neurosensitiva bilateral y erosiones corneales. El análisis de orina muestra un pH de 6,5; densidad de 1,015; hematuria de 1+; proteinuria de 1+, y ausencia de cetonas, glucosa o leucocitos. La concentración de creatinina sérica es de 2,5 mg/dl, y la de nitrógeno ureico en sangre, de 24 mg/dl. La biopsia renal revela células espumosas en el epitelio tubular con microscopio de luz. El estudio con microscopia electrónica muestra una membrana basal glomerular con áreas de atenuación, con duplicación y laminación de la lámina densa en otras áreas engrosadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Mutación del gen que codifica el colágeno de tipo IV
B Aumento de la síntesis de IgA anómala
C Destrucción autoinmunitaria de las células β pancreáticas
D Deficiencia adquirida de la metaloproteasa ADAMTS13
E Daño tóxico de las proteínas del diafragma en hendidura

21 En una revisión médica rutinaria se encuentra que una mujer de 56 años tiene una presión arterial de 168/109 mmHg. No se observan alteraciones en la exploración física. El análisis de orina revela un pH de 7; una densidad de 1,020; proteinuria de 1+, y ausencia de sangre, glucosa o cetonas. Los resultados de las pruebas de ANA y ANCA son negativos. La concentración de nitrógeno ureico en suero es de 51 mg/dl, y la de creatinina, de 4,7 mg/dl. La concentración de hemoglobina A_{1c} se encuentra dentro de valores de referencia. La ecografía abdominal muestra riñones pequeños de forma simétrica y bilateral, sin presencia de masas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Amiloidosis
B Poliquistosis renal autosómica dominante
C Glomerulonefritis crónica
D Polivasculitis microscópica
E Glomeruloesclerosis nodular

22 Se realiza un estudio de autopsia en pacientes con riñones pequeños bilaterales (< 100 g) con aspecto granular en la superficie. El estudio histológico revela glomérulos escleróticos, fibrosis intersticial, atrofia tubular, engrosamiento arterial e infiltrados linfocíticos dispersos. ¿Cuál de los siguientes datos clínicos es más probable que se encuentre en la historia clínica de estos pacientes?

A Hemoptisis
B Hipertensión
C Luxación del cristalino
D Faringitis
E Exantema cutáneo

23 Una mujer de 33 años ha presentado fiebre y fatiga progresiva durante los últimos 2 meses. Durante el último año ha notado dolor musculo y articular, y ha perdido 4 kg de peso. En la exploración física tiene una temperatura de 37,5 °C, frecuencia cardíaca de 80 latidos/min, frecuencia respiratoria de 15 respiraciones/min y presión arterial de 145/95 mmHg. Refiere dolor al inspirar profundamente, y a la auscultación se escucha un soplo de fricción. Los hallazgos de laboratorio muestran cifras de glucosa de 73 mg/dl; de proteínas totales de 5,2 g/dl; de albúmina de 2,9 g/dl, y de creatinina 2,4 mg/dl. Las concentraciones de complemento séricas son bajas. El hemograma completo revela un nivel de hemoglobina de 9,7 g/dl; un recuento plaquetario de 85.000/mm^3 y un recuento leucocítico de 3.560/mm^3. La biopsia renal muestra una glomerulonefritis proliferativa difusa con depósitos inmunitarios granulares extensos de IgG y C1q en las asas capilares y el mesangio. Tras recibir tratamiento inmunodepresor con prednisona y ciclofosfamida, su situación mejora. ¿Cuál de las siguientes pruebas serológicas es más probable que sea positiva en esta paciente?

A Anticuerpos anticentrómero
B Anticuerpos frente a la ADN topoisomerasa I

C Anticuerpos frente al ADN bicatenario
D Anticuerpos frente a la membrana basal glomerular
E Anticuerpos frente a las histonas
F Autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilo
G Antirribonucleoproteína

24 Una mujer de 33 años con antecedentes de consumo de drogas por vía intravenosa acude a urgencias porque lleva con fiebre alta 2 días. En la exploración física tiene 38,4 °C de temperatura. Presenta una punta del bazo palpable, hipersensibilidad bilateral en el ángulo costovertebral y un soplo cardíaco diastólico. Entre los hallazgos de laboratorio destaca una concentración de urea sérica de 15 mg/dl. El análisis de orina revela hematuria 2+ sin glucosa, proteínas ni cetonas. El hemocultivo encuentra *Staphylococcus aureus.* ¿Cuál de las siguientes descripciones es la más adecuada para el aspecto macroscópico de los riñones de esta paciente?

A Aumentados de tamaño y sustituidos por quistes llenos de líquido de 1-4 cm de diámetro
B Marcada dilatación pielocalicial con adelgazamiento de la corteza
C Tamaño normal, con superficie cortical lisa
D Retraídos, con una superficie cortical finamente granular uniforme
E Ligeramente edematosos, con hemorragias petequiales dispersas
F Pequeños y asimétricos con cicatrices corticales irregulares y marcada dilatación calicial
G Regiones con forma de cuña de necrosis cortical de color blanco amarillento

25 Una mujer de 55 años con hiperglucemia mal controlada de muchos años de evolución refiere dolor urente durante la micción durante los últimos 3 días. La exploración revela una úlcera de 2 cm en la piel del talón con reducción de la sensibilidad en las extremidades inferiores. La agudeza visual es de 20/100 en ambos lados. El análisis de orina objetiva proteinuria de 1+, glucosuria de 2+ y ausencia de sangre, cetonas o urobilinógeno. El urocultivo contiene más de 100.000 unidades formadoras de colonias/ml de *Klebsiella pneumoniae.* ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable encontrar en los dos riñones de esta paciente?

A Depósitos de IgG y C3 en la membrana basal glomerular
B Borramiento de los pedicelos de los podocitos
C Formación de semilunas glomerulares
D Depósitos mesangiales de IgA
E Vasculitis granulomatosa necrotizante
F Depósitos mesangiales hialinos nodulares



26 En un hombre de 58 años se detecta hipertensión leve. Los hallazgos de laboratorio revelan una concentración de creatinina sérica de 2,2 mg/dl y de nitrógeno ureico de 25 mg/dl. Se encuentra microalbuminuria con excreción de 250 mg/día de albúmina. A los 2 años, el paciente sigue hipertenso con una concentración de creatinina de 3,8 mg/dl, de nitrógeno ureico de 38 mg/dl y de proteínas en orina de 24 h de 2,8 g. Se obtiene una biopsia renal; la figura corresponde al aspecto de un corte teñido con PAS y visto con microscopio óptico. ¿Cuál de las siguientes pruebas sanguíneas/séricas es más probable que esté alterada en este paciente?

A Anticuerpos frente a la membrana basal glomerular
B Anticuerpos antinucleares
C Autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos
D Antiestreptolisina O
E Factor nefrítico C3

F Hemoglobina A_{1c}
G Antígeno de superficie de la hepatitis B

27 Un chico de 17 años se ve implicado en un accidente de tráfico en el que sufre un traumatismo cerrado grave en las extremidades y el abdomen. Durante los 3 días siguientes desarrolla oliguria y orina oscura. El análisis de la orina con tira reactiva revela mioglobina y sangre, pero en su estudio microscópico no se identifican eritrocitos. La concentración de nitrógeno ureico en suero aumenta hasta los 38 mg/dl y se realiza hemodiálisis durante 3 semanas. El paciente mejora, pero la diuresis sigue siendo mayor de 3 l/día durante 1 semana antes de que se normalice la cifra de nitrógeno ureico. ¿Cuál de las siguientes lesiones renales es más probable que tuviera este paciente?

A Pielonefritis aguda
B Daño tubular agudo
C Nefroesclerosis maligna
D Nefropatía membranosa
E Trombosis de la vena renal

28 Un hombre de 63 años se encuentra estable tras un infarto agudo de miocardio durante el cual sufrió hipotensión durante 3 h antes de la llegada del personal paramédico. Durante la semana siguiente, la concentración de nitrógeno ureico en suero aumenta hasta los 48 mg/dl, la creatinina alcanza los 5 mg/dl y la diuresis disminuye. Se le realiza hemodiálisis durante las 2 semanas siguientes, durante las cuales presenta una marcada poliuria con diuresis de 2-3 l/día. La función renal se normaliza de forma gradual. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que participe en esta elevación de nitrógeno ureico en sangre y creatinina con reducción de la diuresis?

A Aldosterona
B Endotelina
C Eritropoyetina
D Péptido natriurético
E Vasopresina

29 Una mujer de 19 años ha presentado fiebre y escalofríos asociados a dolor en el flanco derecho durante los últimos 3 días. Refiere dos episodios parecidos en el año previo. En la exploración física presenta una temperatura de 38,3 °C y una presión arterial

de 152/94 mmHg, y se identifica hipersensibilidad en el ángulo costovertebral derecho. Las pruebas de laboratorio revelan una glucemia de 77 mg/dl y una concentración de creatinina de 1 mg/dl. El análisis de orina encuentra un pH de 6,5 con una densidad de 1,018 y ausencia de proteínas, sangre, glucosa o cetonas. El estudio microscópico de la orina identifica muchos leucocitos y cilindros leucocíticos. ¿Cuál de las siguientes pruebas es probable que sea más útil en esta paciente?

A Anticuerpos antinucleares
B Renina plasmática
C Biopsia renal
D Urocultivo
E TC abdominal

30 Una mujer de 51 años ha presentado disuria con aumento de la frecuencia miccional durante la última semana. En la exploración física presenta una temperatura de 38 °C, con dolor a la palpación del ángulo costovertebral izquierdo. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de glucosa de 177 mg/dl; de hemoglobina A_{1c} del 9,8%; de hemoglobina de 13,1 g/dl; de recuento plaquetario de 232.200/mm^3 y de recuento de leucocitos de 11.320/mm^3. El análisis de orina observa un pH de 6,5 con densidad de 1,016 y presencia de glucosuria 2+, sin sangre, proteínas o cetonas. El estudio microscópico de la misma revela numerosos neutrófilos, y el urocultivo identifica presencia de *Escherichia coli*. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que desarrolle esta paciente?

A Necrosis tubular aguda
B Glomerulonefritis con semilunas
C Hidronefrosis
D Papilitis necrosante
E Cálculos renales

31 Una mujer de 53 años ha presentado fiebre y dolor en flanco desde hace 2 días. En la exploración física tiene una temperatura de 38,2 °C, con frecuencia cardíaca de 81 latidos/min, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones/min y presión arterial de 130/80 mmHg. El análisis de orina no identifica presencia de proteínas, glucosa ni cetonas. La prueba de la esterasa leucocítica es positiva. El estudio microscópico de la orina revela numerosos leucocitos

polimorfonucleares y ocasionales cilindros leucocíticos. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que se encuentre en el urocultivo de esta paciente?

A *Cryptococcus neoformans*
B *Escherichia coli*
C Estreptococos del grupo A
D *Mycobacterium tuberculosis*
E *Mycoplasma hominis*

32 Una mujer de 30 años ha tenido malestar progresivo con nicturia y poliuria durante el último año. Durante los últimos 3 días ha tenido también fiebre elevada. En la exploración física, la presión arterial es de 170/95 mmHg. El análisis de orina revela un pH de 7,5 con una densidad de 1,01, proteinuria de 1+, positividad de la esterasa leucocítica y los nitritos, y ausencia de glucosa, sangre o cetonas. La ecografía renal identifica un aumento de tamaño del riñón derecho con aumento del calibre de la pelvis y los cálices, así como un adelgazamiento de la corteza; el riñón izquierdo está normal. Se realiza una nefrectomía derecha y, macroscópicamente, se reconocen grandes cicatrices con forma de U en los polos con amputación de los cálices. El estudio histológico revela infiltrados inflamatorios, que se extienden desde la médula a la corteza con destrucción de los túbulos y extensa fibrosis intersticial. Se encuentran abundantes linfocitos, células plasmáticas y neutrófilos. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que ocasione estos hallazgos?

A Poliquistosis renal
B Hipertensión esencial
C Insuficiencia cardíaca congestiva
D Lupus eritematoso sistémico
E Amiloidosis sistémica
F Reflujo vesicoureteral

33 Una mujer de 29 años ha presentado fiebre y odinofagia durante los últimos 3 días. En la exploración física presenta una temperatura de 38 °C. La faringe está eritematosa con exudado amarillento en las amígdalas. Recibe tratamiento con ampicilina y se recupera por completo en 1 semana. A las 2 semanas desarrolla fiebre y exantema, y nota una ligera reducción de la diuresis. La temperatura es de 37,7 °C y presenta un exantema eritematoso

difuso en el tronco y las extremidades. El análisis de orina muestra un pH de 6 con densidad de 1,022, proteinuria de 1+ y hematuria de 1+ sin glucosa ni cetonas. El estudio microscópico revela eritrocitos y leucocitos, incluidos eosinófilos, sin cilindros o cristales. ¿Cuál es la causa más probable de esta enfermedad?

A Depósito de inmunocomplejos con antígenos estreptocócicos
B Formación de anticuerpos frente a la membrana basal glomerular
C Diseminación hematógena de émbolos sépticos
D Reacción de hipersensibilidad frente a la ampicilina
E Necrosis tubular renal causada por toxinas bacterianas

34 Un hombre de 32 años desarrolló fiebre y exantema a lo largo de 3 días. A los 5 días de ese episodio presenta malestar progresivo. La exploración física revela la práctica desaparición del exantema maculopapular eritematoso del tronco. La temperatura es de 37,1 °C y tiene una presión arterial de 135/85 mmHg. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de creatinina sérica de 2,8 mg/dl y de nitrógeno ureico en sangre de 29 mg/dl. El análisis de orina muestra una proteinuria de 2+, con hematuria de 1+ y ausencia de glucosa, cetonas o nitritos. La prueba de la esterasa leucocítica es positiva. El estudio microscópico de la orina identifica eritrocitos y leucocitos, algunos de los cuales corresponden a eosinófilos. ¿Cuál de los siguientes episodios es más probable que precipitara esta enfermedad renal?

A Ingesta de antibióticos
B Insuficiencia cardíaca congestiva
C Ingesta de carne mal cocinada
D Faringitis estreptocócica
E Infección urinaria

35 Un hombre de 72 años con artrosis crónica ha tomado más de 3 g de analgésicos diarios, incluidos fenacetina, ácido acetilsalicílico y paracetamol durante los últimos 20 años. En la actualidad presenta malestar progresivo, con náuseas y deterioro cognitivo. En la exploración física presenta una presión arterial de 156/92 mmHg. Los hallazgos de laboratorio muestran una concentración de nitrógeno ureico en suero de 68 mg/dl y de creatinina de 7,1 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes enfermedades renales es más probable que desarrolle este hombre?

A Daño tubular agudo
B Glomerulonefritis crónica
C Hidronefrosis
D Carcinoma de células renales
E Necrosis papilar renal

36 En la exploración física de un hombre de 49 años se encuentra una presión arterial de 160/110 mmHg, sin otras alteraciones. Las pruebas de laboratorio muestran glucemia de 75 mg/dl, y concentraciones de creatinina de 1,3 mg/dl y nitrógeno ureico de 20 mg/dl. La renina plasmática está elevada. La angiografía por TC identifica una estenosis marcada de las arterias renales. Recibe tratamiento con un inhibidor de la enzima conversora de angiotensina. A la semana presenta una cefalea y toma ibuprofeno. Durante el día siguiente la diuresis disminuye. ¿Cuál de las siguientes sustancias químicas es probable que haya mediado este efecto sobre la diuresis al actuar sin ser contrarrestada?

A Aldosterona
B Histamina
C Óxido nítrico
D Prostaglandinas
E Factor de necrosis tumoral

37 Un hombre de 28 años está diagnosticado de leucemia mieloide aguda (M2) con un recuento leucocítico total de 45.000/mm^3, con un 60% de blastos. Tras la poliquimioterapia de inducción, el paciente presenta un episodio de dolor abdominal bajo con orina rojiza. No refiere fiebre, disuria o aumento de la frecuencia miccional. En la exploración física no se encuentran alteraciones significativas. El análisis de orina muestra un pH de 5,5, una densidad de 1,021 y hematuria de 2+, sin proteínas, cetonas o glucosa. La radiografía de abdomen no revela alteraciones significativas. ¿Cuál de los siguientes hallazgos del análisis de orina es más probable que se encuentre en este paciente?

A Proteína de Bence Jones
B Eosinófilos
C Mioglobina
D Cuerpos grasos ovales
E Cilindros de eritrocitos
F Cristales de ácido úrico

38 Una mujer de 49 años se sometió a una mastectomía derecha hace 2 años por un carcinoma. Actualmente presenta dolor óseo, y la gammagrafía revela múltiples áreas de captación en las vértebras, las costillas, la pelvis y el fémur derecho. El análisis de orina tiene una densidad de 1,01, que no se modifica tras la privación de agua durante 12 h. Se le realizan ciclos múltiples de quimioterapia durante el siguiente año y en este período el nitrógeno ureico en suero aumenta de forma progresiva. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio anómalos es más probable que padezca esta paciente?

A Hipercalcemia
B Hipercolesterolemia
C Hipergammaglobulinemia
D Hiperglucemia
E Hiperuricemia

39 Un hombre de 63 años ha notado una lumbalgia progresiva desde hace 7 meses. Refiere tres infecciones respiratorias por *Streptococcus pneumoniae* durante el último año. En la exploración se encuentra edema con fóvea hasta los muslos. Las pruebas de laboratorio revelan unas cifras de proteínas séricas totales de 9,6 mg/dl; de albúmina de 3,5 g/dl; de creatinina de 3 mg/dl; de nitrógeno ureico de 28 mg/dl, y de glucemia de 79 mg/dl. En el análisis de orina se encuentra una proteinuria de 4 g/día, sin glucosuria o hematuria. La TC abdominal revela riñones aumentados de tamaño sin quistes ni masas. La biopsia renal teñida con H-E identifica depósitos de un material rosado amorfo en los glomérulos, el intersticio y las arterias. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que tenga este paciente?

A Nefropatía por analgésicos
B Vasculitis granulomatosa asociada a ANCA
C Diabetes mellitus de tipo 2
D Nefropatía membranosa
E Mieloma múltiple
F Lupus eritematoso sistémico



40 Una mujer de 66 años ha sufrido cinco ataques isquémicos transitorios a lo largo de 1 semana. En la exploración física solo destaca una presión arterial de 150/95 mmHg. El análisis de orina identifica proteinuria 1+, sin glucosa, sangre o cetonas. El estudio microscópico no revela eritrocitos o leucocitos, pero sí algunos cristales de oxalato. La ecografía abdominal muestra riñones algo reducidos de tamaño. La figura muestra una imagen histológica a gran aumento representativa del aspecto de los riñones. ¿Cuál de las siguientes lesiones renales es más probable que sufra esta paciente?

A Necrosis tubular aguda
B Displasia fibromuscular
C Arterioloesclerosis hialina
D Nefritis intersticial
E Vasculitis necrotizante

41 Un hombre de 45 años presenta cefaleas, náuseas y vómitos que han empeorado en los últimos 5 días. Ha empezado a ver «manchas» delante de los ojos y ha presentado episodios de confusión mental. En la exploración física se detecta una presión arterial de 270/150 mmHg. El análisis de orina revela una proteinuria de 1+ y una hematuria de 2+ sin glucosa, cetonas o

leucocitos. Las concentraciones de nitrógeno ureico en suero y creatinina están elevadas. El paciente fallece a las 2 semanas por una hemorragia cerebral. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos es más probable que se encuentre en los riñones de este paciente durante la autopsia?

A Semilunas glomerulares
B Arterioloesclerosis hiperplásica
C Depósito mesangial de IgA
D Glomeruloesclerosis nodular
E Necrosis tubular segmentaria

42 Una niña de 5 años desarrolla dolor abdominal cólico con diarrea a los 4 días de tomar hamburguesa, chile y helado en una barbacoa doméstica. Al día siguiente presenta una reducción de la diuresis. La exploración física revela hemorragias petequiales cutáneas. Tiene una temperatura de 37 °C, con frecuencia cardíaca de 90 latidos/min, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones/min y presión arterial de 90/50 mmHg. La muestra de heces revela sangre oculta. Entre los hallazgos de laboratorio destacan concentraciones de creatinina sérica de 2,2 mg/dl y nitrógeno ureico de 20 mg/dl. El hemograma completo muestra cifras de hemoglobina de 10,8 g/dl; de hematocrito del 32,4%; de recuento plaquetario de 64.300/mm^3, y de recuento leucocítico de 6.480/mm^3. El frotis de sangre periférica muestra esquistocitos, y la concentración de dímero D sérica está elevada. El análisis de orina revela un pH de 6, con densidad de 1,016 y hematuria de 2+, pero sin proteínas ni glucosa. La biopsia renal identifica pequeños trombos en las asas de los capilares glomerulares. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que produzca esta complicación?

A *Candida albicans*
B *Clostridium difficile*
C *Escherichia coli*
D *Proteus mirabilis*
E *Staphylococcus aureus*

43 En los adultos con nefropatías quísticas bilaterales se encuentran defectos de la función tubular renal. Los riñones de estos pacientes son muy grandes. Sufren una ciliopatía con una menor mecanosensibilidad para el flujo de líquido tubular. Se encuentran mutaciones en un gen que codifica un componente

proteínico de los cilios disfuncionales. ¿Cuál es la proteína más probable de la que se trata?

A Elongina
B Fibrocistina
C Nefrocistina
D Policistina
E Tuberina



44 Una mujer de 61 años refiere malestar progresivo con brotes de dolor abdominal de 5 años de evolución. En la exploración física tiene una presión arterial de 150/95 mmHg. La auscultación revela un soplo mesosistólico en el área mitral. Se palpan masas abdominales bilaterales. La ecografía abdominal revela riñones aumentados de tamaño cuyo aspecto macroscópico se muestra en la figura. ¿Cuál de los siguientes trastornos extrarrenales es más probable que tenga esta paciente?

A Aneurisma en fresa
B Coagulopatía
C Cirrosis hepática
D Miocardiopatía isquémica
E Fibrosis pulmonar

45 Una mujer de 20 años primigrávida en el tercer trimestre de la gestación observa mínimos movimientos fetales. La ecografía

identifica riñones ecógenos aumentados de tamaño en ambos lados, con una reducción importante del índice de líquido amniótico. La mujer da a luz un feto muerto del sexo masculino a las 33 semanas de gestación. La autopsia encuentra deformidades secundarias al intenso oligohidramnios, con aplanamiento de la cara, deformidad en varo de los pies e importante hipoplasia pulmonar. El estudio histológico del hígado identifica múltiples quistes revestidos por epitelio y una proliferación de conductos biliares. ¿Cuál de las siguientes nefropatías es más probable que tuviera ese feto?

A Poliquistosis renal autosómica dominante
B Poliquistosis renal autosómica recesiva
C Riñón en esponja medular
D Displasia multiquística renal
E Atresia uretral

46 Una mujer de 31 años refiere dolor abdominal a la semana de notar presencia de sangre en la orina. Durante el año previo ha tenido tres episodios de infección urinaria. La exploración física no revela alteraciones significativas. El análisis de orina encuentra hematuria de 2+, proteinuria de 1+ e hipercalciuria, sin glucosa ni cetonas. La concentración de creatinina sérica es de 1 g/dl. El estudio histológico de la orina identifica numerosos eritrocitos y cristales de oxalato. La TC abdominal con contraste encuentra unas estriaciones lineales que radian hacia las papilas renales, además de pequeñas colecciones quísticas de contraste en unos conductos colectores dilatados. Se recomienda a la paciente que aumente la ingesta de líquidos, y su situación mejora. ¿Cuál de las siguientes nefropatías quísticas es más probable que cause estas alteraciones?

A Poliquistosis renal autosómica dominante
B Poliquistosis renal autosómica recesiva
C Riñón en esponja medular
D Displasia multiquística renal

47 Un niño de 6 años lleva 7 meses bebiendo más agua y orinando con más frecuencia. En la exploración física se detecta deshidratación. El análisis de orina muestra un pH de 6,5; una densidad de 1,01 y ausencia de proteínas, sangre, glucosa o cetonas. No se identifican eritrocitos, leucocitos ni cilindros. Los

electrólitos séricos muestran cifras de Na^+ de 152 mmol/l; de K^+ de 4,6 mmol/l; de Cl^- de 120 mmol/l; de HCO_3^- de 21 mmol/l; de nitrógeno ureico de 29 mg/dl, y de creatinina de 3,2 mg/dl. La ecografía identifica riñones pequeños con quistes medulares apenas visibles, que se concentran en la unión corticomedular. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que esté mutado en este niño?

A *MCKD1*
B *NPHP1*
C *PKD1*
D *PKHD1*



48 Un hombre de 83 años ha notado dificultad miccional durante los últimos 15 años. En la exploración se identifica una úlcera que no se cicatriza, de 2 cm en el talón del pie derecho. También se encuentra una reducción de la sensibilidad al tacto superficial en las extremidades inferiores. La figura muestra el aspecto macroscópico representativo del riñón derecho. El riñón izquierdo

es parecido. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que tenga este paciente?

A Abuso de analgésicos
B Nefroesclerosis benigna
C Pielonefritis crónica
D Diabetes mellitus
E Adenocarcinoma de próstata

49 Un hombre de 42 años lleva 2 días con dolor en el flanco derecho. En la exploración física tiene una temperatura de 37,1 °C, con frecuencia cardíaca de 70 latidos/min, frecuencia respiratoria de 14 respiraciones/min y presión arterial de 130/85 mmHg. Las pruebas de laboratorio revelan una concentración de creatinina sérica de 1,1 mg/dl. El análisis de orina no identifica presencia de sangre, proteínas o glucosa, y el estudio histológico de la orina no revela eritrocitos o leucocitos. La TC abdominal encuentra una lesión excéntrica de 7 cm en el polo superior del riñón derecho. Esta lesión está bien delimitada y es quística, con una pared delgada y hemorragia focal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Pielonefritis aguda
B Daño tubular agudo
C Nefropatía diabética
D Hidronefrosis
E Quiste simple renal
F Carcinoma de células renales
G Carcinoma urotelial

50 Un hombre de 24 años tiene dolor abdominal bajo intenso que se irradia hacia la ingle. En una escala de 1 a 10 lo grada como 10 y se produce en oleadas. Posteriormente, el paciente observa sangre en la orina. No tiene ninguna enfermedad de base y ha estado sano siempre. En la exploración física destaca que se encuentra afebril y la presión arterial es de 110/70 mmHg. Las pruebas de laboratorio muestran cifras de Na^+ de 142 mmol/l; de K^+ de 4 mmol/l; de Cl^- de 96 mmol/l; de CO_2 de 25 mmol/l; de glucosa de 74 mg/dl; de creatinina de 1,1 mg/dl; de calcio de 9,1 mg/dl, y de fósforo de 2,9 mg/dl. El análisis de orina muestra un pH de 7 y una densidad de 1,02, sin proteínas, glucosa, cetonas o nitritos. Se recomienda al paciente que beba más agua. Al paciente le gusta el té helado y consume gran cantidad durante un verano muy

caluroso. Sigue con episodios parecidos. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que esté aumentada en su orina?

A Oxalato cálcico
B Cistina
C Fosfato de amonio de magnesio
D Mucoproteínas
E Ácido úrico

51 Un hombre de 28 años previamente sano presenta de forma súbita intenso dolor abdominal y orina rojiza. En la exploración física no se encuentran alteraciones. El análisis de orina identifica un pH de 7, con densidad de 1,015 y hematuria de 1+, sin presencia de proteínas, glucosa o cetonas. Se da al paciente un dispositivo que debe emplear para identificar cálculos en la orina. Al día siguiente recupera un cálculo de 0,3 cm, que es remitido para análisis. El cálculo está constituido por oxalato cálcico. ¿Qué trastorno de base es más probable que presente este paciente?

A Cistitis bacteriana aguda
B Diabetes mellitus
C Hipercalciuria idiopática
D Hiperparatiroidismo primario
E Gota secundaria

52 Una mujer de 54 años presenta infecciones urinarias de repetición desde hace 15 años. En muchas de estas ocasiones se cultivó *Proteus mirabilis* en la orina. Durante los últimos 4 días la paciente refiere dolor urente durante la micción con aumento de la frecuencia urinaria. En la exploración física presenta una temperatura de 37,9 °C, con frecuencia cardíaca de 70 latidos/min, frecuencia respiratoria de 15 respiraciones/min y presión arterial de 135/85 mmHg. Destaca una marcada hipersensibilidad a la presión profunda en la región costovertebral derecha y a la palpación abdominal profunda. El análisis de orina identifica un pH de 7,5, con una densidad de 1,02 y hematuria de 1+, sin proteínas, glucosa o cetonas. En el estudio microscópico de la orina se identifican muchos eritrocitos, leucocitos y cristales de fosfato triple. ¿Cuál de las siguientes lesiones renales es más probable que tenga esta paciente?

A Daño tubular agudo
B Nefroesclerosis maligna

C Necrosis papilar
D Carcinoma de células renales
E Cálculo en asta de ciervo



53 Un hombre de 55 años ha tenido lumbalgia con orina oscura desde hace 1 mes. En la exploración física presenta hipersensibilidad en el ángulo costovertebral derecho. El análisis de orina encuentra un pH de 6, con densidad de 1,015 y hematuria de 2+, sin proteínas, glucosa o cetonas. El estudio microscópico de la orina revela numerosos eritrocitos, pocos leucocitos y ausencia de cristales o cilindros. La figura se corresponde con el aspecto macroscópico representativo de la lesión renal. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que se encuentre elevada en la sangre de este paciente?

A Cortisol
B Globulina
C Eritropoyetina
D Renina
E Vasopresina

54 Un hombre de 60 años refiere plenitud abdominal con pérdida de 5 kg de peso en los últimos 6 meses. Tiene antecedentes de tabaquismo con un consumo de 50 paquetes-año. La exploración física no revela alteraciones. Las pruebas de laboratorio muestran

cifras de hemoglobina de 8,3 g/dl; de hematocrito del 24% y de VCM de 70 μm^3. El análisis de orina revela hematuria de 3+, sin proteínas, glucosa o leucocitos. La TC abdominal identifica una masa de 11 cm en el polo superior del riñón derecho. Se realiza una nefrectomía derecha y el estudio macroscópico revela una masa que ha invadido la vena renal. En el estudio histológico se reconocen en ella células con abundante citoplasma claro. ¿Cuál de las siguientes alteraciones moleculares es más probable que se encuentre en el ADN de las células tumorales?

A Pérdida homocigota del gen de von Hippel-Lindau (VHL)
B Integración del virus del papiloma humano de tipo 16 (VPH-16)
C Inestabilidad de microsatélites
D Activación del protooncogén MET
E Trisomía de los genes del cromosoma 7

55 A los miembros de una familia con antecedentes de cánceres renales se les realiza una ecografía de cribado y se encuentran masas renales bilaterales y multifocales en dos adultos. Se obtienen biopsias y el estudio histológico revela un patrón papilar. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que esté mutado en esta familia?

A *MET*
B *PKD1*
C *RAS*
D *TSC1*
E *WT1*

56 Un hombre de 60 años ha observado tos sin expectoración y lumbalgia durante los últimos 4 meses. Su orina es oscura desde hace 1 mes. El paciente tiene antecedentes de tabaquismo con un consumo de 50 paquetes-año. En la exploración tiene una presión arterial de 175/110 mmHg y muestra hipersensibilidad a la percusión de la parte alta de la espalda. El análisis de orina revela sangre 3+, sin cilindros ni cristales. La TC torácica identifica un nódulo sólido de 4 cm en el lóbulo inferior derecho pulmonar y lesiones líticas de 1-2 cm en las vértebras torácicas. ¿En cuál de las siguientes estructuras urinarias es más probable que se haya originado esta neoplasia?

A Cúpula vesical

B Cáliz
C Uretra peniana
D Corteza renal
E Uraco
F Uréter



57 Una niña de 4 años presenta dolor abdominal desde hace 1 mes.

En la exploración física tiene fiebre, y mediante la palpación del abdomen se identifica una masa dolorosa en el lado derecho. Los ruidos intestinales están conservados. Las pruebas de laboratorio revelan hematuria sin proteinuria, y la TC abdominal confirma una masa sólida delimitada, de 12 cm en el riñón derecho. Se realiza una nefrectomía derecha; la figura muestra el aspecto macroscópico de la masa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Angiomiolipoma
B Tumor de células intersticiales
C Carcinoma de células renales
D Carcinoma de células transicionales
E Tumor de Wilms

Respuestas

1 **A** Este paciente presenta uremia, y el cociente nitrógeno ureico en sangre:creatinina (BUN:C) > 20:1; la EF_{Na} baja, la elevada densidad urinaria y la hipotensión son sugestivos de uremia prerrenal, cuya causa más probable es la insuficiencia cardíaca. La nefropatía membranosa es una causa renal de cociente BUN:Cr de 10:1 o menor y posiblemente también de proteinuria en rango nefrótico. La hiperplasia prostática con obstrucción urinaria puede ocasionar una uremia posrenal con valores del cociente BUN:Cr de entre 10:1 y 20:1. El lupus eritematoso sistémico puede producir un síndrome nefrítico con eritrocitos y cilindros de eritrocitos y un cociente BUN:Cr de 10:1 o inferior. El carcinoma urotelial suele ser unilateral, y el riñón contralateral habitualmente conserva suficiente grado de reserva funcional como para evitar la uremia.

2 **C** Estos hallazgos se corresponden con una lesión glomerular de mecanismo inmunitario con depósito de complejos antígeno-anticuerpo, típica de una enfermedad de base, como el LES y con un cuadro nefrítico. La hipersensibilidad de tipo I puede influir en la nefritis intersticial aguda inducida por fármacos. Existe una hipersensibilidad de tipo II en las enfermedades por anticuerpos frente a la membrana basal glomerular, como el síndrome de Goodpasture. La hipersensibilidad de tipo IV está implicada en el rechazo del trasplante renal y en algunos casos

de nefritis intersticial inducida por fármacos.

3 **B** Se describe el aspecto de una glomerulonefritis membranoproliferativa, una causa de síndrome nefrítico en adultos. Las células mesangiales realizan una función fagocítica, aunque también pueden elaborar mediadores inflamatorios, citocinas y matriz. La proliferación de las células mesangiales puede ser inducida por una lesión, sobre todo por el depósito de inmunocomplejos. Las células yuxtaglomerulares secretan renina. Las células epiteliales parietales revisten la cápsula de Bowman y pueden proliferar en las lesiones glomerulares graves y producir semilunas. Los podocitos son células epiteliales viscerales, que forman la barrera de filtración. Las células endoteliales suelen sufrir lesiones con más frecuencia en las microangiopatías trombóticas.

4 **E** Los podocitos (células epiteliales viscerales) del glomérulo forman una barrera de filtración, que depende tanto de la carga aniónica como de los diafragmas en hendidura. Las lesiones que producen borramiento, retracción, desprendimiento y vacuolización permiten la salida de las proteínas, sobre todo de la albúmina, hacia el espacio de Bowman. Los podocitos presentan una capacidad de regeneración y reparación limitada. La pérdida de 3,5 g/día de proteínas define el síndrome nefrótico. Aproximadamente una sexta parte de la filtración se produce a través del mesangio. Las demás opciones recogidas no participan en esta barrera epitelial de filtración de proteínas.

5 **B** Las cepas de estreptococos del grupo A que provocan glomerulonefritis (GN) postestreptocócica son distintas de las que causan fiebre reumática y la mayor parte de ellas inducen una respuesta inmunitaria a través de la exotoxina B de estreptococos piógenos (SpeB). La mayor parte de los niños con GN postestreptocócica se recuperan, aunque el 1% desarrollan una GN rápidamente progresiva caracterizada por formación de semilunas. En el 40% de los adultos afectados la enfermedad progresa a insuficiencia renal crónica. La infección urinaria no suele asociarse a GN postestreptocócica porque los microorganismos que produjeron la reacción inmunitaria ya no se encuentran presentes cuando aparecen los síntomas de GN.

6 **F** Esta paciente está infectada por *Plasmodium* y presenta

paludismo. Los depósitos de inmunocomplejos con leucocitos en los glomérulos han producido el síndrome nefrítico asociado a glomerulonefritis proliferativa aguda. Muchos de estos casos son postinfecciosos. La infección desencadenante depende de la zona y de la frecuencia de aparición. En EE. UU. actualmente es más frecuente *Staphylococcus aureus* (con anticuerpos IgA) que *Streptococcus pyogenes* como causa de GN postinfecciosa, igual que en otros países desarrollados. De las demás opciones solo la GN membranosa puede tener una causa infecciosa, pero suele cursar con síndrome nefrótico.

7 **B** La figura corresponde a glomérulos con semilunas epiteliales, sugestivos de glomerulonefritis rápidamente progresiva. La GN con semilunas se divide en tres grupos en función de los hallazgos con inmunofluorescencia: tipo I (enfermedad por anticuerpos frente a la membrana basal glomerular [MBG]); tipo II (enfermedad por inmunocomplejos), y tipo III (caracterizada por la ausencia de anticuerpos frente a la MBG o inmunocomplejos). Cada tipo presenta una causa y un tratamiento distintos. La presencia de anticuerpos frente a la MBG sugiere un síndrome de Goodpasture; los pacientes con este síndrome necesitan plasmaféresis. La GN con semilunas de tipo II puede aparecer en pacientes con un lupus eritematoso sistémico, en la púrpura del Henoch-Schönlein y tras una infección. Entre las causas de GN con formación de semilunas de tipo II están la granulomatosis con polivasculitis (vasculitis asociada a ANCA) y la polivasculitis microscópica. La prueba de ANA puede ser positiva en los pacientes con una nefritis lúpica, que en pocas ocasiones cursa con semilunas glomerulares. La nefropatía por el VIH se parece a la glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS), que no es rápidamente progresiva. Las inmunoglobulinas cuantitativas séricas no ayudan porque lo importante es el patrón de depósito inmunitario en el riñón. Existe factor reumatoide en la artritis reumatoide, que no se asocia típicamente a complicaciones renales. La inmunoelectroforesis de la orina permite clasificar la gammapatía monoclonal.

8 **A** El patrón de tinción lineal que muestra la figura indica presencia de anticuerpos frente a la membrana basal glomerular

(dirigidos frente al dominio no colágeno de la cadena $\alpha3$ del colágeno de tipo IV). Estos anticuerpos se encuentran típicamente en el síndrome de Goodpasture, una variante de glomerulonefritis (GN) rápidamente progresiva con un patrón de aparición bimodal en hombres jóvenes y ancianos. Los títulos de anticuerpos frente a la estreptolisina O están aumentados en la GN postestreptocócica, que presenta un patrón granular típico de depósito de inmunocomplejos. El factor nefrítico C3 puede ser un marcador de la enfermedad por depósitos densos. Algunos casos de nefropatía membranosa se asocian a la infección por el virus de la hepatitis B, pero el depósito de inmunocomplejos es granular, no lineal. La infección por el VIH puede asociarse a una nefropatía parecida a la GEFS, en la que se depositan IgM y C3 en las regiones mesangiales de los glomérulos afectados.

9 **C** Se trata de una glomerulonefritis con semilunas pauciinmunitaria. La ausencia de depósitos inmunitarios descarta una enfermedad por anticuerpos frente a la membrana basal glomerular (síndrome de Goodpasture). Algunos casos pueden ser idiopáticos, asociados a ANCA, y limitarse al riñón. La GN rápidamente progresiva suele debutar de forma abrupta con una nefritis caracterizada por oliguria. Los anticuerpos frente a la ADN topoisomerasa se encuentran en la esclerodermia, que afecta fundamentalmente a los vasos. Existen anticuerpos antinucleares en muchas enfermedades de tipo autoinmunitario, como el LES, en las que se depositan inmunocomplejos en los glomérulos. Pueden encontrarse anti-HBs en algunos casos de nefropatía membranosa secundaria.

10 **F** La granulomatosis con polivasculitis (vasculitis asociada a ANCA) es una causa de glomerulonefritis (GN) rápidamente progresiva, que se caracteriza por la aparición de semilunas epiteliales en el espacio de Bowman. Varios rasgos la diferencian de otras variantes de GN con formación de semilunas (p. ej., síndrome de Goodpasture), incluida la presencia de una vasculitis granulomatosa, la ausencia de inmunocomplejos o anticuerpos frente a la membrana basal glomerular (MBG) y la existencia de C-ANCA. La glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) no afecta a los vasos renales y es poco

probable que ocasione semilunas con presentación rápidamente progresiva. El síndrome de Goodpasture es una variante de GN rápidamente progresiva con formación de semilunas, pero no existe una vasculitis granulomatosa y se identifican anticuerpos frente a la MBG pero no C-ANCA. La arterioloesclerosis hiperplásica puede producir hemorragias focales con necrosis, pero no se asocia a componente granulomatoso y la presión arterial suele ser bastante alta. La nefritis lúpica, la GN membranoproliferativa y la GN postinfecciosa (con presencia de muchos neutrófilos en los glomérulos) pueden tener una evolución rápidamente progresiva con formación de semilunas, pero no provocan vasculitis granulomatosa. En los pacientes con lupus, la determinación de ANA suele ser positiva. La nefropatía membranosa suele producir síndrome nefrótico sin semilunas.

11 **D** El síndrome nefrótico puede deberse a una variante idiopática de nefropatía membranosa. Este trastorno se caracteriza por un engrosamiento difuso de la membrana basal, sin cambios proliferativos, y los depósitos granulares de IgG y C3 son típicos de este proceso. Se debe a la existencia de anticuerpos frente al antígeno del receptor de tipo M de la fosfolipasa A_2, con depósito de inmunocomplejos en la membrana basal y activación del complemento. En el 75% de los pacientes con nefropatía membranosa se desconoce la causa del depósito de inmunocomplejos. En los demás casos existe una enfermedad sistémica asociada (p. ej., lupus eritematoso sistémico) o alguna causa conocida de formación de inmunocomplejos (p. ej., reacción medicamentosa). Los anticuerpos que reaccionan frente a la membrana basal dan lugar a un patrón de inmunofluorescencia lineal, como se observa en el síndrome de Goodpasture. La nefropatía membranosa no se asocia a infecciones por estreptococos. Tampoco existen datos de lesiones mediadas por citocinas o linfocitos T en esta entidad.

12 **A** La proteinuria que responde a esteroides en niños es típica de la enfermedad de cambios mínimos, en la cual el riñón tiene un aspecto normal con microscopio óptico, pero con microscopia electrónica se puede identificar la fusión de los pedicelos. La causa más probable de esta fusión es la lesión primaria de las

células epiteliales viscerales causada por citocinas elaboradas por los linfocitos T. El rechazo celular agudo del trasplante renal viene mediado por una lesión causada por linfocitos T con tubulitis. La nefropatía IgA con depósito de IgA mesangial y la consiguiente lesión glomerular produce hematuria macroscópica o microscópica recidivante y, con mucha menos frecuencia, síndrome nefrótico. El depósito de inmunocomplejos en la nefropatía membranosa puede producir síndrome nefrótico, pero es mucho menos frecuente en niños que en adultos y no responde a los corticoesteroides. Algunas cepas de *Escherichia coli* secretoras de verocitotoxina pueden ocasionar síndrome hemolítico urémico por daño del endotelio capilar.

13 **A** Una de las causas más frecuentes de síndrome nefrótico en adultos es la nefropatía membranosa, causada por depósito de inmunocomplejos, que aparecen en la figura como depósitos granulares extensos con C3. Aproximadamente el 75% de los casos son idiopáticos y se deben a la presencia de autoanticuerpos frente a los antígenos de los podocitos, pero otros casos se producen tras una infección (p. ej., hepatitis, paludismo) o se asocian a causas como tumores malignos o enfermedades autoinmunitarias. En algunos casos de sida aparece una nefropatía parecida a la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. El mieloma múltiple puede complicarse con una amiloidosis sistémica, que puede afectar al riñón. Las infecciones urinarias de repetición se deben a bacterias y pueden producir pielonefritis crónica. La nefrolitiasis puede causar nefritis intersticial, pero no daño glomerular.

14 **B** La causa más probable de síndrome nefrótico sin otra clínica en un niño es la enfermedad de cambios mínimos, nombre que hace alusión a la escasez de hallazgos patológicos. Se produce la fusión de los pedicelos de los podocitos, que solo se reconoce mediante el estudio con microscopia electrónica. Esta fusión provoca una proteinuria selectiva de las proteínas de bajo peso molecular (albúmina). La variabilidad del engrosamiento de la membrana basal aparece en el síndrome de Alport. La matriz mesangial está expandida en algunas variantes de glomerulonefritis (p. ej., nefropatía IgA) y otras enfermedades, como la diabetes mellitus, pero no en la

enfermedad de cambios mínimos. La reduplicación de la membrana basal glomerular puede encontrarse en la GN membranoproliferativa. Las jorobas causadas por depósitos electrodensos subepiteliales corresponden a inmunocomplejos y se asocian a GN postinfecciosa.

15 **B** La glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS) muestra esclerosis de un segmento del glomérulo (lesión segmentaria) y, dado que solo resultan afectados el 50% de los glomérulos, se habla de enfermedad focal. La GEFS se manifiesta clínicamente como un síndrome nefrótico que no responde al tratamiento con corticoesteroides. La GEFS puede deberse a muchas formas de daño glomerular, algunas vinculadas con mutaciones del gen *NPHS.* Por el contrario, el síndrome nefrótico sensible a corticoesteroides de niños se debe típicamente a una enfermedad de cambios mínimos (nefrosis lipoidea) que no se asocia a cambios en los glomérulos con microscopio óptico. La glomerulonefritis (GN) membranoproliferativa y la enfermedad por depósitos densos suelen producir síndrome nefrítico en adultos. Los diabéticos con síndrome nefrótico suelen tener una glomeruloesclerosis nodular o un engrosamiento difuso de la membrana basal. La GN aguda proliferativa postinfecciosa suele tener glomérulos hipercelulares con neutrófilos. La GN rápidamente progresiva asocia hematuria y presencia de semilunas glomerulares.

16 **D** La hematuria y la proteinuria resistentes a corticoesteroides que producen hipertensión e insuficiencia renal son típicas de la glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS). Actualmente, la GEFS es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos en EE. UU. Las áreas extracelulares especializadas que recubren la membrana basal glomerular entre los pedicelos de podocitos adyacentes se denominan *diafragmas en hendidura* y estos se encargan de controlar la permeabilidad glomerular. Las mutaciones de los genes que afectan a diversas proteínas, como la nefrina y la podocina, se han descrito en casos de GEFS hereditarios; la disfunción de los podocitos, posiblemente causada por citocinas o por factores tóxicos desconocidos, puede ser responsable de los casos de GEFS adquiridos. La GEFS con glomerulopatía colapsante se encuentra en pacientes con

nefropatía asociada al VIH. Los inmunocomplejos que contienen antígenos microbianos producen la glomerulonefritis (GN) postinfecciosa. Los anticuerpos frente a la membrana basal glomerular son responsables del síndrome de Goodpasture. El C3NeF es un autoanticuerpo frente a la C3 convertasa y se encuentra en la GN membranoproliferativa. Los defectos hereditarios del colágeno de la membrana basal producen el síndrome de Alport, que se caracteriza también por hematuria, pero suelen encontrarse otras malformaciones congénitas, como hipoacusia, y el síndrome nefrótico es infrecuente.

17 **B** La enfermedad por depósitos densos (llamada antes glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo II) suele producir hematuria y la mitad de los casos acaban desarrollando una insuficiencia renal crónica. Es frecuente emplear el término *glomerulonefritis* (GN) *crónica* cuando se encuentra esclerosis de muchos glomérulos sin causa evidente. La nefropatía membranosa se suele asociar a proteinuria, pero la hematuria es menos probable y se caracteriza por engrosamiento de la membrana basal y depósitos electrodensos pequeños. La GN postinfecciosa se suele caracterizar por glomérulos hipercelulares infiltrados por polimorfonucleares, sin engrosamiento de la membrana basal. La GN rápidamente progresiva se caracteriza por la formación de semilunas en el espacio de Bowman.

18 **C** La nefropatía IgA (denominada también *enfermedad de Berger*) puede explicar este cuadro nefrítico con hematuria recurrente en un adulto joven. No se acompaña de un síndrome nefrótico y es característico el depósito de IgA mesangial. El episodio inicial de hematuria suele producirse después de una infección respiratoria alta. La nefropatía IgA es más frecuente en pacientes con enfermedad celíaca y hepatopatía. Produce una insuficiencia renal crónica en 20 años hasta en el 50% de los casos. La proliferación difusa y el engrosamiento de la membrana basal son característicos de la glomerulonefritis (GN) membranoproliferativa con depósito de IgG y C3 en los glomérulos. La tinción granular de la membrana basal con anticuerpos frente a IgG es indicativa de depósito de inmunocomplejos, que puede ocurrir en la GN postinfecciosa y

que se asocia a depósitos subepiteliales vistos mediante microscopio electrónico. Los pacientes con estos cambios tienen también síndrome nefrítico. La trombosis de los capilares glomerulares es característica del síndrome hemolítico urémico.

19 **C** La aparición de hematuria de repetición tras una enfermedad vírica en un niño o adulto joven es típica de la nefropatía IgA. En una biopsia renal se identificará una proliferación mesangial difusa con depósitos electrodensos mesangiales. En estos pacientes algún defecto de la regulación inmunitaria condiciona una síntesis excesiva de IgA mucosa en respuesta a antígenos víricos o ambientales de otro tipo. Los complejos IgA se depositan en el mesangio e inician la lesión glomerular. Los defectos de la estructura de la membrana basal glomerular son característicos de las nefritis hereditarias, y los anticuerpos frente al colágeno de tipo IV se forman en el síndrome de Goodpasture. El epitelio parietal puede reaccionar proliferando y formar semilunas cuando el fibrinógeno entra en el espacio de Bowman en el contexto de una glomerulonefritis grave. Los podocitos pueden resultar afectados en muchos tipos de enfermedades glomerulares, pero tienen un mal funcionamiento aislado en la enfermedad de cambios mínimos.

20 **A** El síndrome de Alport es una variante de nefritis hereditaria. La hematuria es el rasgo de presentación más frecuente, pero a menudo aparece proteinuria y puede llegar al rango nefrótico. Los pacientes evolucionan con desarrollo de insuficiencia renal crónica durante la edad adulta. Se describe un patrón de herencia ligada al cromosoma X en el 85% de los casos, pero existen también familias autosómicas dominantes y autosómicas recesivas. El cambio espumoso en las células epiteliales tubulares y los cambios ultraestructurales de la membrana basal son típicos. El defecto genético se debe a la mutación del gen de la cadena $\alpha5$ del colágeno de tipo IV. La nefropatía IgA es una variante de glomerulonefritis que no produce cambios en las células epiteliales tubulares. La PTT se suele asociar a deficiencias hereditarias o adquiridas de ADAMTS13, lo que provoca una microangiopatía trombótica parecida al síndrome hemolítico urémico porque la toxina de Shiga de *Escherichia coli* provoca lesiones en el endotelio

vascular. La glomeruloesclerosis nodular y difusa son cambios típicos de una nefropatía diabética, que puede deberse a la pérdida de las células β de los islotes pancreáticos. Las lesiones tóxicas suelen dañar las células tubulares con desarrollo de una necrosis tubular aguda.

21 **C** La glomerulonefritis (GN) crónica puede aparecer después de algunas formas específicas de GN aguda. Sin embargo, en muchas ocasiones se desarrolla de forma insidiosa sin causa conocida. Al progresar la lesión glomerular y la esclerosis, los dos riñones se vuelven más pequeños y adquieren una superficie granular. Es frecuente que aparezca hipertensión por la isquemia renal. Independientemente de la causa inicial, estos riñones «en fase terminal» son morfológicamente idénticos y presentan esclerosis glomerular, engrosamiento arterial e inflamación intersticial crónica. Dado que los resultados de ANA y ANCA son negativos en este caso, la vasculitis es poco probable. La poliquistosis renal y la amiloidosis se asociarían a un aumento del tamaño de los riñones, no a su reducción. La concentración normal de hemoglobina A_{1c} indica que el paciente no tiene diabetes mellitus. La glomeruloesclerosis nodular es típica de la diabetes mellitus con elevación de la concentración de hemoglobina A_{1c}.

22 **B** Estos hallazgos describen la presencia de nefropatía terminal, cuyo aspecto es parecido, sea cual sea la causa (p. ej., enfermedad vascular o glomerular). Entre las características de la lesión renal progresiva están la glomeruloesclerosis (que se inicia como una glomeruloesclerosis focal y segmentaria) y la fibrosis tubulointersticial. Cuando la destrucción renal está avanzada, casi siempre aparece hipertensión, incluso cuando no existía al comenzar la enfermedad renal. Muchos de estos casos se denominan *glomerulonefritis* (GN) *crónica,* a falta de un nombre mejor. En el síndrome de Goodpasture, que afecta a los pulmones y también a los riñones, se produce hemoptisis. La luxación del cristalino es característica del síndrome de Alport y se debe al adelgazamiento de la cápsula anterior del mismo. La faringitis por estreptococos del grupo A puede preceder a la GN postinfecciosa. Antes que la GN postinfecciosa puede aparecer un exantema cutáneo.

23 **C** La nefritis lúpica es una manifestación de los problemas sistémicos relacionados con el depósito de inmunocomplejos, como fiebre, artralgias, mialgias, pancitopenia y serositis con pericarditis y pleuritis, que son características del lupus eritematoso sistémico (LES). La nefropatía es frecuente en presencia de LES, y la biopsia renal permitirá determinar la gravedad de la afectación y el tratamiento adecuado. Los anticuerpos frente al centrómero se consideran más específicos de la esclerodermia limitada (llamada antes síndrome CREST), que no suele asociarse a afectación renal. Los anticuerpos frente a la ADN topoisomerasa I son más específicos de la esclerodermia difusa, que puede acompañarse de afectación renal, aunque se suele manifestar como una enfermedad vascular, no como glomerulonefritis. Los anticuerpos frente a la membrana basal glomerular son característicos del síndrome de Goodpasture, en el cual se depositan anticuerpos IgG con un patrón lineal siguiendo la membrana basal de los capilares glomerulares. Pueden aparecer anticuerpos frente a las histonas en el lupus inducido por fármacos. Los ANCA aparecen en algunas formas de vasculitis, como la vasculitis granulomatosa asociada a ANCA o la polivasculitis microscópica. Los anticuerpos frente a ribonucleoproteína aparecen en la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, que tiene algunas características del LES, pero que, en general, no determina una afectación renal grave.

24 **G** Esta paciente se encuentra séptica y el soplo cardíaco es muy sugestivo de una endocarditis infecciosa. Las lesiones cardíacas son origen de émbolos (originados en vegetaciones valvulares o en trombos murales), que pueden quedar alojados en ramas de la arteria renal y producir áreas de necrosis coagulativa. Estas áreas de infarto agudo adoptan típicamente forma de cuña al corte por el patrón del flujo vascular. Además, estos émbolos sépticos pueden producir abscesos en los lugares de la vasculatura donde quedan alojados. Los riñones quísticos aumentados de tamaño de forma bilateral son típicos de la poliquistosis renal autosómica dominante. Es posible que los riñones de esta paciente tuvieran un tamaño normal y una superficie lisa antes de este episodio. Los riñones pequeños y

retraídos representan un estadio final de muchas nefropatías crónicas. Pueden encontrarse petequias y edema en la arterioloesclerosis hiperplásica asociada a hipertensión maligna. Las cicatrices corticales irregulares con dilatación pielocalicial pueden representar una hidronefrosis complicada con una infección en una pielonefritis crónica, mientras que la dilatación aislada es sugestiva de una uropatía obstructiva, como ocurre en la obstrucción de la salida vesical.

25 **F** La glomeruloesclerosis nodular y difusa es una lesión clásica de la nefropatía diabética. Los pacientes con diabetes mellitus presentan concentraciones elevadas de hemoglobina glucosilada (HbA_{1c}) e inicialmente pueden debutar con una microalbuminuria, que predice el desarrollo de una nefropatía diabética franca en el futuro. Se observa una pérdida progresiva de la función renal. Estos pacientes presentan con frecuencia hipertensión y arterioloesclerosis hialina. La presencia de proteinuria franca es sugestiva de progresión a nefropatía terminal en 5 años. Los anticuerpos frente a la membrana basal glomerular se encuentran en el síndrome de Goodpasture, que se manifiesta como una glomerulonefritis (GN) rápidamente progresiva. Los ANA son positivos en diversas enfermedades autoinmunitarias, sobre todo en el lupus eritematoso sistémico, que puede asociarse a una GN. Los ANCA son positivos en algunas variantes de vasculitis, que pueden afectar a los riñones. El título de anticuerpos frente a la estreptolisina O está elevado tras las infecciones por estreptococos, que pueden producir una GN postinfecciosa. El factor nefrítico C3 puede aparecer en la enfermedad por depósitos densos. Algunos pacientes con nefropatía membranosa muestran una serología positiva para HBsAg.

26 **F** La figura refleja una glomeruloesclerosis nodular y difusa, que se encuentra con frecuencia en pacientes con diabetes mellitus de larga evolución y que a menudo se complica con infecciones de las vías urinarias. Las infecciones de origen bacteriano son más frecuentes en pacientes diabéticos que tienen una concentración de HbA_{1c} elevada. Se producen depósitos de IgG y C3 en la membrana basal glomerular en las variantes de glomerulonefritis (GN) ocasionadas por depósito de

inmunocomplejos, incluida la nefritis lúpica y la nefropatía membranosa. La única alteración que se identifica en la enfermedad por cambios mínimos es el borramiento de los pedicelos de los podocitos, pero este cambio no es específico de esta enfermedad y puede encontrarse en otros trastornos que ocasionan proteinuria. La GN con semilunas no suele asociarse a diabetes mellitus. En la nefropatía IgA (enfermedad de Berger) se deposita IgA en el mesangio. Se puede encontrar una vasculitis granulomatosa necrotizante en los riñones de los pacientes con una granulomatosis asociada a polivasculitis (vasculitis asociada a ANCA).

27 **B** La grave lesión muscular de este paciente produjo una mioglobinemia con mioglobinuria. La gran cantidad de mioglobina excretada produce una forma tóxica de daño tubular agudo. Si se aplica tratamiento de soporte, el epitelio tubular puede regenerar, en cuyo caso la función renal se recupera. Durante la fase de recuperación de una lesión tubular aguda, los pacientes pueden excretar grandes volúmenes de orina porque el filtrado glomerular no es reabsorbido adecuadamente por el epitelio tubular lesionado. Es poco probable que una infección con pielonefritis se caracterice por esta evolución tan corta y una pérdida tan importante de función renal. Los traumatismos no originan hipertensión maligna. La glomerulonefritis no puede producirse como consecuencia de un traumatismo. La trombosis de la vena renal bilateral es infrecuente y no se relaciona con traumatismos musculares.

28 **B** La causa más frecuente de necrosis tubular aguda es la lesión isquémica. La hipotensión que aparece tras un infarto de miocardio reduce el flujo renal y conduce a la vasoconstricción intrarrenal. Las lesiones endoteliales subletales por la reducción del flujo condicionan un aumento de la liberación del vasoconstrictor endotelina y una reducción de la de vasodilatadores como el óxido nítrico y las prostaglandinas. La variante isquémica de la lesión tubular aguda se suele asociar a rotura de la membrana basal (tubulorrexis). La fase de inicio dura aproximadamente 1 día y se sigue de otra de mantenimiento, durante la cual se observa una oliguria progresiva con aumento de las concentraciones de nitrógeno

ureico en sangre y sobrecarga de sal y agua. Posteriormente, se observa una fase de recuperación, durante la cual se recupera de forma gradual la diuresis y aparece hipopotasemia. Al final se recupera la función tubular. El tratamiento de esta insuficiencia renal aguda consigue la recuperación de casi todos los pacientes. La aldosterona participa en la absorción de sodio. La eritropoyetina interviene en la regulación de la producción de eritrocitos. El péptido natriurético aumenta en presencia de una insuficiencia cardíaca congestiva, pero no condiciona una isquemia renal. La vasopresina (hormona antidiurética) controla la eliminación de agua libre.

29 **D** En los pacientes jóvenes que debutan con pielonefritis aguda de repetición es muy importante buscar trastornos adquiridos o congénitos que produzcan obstrucción o reflujo. El cultivo ayuda a identificar los microorganismos resistentes al tratamiento antibiótico. La patogenia de las infecciones urinarias ascendente involucra a bacterias que ascienden desde la vejiga hasta el uréter y la pelvis. Las infecciones urinarias suelen ser más frecuentes en mujeres, porque tienen una uretra más corta, pero, si no existen malformaciones de la vía urinaria, dichas infecciones suelen quedar localizadas en la vejiga. Las mujeres ancianas y las que tienen actividad sexual presentan un aumento del riesgo de sufrir infecciones urinarias. Puede solicitarse la determinación de ANA durante el estudio de enfermedades autoinmunitarias, como el lupus eritematoso sistémico, con afectación renal, pero cuya naturaleza no es infecciosa. No se debería realizar una biopsia renal cuando existan datos de infección renal. La determinación de la renina puede formar parte de los estudios en caso de hipertensión, proceso que condiciona una estenosis de los vasos renal y que acaba alterando la función renal, pero no predispone al desarrollo de infecciones. Aunque los estudios radiológicos pueden ayudar a demostrar la magnitud de las lesiones de la vía urinaria, sigue siendo preciso tratar la infección de forma adecuada, si es posible antes de que se produzcan lesiones importantes.

30 **D** Estos hallazgos de laboratorio son compatibles con diabetes mellitus y las características clínicas son sugestivas de

pielonefritis aguda secundaria a infección por *Escherichia coli.* La papilitis necrotizante con necrosis papilar es una complicación de la pielonefritis aguda, y los diabéticos muestran una especial tendencia a desarrollarla. En pacientes no diabéticos, se produce necrosis papilar cuando la pielonefritis aguda se combina con una obstrucción urinaria. También se puede producir necrosis papilar por el uso prolongado de analgésicos. La necrosis tubular aguda es típica de la insuficiencia renal aguda causada por hipoxia (p. ej., shock) o tóxicos (p. ej., mercurio). La glomerulonefritis con semilunas produce insuficiencia renal rápidamente progresiva. Se detecta hidronefrosis si se obstruye el flujo urinario en la pelvis renal o el uréter. Los cálculos renales pueden complicar procesos como la gota, pero no se asocian a diabetes mellitus.

31 **B** Las características clínicas de este paciente son típicas de una infección urinaria, cuya causa más frecuente es *Escherichia coli.* Los leucocitos son característicos de un proceso inflamatorio agudo. La presencia de cilindros leucocíticos indica que la infección debe afectar al riñón, dado que los cilindros se forman en los túbulos renales. La mayor parte de las infecciones urinarias se inician en la vía urinaria baja y ascienden hacia los riñones, siendo menos frecuente la diseminación hematógena. *Cryptococcus* y *Mycoplasma* son patógenos urinarios menos frecuentes. Los estreptococos del grupo A se conocen porque son responsables de la infección que antecede al desarrollo de la glomerulonefritis postestreptocócica, una enfermedad de mecanismo inmunitario en la que no se encuentran microorganismos en la lesión glomerular. *Mycobacterium tuberculosis* es responsable de la infrecuente piuria estéril; sin embargo, es típico que la tuberculosis renal no curse como una enfermedad aguda febril.

32 **F** El aspecto macroscópico de este riñón es típico de la pielonefritis crónica, que se debe, en general, a una nefropatía por reflujo. Entre las características típicas están cicatrices irregulares groseras, que aparecen como consecuencia de una infección ascendente, con decapitación y deformidad de los cálices y afectación asimétrica de los riñones. La pérdida de túbulos secundaria a las cicatrices suele reducir la capacidad de

concentración del riñón, y el paciente presenta poliuria con orina de densidad baja. La obstrucción urinaria facilita las infecciones urinarias (IU) de repetición. El reflujo vesicoureteral empuja la orina infectada desde la vejiga hacia los uréteres y la pelvis renal, y predispone a la infección; puede ser unilateral. La poliquistosis renal autosómica dominante es un proceso bilateral; los pacientes no suelen desarrollar síntomas hasta que tienen una edad intermedia; aunque los quistes pueden infectarse, es poco probable que aparezcan IU de repetición. La nefroesclerosis benigna es una enfermedad vascular que puede asociarse a hipertensión, pero no determina riesgo de infecciones. La insuficiencia cardíaca congestiva puede predisponer al daño tubular agudo. La nefritis lúpica se asocia a extensos cambios inflamatorios en los glomérulos que no son infecciosos. La amiloidosis puede conducir a una insuficiencia renal progresiva como consecuencia del depósito de amiloide en los glomérulos; sin embargo, el amiloide no induce una respuesta inflamatoria.

33 **D** La ampicilina puede producir nefritis intersticial aguda de origen medicamentoso. Se trata de una reacción inmunitaria que posiblemente se deba a que el fármaco actúa como un hapteno. Es poco probable que una faringitis con glomerulonefritis postestreptocócica y depósito de inmunocomplejos se asocie a exantema o presencia de eosinófilos en la orina. Los anticuerpos frente a la membrana basal glomerular se describen en el síndrome de Goodpasture, que cursa con hemorragias pulmonares. La pielonefritis aguda es una infección ascendente y en raras ocasiones se debe a la siembra hematógena de bacterias de otro origen. La lesión tubular aguda puede producir una insuficiencia renal aguda y se debe a la hipoxia secundaria al shock o a un daño tóxico por sustancias químicas como el mercurio; es muy raro, si es que ocurre, que este cuadro se relacione con toxinas bacterianas.

34 **A** Diversos fármacos pueden producir una nefritis intersticial inducida por fármacos, incluidas las sulfonamidas, las penicilinas, las cefalosporinas, las fluoroquinolonas ciprofloxacino y norfloxacino, y los antituberculosos isoniacida y rifampicina. La nefritis tubulointersticial aguda también puede

asociarse al uso de diuréticos tiacídicos y de asa, de cimetidina, de ranitidina, de omeprazol y de antiinflamatorios no esteroideos. La enfermedad se suele manifestar unas 2 semanas después de que el paciente comienza a consumir el fármaco y en ella participan elementos de hipersensibilidad de tipos I (aumento de IgE) y IV (positividad de las pruebas cutáneas frente a los haptenos del fármaco). La insuficiencia cardíaca congestiva puede producir una lesión tubular aguda, pero no se asocia a exantema o proteinuria. El síndrome hemolítico urémico aparece tras la ingesta de cepas de *Escherichia coli* presentes en la carne picada. La glomerulonefritis (GN) postestreptocócica podría explicar la hematuria y la proteinuria de este paciente, pero no el exantema, dado que, en las cepas de estreptococos β-hemolíticos del grupo A que producen infección cutánea, esta tiene lugar semanas antes de que se desarrolle la GN. En la orina de los pacientes con una infección urinaria se pueden encontrar leucocitos, pero no eosinófilos.

35 **E** La nefropatía por analgésicos produce lesiones en el intersticio renal y puede producir necrosis papilar; una complicación temida, aunque infrecuente, es el carcinoma urotelial. Es poco probable que se desarrolle hidronefrosis en caso de nefropatía por analgésicos, porque no hay obstrucción de la vía urinaria. La papila desprendida puede descender por el uréter. Las lesiones tóxicas asociadas a consumo de analgésicos son lentamente progresivas y no agudas, a diferencia de la lesión tubular aguda. Si existe consumo abusivo de analgésicos, no se producen lesiones glomerulares específicas.

36 **D** La hipertensión de este paciente se debe a una estenosis de los vasos renales, típica de la ateroesclerosis de la arteria renal. Cuando se reduce el flujo renal, el filtrado glomerular (FG) se mantiene gracias a la vasodilatación mediada por las prostaglandinas de las arteriolas aferentes y la vasoconstricción mediada por angiotensina II de las arteriolas eferentes. Los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (ECA) reducen la vasoconstricción de las arteriolas eferentes y la presión de perfusión del capilar glomerular. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno, inhiben la síntesis de prostaglandinas y producen

vasoconstricción, con la consiguiente disminución del flujo renal y el FG. La aldosterona aumenta al incrementarse la producción de renina y angiotensina, lo que determina una menor excreción de sodio. La histamina es un vasodilatador de los gránulos de los mastocitos, que interviene en los procesos inflamatorios agudos, pero no en la regulación de la presión arterial. El óxido nítrico es un vasodilatador, pero no tiene efectos significativos sobre el flujo de sangre capilar. El factor de necrosis tumoral interviene en muchos procesos inflamatorios, pero no afecta al flujo renal.

37 **F** El rápido recambio celular en las leucemias agudas y la muerte celular secundaria al tratamiento condicionan la liberación de purinas por la degradación del ADN celular. La hiperuricemia que se produce puede predisponer a la formación de cristales de ácido úrico en los conductos colectores. Cuando se desarrollan cálculos renales, pueden provocar dolores cólicos cuando se expulsan a través del uréter y de la uretra, y las lesiones locales del urotelio pueden ser origen de hematuria. Los cálculos de ácido úrico se forman en orinas ácidas. A diferencia de los cálculos que contienen calcio, los cálculos que contienen ácido úrico son difíciles de visualizar en una radiografía simple. La tira reactiva de orina es sensible a la albúmina, pero no a las globulinas; la prueba de proteína de Bence Jones puede ser positiva, aunque la tira reactiva para proteínas sea negativa. La proteinuria de Bence Jones es característica del mieloma múltiple, pero no se asocia a leucemia o linfoma. Pueden encontrarse eosinófilos en la orina en caso de nefritis intersticial inducida por fármacos. La mioglobina puede condicionar un resultado positivo de la tira reactiva para sangre aunque no existan eritrocitos o hemoglobina en la orina. La mioglobinuria suele asociarse a rabdomiólisis, fenómeno que puede ocurrir tras las lesiones por aplastamiento graves. Los cuerpos grasos ovales son células tubulares descamadas que contienen abundantes lípidos y son típicas de los síndromes nefróticos. Los cilindros de eritrocitos aparecen en los síndromes nefríticos como consecuencia de la lesión glomerular.

38 **A** Estos hallazgos son característicos de la nefrocalcinosis secundaria a hipercalcemia. Una de las causas más frecuentes de hipercalcemia en adultos es la enfermedad metastásica. La

hipercalcemia produce una enfermedad tubulointersticial crónica renal, que inicialmente se manifiesta con una pérdida de la capacidad de concentración. Al mantenerse la hipercalcemia, se pierde de forma progresiva la función renal. También pueden aparecer cálculos urinarios constituidos por oxalato cálcico. Puede encontrarse hipercolesterolemia en algunos casos de enfermedad de cambios mínimos. En el mieloma múltiple se puede encontrar hipergammaglobulinemia con proteína monoclonal (proteína M), pero este proceso no se asocia a cáncer de mama. En la diabetes mellitus puede desarrollarse hiperglucemia, pero los enfermos oncológicos no presentan un aumento del riesgo de sufrir diabetes mellitus. Se describe hiperuricemia en algunos casos de gota. También puede ocurrir en algunos pacientes oncológicos (sobre todo con linfomas y leucemias) con una elevada velocidad de proliferación y que reciben tratamiento quimioterápico. En estos casos, la extensa muerte celular (síndrome por lisis) provoca un incremento agudo de las concentraciones de ácido úrico, con la consiguiente nefropatía por uratos.

39 **E** Se describe una elevada concentración de globulinas séricas, lumbalgia por las lesiones líticas, inmunodepresión con infecciones de repetición y depósitos de amiloide con aumento del tamaño de los riñones, datos compatibles con un mieloma múltiple. Este depósito de amiloide AL se describe en el 6-24% de los casos de mieloma y puede afectar a los riñones. Los pacientes con un mieloma suelen presentar proteinuria de Bence Jones (que no se detecta con el análisis de orina mediante tiras reactivas) y algunos desarrollan nefropatía por cilindros, que puede causar una insuficiencia renal aguda o, con más frecuencia, crónica. La nefropatía por analgésicos (p. ej., ácido acetilsalicílico, fenacetina, paracetamol) puede conducir a nefritis tubulointersticial y necrosis papilar. En la vasculitis granulomatosa asociada a ANCA se pueden encontrar vasculitis necrotizante y necrosis fibrinoide de las arterias renales, pero no depósitos de amiloide. La glucemia de este paciente no se encuentra en rango diabético, y los depósitos rosados que se encuentran en la glomeruloesclerosis nodular o difusa no son amiloide. La tinción rosada de las asas capilares engrosadas de

la nefropatía membranosa se debe a los depósitos inmunitarios, no al amiloide. En el lupus eritematoso sistémico pueden producirse depósitos inmunitarios con engrosamiento en «asa de alambre» de los capilares glomerulares, pero estos se deben al depósito inmunitario, pero no al amiloide.

40 **C** La figura muestra arterioloesclerosis hialina, que afecta de forma típica a pacientes con hipertensión benigna, y los cambios en el parénquima renal pueden llamarse *nefroesclerosis benigna.* Pueden aparecer cambios similares con el envejecimiento en personas no hipertensas. La estenosis vascular produce cambios isquémicos, lentos y progresivos. Se observa cicatrización difusa con retracción de los riñones. La determinación selectiva de la presión arterial es un método importante que permite identificar a los pacientes hipertensos antes de que sufran un daño importante de los órganos. La hipertensión esencial (benigna) puede evolucionar a hipertensión maligna, que produce lesiones vasculares renales características, entre las que se encuentran la necrosis fibrinoide y la arterioloesclerosis hiperplásica. La hipertensión crónica predispone al desarrollo de enfermedad cerebral vascular asociada a ataques isquémicos transitorios e ictus. La necrosis tubular aguda se produce como consecuencia de una lesión anóxica o tóxica sobre los túbulos renales. La displasia fibromuscular puede afectar a una o más capas de las arterias renales y producir una estenosis focal. En caso de nefritis intersticial se encontrarían más células en el sedimento urinario. La vasculitis asociada a ANCA puede tener un componente necrotizante, al igual que la arterioloesclerosis hiperplásica.

41 **B** La hipertensión maligna puede producirse tras una hipertensión benigna de larga evolución. En la hipertensión maligna se encuentran dos tipos de lesiones vasculares con nefroesclerosis acelerada. Puede aparecer necrosis fibrinoide de las arteriolas y, además, engrosamiento de la íntima de las arterias y arteriolas interlobulillares por proliferación de las células musculares lisas y depósito de colágeno. Las células musculares lisas que proliferan se disponen de forma concéntrica y estas lesiones, llamadas *arterioloesclerosis hiperplásica,* condicionan una estenosis importante de la luz. La

isquemia que determinan incrementa las concentraciones de renina, lo que contribuye todavía más a la lesión porque fomenta la vasoconstricción. Las semilunas glomerulares son una característica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva; sin embargo, el incremento de la presión arterial no es tan importante como se describe en este paciente. La nefropatía IgA afecta a los glomérulos, pero suele respetar el intersticio o los vasos. La glomeruloesclerosis nodular es una característica de la diabetes mellitus, que progresa con lentitud a lo largo de muchos años. La necrosis tubular segmentaria se observa en las variantes isquémicas de lesión tubular aguda.

42 **C** El síndrome hemolítico urémico es una de las causas más frecuentes de fracaso renal agudo en niños. Se suele producir tras la ingesta de carne infectada con *Escherichia coli* productora de verocitotoxina, sobre todo del serotipo O157:H7. Esta toxina de Shiga lesiona el endotelio, reduce el óxido nítrico y fomenta la vasoconstricción y la necrosis, lo cual estimula la activación de las plaquetas con formación de trombos en los vasos pequeños. Con el tratamiento de soporte, la mayor parte de los pacientes se recuperan en unas pocas semanas, aunque una cuarta parte de ellos progresan a insuficiencia renal crónica. Sin embargo, el síndrome hemolítico urémico también puede afectar a adultos tras la ingesta de la toxina de Shiga o de algunos fármacos. La púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) en adultos puede ocasionar una microangiopatía trombótica renal similar, pero se debe a la eliminación anómala de la metaloproteinasa ADAMTS13 de los multímeros de von Willebrand. Las infecciones urinarias por *Candida* afectan de forma típica a la vejiga urinaria. *Clostridium difficile* es conocido como causa de enterocolitis seudomembranosa, pero no ocasiona lesiones renales. *Proteus* es una causa frecuente de infecciones urinarias de tipo bacteriano, mientras que *Staphylococcus aureus* es menos habitual.

43 **D** Se describe poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD). En la mayor parte de los casos se encuentran mutaciones del gen *PKD1,* que codifica la policistina 1, mientras que aproximadamente el 15% de los pacientes tienen mutaciones de *PKD2,* que codifica la policistina 2 y tiene una

evolución más lenta. A lo largo de muchos años se desarrollan grandes quistes, y en la edad adulta estos pacientes terminan por presentar insuficiencia renal. Las proteínas elongina son parte del complejo formado por la actividad del gen de von Hippel-Lindau *(VHL);* pueden formarse quistes en muchos órganos, pero *VHL* es más conocido como supresor de tumores. Las mutaciones de la fibrocistina se asocian a poliquistosis renal autosómica recesiva (PQRAR), que se manifiesta dentro del útero. Las mutaciones de *NPHP1,* que codifica la nefrocistina, se asocian al complejo nefronoptisis-enfermedad quística medular. La tuberina codificada por *TSC2* participa en la aparición de quistes en relación con la esclerosis tuberosa.

44 **A** Estos hallazgos son típicos de la poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD). Como muestra la figura, múltiples quistes de gran tamaño han sustituido por completo al parénquima renal. Los quistes que aumentan de tamaño y la hemorragia dentro de los quistes pueden provocar dolor. Puede encontrarse un prolapso de la válvula mitral en el 25% de los pacientes. El 10-30% de los que presentan PQRAD tienen un aneurisma en fresa intracraneal, que en algunos casos puede romperse sin previo aviso. La coagulación intravascular diseminada puede ser una complicación del síndrome hemolítico urémico. Aunque la PQRAD puede afectar al hígado, provoca quistes, no cirrosis. La cardiopatía isquémica se debe a la ateroesclerosis, que puede asociarse a diabetes mellitus, a menudo relacionada con una nefropatía. En la PQRAD los pulmones no resultan afectados.

45 **B** La poliquistosis renal autosómica recesiva (PQRAR) suele afectar a niños y, en este caso, se asocia a un dato característico, que es la fibrosis hepática congénita. La mayor parte de los casos de PQRAR presentan mutaciones del gen *PKHD1,* que codifica la fibrocistina expresada en el hígado, en los riñones y en el páncreas. Por el contrario, la poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) se manifiesta como una insuficiencia renal en adultos y se relaciona con mutaciones de los genes *PKD1* y *PKD2,* que codifican las proteínas policistina presentes en los túbulos renales. Algunas variantes menos frecuentes de la PQRAR permiten la supervivencia pasada la lactancia y estos

pacientes desarrollan fibrosis hepática congénita. Los riñones grandes con quistes de 1-4 cm son típicos de la PQRAD en adultos. Quizá la nefropatía quística más frecuente en fetos y lactantes sea la displasia renal multiquística (riñón displásico multiquístico), que se asocia a quistes de tamaño variable focales, uni- o bilaterales, pero no a fibrosis hepática congénita. El riñón en esponja medular es un proceso benigno que se suele encontrar en estudios radiológicos en adultos. La atresia uretral produciría una importante dilatación vesical con hidrouréter e hidronefrosis.

46 **C** Hasta el 1% de los adultos presentan algún grado de un proceso congénito conocido como *riñón en esponja medular* (REM). En el REM se produce dilatación quística de 1-5 mm en los conductos colectores medulares internos y papilares. El REM es bilateral en el 70% de los pacientes. La afectación de las papilas no es igual en todas ellas, aunque es frecuente encontrar cálculos en los conductos colectores dilatados. Los pacientes suelen desarrollar cálculos renales, infecciones o hematuria de repetición en la tercera o cuarta década de la vida. Más del 50% de estos pacientes presentan cálculos. La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) ocasiona quistes mucho más grandes, que afectan a todo el riñón y acaban ocasionando una renomegalia masiva. La poliquistosis renal autosómica recesiva (PQRAR) es infrecuente y produce un aumento de tamaño renal bilateral y simétrico que se manifiesta dentro del útero y ocasiona una insuficiencia renal evidente desde el nacimiento. La displasia renal multiquística puede ser esporádica o aparecer como parte de diversos síndromes genéticos, como el síndrome de Meckel-Gruber, en fetos y recién nacidos.

47 **B** Este niño presenta nefronoptisis, que es la causa genética más frecuente de nefropatía terminal en niños y adolescentes, y que se transmite con un patrón de herencia autosómica recesiva. Los genes *NPHP1* a *NPHP11* codifican las proteínas presentes en los cilios primarios, los cuerpos basales ciliares a los que se unen o el centrosoma, en el que se originan los cuerpos basales. Esto condiciona una pérdida de la capacidad de concentración con una acidosis tubular renal. Las mutaciones de *MCKD1* se asocian a enfermedad quística medular del adulto, de herencia

autosómica dominante. *PKD1* codifica la policistina 1, que se asocia a poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD). Las mutaciones de *PKHD1* afectan a la fibrocistina y se asocian a poliquistosis renal autosómica recesiva (PQRAR).

48 **D** La dilatación de la pelvis y de los cálices se debe a una obstrucción prolongada con hidrouréter e hidronefrosis. En algunos diabéticos, la neuropatía se complica con una vejiga neurógena, lo que puede conducir a una obstrucción funcional. La neuropatía diabética de este paciente contribuye a la presencia de un «pie diabético» con ulceraciones. La diabetes mellitus se asocia a muchas complicaciones renales, sobre todo por las lesiones vasculares, glomerulares o intersticiales, pero no se relaciona con obstrucción. Las cicatrices asociadas a nefropatía por analgésicos o pielonefritis crónica pueden ser importantes y se asocian a una pérdida significativa de parénquima renal, pero sin dilatación pélvica. En la nefroesclerosis benigna los riñones se vuelven más pequeños y presentan una superficie granular, pero no tienen dilatación. Es poco probable que un paciente con cáncer de próstata lo suficientemente grande como para producir una obstrucción de la vía urinaria hubiera sobrevivido 15 años.

49 **E** Los quistes simples son frecuentes en adultos y pueden ser múltiples, aunque no son tan abundantes como los que se describen en la poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) ni se asocian a insuficiencia renal. Los quistes simples pueden alcanzar un tamaño de unos 10 cm y a veces se producen hemorragias en su seno. En ocasiones se desarrollan quistes múltiples en pacientes sometidos a hemodiálisis a largo plazo. Es poco probable que este paciente tenga pielonefritis aguda, porque no presenta fiebre ni se detectan leucocitos en su orina. La pielonefritis aguda puede asociarse a pequeños abscesos, pero no a quistes, aunque en los pacientes con una PQRAD pueden infectarse los quistes. La necrosis tubular aguda es consecuencia de una lesión isquémica o tóxica y se asocia a evidencia de insuficiencia renal. La nefropatía diabética incluye enfermedad vascular y glomerular, pero no a quistes. La hidronefrosis puede provocar una obstrucción focal de un cáliz con dilatación, pero no un quiste excéntrico. Las neoplasias

producen, en general, masas sólidas, aunque algunos carcinomas de células renales pueden ser quísticos. Esta última situación es mucho menos frecuente que un quiste simple.

50 **A** La eliminación de un cálculo por el uréter durante un cólico ureteral se asocia a un intenso dolor (10 sobre 10). Aproximadamente el 70% de todos los cálculos renales están constituidos por cristales de oxalato cálcico. Los pacientes afectados suelen presentar hipercalciuria sin hipercalcemia. Los cálculos de ácido úrico y cistina suelen formarse en orinas ácidas. Los cálculos de cistina son infrecuentes. Los cálculos de triple fosfato (fosfato de amonio de magnesio) suelen asociarse a infecciones urinarias de repetición, sobre todo a las causadas por bacterias positivas para la ureasa, como *Proteus.* Las mucoproteínas pueden fusionarse y formar cilindros hialinos, que son demasiado pequeños como para provocar signos o síntomas.

51 **C** Los cálculos de oxalato cálcico son la variante más frecuente de cálculo urinario y aproximadamente el 50% de los pacientes tienen un aumento de la excreción de calcio sin hipercalcemia. La base de la hipercalciuria no está clara. Las infecciones pueden predisponer a la formación de cálculos de fosfato de amonio y magnesio, sobre todo los microorganismos *Proteus* que degradan la urea. La diabetes mellitus es una causa poco frecuente de litiasis urinaria. Aunque las infecciones son más frecuentes en diabéticos, la mayor parte de ellas no se deben a bacterias capaces de degradar la urea. El hiperparatiroidismo predispone a los individuos afectados a la formación de cálculos que contienen calcio, aunque pocos pacientes con cálculos urinarios presentan este proceso. La mayor parte de los cálculos de ácido úrico se forman en orina ácida y no guardan relación con la gota. Se cree que estos pacientes tienen una tendencia no explicada a excretar orina ácida. Con un pH bajo, el ácido úrico es insoluble y se forman cálculos.

52 **E** Las infecciones urinarias de repetición por microorganismos que degradan la urea, como *Proteus*, pueden provocar la formación de cálculos de fosfato de amonio y magnesio. Estos cálculos son grandes y llegan el sistema calicial dilatado. Dado su gran tamaño y las proyecciones hacia los cálices, estos

cálculos se denominan a veces *cálculos en asta de ciervo.* La necrosis tubular aguda se asocia típicamente a lesiones renales de origen isquémico o tóxico. La nefroesclerosis maligna es un proceso principalmente vascular, no asociado a infecciones. La necrosis papilar puede complicar la diabetes mellitus. Las infecciones no son una característica clave en el carcinoma de células renales.

53 **C** La figura muestra un carcinoma de células renales. Aproximadamente el 5-10% de estos tumores secretan eritropoyetina, con lo que causan policitemia. Pueden secretar, además, otras sustancias, como corticotropina (hormona adrenocorticótropa), que ocasiona hipercortisolismo en el contexto de un síndrome de Cushing, aunque esta situación es menos frecuente que la policitemia. Los carcinomas de células renales suelen ser unilaterales y no destruyen todo el riñón en los casos típicos, por lo que no se produce una pérdida significativa de función renal y las concentraciones de nitrógeno ureico y creatinina sérica son normales. En algunos pacientes con carcinoma de células renales puede aparecer hipertensión secundaria a hiperreninemia, aunque es poco frecuente. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (vasopresina) es un síndrome paraneoplásico más frecuente en presencia de carcinomas pulmonares de células pequeñas. Las cifras de globulinas están elevadas en caso de mieloma múltiple y condicionan el depósito de amiloide, que es un proceso difuso.

54 **A** La variante de células claras de carcinoma de células renales, que es la forma más frecuente de cáncer renal, suele manifestarse con hematuria indolora, sobre todo en pacientes en la sexta o séptima década de la vida; el tabaquismo es un factor de riesgo. En la mayor parte de los carcinomas de células claras esporádicos se pierden ambos alelos del gen *VHL.* Las mutaciones en línea germinal del gen *VHL* pueden producir el síndrome de von Hippel-Lindau, que tiene una incidencia máxima de carcinoma de células renales en la cuarta década de la vida y que se puede asociar a otros tumores, como hemangioblastomas cerebelosos, angiomas retinianos y feocromocitomas suprarrenales. La infección por el VPH-16 se asocia a carcinomas de cuello uterino. La inestabilidad de

microsatélites es una característica del síndrome de Lynch, llamado también *síndrome de cáncer colorrectal hereditario no poliposo* y que se caracteriza por cáncer del colon derecho y, en algunos casos, cáncer de endometrio. La mutación del gen *MET* en el cromosoma 7 se asocia a la variante papilar del carcinoma de células renales, pero las trisomías no son específicas de esta neoplasia.

55 **A** El segundo tipo de carcinoma renal más frecuente en adultos es el carcinoma de células renales papilar, asociado a mutaciones del gen *MET,* que pueden ser familiares o esporádicas. Las mutaciones de *PKD1* se asocian a poliquistosis renal autosómica dominante. Las mutaciones de *RAS* son frecuentes en muchos cánceres de numerosas localizaciones, sobre todo del tubo digestivo, pero no parece probable que se asocien a carcinomas renales familiares. *TSC1* codifica la hamartina, asociada a esclerosis tuberosa y angiomiolipomas renales. Pueden encontrarse mutaciones de *WT1* en el tumor de Wilms renal, que aparece durante la infancia.

56 **D** Si se desplaza la imagen de TC para cubrir la parte superior del abdomen, es probable que se encuentre una masa renal, que correspondería a un carcinoma de células renales. El tabaquismo es un factor de riesgo. Pueden aparecer metástasis a distancia antes de que el tumor primario provoque síntomas. La hematuria es frecuente, aunque puede ser microscópica. La producción de hormonas en un carcinoma de células renales puede provocar hipertensión. Si se reseca el tumor primario, puede que se consiga la remisión de las metástasis, ya que dependen de la elaboración de citocinas, como el VEGF, por parte del carcinoma de células renales primario. Es menos probable que el carcinoma urotelial, que también se asocia a tabaquismo, produzca metástasis óseas y pulmonares. Este tumor puede originarse en los cálices y la pelvis renales, así como en la vejiga urinaria y los uréteres. El carcinoma de uraco, que suele ser un adenocarcinoma, es una causa infrecuente de hematuria y aparece sobre un resto del uraco derivado del alantoides embrionario.

57 **E** El tumor de Wilms es la neoplasia renal más frecuente en niños y una de las neoplasias más comunes durante la infancia.

Una compleja fórmula de análisis de la estadificación, gradación y molecular, además de la cirugía, quimioterapia y radioterapia, consigue una elevada frecuencia de curaciones. El patrón microscópico del tumor de Wilms (nefroblastoma) recuerda a la zona nefrógena del riñón fetal. Los angiomiolipomas pueden ser esporádicos o aparecer como parte del síndrome genético de la esclerosis tuberosa. Pueden ser múltiples y bilaterales, y contener músculo bien diferenciado, tejido adiposo y elementos vasculares. Los tumores de células intersticiales renomedulares (fibromas medulares) suelen medir menos de 1 cm y son hallazgos incidentales. El carcinoma de células renales es infrecuente en niños, y entre los patrones más frecuentes están el de célula clara, el papilar y el cromófobo. Los carcinomas de células transicionales se originan en el urotelio en adultos y se parecen histológicamente al urotelio.

CAPÍTULO

21

Vías urinarias bajas y aparato genital masculino

PEF9 Capítulo 21: Vías urinarias bajas y aparato genital masculino

PH9 Capítulo 17: Aparato genital masculino y vía urinaria baja

1 Un lactante ha presentado infecciones urinarias de repetición desde el nacimiento. La ecografía revela dilatación de la pelvis y los cálices del riñón izquierdo; no se identifica presencia de riñón derecho. Se repara quirúrgicamente la obstrucción. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable que se encuentre en el lugar de la obstrucción?

A Adenocarcinoma en el seno de una extrofia vesical
B Divertículo con hemorragia en la pared del uréter
C Inflamación granulomatosa en un uréter doble
D Discontinuidad del músculo liso en la unión ureteropélvica
E Resto de uraco en la cúpula vesical

2 Un hombre de 73 años con frecuencia urinaria ha presentado tres infecciones urinarias en el último año. En la exploración física destaca un aumento de tamaño difuso de la próstata. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable que se encuentre en la vejiga urinaria de este paciente?

A Divertículo
B Cistitis intersticial
C Malacoplaquia
D Papiloma
E Huevos de esquistosomas

3 Un hombre de 69 años con antecedentes de pancreatitis de

repetición tratada con corticoesteroides presenta fatiga progresiva desde hace 2 años. No consume alcohol ni muestra evidencias de enfermedad en la vesícula biliar. En la exploración no se encuentran alteraciones. En las pruebas de laboratorio destacan cifras de creatinina sérica de 5 mg/dl y de nitrógeno ureico de 48 mg/dl. La concentración de IgG4 sérica está elevada. La ecografía muestra hidronefrosis bilateral. ¿Qué es más probable que muestre la TC abdominal en este paciente?

A Nefrolitiasis
B Cistitis polipoidea
C Fibrosis retroperitoneal
D Carcinoma de células renales
E Carcinoma urotelial

4 En una lactante se observa que, con frecuencia, la parte superior del pañal está húmeda. La radiografía con contraste revela una conexión entre la vejiga y el ombligo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Divertículo congénito
B Extrofia
C Persistencia del uraco
D Reflujo vesicoureteral
E Resto del conducto vitelino

5 Una mujer de 51 años con nefropatía diabética se somete a un trasplante renal con aloinjerto. Un episodio de rechazo celular agudo obliga a aumentar el tratamiento inmunodepresor. Desarrolla disuria. A la palpación se observa dolor suprapúbico. El análisis de orina revela hematuria. Se realiza una cistoscopia y se observan placas mucosas ligeramente abultadas de 3-4 cm de diámetro, blandas y amarillentas. La biopsia de estas lesiones muestra infiltración de la mucosa por macrófagos espumosos con abundantes gránulos citoplásmicos positivos para PAS y pequeñas concreciones mineralizadas laminares. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que se identifique en la orina de esta paciente?

A Adenovirus
B *Candida albicans*
C *Chlamydia trachomatis*
D *Escherichia coli*

E *Schistosoma haematobium*

6 Se realiza un estudio sobre pacientes con un carcinoma urotelial vesical. Se analizan las características macroscópicas, microscópicas y moleculares de estos tumores malignos, y se correlaciona la supervivencia con el tratamiento. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que obligue a realizar una cistectomía radical para mejorar la supervivencia de estas neoplasias?

A Exposición a carcinógenos químicos
B Infiltración de la capa muscular propia
C Falta de respuesta al tratamiento con BCG
D Origen sobre un papiloma urotelial invertido
E Mutación del gen *TP53*



7 Un hombre de 58 años originario de Shanghái ha observado que su orina es más oscura desde hace 3 semanas. La exploración física no revela alteraciones. El análisis de orina muestra presencia de sangre. Se realiza una cistoscopia y se identifica una zona rojiza de 0,5 × 1,7 cm en la cúpula vesical. Se obtienen biopsias y el aspecto histológico observado es el que se muestra en la figura. ¿Cuál es el factor de riesgo más probable para esta enfermedad?

A Resto congénito del uraco
B Mutación génica hereditaria

C Obesidad
D Esquistosomiasis
E Tabaquismo



8 Un hombre de 65 años se jubiló después de trabajar durante muchos años en un puesto vinculado con la exposición a tintes de tipo anilina, incluida la β-naftilamina. Hace 1 mes tuvo un episodio de hematuria sin dolor abdominal. En la exploración física no se encuentran alteraciones. El análisis de orina muestra hematuria de 4+ sin presencia de cetonas, glucosa o proteínas. El estudio microscópico de la orina revela presencia de eritrocitos en cantidad demasiado abundante como para que sea posible su recuento, 5-10 leucocitos por campo de gran aumento y ausencia de cilindros o cristales. El urocultivo es negativo. Se realiza una cistoscopia y la biopsia de la lesión muestra el aspecto histológico que muestra la imagen. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que tenga este paciente?
A Adenocarcinoma
B Rabdomiosarcoma
C Carcinoma de células renales
D Carcinoma epidermoide
E Carcinoma urotelial



9 Un hombre de 78 años presenta dificultad progresiva para la micción desde hace 6 años. Refiere dificultad tanto para iniciar el chorro como para interrumpirlo. En la exploración física tiene temperatura de 37 °C y presión arterial de 130/85 mmHg. La figura muestra el aspecto macroscópico representativo de la vejiga. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que se encuentre en este paciente?

A Anticuerpos antinucleares positivos
B Concentración de hemoglobina de 22,5 g/dl
C Concentración de antígeno prostático específico de 5 ng/ml
D Huevos de *Schistosoma haematobium* en la orina
E Prueba cutánea de *Mycobacterium tuberculosis* positiva

10 Una mujer de 57 años refiere dolor miccional durante los últimos 5 meses y ayer observó que la ropa interior estaba manchada de sangre. La exploración revela un nódulo rojizo doloroso de 1 cm en el labio posterior de la uretra externa, que se extirpa. ¿Qué hallazgo patológico es más probable que se encuentre en el estudio de esta lesión?

A Tejido de granulación
B Células multinucleadas
C Infiltrados de células plasmáticas
D Rabdomiosarcoma
E Carcinoma epidermoide

F Displasia urotelial

11 Una mujer de 74 años ha observado una masa de crecimiento lento en la uretra desde hace 6 meses. La masa produce dolor local e irritación y en este momento sangra. La exploración física confirma la presencia de una masa verrugosa ulcerada de 2,5 cm de diámetro que protruye desde el meato uretral externo. No se encuentran más lesiones en los labios mayores o menores o en la vagina. ¿Qué hallazgo es más probable que muestre una biopsia de la lesión descrita?

A Carcinoma de células claras
B Rabdomiosarcoma embrionario
C Leiomioma
D Condilomas planos
E Carcinoma epidermoide

12 Un niño de 5 años tiene antecedentes de infecciones urinarias de repetición. Los urocultivos identifican *Escherichia coli, Proteus mirabilis* y *Enterococcus.* La exploración física actual revela estenosis patológica de la desembocadura uretral en la superficie ventral del pene a 1,5 cm de la punta del glande. También se encuentran criptorquidia en el testículo derecho y una hernia inguinal izquierda. ¿Qué término describe mejor el trastorno del pene en este paciente?

A Balanitis
B Enfermedad de Bowen
C Epispadias
D Hipospadias
E Fimosis

13 Un hombre de 19 años presenta dolor local e irritación progresivas con dificultades para la micción desde hace 3 años. Durante el último año ha aumentado su actividad sexual y describe que la erección le provoca dolor. La exploración física muestra que no está circuncidado. No es sencillo retraer el prepucio por encima del glande. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Papulosis bowenoide
B Epispadias
C Candidiasis genital
D Parafimosis

E Fimosis

14 Un hombre de 46 años con antecedentes de diabetes mellitus mal controlada ha presentado lesiones dolorosas, erosivas y muy pruriginosas en el glande, el escroto y la región inguinal de la piel durante los últimos 2 meses. La exploración física identifica úlceras poco profundas eritematosas e irregulares, de 1-4 cm. Se realiza un estudio histológico del raspado de estas lesiones. ¿Cuál de los siguientes hallazgos microscópicos es más probable que se encuentre en estos raspados?

A Células atípicas de núcleos hipercromáticos
B Células en gemación con seudohifas
C Huevos y excrementos de ácaros
D Células aumentadas de tamaño con inclusiones intranucleares
E Espiroquetas en el estudio con campo oscuro

15 Un hombre de 23 años, sexualmente activo, ha recibido tratamiento por una infección por *Neisseria gonorrhoeae* seis veces en los últimos 5 años. Ahora acude a consulta por el aumento del número y del tamaño de unas lesiones verrugosas de crecimiento lento en los genitales externos durante el último año. En la exploración física se identifican múltiples excrecencias papilares no ulceradas sésiles de 1-3 mm en la superficie interna del prepucio. Se extirpan estas lesiones, pero a los 2 años aparecen otras similares. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que predispusiera al paciente al desarrollo de estas lesiones recidivantes?

A Infección por *Candida albicans*
B Circuncisión
C Infección por el virus del papiloma humano
D Infección por *Neisseria gonorrhoeae*
E Parafimosis
F Fimosis



16 Un hombre de 56 años de Fortaleza, Brasil, ha detectado una lesión en su pene que ha aumentado de tamaño durante los últimos 18 meses. La exploración física identifica la lesión que muestra la figura una vez resecada. ¿Qué es más probable encontrar en el estudio histológico de esta lesión?

A Inflamación aguda y crónica con células en gemación y seudohifas

B Urotelio displásico por encima de la membrana basal

C Epitelio escamoso hiperqueratósico y acantósico por encima de unos vasos ectásicos

D Células escamosas poco diferenciadas pleomorfas infiltrantes

E Glándulas infiltrantes con epitelio mucinoso cilíndrico alto

17 Un hombre de 48 años lleva 3 meses notándose un área rojiza en el pene. En la exploración física se identifica una zona solitaria eritematosa, parecida a una placa, de 0,8 cm en la parte distal del cuerpo del pene. El cultivo microbiológico rutinario y el frotis con tinción de Gram de la lesión revelan que la flora cutánea es normal. El estudio histológico de una biopsia de la lesión muestra displasia con afectación de todo el espesor del epitelio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Balanitis

B Enfermedad de Bowen

C Condiloma acuminado

D Sífilis primaria

E Chancro blando

18 Un hombre de 18 años se somete a una revisión de salud rutinaria. En la exploración física no se palpa el testículo izquierdo en el escroto. El paciente está sano, sin enfermedades importantes y su función sexual es normal. ¿Cuál de las siguientes complicaciones le diría al paciente que es más probable que tenga?

A Carcinoma
B Herencia
C Infección
D Infertilidad
E Ausencia de secuelas

19 Un hombre de 64 años notó dolor urente durante la micción hace 1 semana. Ha observado molestias en el escroto durante los últimos 2 días. En la exploración se identifica un testículo derecho tumefacto y doloroso. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que ocasione la enfermedad de este paciente?

A *Escherichia coli*
B Virus del papiloma humano
C Virus de la parotiditis
D *Mycobacterium tuberculosis*
E *Treponema pallidum*

20 Un hombre de 36 años y su mujer de 33 llevan 12 años intentando concebir, y actualmente se encuentran en estudio por infertilidad. En la exploración física no se encuentran alteraciones significativas en ninguno de los cónyuges. Las pruebas de laboratorio demuestran que el hombre tiene un recuento de espermatozoides en el límite bajo de la normalidad. El estudio microscópico del líquido seminal identifica espermatozoides de morfología normal. Se realiza una biopsia testicular, en la cual se encuentra una atrofia parcheada de los túbulos seminíferos, aunque los demás conservan una espermatogenia activa. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que produzca estos hallazgos?

A Fallo en el descenso normal del testículo
B Formación de hidrocele con cambios compresivos
C Síndrome de Klinefelter
D Antecedentes de infección por el virus de la parotiditis
E Antecedentes de exposición a la radiación



21 Un hombre de 23 años previamente sano desarrolla de forma súbita un intenso dolor escrotal que persiste sin cambios durante 6 h. Pasado este tiempo acude a urgencias. En la exploración física se encuentra afebril y muestra una intensa hipersensibilidad en la zona de un testículo derecho ligeramente aumentado de tamaño, sin otros hallazgos significativos. La figura refleja el aspecto macroscópico del testículo derecho. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que cause estos hallazgos?

A Coriocarcinoma hemorrágico
B Obstrucción linfática
C Infección por micobacterias
D Obstrucción del flujo de sangre
E Vasectomía previa

22 Un hombre de 33 años ha observado un aumento de tamaño asimétrico del escroto durante los últimos 4 meses. En la exploración física, el testículo derecho mide el doble de lo normal y se observa hipersensibilidad a la palpación. Se realiza una biopsia del mismo. En el epidídimo y la parte superior del testículo derecho se observa una extensa inflamación granulomatosa con células epitelioides, células gigantes de Langhans y necrosis caseosa. ¿Cuál de las siguientes infecciones es más probable que ocasione estos hallazgos?

A Chancroide
B Gonorrea
C Parotiditis
D Sífilis

E Tuberculosis

23 Se realiza un estudio sobre carcinomas testiculares en adultos. Estas neoplasias se asocian a una elevada frecuencia de alteraciones cariotípicas, sobre todo i(12p). Entre los hallazgos patológicos destacan focos de neoplasia de células germinales intratubular adyacentes a los tumores malignos. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que se asocie a estos carcinomas?

A Disgenesia gonadal
B Infección por el virus del papiloma humano
C Hidrocele
D Sífilis
E Torsión



24 Un hombre de 29 años refiere una vaga sensación de pesadez indolora en el escroto desde hace 5 meses, aunque por lo demás está sano. La exploración física muestra un testículo derecho ligeramente más grande que el izquierdo. La ecografía revela una masa delimitada sólida de 1,5 cm en el cuerpo del testículo derecho. La figura muestra el aspecto macroscópico representativo de esta masa. Se realiza una biopsia, cuyo estudio histológico revela nidos uniformes de células, de límites citoplásmicos netos, con abundante contenido en glucógeno y núcleos redondeados con llamativos nucléolos. Se identifican agregados de linfocitos entre

estos nidos celulares. ¿Cuál de las siguientes características es más característica de esta lesión?

A Asociación a cariotipo 46,X(fra)Y
B Asociación a cariotipo 46,XXY
C Respuesta a radioterapia
D Extensas metástasis pulmonares
E Elevación de la concentración de gonadotropina coriónica humana
F Elevación de la concentración de α-fetoproteína



25 Un hombre de 37 años ha observado un aumento de tamaño bilateral de las mamas durante los últimos 6 meses. En la exploración física presenta hipertrofia de ambas mamas, sin presencia de masas. Muestra un testículo derecho firme y 1,5 veces más grande que el izquierdo. Presenta un incremento de las concentraciones de estrógenos séricos. La ecografía revela una masa de 2 cm delimitada en el cuerpo del testículo derecho. Se realiza una orquiectomía derecha, y la masa tiene un aspecto macroscópico uniforme parduzco. La figura se corresponde con su aspecto histológico. El estudio con microscopia electrónica identifica que las células contienen cristaloides de Reinke, con forma de bastón. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Coriocarcinoma

B Carcinoma embrionario
C Gonadoblastoma
D Tumor de células de Leydig
E Seminoma
F Teratoma
G Tumor del seno endodérmico

26 Un hombre de 28 años ha notado un aumento de tamaño progresivo del escroto con sensación de pesadez durante el último año. En la exploración física, se observa que el testículo derecho es dos veces mayor de lo normal, firme y ligeramente doloroso. La ecografía identifica una masa testicular derecha de 3,5 cm sólida. La TC abdominal revela un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos paraaórticos. En la radiografía de tórax se identifican múltiples nódulos pulmonares. En las pruebas de laboratorio destaca un incremento de las concentraciones séricas de gonadotropina coriónica humana y α-fetoproteína. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que tenga este paciente?

A Coriocarcinoma
B Linfoma B difuso de células grandes
C Tumor de células de Leydig
D Adenocarcinoma de próstata metastásico
E Tumor de células germinales mixto
F Seminoma espermatocítico puro

27 Un hombre de 32 años refiere pesadez en el escroto desde hace 10 meses. En la exploración física el testículo izquierdo mide tres veces más que el derecho y aparece firme a la palpación. La ecografía revela una masa sólida de 6 cm en el cuerpo del testículo izquierdo. En las pruebas de laboratorio destaca una elevación de las concentraciones de α-fetoproteína sérica. ¿Cuál de los siguientes componentes celulares es más probable que se encuentre en esta masa?

A Citotrofoblasto
B Células de carcinoma embrionario
C Células de Leydig
D Linfoblastos
E Células de seminoma
F Células del seno endodérmico

28 Un hombre de 26 años ha notado en algunas ocasiones dolor

escrotal desde hace 3 meses. En la exploración física el testículo derecho está más sensible que el izquierdo, pero no parece aumentado de tamaño. La ecografía revela una masa de 1,5 cm en el testículo derecho. Se realiza una orquiectomía derecha, y macroscópicamente la masa es hemorrágica y blanda. Se disecan los ganglios retroperitoneales. En los cortes de los ganglios se identifica una neoplasia con extensa necrosis y hemorragia. El estudio histológico revela que las áreas viables del tumor corresponden a células cúbicas mezcladas con grandes células sincitiales eosinófilas, que contienen múltiples núcleos pleomorfos oscuros. ¿Cuál de los siguientes marcadores inmunohistoquímicos es más probable que sea positivo en estas células sincitiales?

A α-fetoproteína
B Antígeno carcinoembrionario
C CD20
D Gonadotropina coriónica humana
E Testosterona
F Vimentina

29 La madre de un niño de 2 años observa que le ha crecido de forma asimétrica el escroto durante los últimos 6 meses. En la exploración física se encuentra una masa bien delimitada de 2,5 cm en el testículo izquierdo. Se realiza una orquiectomía izquierda y su estudio histológico revela láminas de células y glándulas mal definidas constituidas por células cúbicas, algunas de las cuales contienen glóbulos hialinos eosinófilos. Se identifican también microquistes y estructuras glomeruloides primitivas. La tinción inmunohistoquímica muestra positividad para α-fetoproteína (AFP) en el citoplasma de las células neoplásicas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Coriocarcinoma
B Tumor de células de Leydig
C Seminoma
D Teratoma
E Tumor del seno endodérmico

30 Un hombre de 32 años ha notado un aumento de tamaño con sensación de pesadez en el escroto durante los últimos 9 meses. En la exploración física se encuentra un testículo izquierdo aumentado de tamaño y firme, sin otras alteraciones significativas.

La ecografía confirma la existencia de una masa sólida de 5 cm en el cuerpo de dicho testículo, por lo que se realiza una orquiectomía izquierda. En el estudio histológico de la masa se identifican áreas de cartílago maduro, epitelio escamoso queratinizante y epitelio glandular de tipo cólico. En las pruebas de laboratorio destacan unas concentraciones elevadas de gonadotropina coriónica humana (hCG) y α-fetoproteína (AFP) séricas. A pesar del aspecto de las células de este tumor, el cirujano informa al paciente de que probablemente se trate de un tumor testicular maligno. ¿En cuál de los siguientes factores es más probable que esté basada la conclusión del cirujano?

A Edad del paciente en el momento del diagnóstico
B Incremento de las concentraciones de hCG y AFP
C Localización de la masa en el testículo izquierdo
D Presencia de epitelio glandular de tipo cólico
E Tamaño de la tumoración

31 Un hombre de 59 años observa un aumento de tamaño gradual del escroto a lo largo de 1 año. Este crecimiento no es doloroso, aunque se asocia a sensación de pesadez. No refiere dificultades sexuales. La exploración física no revela lesiones en la piel escrotal ni masas evidentes, pero el escroto aparece aumentado de tamaño, edematoso y blando en ambos lados. El resultado de la transiluminación es positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Elefantiasis
B Hidrocele
C Orquitis
D Seminoma
E Varicocele

32 Un hombre de 54 años ha sufrido disuria con aumento de la frecuencia y de la urgencia miccional durante los últimos 6 meses. En ocasiones ha percibido también lumbalgia poco intensa. En la exploración física se encuentra afebril y no presenta dolor en el ángulo costovertebral. El tamaño de la próstata es normal y no detectan nódulos a la palpación. Las pruebas de laboratorio muestran que las secreciones prostáticas exprimidas contienen 30 leucocitos por campo de gran aumento. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Prostatitis bacteriana aguda
B Prostatitis abacteriana crónica
C Adenocarcinoma de próstata
D Hiperplasia de próstata
E Prostatitis sifilítica

33 Un hombre de 65 años ha presentado múltiples infecciones urinarias de repetición durante el último año. Se han cultivado *Escherichia coli* y estreptococos en la orina en tres episodios, y el recuento bacteriano ha sido de más de 10^5/ml. Presenta dificultad para orinar, tanto para iniciar como para detener el chorro. En la última semana ha vuelto a presentar dolor urente al orinar. El análisis de orina revela un pH de 6,5 y una densidad específica de 1,02. No se identifican sangre o proteínas en la orina. Las pruebas de esterasa leucocítica y nitritos son positivas. El estudio histológico de la orina identifica numerosos leucocitos y algunos cilindros leucocíticos. ¿Qué trastorno es más probable que predisponga a este paciente a presentar infecciones repetidas?

A Epispadias
B Hiperplasia nodular de próstata
C Fimosis
D Válvulas uretrales posteriores
E Adenocarcinoma de próstata
F Reflujo vesicoureteral

34 Un ensayo clínico sobre dos fármacos compara uno que inhibe la 5α-reductasa y reduce la síntesis de dihidrotestosterona (DHT) en la próstata con otro que se comporta como bloqueante del receptor α_1-adrenérgico. Los pacientes tienen entre 40 y 80 años de edad. El estudio determinará si los síntomas asociados a la enfermedad prostática mejoran en los pacientes que reciben estos fármacos. ¿El tratamiento de cuál de las siguientes enfermedades es más probable que se beneficie de uno de estos fármacos o de ambos?

A Prostatitis aguda
B Adenocarcinoma
C Prostatitis crónica
D Leiomiomas
E Hiperplasia nodular

35 Un hombre de 72 años ha presentado una dificultad progresiva

para la micción desde hace 10 años. Actualmente se tiene que levantar varias veces cada noche por urgencia, aunque el volumen de orina en cada micción no es grande. Refiere dificultad para iniciar e interrumpir el chorro. En la exploración física el tamaño de la próstata es hasta dos veces mayor de lo normal, pero es indolora a la palpación. Hace 1 año, la concentración de antígeno prostático específico (PSA) era de 6 ng/ml y al repetir la determinación se mantiene en valores parecidos. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más probable que resulte eficaz como tratamiento de este paciente?

A Estrógenos (hormonas)
B Finasterida (inhibidor de 5α-reductasa)
C Mitoxantrona (quimioterápico)
D Nitrofurantoína (antibiótico)
E Prednisona (corticoesteroide)

36 Un hombre de 71 años previamente sano consulta al médico para una revisión médica rutinaria. A la palpación se identifica un nódulo en una próstata de tamaño normal. Las pruebas de laboratorio revelan una concentración de antígeno prostático específico (PSA) en suero de 17 ng/ml. El análisis de orina habitual no muestra alteraciones. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos es más probable que se encuentre en la biopsia de próstata de este paciente?

A Prostatitis aguda
B Adenocarcinoma
C Prostatitis abacteriana crónica
D Hiperplasia nodular
E Neoplasia intraepitelial prostática

37 Un hombre de 85 años ha presentado dificultad para iniciar la micción y nicturia durante el último año. Además, ha sufrido una lumbalgia progresiva durante los últimos 6 meses. Al tacto rectal se encuentra una próstata dura e irregular. La gammagrafía ósea revela áreas de captación en las vértebras torácicas y lumbares. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de fosfatasa alcalina sérica de 300 U/l y de antígeno prostático específico (PSA) de 72 ng/ml. La de nitrógeno ureico en sangre es de 44 mg/dl y la de creatinina sérica es de 3,8 mg/dl. Se obtienen muestras transrectales de biopsia de todos los lóbulos prostáticos. El estudio

histológico de las mismas revela que más del 90% del tejido está constituido por un patrón de cordones y láminas de células con núcleos pleomorfos hipercromáticos, con llamativos nucléolos y escaso citoplasma. ¿Cuál de las siguientes clasificaciones es la mejor para la enfermedad de este paciente?

	Estadio	Grado de Gleason
A	A	1, 1
B	B	2, 2
C	B	3, 3
D	C	4, 4
E	D	5, 5



38 Un hombre afroamericano de 71 años acude al médico para una revisión debido a la preocupación por sus antecedentes familiares de cáncer de próstata. La exploración física no identifica alteraciones. Dados la edad del paciente y sus antecedentes familiares, se determina la concentración del antígeno prostático específico (PSA), que es de 8 ng/ml. A los 6 meses, dicha concentración es de 10 ng/ml. El urólogo realiza una biopsia transrectal y el estudio histológico revela áreas multifocales de hiperplasia glandular con el aspecto que muestra esta figura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica mejor a esta situación clínica y patológica?

A Asociación a un riesgo aumentado de carcinoma infiltrante

B Inflamación crónica por obstrucción de la vía urinaria
C Aspecto histológico normal de la zona periférica
D Relación con la herencia de una mutación en un gen supresor de tumores
E Respuesta al tratamiento con inhibidores de 5α-reductasa



39 Un hombre de 45 años acude al médico para una revisión médica rutinaria. En la exploración física no presenta alteraciones. Entre los hallazgos de laboratorio destacan cifras de creatinina sérica de 1,1 mg/dl; de nitrógeno ureico de 17 mg/dl; de glucosa de 76 mg/dl; de fosfatasa alcalina de 89 U/l, y de antígeno prostático específico (PSA) de 16 ng/ml. Se obtienen biopsias de próstata, cuyo aspecto histológico a gran aumento se muestra en la figura. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que se asocie a esta enfermedad?

A Hipermetilación epigenética del gen *GSTP1*
B Exposición a compuestos de tipo naftilamina
C Hiperproducción de dihidrotestosterona
D Consumo prolongado de tabaco
E Infecciones urinarias de repetición de origen bacteriano

Respuestas

1 **D** Se describen las características del reflujo vesicoureteral en relación con una obstrucción de la unión ureteropélvica (UUP). Esta es la causa más frecuente de hidronefrosis en lactantes y niños. Los túbulos obstruidos no reabsorben la β_2-microglobulina. Pueden aparecer otras alteraciones, como la agenesia del riñón contralateral. La corrección quirúrgica de la UUP anómala recupera el flujo peristáltico adecuado de la orina. La extrofia vesical es un defecto abierto en la pared abdominal. Los divertículos urinarios pueden predisponer a las infecciones pero no a las obstrucciones. Puede existir una duplicación de una parte de un uréter o de su totalidad y en ocasiones de ambos, aunque este hallazgo suele ser incidental. La inflamación granulomatosa de la vía urinaria es infrecuente. Los restos de uraco (alantoides embrionaria) pueden predisponer a las infecciones, pero no se asocian a hidronefrosis; sobre un quiste del uraco puede originarse un adenocarcinoma.

2 **A** Los hallazgos en este paciente son compatibles con hiperplasia prostática nodular con obstrucción de la salida de la vejiga. Pueden desarrollarse divertículos en presencia de obstrucción e hipertrofia de la pared vesical, lo que predispone a la estasis urinaria, con la consiguiente infección; no se trata de divertículos auténticos. La cistitis intersticial es una complicación de las infecciones vesicales de repetición, sobre todo en mujeres, y se caracteriza por dolor crónico. La malacoplaquia es una respuesta infrecuente frente a infecciones bacterianas en la que las colecciones de macrófagos llenos de productos bacterianos degradados inducen la formación de unas concreciones calcificadas laminadas llamadas *cuerpos de Michaelis-Gutmann.* Los papilomas verdaderos son proliferaciones uroteliales infrecuentes y asintomáticas. La esquistosomiasis determina hematuria e inflamación con fibrosis de la pared vesical.

3 **C** La hidronefrosis bilateral, no asociada a hidrouréter o dilatación vesical, sugiere que el problema afecta a los dos uréteres. La uropatía obstructiva ha producido una insuficiencia renal crónica con uremia. El incremento de IgG4 es sugestivo de un proceso fibroinflamatorio con células plasmáticas secretoras de IgG4 en el retroperitoneo; este proceso forma parte de la

pancreatitis autoinmunitaria y también puede involucrar a la vía biliar, las glándulas salivales y los pulmones, pero no se asocia a las otras opciones que se enumeran. La nefrolitiasis podría producir obstrucción de la unión ureteropélvica, pero la bilateralidad sería infrecuente. La cistitis polipoidea se debe a inflamación y puede confundirse con una masa tumoral; este cuadro podría obstruir un orificio ureteral o ambos y ocasionar un hidrouréter. El carcinoma de células renales puede ser unilateral, pero solo produce una obstrucción focal. Los carcinomas uroteliales pueden ser multifocales, pero es poco probable que obstruyan de forma simultánea ambos uréteres.

4 **C** Puede que el uraco embrionario no se oblitere, lo que determinaría un trayecto fistuloso o la formación de un quiste entre la vejiga y la pared abdominal en la zona del ombligo. Los divertículos congénitos se producen por un fallo focal en la formación de la musculatura vesical o por obstrucción de la salida vesical y no se asocian a ningún trayecto fistuloso. El término extrofia se refiere a un fallo en el desarrollo de la pared abdominal inferior, el cual determina un defecto abierto en la vejiga. El reflujo vesicoureteral se caracteriza por un reflujo anómalo del contenido vesical hacia el uréter, algo que se puede relacionar con malformaciones congénitas en la vejiga, pero sin trayecto fistuloso. El resto del conducto vitelino puede asociarse a un divertículo de Meckel o, con menos frecuencia, a la formación de un trayecto fistuloso entre el intestino delgado y el ombligo.

5 **D** Esta mujer presenta una forma especial de cistitis, denominada *malacoplaquia,* en la que los macrófagos tienen una menor función fagocítica y las concreciones formadas dentro de los macrófagos se denominan *cuerpos de Michaelis-Gutmann.* La malacoplaquia es una reacción frente a infecciones bacterianas crónicas, sobre todo por *Escherichia coli* y especies de *Proteus,* a menudo en pacientes inmunodeprimidos. El microorganismo más frecuente como causa de cistitis aguda es *E. coli.* Los demás microorganismos enumerados raramente causan cistitis y malacoplaquia.

6 **B** En los carcinomas uroteliales de bajo grado localizados y mínimamente infiltrantes puede ser suficiente con una

resección local. Puede reducirse el riesgo de recaída mediante la instilación de BCG intravesical. Cuando el tumor infiltre la pared muscular, será precisa una cistectomía radical. Los carcinógenos químicos, como las anilinas, aumentan el riesgo de desarrollar un carcinoma urotelial, pero no determinan el tratamiento. Un papiloma urotelial invertido es benigno, pero una neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno (NUPBPM) es precursora de los carcinomas uroteliales, que pueden presentar mutaciones en *TP53* independientemente del estadio.

7 **E** La figura muestra un carcinoma urotelial *in situ.* Los fumadores tienen un riesgo aumentado de presentarlo, y China alberga un tercio de los fumadores del planeta. Los tumores malignos uroteliales pueden recidivar y ser multifocales; es mucho más probable que sean esporádicos que familiares, aunque algunas mutaciones genéticas, como las de *TP53,* pueden ser similares. Los tumores malignos familiares suelen debutar en fases mucho más tempranas de la vida. El alantoides embriológico se extiende desde la vejiga en desarrollo y puede persistir como un resto de uraco, con formación de un divertículo, un quiste o una fístula umbilical y existe un riesgo bajo de adenocarcinoma. La obesidad incrementa el riesgo de desarrollar tumores malignos, pero resulta difícil establecer la correlación con un tumor maligno específico. La esquistosomiasis puede producir una metaplasia escamosa y aumentar el riesgo de carcinoma epidermoide vesical.

8 **E** La exposición a arilaminas aumenta de forma muy importante el riesgo de carcinoma urotelial, como el que muestra la figura; estos tumores pueden aparecer décadas después de la exposición inicial. Tras la absorción, la aminas aromáticas se hidroxilan a su forma activa, que se desintoxica mediante conjugación con el ácido glucurónico y luego se excretan. La glucuronidasa urinaria divide la forma no tóxica conjugada en una forma activa carcinógena. El adenocarcinoma es una complicación de la malformación congénita llamada *extrofia vesical*. El rabdomiosarcoma de la pelvis es típicamente una neoplasia pediátrica y no se asocia a exposición a sustancias químicas. Los carcinomas de células renales pueden

manifestarse también como una hematuria indolora, pero la exposición a las anilinas no es un factor de riesgo. El carcinoma epidermoide es el tumor maligno uretral más habitual, pero es infrecuente y no guarda relación con carcinógenos.

9 **C** La hipertrofia vesical puede ser consecuencia de una obstrucción de la salida de la vejiga. En un anciano, este tipo de obstrucción suele relacionarse con un aumento de tamaño de la próstata secundario a hiperplasia o a un carcinoma. En pacientes con hiperplasia prostática puede encontrarse un incremento leve de la concentración del antígeno prostático específico (PSA), mientras que será sugestivo de carcinoma si el aumento es mayor. Los trastornos autoinmunitarios pueden asociarse a una cistitis intersticial, pero esta no obstruye el cuello vesical. La policitemia puede producirse como consecuencia de un síndrome paraneoplásico, pero es poco probable que los tumores uroteliales produzcan este hallazgo, que se encuentra con más frecuencia en relación con carcinomas de células renales. La esquistosomiasis provoca inflamación crónica con formación de cicatrices. La obstrucción de la salida de la vejiga puede incrementar el riesgo de infección, típicamente por bacterias como *Escherichia coli*, pero no por *Mycobacterium tuberculosis*.

10 **A** Esta paciente presenta una carúncula uretral, que es más frecuente en las mujeres posmenopáusicas, como consecuencia del prolapso de la uretra con atrofia secundaria a la disminución de los estrógenos. Las cremas de estrógenos y los fármacos antiinflamatorios tópicos pueden reducir el tamaño de la lesión. No se trata de un proceso infeccioso, de forma que es poco probable encontrar células multinucleadas (virus del herpes simple) o infiltrados de células plasmáticas (sífilis). No es maligno o premaligno. El liquen escleroso también aparece a esta edad, pero no cursa con una masa.

11 **E** El carcinoma de la uretra es poco frecuente, suele afectar a mujeres ancianas y localmente se comporta de forma invasiva. El carcinoma de células claras se produce en el cérvix y puede guardar relación con la exposición intrauterina al dietilestilbestrol. El rabdomiosarcoma embrionario (sarcoma botrioideo) es un tumor infrecuente que afecta a niños. Los

tumores benignos, como los leiomiomas, son lesiones típicamente bien delimitadas y que no se ulceran. Los condilomas planos pueden asociarse a la sífilis secundaria, pero son planos y habitualmente no se ulceran. Los condilomas acuminados son lesiones papilares con acantosis relacionadas con la infección por el virus del papiloma humano y en general no se ulceran.

12 **D** El hipospadias es un cuadro congénito que afecta aproximadamente a 1 de cada 300 recién nacidos de sexo masculino. La hernia inguinal y la criptorquidia pueden asociarse a este cuadro. El epispadias es un proceso congénito en el que la uretra desemboca de forma anómala en la superficie dorsal del pene. La enfermedad de Bowen, que se corresponde con un carcinoma epidermoide *in situ* del pene, afecta a adultos. La fimosis es una constricción que impide retraer el prepucio. Puede ser congénita, aunque con más frecuencia es secundaria a la inflamación del glande peniano (p. ej., balanitis, que es la inflamación local del glande).

13 **E** La fimosis puede ser congénita, pero con más frecuencia es secundaria a múltiples episodios de balanitis (inflamación del glande del pene). La balanitis produce cicatrices que impiden que se retraiga el glande. Una retracción forzada del mismo puede dar lugar a un compromiso vascular, con aumento de la inflamación y edema (parafimosis). La papulosis bowenoide es una lesión premaligna del cuerpo del pene, secundaria a una infección vírica. El epispadias es un proceso congénito en el que la uretra peniana desemboca en la superficie dorsal del pene. La candidiasis suele ocasionar úlceras poco profundas e intensamente pruriginosas.

14 **B** La candidiasis genital puede afectar a individuos sin una enfermedad de base, pero es mucho más frecuente en diabéticos. El ambiente húmedo y cálido de los genitales favorece el crecimiento de los hongos. Los ácaros de la sarna se suelen encontrar en unos surcos lineales de la epidermis, que se originan en las extremidades. Las neoplasias con células atípicas pueden ulcerarse, aunque es poco probable que sean poco profundas o múltiples y que no se asocien a una masa. Las inclusiones intranucleares son sugestivas de una infección vírica,

pero la diabetes no es considerada un factor de riesgo para las infecciones genitales de tipo vírico. Estas lesiones son demasiado grandes y numerosas como para corresponder a chancros sifilíticos.

15 **C** Los condilomas acuminados son una proliferación de células epiteliales escamosas benigna y recidivante relacionada con la infección por el virus del papiloma humano (VPH), una de las múltiples enfermedades de transmisión sexual que pueden encontrarse en individuos sexualmente activos. La coilocitosis es considerada especialmente característica de la infección por el VPH. La candidiasis puede producir inflamación, como balanopostitis, pero no condilomas. Las infecciones de repetición por gonococo indican que el paciente tiene actividad sexual y riesgo de sufrir otras infecciones, aunque no es una causa de condilomas. Las infecciones gonocócicas provocan lesiones supurativas en las que se puede encontrar necrosis por licuefacción y un exudado de neutrófilos o infiltrado inflamatorio mixto. La circuncisión reduce, en general, el riesgo de estas infecciones. La fimosis es la falta de retracción del prepucio y la parafimosis es un cuadro secundario a la retracción forzada del prepucio, y cursa con dolor y obstrucción urinaria.

16 **D** Los carcinomas epidermoides de pene, como esta masa grande y ulcerada, probablemente sean infiltrantes, lo que reducirá la supervivencia a 5 años por debajo del 70%; en pacientes con afectación ganglionar, dicha supervivencia a 5 años se reduce por debajo del 30%. Los antecedentes de fimosis e infección por el virus del papiloma humano, sobre todo en pacientes no circuncidados, son factores de riesgo. La candidiasis no es considerada un factor de riesgo. Los angioqueratomas son pápulas rojizas o azuladas localizadas y benignas. El urotelio se extiende hacia el orificio uretral y en teoría se podría desarrollar un carcinoma urotelial en esa zona, aunque esto es mucho menos frecuente que los carcinomas epidermoides. Los adenocarcinomas de este origen no son habituales.

17 **B** La enfermedad de Bowen es la variante *in situ* de carcinoma epidermoide de pene. Igual que sucede con los carcinomas *in situ* de otras localizaciones, su evolución natural es progresar a

un carcinoma infiltrante si no se tratan. La mala higiene y la infección por el virus del papiloma humano (sobre todo por los tipos 16 y 18) son factores que facilitan el desarrollo de displasia y cáncer sobre el epitelio de los genitales. La balanitis es un proceso inflamatorio sin displasia. Los condilomas son lesiones abultadas y blanquecinas. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que produce un chancro duro que cicatriza en unas semanas. En las infecciones por *Haemophilus ducreyi* se puede encontrar un chancro blando.

18 **A** La criptorquidia es la consecuencia de la falta de descenso testicular desde la cavidad abdominal hasta el escroto durante el desarrollo fetal. Pueden afectarse uno o ambos testículos y se asocia a un aumento del riesgo de cáncer testicular. El testículo no descendido se acaba atrofiando durante la infancia. La criptorquidia unilateral puede ocasionar infertilidad, porque puede asociarse a atrofia del testículo contralateral localizado en la bolsa escrotal. La criptorquidia aislada es un trastorno del desarrollo, en general esporádico y que no se hereda en la línea germinal. Las infecciones por parotiditis suelen producir una atrofia testicular bilateral parcheada, en general no asociada a infertilidad.

19 **A** Se trata de una epididimitis/orquitis aguda y la mayor parte de estas infecciones son secundarias a infecciones ascendentes originadas en la vía urinaria. La evolución temporal sugiere una infección bacteriana. El virus del papiloma humano afecta al epitelio escamoso. La orquitis por parotiditis puede ser bilateral y no se asocia a infecciones urinarias. La tuberculosis puede producir una infección testicular, pero la evolución temporal suele ser de semanas o meses y en general existen antecedentes de una enfermedad respiratoria. La sífilis puede producir una orquitis, pero es poco probable que esté precedida por una infección urinaria.

20 **D** La parotiditis es una infección infantil frecuente, que puede cursar con orquitis además de parotiditis. Los adultos que se ven afectados por esta infección suelen desarrollar con más frecuencia orquitis. Esta no acostumbra a ser grave en los niños y la afectación testicular en este caso es parcheada o unilateral, de forma que la infertilidad no es una evolución habitual. La

orquitis por parotiditis puede ser más grave en los adultos. La criptorquidia se produce por la falta de descenso normal del testículo al escroto; el testículo de posición anómala se vuelve totalmente atrófico. El hidrocele es una colección de líquido fuera del cuerpo testicular que no interfiere en la espermatogenia. El síndrome de Klinefelter y el tratamiento con estrógenos pueden producir atrofia tubular y en ambos casos es generalizada. La pérdida parcheada de túbulos seminíferos es indicativa de un proceso inflamatorio local. La radioterapia y muchos quimioterápicos son especialmente lesivos para las células germinales testiculares que proliferan de forma continua y rápida, pero este efecto sería difuso en el seno del parénquima testicular. La radioterapia se suele focalizar sobre los tumores malignos para prevenir las lesiones de los tejidos circundantes normales. Los pacientes que deseen tener descendencia pueden querer que sus espermatozoides se almacenen en un banco de esperma antes de someterse a radioterapia o quimioterapia.

21 **D** El aspecto muy hemorrágico que muestra la figura se debe a una torsión testicular, que obstruye el retorno venoso en mayor medida que el flujo arterial. La ecografía Doppler muestra una reducción del flujo en el testículo afectado o su ausencia. Un testículo anómalamente colocado o anclado en el escroto es un factor de riesgo para este proceso. Los carcinomas testiculares no obstruyen el flujo sanguíneo y es poco probable que provoquen un cuadro agudo. Las infestaciones parasitarias, sobre todo las filariasis, obstruyen el flujo linfático, lo que determina un aumento de tamaño gradual del escroto con engrosamiento de la piel suprayacente. La tuberculosis puede diseminarse desde el pulmón a través del torrente circulatorio y ocasionar una tuberculosis miliar, que cursa como múltiples lesiones del tamaño de un grano de mijo pálidas y que suelen afectar al epidídimo. La vasectomía previa puede condicionar una pequeña fuga de líquido y esperma, que produce un granuloma espermatocítico localizado.

22 **E** La tuberculosis por infección micobacteriana es poco frecuente en los testículos, pero puede encontrarse en la enfermedad diseminada. La infección debuta típicamente en el epidídimo y se extiende al cuerpo testicular. El chancroide

causado por *Haemophilus ducreyi* provoca nódulos ulcerados en los genitales externos. La parotiditis es causa de una orquitis parcheada con mínima inflamación, que cicatriza con fibrosis parcheada. La sífilis afecta al cuerpo del testículo pudiendo producir una inflamación gomosa con neutrófilos, necrosis y algunas células mononucleares. Las infecciones gonocócicas pueden provocar inflamación aguda.

23 **A** Las mutaciones que afectan al gen *SRY* u otros genes implicados en la diferenciación testicular pueden aumentar el riesgo de cáncer de testículo. Otro factor de riesgo es la criptorquidia. Las infecciones testiculares no tienen asociación conocida con neoplasias. Los problemas mecánicos, como la torsión con isquemia, no suelen ser antecedentes de los procesos neoplásicos. El hidrocele es una colección de líquido benigna.

24 **C** El seminoma es la forma más frecuente de tumor de células germinales testicular «puro», que puede estar limitado al testículo (estadio I). La figura corresponde a una masa de aspecto homogéneo. El pronóstico es bueno en la mayor parte de los casos, incluso en los metastásicos, porque los seminomas son tumores radiosensibles. Las concentraciones de gonadotropina coriónica humana (hCG) pueden estar ligeramente elevadas en aproximadamente el 15% de los pacientes con seminoma. La concentración elevada de hCG es sugestiva de un componente de células sincitiales y, si las concentraciones son muy elevadas, se debería sospechar un coriocarcinoma. Las concentraciones de α-fetoproteína están elevadas en los tumores testiculares con un componente del seno endodérmico y muchos tumores con un componente de células embrionarias contienen también células del seno endodérmico (saco vitelino). La testosterona la producen las células de Leydig, no las células germinales. El síndrome del X frágil se asocia a un aumento del tamaño de los testículos bilateral y a retraso mental. El síndrome de Klinefelter se asocia a una reducción del tamaño de los dos testículos con una menor fertilidad.

25 **D** Los tumores de células de Leydig testiculares suelen ser masas pequeñas y benignas y con frecuencia no se diagnostican. Algunos pacientes presentan ginecomastia, causada por la

producción de hormonas androgénicas o estrogénicas (o ambas) en el tumor. La mayor parte de los pacientes son hombres jóvenes o de mediana edad; puede encontrarse precocidad sexual en los pocos niños que presentan estos tumores. Los coriocarcinomas son masas blandas y hemorrágicas que contienen grandes células citotrofoblásticas y sincitiotrofoblásticas anómalas, y tienen un comportamiento invasivo. Los carcinomas embrionarios son tumores grandes e invasivos, con aspecto macroscópico variado y constituidos por células primitivas con núcleos hipercromáticos grandes. Los gonadoblastomas son tumores testiculares infrecuentes que aparecen en pacientes con una disgenesia gonadal de base. El seminoma puro puede mostrar una superficie de corte parda homogénea, pero a menudo presenta un estroma linfoide y no es probable que secrete andrógenos ni estrógenos. Los teratomas puros son infrecuentes y contienen elementos de las tres capas germinales. Los tumores del seno endodérmico presentan células que se organizan en senos endodérmicos primitivos (cuerpos de Schiller-Duval).

26 **E** Aunque en los seminomas que contienen algunas células gigantes de tipo sincitial se puede encontrar una elevación modesta de la concentración de gonadotropina coriónica humana (hCG), en los seminomas puros nunca se produce un aumento significativo de la concentración de α-fetoproteína (AFP). El incremento de las concentraciones de AFP y hCG descarta, de forma eficaz, el diagnóstico de seminoma puro e es indicativo de la presencia de un tumor no seminomatoso de tipo mixto. La variante más frecuente de neoplasia testicular combina múltiples elementos; el término *teratocarcinoma* se emplea en ocasiones para describir tumores con elementos de teratoma, carcinoma embrionario y tumor del seno endodérmico. El elemento de seno endodérmico explica el aumento de las concentraciones de AFP. Los tumores mixtos pueden incluir seminoma. Los coriocarcinomas secretan elevadas concentraciones de hCG, pero no de AFP. Es raro que un tumor metastatice al testículo; el paciente tiene una edad en la que se debería plantear un cáncer testicular primario en presencia de una masa testicular. Los linfomas pueden afectar al testículo, en

general, cuando existe afectación sistémica por una lesión de alto grado. Los adenocarcinomas de próstata y los linfomas no elaboran hormonas. Los tumores de células de Leydig son tumores no germinales derivados de las células intersticiales (de Leydig); pueden elaborar andrógenos.

27 **F** La α-fetoproteína (AFP) es un producto de las células del seno endodérmico cuya presencia se puede demostrar con tinciones inmunohistoquímicas. Los tumores del seno endodérmico puros son infrecuentes en adultos, pero los componentes de este tipo son habituales en los tumores no seminomatosos mixtos. Las células del citotrofoblasto no elaboran este marcador sérico, pero pueden aparecer en un coriocarcinoma junto con las células del sincitiotrofoblasto, que elaboran la gonadotropina coriónica humana. Las células del carcinoma embrionario no elaboran por sí mismas ningún marcador específico. Sin embargo, es frecuente encontrar células de carcinoma embrionario en los tumores no seminomatosos y a menudo aparecen mezcladas con otros tipos celulares. Las células de Leydig elaboran andrógenos. Pueden encontrarse linfoblastos en los linfomas no hodgkinianos de alto grado, que no elaboran hormonas. Los seminomas puros no producen AFP.

28 **D** El coriocarcinoma es el carcinoma testicular más invasivo. Con frecuencia provoca metástasis diseminadas. Las células sincitiales primitivas recuerdan al sincitiotrofoblasto del tejido placentario y se tiñen con gonadotropina coriónica humana. La α-fetoproteína es un marcador que se encuentra con más frecuencia en los tumores mixtos con un componente del seno endodérmico. El antígeno carcinoembrionario (CEA) se encuentra en diversas neoplasias epiteliales, sobre todo en adenocarcinomas. CD20 es un marcador linfoide de linfocitos B. La testosterona se encuentra en las células de Leydig. La vimentina es un marcador más probable en los sarcomas, que son infrecuentes en la región testicular.

29 **E** Los tumores del seno endodérmico (saco vitelino) afectan típicamente a niños menores de 3 años. Las estructuras glomeruloides primitivas se denominan *cuerpos de Schiller-Duval*. Las células son intensamente positivas para α-fetoproteína (AFP). Los carcinomas embrionarios con células del

seno endodérmico contienen AFP, pero se encuentran en adultos. Están constituidos por cordones y láminas de células primitivas. Los coriocarcinomas contienen células de tipo sincitiotrofoblástico grandes e hipercromáticas. Los seminomas están constituidos por nidos y láminas de células similares a las germinales primitivas, con frecuencia acompañadas de un estroma linfoide. Los tumores de células de Leydig son benignos y pueden elaborar andrógenos, estrógenos o ambos. Los teratomas contienen elementos de cartílago y hueso maduro o bien otros derivados de estirpe endo-, meso- o ectodérmica.

30 **B** Este tumor contiene elementos de las tres capas germinales y es un teratoma. Es raro que los teratomas sean totalmente benignos en los hombres. El componente adicional más frecuente es el carcinoma embrionario. El aumento de las concentraciones de gonadotropina coriónica humana y α-fetoproteína es indicativo de un tumor mixto con elementos de coriocarcinoma y células del seno endodérmico. El tamaño del tumor, la edad del paciente, la localización del tumor (derecho, izquierdo, criptorquidia) y la diferenciación del epitelio glandular no son marcadores de malignidad. Al estudiar más cortes histológicos de la masa, el patólogo debería identificar los elementos malignos.

31 **B** El hidrocele es una de las causas más frecuentes de aumento de tamaño del escroto. Se corresponde con una colección de líquido seroso en el seno de la túnica vaginal. La mayor parte de los casos son idiopáticos, aunque algunos se pueden relacionar con inflamación local. La elefantiasis es una complicación de las infecciones por parásitos de tipo filarias que afectan a los linfáticos inguinales y suele ser bilateral. La orquitis afecta al cuerpo del testículo sin aumento de tamaño llamativo, pero con hipersensibilidad. El seminoma cursa en los casos típicos como una masa firme unilateral. El varicocele es una colección de venas dilatadas (plexo pampiniforme) que puede producir calor local, lo que inhibe la espermatogenia.

32 **B** Este paciente presenta más de 10 leucocitos por campo de gran aumento, lo cual es un indicio de prostatitis. La prostatitis abacteriana crónica es la variante más frecuente de este trastorno. Los pacientes no refieren antecedentes de infecciones

urinarias de repetición. Los enfermos con una prostatitis aguda bacteriana, que suele deberse a la infección por *Escherichia coli,* presentan fiebre, escalofríos y disuria. El tacto rectal identifica una próstata muy dolorosa. Los carcinomas de próstata no suelen tener una inflamación aguda significativa y las metástasis suelen asociarse a dolor; la mayor parte de los trastornos prostáticos que producen disuria son benignos. La hiperplasia nodular de próstata no es, por sí misma, un proceso inflamatorio. La sífilis afecta a los genitales externos, aunque también puede afectar al testículo.

33 **B** De todas las enfermedades que se enumeran, la hiperplasia nodular prostática es la más frecuente en ancianos. Cuando obstruye la uretra prostática, puede predisponer a las infecciones urinarias de tipo bacteriano. El epispadias es un proceso congénito que aparece desde el nacimiento. La fimosis puede afectar a hombres no circuncidados y puede ser congénita o secundaria a un proceso inflamatorio, en general en edades mucho más tempranas. Las válvulas uretrales posteriores obstruyen la salida de la vejiga dentro del útero, con oligohidramnios. El adenocarcinoma de próstata tiene menos riesgo de producir síntomas obstructivos que la hiperplasia. El reflujo vesicoureteral es más probable en edades tempranas y no explica los síntomas obstructivos miccionales de este paciente.

34 **E** Los andrógenos son el principal estímulo hormonal para la proliferación glandular y estromal que conduce a la hiperplasia prostática nodular. Aunque la producción de testosterona disminuye con la edad, la hiperplasia prostática es más frecuente, posiblemente por el aumento de expresión de los receptores hormonales prostáticos, lo que fomenta el efecto de cualquier cantidad de DHT presente. Los inhibidores de la 5α-reductasa, como la finasterida, reducen el volumen prostático, sobre todo el glandular, de forma que mejoran el flujo urinario. Los bloqueantes del receptor α_1-adrenérgico, como la tamsulosina, provocan la relajación del músculo liso del cuello vesical y de la próstata, lo que se traduce en un alivio de los síntomas con mejora inmediata del flujo urinario. Los demás trastornos que se enumeran no se pueden tratar con estos fármacos.

35 **B** Las características clínicas son típicas de una hiperplasia prostática nodular, con un ligero incremento de la concentración de PSA. Si esta no ha sufrido cambios durante 1 año, como sucede en este paciente, será menos probable que sea indicativa de un carcinoma de próstata. La finasterida es un inhibidor de la 5α-reductasa, que reduce la formación de dihidrotestosterona (DHT), que se liga a los receptores de andrógenos en las células del estroma y del epitelio prostático, por lo que regula la proliferación y el consiguiente aumento del tamaño de la próstata. Sin embargo, los bloqueantes α_1-adrenérgicos que reducen el tono del músculo liso son algo más eficaces en el tratamiento de la hiperplasia nodular. El tratamiento con estrógenos se ha empleado como tratamiento antihormonal en el cáncer de próstata. La mitoxantrona es un quimioterápico que resulta eficaz como tratamiento de los cánceres de próstata avanzados cuando se administra junto con prednisona. La nitrofurantoína es un antibiótico empleado con frecuencia como tratamiento de las infecciones urinarias.

36 **B** La concentración de antígeno prostático específico (PSA) está elevada de forma significativa en este paciente. Este importante aumento es sugestivo de carcinoma. Es típico que los carcinomas de próstata sean adenocarcinomas que forman glándulas pequeñas adosadas. Muchos adenocarcinomas de próstata no provocan síntomas obstructivos y pueden no palparse en el tacto rectal. Las hiperplasias nodulares y la inflamación pueden incrementar también la concentración de PSA, pero no hasta niveles tan altos ni de forma significativa a lo largo del tiempo. La neoplasia intraepitelial prostática, aunque es un precursor del adenocarcinoma, no suele incrementar la concentración de PSA de forma significativa con el tiempo.

37 **E** La presencia de un nódulo irregular y duro, además de la concentración de antígeno prostático específico (PSA) extremadamente elevada, es indicativa, de forma clara, de un carcinoma de próstata. Pueden encontrarse incrementos modestos de la concentración de PSA en la hiperplasia nodular prostática y las prostatitis. Los síntomas obstructivos urinarios son más llamativos en la hiperplasia nodular, dado que los nódulos se distribuyen por la región periuretral. Sin embargo,

este signo resulta insuficiente para diferenciar el cáncer de la hiperplasia. De un modo parecido, la insuficiencia renal secundaria a una obstrucción o infiltración es más habitual en la hiperplasia nodular, aunque también está descrita en el cáncer. Las concentraciones de fosfatasa alcalina están elevadas en carcinomas de próstata con metástasis osteoblásticas. Aunque los protocolos para la estadificación y la gradación de los tumores malignos parecen complicados, se pueden emplear de forma intuitiva. Los estadios más bajos corresponden a tumores más pequeños y localizados, mientras que los más altos se refieren a tumores grandes o que se han diseminado dentro o fuera del origen primario. Los sistemas de gradación también se inician con los tumores de estadio más bajo y mejor diferenciados, según criterios microscópicos. Al aumentar el grado lo hace el aspecto anómalo de las células y las estructuras llegan a ser tan poco diferenciadas que apenas recuerdan al lugar donde se originan. En este caso, el grado del cáncer de próstata es el máximo (no conforma estructuras glandulares) y también lo es el estadio (con metástasis vertebrales).

38 **A** La neoplasia intraepitelial prostática (PIN) de la imagen presenta rasgos displásicos, como células hipercromáticas que se disponen apiladas con un patrón seudoestratificado y con conservación de la arquitectura glandular. La PIN es una precursora potencial del adenocarcinoma de próstata. No necesita tratamiento, porque aproximadamente solo un tercio de los pacientes diagnosticados de PIN desarrollan un carcinoma infiltrante en 10 años. Por el contrario, aproximadamente en el 80% de los casos de cáncer de próstata se puede encontrar PIN en el tejido adyacente. La PIN no suele aumentar las concentraciones de PSA. En este caso, el incremento de estas puede deberse, en parte, a la coexistencia de una hiperplasia. Aunque la prostatitis puede elevar las concentraciones de PSA, en la imagen no se encuentra inflamación. Si bien la PIN puede aparecer en la zona periférica, no se considera un hallazgo normal. Aunque existen antecedentes familiares, es difícil identificar factores de riesgo específicos; las mutaciones de BRCA2 explican un pequeño número de casos de cáncer de próstata. La hiperplasia prostática puede responder a la

inhibición de la síntesis de DHT, pero el cáncer y la PIN no lo hacen.

39 **A** La figura muestra un adenocarcinoma de próstata con glándulas adosadas, llamativos nucléolos e infiltración perineural. Las alteraciones del gen de la *glutatión S-transferasa (GSTP1)* facilitan que se produzcan las lesiones causadas por los carcinógenos. El gen de fusión *TMPRSS2-ETS* y las mutaciones de *PTEN* son frecuentes. Otras alteraciones genéticas en el cáncer de próstata son variaciones en las repeticiones CAG del gen del *receptor de andrógenos,* mutaciones de *BRCA2* y translocación de los genes de transcripción de la familia *ETS.* Las concentraciones de antígeno prostático específico (PSA) están cuatro veces por encima del límite superior de la normalidad. Esto es un dato preocupante, aunque no es plenamente indicativo de cáncer de próstata. Pueden existir concentraciones altas de PSA en presencia de hiperplasia nodular o prostatitis, aunque cuanto más alta sea la concentración, cuando esta aumente con el tiempo o cuando el PSA libre sea más elevado, más se deberá sospechar un carcinoma. Los compuestos de tipo naftilamina se vinculan con los carcinomas uroteliales. El aumento de la liberación de dihidrotestosterona por las células del estroma prostático produce hiperplasia nodular. El tabaquismo se asocia a muchos otros cánceres, incluidos el carcinoma urotelial y el de células renales. Las infecciones urinarias de repetición y la hidronefrosis son complicaciones de la obstrucción, y son más frecuentes en caso de hiperplasia nodular prostática.

CAPÍTULO

22

Aparato genital femenino

PEF9 Capítulo 22: Aparato genital femenino

PH9 Capítulo 18: Aparato genital femenino y mama

1 Una mujer de 31 años sexualmente activa lleva 1 semana con secreción vaginal mucopurulenta. La exploración pélvica revela un cérvix enrojecido alrededor del orificio cervical externo, sin erosiones o masas. La citología cervicovaginal muestra numerosos neutrófilos, pero no células displásicas. La biopsia de cérvix revela una cervicitis folicular prominente. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que ocasione estos hallazgos?

A *Candida albicans*
B *Chlamydia trachomatis*
C *Gardnerella vaginalis*
D Virus del herpes simple
E Virus del papiloma humano
F *Neisseria gonorrhoeae*
G *Trichomonas vaginalis*

2 Una mujer de 31 años ha presentado prurito vulvar y una secreción vaginal densa, globular, inodora y blanquecina durante la última semana. La exploración pélvica identifica un cérvix eritematoso, sin erosiones ni masas. La citología cervicovaginal identifica células en gemación y seudohifas. No se identifican células displásicas. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que ocasione estos hallazgos?

A *Candida albicans*
B *Chlamydia trachomatis*
C *Neisseria gonorrhoeae*
D *Trichomonas vaginalis*
E *Ureaplasma urealyticum*

3 Una chica de 17 años sexualmente activa refiere dolor pélvico

desde hace 1 semana. La exploración pélvica revela leve eritema en el ectocérvix y dolor a la palpación del anejo derecho. La citología cervicovaginal identifica muchos neutrófilos, pero no células displásicas. El cultivo cervical muestra presencia de *Neisseria gonorrhoeae.* ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que desarrolle esta paciente en el caso de que no se trate de forma adecuada la infección?

A Carcinoma de cérvix
B Hemorragia uterina disfuncional
C Embarazo ectópico
D Hiperplasia endometrial
E Endometriosis
F Placenta previa

4 Una mujer de 25 años percibe molestias durante el coito desde hace 1 mes. En la exploración física no se identifican lesiones en los genitales externos. La exploración pélvica revela un área focal de tumefacción en la parte posterolateral del labio menor izquierdo, que muestra una gran hipersensibilidad a la palpación. Se reseca una lesión quística llena de exudado purulento de 3 cm de diámetro. ¿Sobre cuál de las siguientes estructuras es más probable que se haya desarrollado esta lesión?

A Glándula de Bartholin
B Conducto de Gartner
C Folículo piloso
D Diafragma urogenital
E Bulbo vestibular

5 Una mujer de 53 años posmenopáusica está preocupada por la aparición de áreas pálidas en los labios vulvares que han aumentado de tamaño lentamente durante el último año. Las lesiones producen molestias y se irritan con facilidad. En la exploración física destacan áreas de piel gris pálido a modo de parches que afectan a la mayor parte de los labios mayores, de los labios menores y del introito. Este último aparece estenosado. En una muestra de biopsia se observa adelgazamiento del epitelio escamoso, una densa banda de colágeno hialino en la parte superior de la dermis y células inflamatorias mononucleares dispersas en la dermis superior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Enfermedad de Paget extramamaria
B Infección por el virus del papiloma humano
C Liquen escleroso y atrófico
D Enfermedad inflamatoria pélvica
E Neoplasia intraepitelial vulvar

6 Una mujer de 40 años ha percibido placas pruriginosas en la vulva durante los últimos 4 meses. En la exploración física se reconocen múltiples placas descamativas de 1,5-3 cm y coloración blanquecina en la vulva. Se realiza una biopsia de una de las lesiones, y su estudio histológico revela engrosamiento de la epidermis con hiperqueratosis e intensa inflamación en dermis. Los queratinocitos muestran mitosis, pero no atipias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Condiloma acuminado
B Dermatitis de contacto
C Psoriasis
D Hiperplasia de células escamosas
E Neoplasia intraepitelial vulvar



7 Una mujer de 36 años sexualmente activa se ha notado unas lesiones verrugosas vulvares cuyo tamaño y número han aumentado durante los últimos 5 años. En la exploración física se reconocen múltiples lesiones planas rojizas, de 0,5 a 2 cm de

diámetro y con una superficie rugosa en la vulva y el periné. Se extirpa una de las lesiones más grandes, cuyo aspecto histológico muestra la figura. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que ocasione estas lesiones?

A *Candida albicans*
B *Chlamydia trachomatis*
C *Haemophilus ducreyi*
D Virus del papiloma humano
E *Treponema pallidum*

8 Una mujer de 57 años se ha detectado recientemente un área pálida de decoloración en los labios. La exploración pélvica identifica una zona plana blanca de 0,7 cm en el labio mayor derecho. Se realiza una biopsia, cuyo estudio histológico revela células displásicas que ocupan la mitad del espesor del epitelio escamoso con una inflamación crónica subyacente mínima. La hibridación *in situ* revela presencia de ADN del virus del papiloma humano de tipo 16 en las células epiteliales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Vulvitis crónica
B Condiloma acuminado
C Liquen escleroso y atrófico
D Hiperplasia escamosa
E Neoplasia intraepitelial vulvar

9 Una mujer de 52 años ha observado una lesión pruriginosa rojiza en el labio izquierdo, que ha aumentado de tamaño en los últimos 7 meses. En la exploración física se identifica una lesión descamativa rugosa, de 0,4 × 0,9 cm. El periné parece normal y no se encuentran adenopatías ni lesiones rectales. La citología cervicovaginal no identifica alteraciones. Se extirpa la lesión y el estudio histológico revela grandes células atípicas, que se disponen solas o en pequeños agregados dentro de la epidermis. Estas células tienen un citoplasma abundante que se tiñe con el ácido peryódico de Schiff (PAS). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Condiloma acuminado
B Enfermedad de Paget extramamaria
C Liquen escleroso y atrófico
D Liquen simple crónico

E Neoplasia intraepitelial vulvar



10 Una mujer de 18 años sexualmente activa lleva 1 mes con dispareunia seguida de hemorragia vaginal. En la exploración pélvica se identifica una masa friable, rojiza y nodular de 2,5 cm en la pared anterior del tercio superior de la vagina. La figura se corresponde con el aspecto histológico de la biopsia de dicha masa. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que haya contribuido a la aparición de esta neoplasia?

A Hiperplasia suprarrenal congénita
B Exposición a dietilestilbestrol (DES)
C Infección por el virus del papiloma humano
D Síndrome del ovario poliquístico (SOPQ)
E Vaginitis por *Trichomonas*

11 Una niña de 4 años es llevada al médico por sus padres porque estos han notado presencia de sangre en la ropa interior y que «algo» protruye desde los genitales externos. En la exploración física se reconocen masas polipoideas, similares a un racimo de uvas, que se proyectan desde la vagina. El estudio histológico de la biopsia de esta lesión revela células tumorales pequeñas y redondeadas, algunas de las cuales tienen un citoplasma eosinófilo alargado. La inmunohistoquímica muestra positividad de las mismas con desmina, vimentina y miogenina. ¿Cuál es el

diagnóstico más probable?

A Carcinoma de células claras
B Carcinoma epidermoide infiltrante
C Neuroblastoma
D Sarcoma botrioideo
E Neoplasia intraepitelial vulvar

12 Una mujer de 30 años sana consulta al médico para una revisión médica rutinaria. La exploración física no revela alteraciones. La citología cervicovaginal de cribado identifica células compatibles con una neoplasia intraepitelial escamosa de bajo grado (LSIL). La biopsia cervical realizada posteriormente confirma la presencia de una neoplasia intraepitelial cervical (CIN) I. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que se relacione con los hallazgos en la citología cervicovaginal?

A Exposición a dietilestilbestrol (DES)
B Múltiples parejas sexuales
C Uso de anticonceptivos orales
D Tratamiento previo por un tumor maligno
E Deficiencia de vitamina B_{12} (cobalamina)



13 Una mujer de 33 años acude a su médico para una revisión médica rutinaria. En la exploración física no se encuentran hallazgos anómalos. La citología cervicovaginal está alterada; se

realiza una colposcopia con biopsia. La figura muestra el aspecto histológico de la biopsia. ¿Cuál de las siguientes estrategias es la mejor para prevenir la aparición de esta lesión?

A Evitar el tabaco y sus derivados
B Consumo de una dieta rica en verduras
C Mantener el peso corporal ideal
D Uso de anticonceptivos orales
E Vacunación frente al virus del papiloma humano

14 Una mujer de 42 años se somete a una citología cervicovaginal como parte de una revisión médica rutinaria. No se encuentran alteraciones significativas en la exploración física. La citología cervicovaginal muestras células compatibles con una lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL) con presencia del virus del papiloma humano de tipo 18. Se obtienen biopsias cervicales, cuyo estudio histológico confirma la presencia de una extensa displasia moderada (CIN II), además de intensa inflamación crónica con metaplasia escamosa en el conducto endocervical. ¿Cuál es el motivo más probable para realizar una conización cervical en esta paciente?

A Ha culminado su etapa fértil
B No es posible tratar la infección por el VPH
C Situación perimenopáusica
D Presencia de cervicitis crónica
E Riesgo de carcinoma infiltrante

15 Una mujer de 28 años sexualmente activa acude al médico para una revisión rutinaria. No se encuentran alteraciones en la exploración física. La paciente lleva tomando anticonceptivos orales 10 años. La citología cervicovaginal muestra una lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL), que se denomina también *displasia moderada* o *neoplasia intraepitelial cervical* (CIN) II. ¿Cuál es la patogenia molecular más probable para este hallazgo?

A Estimulación estrogénica de la proliferación celular
B Herencia de una mutación en un gen supresor
C Cervicitis gonocócica de repetición
D Regulación al alza de genes antiapoptósicos
E Inactivación vírica del producto del gen *RB1*

16 Una mujer de 34 años se somete a una citología cervicovaginal

de rutina por vez primera. Los resultados indican presencia de células displásicas, compatibles con una lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL), que se llama también *neoplasia intraepitelial cervical* (CIN) III. Se deriva a la paciente al ginecólogo, que le realiza una colposcopia y obtiene múltiples biopsias cervicales, todas las cuales muestran lesiones de CIN III. En la conización se identifica un foco de microinfiltración en la unión escamocilíndrica. A partir de estos hallazgos, ¿cuál de los siguientes pasos es más probable que se tenga que realizar para tratar a esta paciente?

A Gammagrafía ósea para descartar metástasis
B Ciclo de radioterapia
C No realizar más tratamiento
D Evisceración pélvica
E Histerectomía vaginal



17 Una mujer de 45 años ha presentado una hemorragia vaginal de poca intensidad y también una secreción parda maloliente durante

el último mes. En la exploración pélvica se reconoce una lesión de 3 cm en el ectocérvix, que se muestra en la figura. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable encontrar en el estudio histológico de esta lesión?

A Adenocarcinoma
B Neoplasia intraepitelial cervical
C Cervicitis crónica
D Carcinoma de células claras
E Enfermedad de Paget extramamaria
F Carcinoma epidermoide

18 Una mujer de 43 años refiere hemorragia poscoital de 6 meses de evolución. Tuvo la menarquia a los 11 años y a lo largo de su vida ha tenido 12 parejas sexuales. Sigue teniendo ciclos menstruales regulares sin hemorragias intermenstruales anómalas. La exploración pélvica revela un área focal ligeramente elevada de eritema en el cérvix, en la posición horaria de las 5:00. La citología cervicovaginal muestra una lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL), que también se llama *neoplasia intraepitelial cervical grave* (CIN III). El análisis de las células cervicales revela presencia del virus del papiloma humano de tipo 16. ¿Cuál de los siguientes tumores malignos es más probable que desarrolle esta paciente si no es tratada?

A Carcinoma de células claras
B Teratoma inmaduro
C Tumor de Krukenberg
D Leiomiosarcoma
E Sarcoma botrioideo
F Carcinoma epidermoide

19 Una niña de 13 años tuvo la menarquia hace 1 año. Ahora presenta una hemorragia vaginal anómala, con ciclos que duran 2-7 días y que se producen cada 2-6 semanas. La intensidad de la hemorragia varía desde un mínimo goteo hasta un flujo muy intenso. En la exploración física no se encuentran alteraciones. La ecografía pélvica no revela alteraciones. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que produzca estos hallazgos?

A Ciclos anovulatorios
B Embarazo ectópico
C Carcinoma endometrial

D Pólipo endometrial
E Leiomiomas uterinos

20 Una mujer de 41 años, G5, P5, ha notado dolor abdominal bajo con fiebre desde hace 2 días. Tuvo un parto normal a término hace 1 semana. En la exploración tiene una temperatura de 37,4 °C y presenta una secreción vaginal maloliente. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable que tenga?

A Neoplasia intraepitelial cervical
B Infiltrados endometriales de neutrófilos
C Neoplasia de músculo liso miometrial
D Endometrioma ovárico
E Inflamación granulomatosa tubárica
F Tricomoniasis vaginal

21 Una mujer de 35 años consulta por esterilidad. Refiere dismenorrea, dispareunia y dolor pélvico con la defecación desde hace 4 años. La exploración laparoscópica identifica nódulos de color rojo azulados en la superficie uterina, con extensas adherencias entre los ovarios y las trompas de Falopio. El estudio histológico de una biopsia de uno de los nódulos muestra glándulas endometriales hiperplásicas con hemorragia en el estroma. El análisis molecular de la biopsia revela hipometilación de las regiones promotoras de los genes que codifican el factor esteroidogénico 1 y el receptor de estrógenos β. No se reconocen mutaciones en los genes *PTEN, KRAS* o *MLH1*. ¿Cuál de las siguientes modalidades terapéuticas es apropiada en este caso?

A Inhibidores de la aromatasa
B Quimioterapia
C Estrógenos
D Antituberculosos
E Histerectomía abdominal total

22 Una mujer de 36 años refiere menorragia y dolor pélvico desde hace 6 meses. Tuvo un embarazo normal sin complicaciones hace 10 años, pero no ha conseguido otro desde entonces. Mantiene relaciones sexuales con una única pareja desde hace 20 años y no ha sufrido dispareunia. En la exploración pélvica se encuentra un útero aumentado de tamaño de forma simétrica, sin nódulos aparentes o masas palpables. La prueba de embarazo en suero es negativa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Adenomiosis
B Endometritis crónica
C Hiperplasia endometrial
D Endometriosis
E Leiomioma

23 Una mujer de 32 años presenta dolor abdominal cíclico, coincidente con la menstruación. Los intentos de conseguir quedarse embarazada han fracasado durante los últimos 5 años. La exploración física no muestra alteraciones. El estudio laparoscópico revela numerosas lesiones hemorrágicas de 0,2-0,5 cm de diámetro en las superficies peritoneales del útero y los ovarios. ¿Cuál de las siguientes lesiones ováricas es más probable que se asocie a estos hallazgos?

A Fibroma
B Tumor de Brenner
C Quiste endometriósico
D Tumor de Krukenberg
E Coriocarcinoma metastásico
F Cistoadenocarcinoma mucinoso



24 Una mujer de 49 años perimenopáusica refiere menometrorragia durante los últimos 3 meses. En la exploración física no se encuentran alteraciones significativas. En la figura se

muestra el aspecto histológico de una biopsia endometrial. Se realiza un legrado a la paciente y la hemorragia cede, sin complicaciones posteriores. ¿Cuál de las siguientes circunstancias es más probable que produzca estos hallazgos?

A Endometritis crónica
B Teratoma quístico maduro ovárico
C Embarazo con aborto retenido
D Falta de ovulación repetida
E Uso de anticonceptivos orales

25 Una mujer de 52 años perimenopáusica ha presentado hemorragia vaginal durante la última semana. No refiere antecedentes médicos de interés ni toma ningún fármaco. Se realiza una histeroscopia y se observa una masa solitaria, blanda y lisa de 2 cm que protruye hacia la cavidad endometrial y a cuya biopsia se procede. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más probable que se encuentre en el estudio histológico de la biopsia?

A Glándulas endocervicales con metaplasia escamosa
B Glándulas endometriales que remedan el estrato basal
C Papilas con marcada atipia celular
D Células musculares lisas en husos
E Glándulas tubulares revestidas por células claras con glucógeno

26 Una mujer de 42 años lleva 2 meses con menometrorragia. No tiene antecedentes de hemorragia menstrual irregular previa y todavía no ha tenido la menopausia. En la exploración física no se encuentran lesiones vaginales ni cervicales y el útero tiene un tamaño normal, pero se identifica una masa anexial derecha. La ecografía abdominal confirma la presencia de una masa anexial derecha sólida de 7 cm. La biopsia endometrial revela una hiperplasia de endometrio sin atipia celular. ¿Qué lesión es más probable que explique las alteraciones menstruales de esta paciente?

A Quiste del cuerpo lúteo
B Endometrioma
C Tumor de células de la granulosa-teca
D Teratoma quístico maduro
E Metástasis
F Síndrome del ovario poliquístico

27 Una mujer de 62 años, sin hijos, refiere una secreción vaginal sanguinolenta dos veces en el mes anterior. Tuvo su último período menstrual hace 10 años. La exploración pélvica bimanual muestra un útero de tamaño normal sin masas anexiales palpables. No se reconocen erosiones ni masas cervicales. Su IMC es de 33. Entre sus antecedentes médicos destaca que durante los últimos 30 años ha tenido diabetes de tipo 2 e hipertensión. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que se encuentre en una biopsia endometrial?

A Adenocarcinoma
B Coriocarcinoma
C Leiomiosarcoma
D Tumor de Müller mixto maligno
E Carcinoma epidermoide

28 Un estudio sobre pacientes con hemorragia uterina posmenopáusica indica que algunas tienen neoplasias malignas originadas sobre lesiones hiperplásicas atípicas previas. La máxima incidencia se produce entre los 55 y los 65 años en mujeres obesas, hipertensas y/o diabéticas. Los análisis moleculares identifican mutaciones del gen supresor de tumores *PTEN* en la mayor parte de los casos. Estos tumores malignos suelen permanecer localizados muchos años antes de diseminarse a los linfáticos locales. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que tenga estas características?

A Carcinoma de células claras
B Carcinoma endometrioide
C Leiomiosarcoma
D Tumor de Müller mixto
E Carcinoma seroso
F Sarcoma del estroma

29 Una mujer nulípara obesa de 62 años ha presentado un episodio de hemorragia vaginal, con solo 5 ml de sangre. En la exploración pélvica, el útero no está aumentado de tamaño y el cérvix parece normal. La citología cervicovaginal muestra células compatibles con un adenocarcinoma. ¿Cuál de las siguientes situaciones preexistentes es más probable que haya contribuido a la aparición de este tumor maligno?

A Adenomiosis

B Endometritis crónica
C Hiperplasia endometrial
D Infección por el virus del papiloma humano
E Uso de anticonceptivos orales

30 Una mujer nulípara de 40 años refiere menorragia de 6 meses de evolución. En la exploración física tiene una presión arterial de 154/93 mmHg y no se identifican lesiones cervicales ni masas anexiales. El útero tiene un tamaño normal. La paciente mide 155 cm y pesa 74,5 kg (IMC, 38). La citología cervicovaginal identifica células glandulares atípicas de significado incierto. La concentración de hemoglobina A_{1c} es del 9,8%. La biopsia endometrial muestra una hiperplasia compleja con atipia, y el análisis molecular detecta pérdida de heterocigosidad del gen *PTEN* y aumento de la fosforilación de AKT. ¿Cuál de las siguientes vías metabólicas es más probable que esté activada en este tumor?

A Menor captación de glucosa
B Menor síntesis de prostaglandinas
C Aumento de la glucólisis aeróbica
D Aumento del depósito de glucógeno
E Aumento de la fosforilación oxidativa



31 Una mujer sana de 59 años refiere sensación de pesadez en la pelvis desde hace 11 meses. No tiene antecedentes de hemorragias anómalas, y tuvo el último período menstrual hace 8 años. El médico palpa un útero nodular aumentado de tamaño en la exploración pélvica bimanual. La citología cervicovaginal no muestra alteraciones. La TC pélvica identifica múltiples masas uterinas sólidas, sin evidencia de necrosis o hemorragia. Se realiza una histerectomía abdominal total. A partir del aspecto macroscópico que muestra la figura, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

A Adenomiosis
B Endometriosis
C Leiomiomas
D Metástasis
E Tuberculosis

32 Una mujer de 53 años que tuvo el último período menstrual hace 3 años nota una hemorragia vaginal desde hace 1 semana. En la exploración física tiene un marcado aumento del tamaño del útero, sin masas anexiales. La TC identifica una masa irregular de 8 cm en el cuerpo del útero. Se realiza una histerectomía abdominal total y el estudio histológico de la masa hemorrágica y blanda observa células fusiformes con atipias y numerosas mitosis. Se identifica necrosis coagulativa de las células neoplásicas. ¿Cuál de las siguientes células es más probable que origine esta masa?

A Células citotrofoblásticas
B Células glandulares endometriales
C Células germinales
D Células musculares lisas
E Células epiteliales escamosas

33 Una mujer de 69 años lleva sangrando por la vagina 1 mes. En la exploración pélvica no se encuentran alteraciones. ¿Cuál de las siguientes técnicas diagnósticas tendría que realizarse a continuación?

A Biopsia endometrial
B Resonancia magnética
C Cultivo microbiológico
D Citología cervicovaginal
E Prueba de embarazo

34 Una mujer de 28 años ha tenido fiebre, dolor pélvico y sensación de pesadez en la pelvis durante la última semana. La exploración pélvica identifica una masa anexial izquierda dolorosa. La laparoscopia muestra que la trompa de Falopio izquierda se confunde con una masa pardo-rojiza de 5 cm, delimitada que afecta a la región anexial izquierda. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que produzca estos hallazgos?

A *Chlamydia trachomatis*
B *Haemophilus ducreyi*
C Virus del herpes simple
D *Mycobacterium tuberculosis*
E *Treponema pallidum*

35 Una mujer de 19 años presenta de forma súbita dolor abdominal. En la exploración se encuentra dolor pélvico a la palpación. No se identifica sangre oculta en las heces. Las pruebas de embarazo en suero y orina son negativas. La ecografía transvaginal no encuentra saco gestacional intrauterino, y el útero y los anejos tienen un tamaño normal. Mediante culdocentesis se obtiene una pequeña cantidad de líquido sanguinolento. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que haya producido estos hallazgos?

A Embarazo ectópico
B Endometriosis
C Quiste folicular
D Mola invasiva
E Enfermedad inflamatoria pélvica



36 Una mujer de 21 años tuvo la menarquia a los 14 años y presentó ciclos menstruales regulares durante los 3 años siguientes. En este último año ha tenido oligomenorrea y ha aparecido hirsutismo. En los últimos 4 meses ha ganado 10 kg de peso. En la exploración pélvica no se identifican lesiones vaginales o cervicales, el tamaño del útero es normal, y los anejos son prominentes. La ecografía pélvica muestra que los dos ovarios miden el doble de lo normal, mientras que tamaño del útero es normal. La figura se corresponde con la RM de la paciente. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que tenga esta paciente?

A Teratomas inmaduros
B Tumores de Krukenberg
C Cistoadenocarcinomas de ovario
D Síndrome del ovario poliquístico
E Abscesos tuboováricos

37 Una mujer de 35 años ha presentado un aumento del perímetro abdominal progresivo en los últimos 6 meses. Afirma sentirse

como si estuviera embarazada, pero las pruebas de embarazo son negativas. En la exploración física se encuentra distensión abdominal con oleada ascítica. La ecografía pélvica muestra masas ováricas quísticas bilaterales, de 10 cm en el lado derecho y de 7 cm en el izquierdo. Se extirpan ambas quirúrgicamente. La exploración macroscópica muestra que las masas extirpadas son quistes uniloculares llenos de líquido claro y con proyecciones papilares que se extienden hacia una luz central en el quiste. Histológicamente, las papilas están revestidas por células cúbicas atípicas que infiltran el estroma subyacente. Se encuentran cuerpos de psamoma. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Tumor endometrioide
B Cistoadenocarcinoma
C Disgerminoma
D Tumor de células de la granulosa
E Teratoma quístico maduro
F Tumor de células de Sertoli-Leydig



38 Una mujer de 40 años ha observado un aumento progresivo del perímetro abdominal durante los últimos 5 meses, aunque no ha cambiado la dieta y está haciendo más ejercicio. La exploración no identifica masas palpables, pero existe oleada ascítica. Mediante paracentesis se obtienen 500 ml de líquido ligeramente turbio. El estudio citológico de este revela la presencia de células malignas. La ecografía identifica una masa multilobulada de 15 cm en la región anexial derecha. El tamaño del útero es normal. Se extirpa quirúrgicamente la masa, cuyas características macroscópicas se muestran en la figura. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Coriocarcinoma
B Disgerminoma
C Tumor de células de la granulosa
D Cistoadenocarcinoma mucinoso
E Teratoma con transformación maligna

39 Una mujer de 56 años refiere pérdida de peso acompañada de un aumento del perímetro abdominal durante los últimos 5 meses.

La paciente tiene antecedentes familiares de carcinoma de mama y ovario. En la exploración física no se encuentran lesiones en el cérvix y el tamaño del útero es normal, pero se observa una masa anexial izquierda. La ecografía abdominal identifica una masa quística de 10 cm en el anejo izquierdo, con nódulos peritoneales dispersos de 1 cm y ascitis. El estudio citológico del líquido ascítico encuentra células malignas. ¿Cuál de los siguientes genes mutados es más probable que influya en el desarrollo de esta neoplasia?

A *BRCA1*
B *ERBB2 (HER2)*
C *MYC*
D *KRAS*
E *RB1*



40 Una mujer de 42 años ha notado dolor abdominal bajo sordo desde hace 1 año. No refiere hemorragias anómalas. En la exploración física se identifica una gran masa anexial izquierda. La prueba de embarazo es negativa. La ecografía transvaginal muestra una masa anexial izquierda de 10 cm, quística y llena de líquido. Se extirpa la masa y su imagen histológica es la que se muestra en la figura. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que se asocie a esta lesión?

A Metástasis cerebrales

B Hiperplasia endometrial
C Masculinización
D Implantes peritoneales
E Transformación sarcomatosa



41 Una mujer de 33 años presenta dolor abdominal sordo y constante desde hace 6 meses. En la exploración física solo se encuentra una masa anexial derecha. La TC pélvica identifica una masa quística de 7 cm, delimitada en el ovario derecho, con calcificaciones irregulares. Se extirpan quirúrgicamente la trompa de Falopio y el ovario derechos. La figura muestra el aspecto macroscópico del ovario una vez abierto. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que se encuentre en el estudio histológico de esta lesión?

A Epitelio escamoso maduro
B Estructuras papilares con cuerpos de psamoma
C Neuroepitelio primitivo
D Rabdomioblastos en un estroma celular
E Láminas de células del trofoblasto y el sincitio

42 Una mujer de 23 años refiere molestias pélvicas desde hace 4 meses. En la exploración pélvica se encuentra una gran masa indolora en el anejo derecho. La TC abdominal muestra una masa de 11 cm sólida y delimitada. Durante la extirpación quirúrgica se

observa que la masa es sólida y blanquecina, con pequeñas áreas de necrosis. Histológicamente, está constituida, sobre todo, por células mesenquimatosas primitivas, además de cartílago, músculo y focos de diferenciación neuroepitelial. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Tumor de Brenner
B Disgerminoma
C Tumor de células de la granulosa
D Teratoma inmaduro
E Leiomiosarcoma
F Tumor de Müller mixto maligno

43 Una mujer de 52 años presenta dolor sordo en la parte baja del abdomen durante los últimos 6 meses con una hemorragia vaginal mínima en tres ocasiones. Tuvo la menopausia hace 2 años. En la exploración pélvica se identifica una masa anexial derecha y el tamaño del útero es normal. La ecografía abdominal muestra una masa sólida de 8 cm, una pequeña cantidad de ascitis y derrame pleural derecho. Se realiza una histerectomía abdominal total y la masa se diagnostica como un fibrotecoma ovárico. ¿Cuál de las siguientes lesiones adicionales es más probable que se encuentre en la muestra de resección?

A Salpingitis crónica bilateral
B Condilomas acuminados cervicales
C Hiperplasia endometrial
D Metástasis en la serosa uterina
E Mola parcial uterina

44 Un estudio clínico sobre mujeres diagnosticadas de neoplasias ováricas indica que 1 de cada 200 desarrolla signos y síntomas de masculinización, como hirsutismo, acné, atrofia mamaria y amenorrea. Se observa que estas mujeres tienen masas amarillentas, firmes, bien delimitadas y lobuladas con un diámetro medio de 5 cm. El estudio histológico observa células rosadas rechonchas que muestran positividad inmunohistoquímica con inhibina. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que presente estas características?

A Tumor de Brenner
B Disgerminoma
C Carcinoma endometrioide

D Tumor de células de la teca-granulosa
E Tumor de células de Sertoli-Leydig

45 Una chica de 17 años tiene una falta y la prueba de embarazo resulta positiva. Un mes después presenta dolor suprapúbico y expulsa coágulos de sangre por vía vaginal. A los 3 días también expulsa una pequeña cantidad de tejido. El estudio histológico de este tejido identifica productos de la concepción. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que haya ocasionado este aborto?

A Útero bífido
B Infección por estreptococos del grupo B
C Síndrome del ovario poliquístico
D Preeclampsia
E Tabaquismo
F Trisomía 16 fetal

46 Una mujer de 36 años ha tenido un embarazo de 37 semanas sin complicaciones. Durante las últimas 12 h ha presentado dolor abdominal bajo, y en la exploración se observa hipersensibilidad suprapúbica. La temperatura es de 37,4 °C. La exploración pélvica encuentra secreción cervical purulenta. El lactante nace a las 12 h. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que produjera este parto prematuro?

A Estreptococos del grupo B
B Virus del herpes simple
C Virus de la rubéola
D *Toxoplasma gondii*
E *Treponema pallidum*

47 Una mujer de 22 años presenta dolor abdominal bajo intenso de aparición súbita. En la exploración física no se identifican masas, pero se observa una importante hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho. La exploración pélvica no encuentra lesiones en el cérvix ni en la vagina. Los ruidos intestinales se conservan. En la ecografía abdominal se observa un aumento de tamaño focal de 4 cm de diámetro en la parte proximal de la trompa de Falopio derecha. El legrado endometrial solo encuentra decidua en la cavidad endometrial. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que presente esta paciente?

A Cultivo cervical positivo para *Neisseria gonorrhoeae*

B Detección de gonadotropina coriónica humana en el suero
C Cariotipo 69,XXY en las células deciduales
D Citología cervicovaginal con presencia de seudohifas de *Candida*
E Resultados positivos en la serología de la sífilis

48 Una primigrávida de 36 años desarrolla edema periférico al final del segundo trimestre del embarazo. En la exploración física tiene una presión arterial de 155/95 mmHg. El análisis de orina revela una proteinuria de 2+, sin presencia de sangre, glucosa o cetonas. A las 36 semanas da a luz un niño viable normal, pero de bajo peso. La presión arterial se normaliza y ya no presenta proteinuria. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable que se encuentre al estudiar la placenta?
A Corioamnionitis
B Vellositis coriónica
C Vellosidades hidrópicas
D Múltiple infartos
E Mola parcial

49 Una primigrávida de 35 años en la semana 30 de gestación desarrolla cefaleas cada vez más intensas y aumenta 3 kg su peso en 1 semana. Esta mañana presenta una convulsión generalizada. En la exploración física se encuentra afebril, pero la presión arterial es de 190/115 mmHg (era de 120/80 mmHg en la consulta prenatal realizada 1 mes antes). Presenta edema periférico en la cabeza y todas las extremidades. La frecuencia cardíaca fetal es de 140 latidos/min y existen movimientos fetales. Las pruebas de laboratorio revelan cifras de hemoglobina de 12,5 g/dl; de hematocrito del 37,6%; de VCM de 92 μm^3; de recuento plaquetario de 199.000/mm^3; de creatinina sérica de 1 mg/dl; de potasio de 4,2 mmol/l, y de glucosa de 101 mg/dl. El análisis de orina revela una proteinuria de 2+ sin hematuria, eritrocitos, cilindros o leucocitos. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que haya contribuido a causar su enfermedad?
A Hiperplasia cortical suprarrenal
B Coagulación intravascular diseminada
C Enfermedad trofoblástica gestacional
D Neoplasia ovárica productora de estrógenos
E Isquemia placentaria

F Diabetes gestacional no controlada



50 Una mujer de 21 años, G2, P1, en la primera fase del segundo trimestre de la gestación nota una pequeña hemorragia vaginal durante la última semana y durante 3 semanas ha presentado náuseas y vómitos intensos. En la exploración física, el útero es grande para la edad gestacional. La ecografía revela un contenido intrauterino con «aspecto de tormenta de nieve» y el feto no es identificado. La figura corresponde al aspecto macroscópico del tejido obtenido mediante legrado. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que esté incrementada en el suero?

A Acetilcolinesterasa
B α-fetoproteína
C Estradiol
D Gonadotropina coriónica humana
E Lactógeno placentario humano

51 Una mujer de 23 años, G3, P2, ha presentado un aborto espontáneo a las 15 semanas de gestación. El feto, de sexo masculino, es pequeño para la edad gestacional y presenta malformaciones con sindactilia del tercer y cuarto dedos de las dos manos. La placenta también es pequeña y presenta vellosidades de 0,5 cm parecidas a racimos de uvas mezcladas con otras vellosidades de aspecto normal. ¿Cuál de los siguientes cariotipos

es más probable que se encuentre en el análisis cromosómico del tejido placentario?

A 45,X
B 46,XX
C 47,XXY
D 47,XY, + 18
E 69,XXY



52 Una mujer de 23 años observa de pronto una secreción vaginal parda sanguinolenta. Al día siguiente presenta disnea. En la exploración física se encuentra una masa pardo-rojiza de 3 cm en la pared lateral de la vagina. La radiografía de tórax muestra numerosos nódulos de 2-5 cm en los dos pulmones. Las pruebas de laboratorio reflejan una marcada elevación de las concentraciones de gonadotropina coriónica humana sérica. Se realiza una biopsia de la masa vaginal, que se muestra en la figura. El análisis cromosómico de estas células muestra un cariotipo 46,XX. ¿Cuál de las siguientes células es más probable que se encuentre en esta masa?

A Amnióticas
B Rabdomioblastos
C Epiteliales serosas
D Del músculo liso

E Sincitiotrofoblasto

53 Una mujer de 26 años dio a luz un neonato normal hace 1 mes después de un embarazo sin complicaciones. Ahora presenta una hemorragia vaginal. La histeroscopia muestra un nódulo en el fondo uterino. Las pruebas de laboratorio revelan una concentración de gonadotropina coriónica humana de 200 mUI/ml. Recibe quimioterapia, pero la lesión no se resuelve. Se realiza una histerectomía. El estudio histológico del nódulo identifica células del trofoblasto intermedio. ¿Cuál de las siguientes proteínas es más probable que se pueda demostrar mediante inmunotinción en este nódulo?

A α-fetoproteína
B Cromogranina
C Desmina
D Lactógeno placentario humano
E Enolasa neuronal específica

Respuestas

1 **B** Las células inflamatorias de la secreción cervical con presencia de áreas rojizas (eritema) y los datos de la biopsia indican que la paciente presenta cervicitis. La infección por *Chlamydia trachomatis* es la causa más frecuente de cervicitis en las mujeres con sexualmente activas. La candidiasis, la gonorrea y la tricomoniasis son también frecuentes. La candidiasis produce una secreción vaginal escasa y blanquecina, parecida a la nata; la gonorrea puede asociarse a una uretritis, mientras que las *Trichomonas* pueden ocasionar una secreción vaginal adherente verdosa o amarillenta abundante homogénea y de aspecto espumoso. *Gardnerella* se encuentra en la vaginosis bacteriana, un proceso frecuente causado por sobrecrecimiento bacteriano. La infección por *Gardnerella* cursa con una secreción vaginal moderada y homogénea de baja viscosidad, adherente, blanca o grisácea y con un olor a pescado característico; en un frotis en fresco se pueden encontrar células clave de la vaginosis. Las infecciones herpéticas suelen manifestarse con vesículas claras en la piel de la región perineal. La infección por el virus del papiloma humano se asocia a condilomas, displasias y carcinomas.

2 **A** La presencia de células en gemación con seudohifas indica una infección por hongos de tipo *Candida*. La vaginitis candidiásica es frecuente; este microorganismo se encuentra aproximadamente en el 5-10% de las mujeres. Los episodios repetidos de candidiasis vaginal pueden asociarse a especies distintas de *C. albicans*. La inflamación suele ser superficial y típicamente no se encuentra infiltración de los tejidos subyacentes. *Ureaplasma* es una bacteria, igual que lo es *Chlamydia*, y ambas especies pueden producir una cervicitis. *Neisseria gonorrhoeae*, un diplococo gramnegativo, es el causante de la gonorrea. La infección por *Trichomonas vaginalis* puede producir una secreción vaginal purulenta, pero los microorganismos son protozoos y no se encuentran hifas.

3 **C** Las infecciones por gonorrea pueden producir salpingitis y enfermedad inflamatoria pélvica con cicatrización de la trompa de Falopio. Estas predisponen al embarazo ectópico, porque el óvulo fecundado tiene dificultades para atravesar la trompa. La gonorrea y otras infecciones genitales no producen hemorragia disfuncional. La gonorrea no se asocia a riesgo de displasia o carcinoma, a diferencia de lo que sucede con el virus del papiloma humano. La gonorrea y otras infecciones no contribuyen a la hiperplasia endometrial. La causa de la endometriosis no se conoce de forma segura, pero no parece que las infecciones intervengan en este proceso. La placenta previa se debe a una placenta de implantación baja y no se relaciona con las enfermedades de transmisión sexual.

4 **A** Las glándulas de Bartholin pueden obstruirse, inflamarse y enquistarse por la formación de abscesos, que producen dolor focal. El quiste del conducto de Gartner puede formarse en la pared lateral de la vagina a partir de un resto del conducto de Wolff (mesonéfrico); el quiste se llena de líquido y, en general, no está inflamado. En los labios menores no existen folículos pilosos. La glándula de Bartholin se encuentra situada inferior a la fascia del diafragma urogenital y anterior al bulbo vestibular, que no es glandular y no se enquista.

5 **C** El liquen escleroso y atrófico es más frecuente en las mujeres posmenopáusicas. Aunque esta lesión no se considera premaligna, las mujeres con esta entidad muestran un riesgo del

1-5% de desarrollar un carcinoma epidermoide posteriormente. Por el contrario, el liquen simple crónico cursa, macroscópicamente, como una leucoplasia por la hiperplasia del epitelio escamoso y no se asocia a procesos malignos. La enfermedad de Paget extramamaria es infrecuente y produce áreas de descamación rojizas que se deben a la presencia de células parecidas a un adenocarcinoma en la unión dermoepidérmica. La infección por el virus del papiloma humano se asocia a la aparición de condilomas acuminados y displasias del epitelio escamoso. La enfermedad inflamatoria pélvica se debe a la infección de los genitales internos por microorganismos, como *Neisseria gonorrhoeae* y *Chlamydia trachomatis.* La neoplasia intraepitelial vulvar se caracteriza por epitelio escamoso displásico.

6 **D** La hiperplasia de células escamosas, llamadas antes *liquen simple crónico,* suele afectar a mujeres de 30 a 50 años. No se trata de una lesión premaligna, pero puede coexistir con un liquen escleroso, y la leucoplasia es sugestiva de un posible carcinoma epidermoide, que se debe descartar en la biopsia. La infección por el virus del papiloma humano se asocia a condilomas acuminados y displasias de células escamosas, que muestran vacuolización de los queratinocitos e inflamación mínima. La dermatitis por contacto produce placas rojizas y vesículas, con intensos infiltrados de células redondas y suelen mejorar cuando no se utiliza el antígeno responsable (como las cremas cutáneas). Las lesiones de psoriasis determinan una descamación extensa y el estudio histológico revela adelgazamiento focal de la epidermis con intensa paraqueratosis. La neoplasia intraepitelial vulvar se caracteriza por cambios displásicos en el epitelio escamoso.

7 **D** El epitelio muestra rasgos típicos de una infección por el virus del papiloma humano (VPH) – en concreto una llamativa vacuolización perinuclear (coilocitosis) y angulación de los núcleos–. Estas lesiones, que se denominan *condilomas acuminados,* pueden aparecer en cualquier lugar de la superficie anogenital como lesiones solitarias o, con más frecuencia, lesiones múltiples. No son precancerosas. Los condilomas se asocian a infección por el VPH, a menudo de los tipos 6 y 11. Las

infecciones por *Candida* producen vaginitis o cervicitis con exudado y eritema. Las infecciones por *Chlamydia* pueden producir uretritis, cervicitis y enfermedad inflamatoria pélvica. *Haemophilus ducreyi* es responsable del chancro blando del chancroide. *Treponema pallidum* es el microorganismo causante de la sífilis, que se caracteriza por un chancro duro.

8 **E** La presencia de células displásicas que ocupan la mitad del espesor del epitelio es sugestiva de una neoplasia intraepitelial vulvar (VIN). La incidencia de estas lesiones ha aumentado, posiblemente porque hay más casos de infección por el virus del papiloma humano (VPH). Algunas lesiones de tipo VIN pueden evolucionar a cánceres infiltrantes. La inflamación crónica no provoca por sí misma displasia. El condiloma suele ser una lesión nodular abultada. También lo produce el VPH, sobre todo los tipos 6 y 11. El liquen escleroso es una distrofia vulvar caracterizada por adelgazamiento del epitelio escamoso y esclerosis dérmica. Igual que la VIN, la hiperplasia escamosa, que es otro tipo de distrofia vulvar, puede producir una zona de leucoplasia, pero no presenta cambios displásicos.

9 **B** La enfermedad de Paget extramamaria es un proceso infrecuente que no se suele asociar a un tumor maligno de base, a diferencia de la enfermedad de Paget mamaria. En muchos casos, las células de Paget extramamarias quedan limitadas al epitelio, a menudo durante años, lo que da lugar a una molesta lesión rojiza pruriginosa. Sin embargo, en el 25% de los casos puede existir una neoplasia de base y, por tanto, infiltración local e incluso metástasis. El condiloma es consecuencia de la infección por el virus del papiloma humano (VIH) y provoca una atipia coilocitótica, pero las células del condiloma no son malignas. La esclerosis liquenoide es una placa blanquecina de adelgazamiento epitelial con fibrosis dérmica e inflamación crónica, que puede tener una magnitud suficiente como para constreñir el orificio vaginal; puede tener una base autoinmunitaria, y aumenta el riesgo de desarrollar un carcinoma epidermoide en el futuro. El liquen simple crónico es una zona de hiperplasia epitelial sin atipia que no se asocia a malignidad. La neoplasia intraepitelial vulvar tiene células neoplásicas que se extienden por todo el espesor del epitelio; se

relaciona con la infección por el VPH.

10 **B** El aspecto histológico corresponde a un tumor maligno constituido por células de citoplasma claro. Los carcinomas de células claras vaginales se asocian a exposición al dietilestilbestrol (DES) por parte de la madre de la paciente durante el embarazo. Estos tumores suelen diagnosticarse al final de la adolescencia. La hiperplasia suprarrenal congénita puede producir masculinización en las niñas, que se manifiesta en los primeros años de la infancia. La infección por el virus del papiloma humano se asocia a displasia y tumores malignos del epitelio escamoso, pero no a adenocarcinomas de células claras. El síndrome del ovario poliquístico puede provocar desequilibrios hormonales por una excesiva producción de andrógenos, pero las neoplasias vaginales no aparecen en este contexto. Las infecciones por *Trichomonas* no producen neoplasias.

11 **D** El rabdomiosarcoma embrionario es un tumor vaginal poco frecuente, que puede afectar a niñas menores de 5 años. Dado que forma masas polipoideas similares a racimos de uvas, en ocasiones se denomina *sarcoma botrioideo.* Histológicamente, es un tumor de células pequeñas azules y redondeadas que presenta diferenciación muscular esquelética, la cual se traduce en la presencia de proteínas específicas del músculo, como la desmina. Los neuroblastomas son tumores infantiles y son uno de incluidos dentro de la categoría de los de células pequeñas azules, pero se localizan en las glándulas suprarrenales o la cadena simpática extrasuprarrenal. El carcinoma de células claras de vagina puede guardar relación con la exposición intrauterina al dietilestilbestrol (DES), pero debuta en la segunda o tercera década de la vida. Los carcinomas epidermoides infiltrantes son infrecuentes en los pacientes muy jóvenes y muestran evidencia histológica de diferenciación escamosa y se relacionan con la infección por el virus del papiloma humano (VPH). La neoplasia intraepitelial vulvar es un carcinoma *in situ* de la piel vulvar de origen escamoso y que guarda relación con la infección por el VPH.

12 **B** La neoplasia intraepitelial cervical (CIN) I representa una displasia mínima (leve) (neoplasia intraepitelial escamosa de

bajo grado [LSIL]) y se trata de un proceso potencialmente reversible. Las displasias son lesiones preneoplásicas y pueden evolucionar a carcinomas si no se tratan. Entre los factores de riesgo de las displasias y carcinomas cervicales están la edad temprana en el primer coito, múltiples parejas sexuales y una pareja masculina con múltiples relaciones sexuales previas. Todos estos factores aumentan el riesgo de infección por el virus del papiloma humano. La exposición a dietilestilbestrol (DES) es un factor implicado en el desarrollo del carcinoma de células claras de vagina y cérvix. El uso de anticonceptivos orales, que contienen cantidades muy pequeñas de compuestos con actividad hormonal, no produce displasia ni carcinoma de cérvix. El tratamiento de los cánceres no produce displasias, aunque puede resultar difícil distinguir los cambios atípicos que aparecen en las células epiteliales en relación con la radioterapia y/o la quimioterapia de un cáncer auténtico. La deficiencia de vitamina B_{12} puede ocasionar cambios megaloblásticos epiteliales, pero no displasia.

13 **E** La figura muestra una lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL), llamada *neoplasia intraepitelial cervical* (CIN) III porque la displasia afecta a todo el espesor del epitelio cervical. Estas lesiones se originan con más frecuencia en mujeres que han tenido relaciones sexuales en edades tempranas, que han tenido múltiples parejas sexuales o que tienen una pareja masculina con múltiples parejas sexuales previas. Se cree que estos factores aumentan el riesgo de infección por el virus del papiloma humano (VPH), sobre todo los de los tipos 16 y 18, que se asocian a un elevado riesgo de displasia y carcinoma cervical. Dada la relación causal con la infección por el VPH, se ha demostrado que el uso de vacunas frente a este virus previene la progresión de la enfermedad. No se ha demostrado asociación entre la neoplasia escamosa cervical y el tabaquismo, la dieta, el peso corporal o las influencias hormonales.

14 **E** La neoplasia intraepitelial cervical (CIN) II de esta paciente es una lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL) que puede evolucionar a carcinoma infiltrante en unos años si no se trata, sobre todo porque está infectada por un subtipo de virus de alto riesgo. La infección por el VPH suele controlar este

proceso, pero su mera presencia no determina el tratamiento. La infección por el VPH no se puede erradicar con antibióticos, pero las pacientes pueden eliminar el virus. La cervicitis crónica con metaplasia escamosa no es una lesión maligna y no determina el tratamiento en este caso. La conización puede conservar la fertilidad en mujeres en edad fértil.

15 **E** No se deben obviar las displasias de cérvix, dado que evolucionan de forma natural a displasias más graves y carcinomas infiltrantes. Aunque no todos los casos evolucionan, el médico no debe correr este riesgo. Las displasias se relacionan de forma importante con las infecciones por el virus del papiloma humano (VPH) y es posible encontrar ADN del VPH hasta en el 90% de los casos. Las proteínas E6 y E7 del virus se ligan a Rb y regulan al alza a la ciclina E. En aproximadamente el 10-15% de los casos no se encuentran evidencias del VPH y otros factores pueden influir en la aparición de la displasia. En pacientes con infección por el VPH, la citología cervicovaginal puede mostrar cambios de neoplasia intraepitelial cervical (CIN) I (lesión intraepitelial escamosa de bajo grado [LSIL]). Los anticonceptivos orales con dosis bajas de estrógenos y progesterona no incrementan de forma significativa el riesgo de displasia. A pesar de la implicación del gen *RB1,* no es un problema hereditario y los retinoblastomas no se asocian a infección por el VPH. La cervicitis suele deberse a bacterias u hongos y no es un factor de riesgo significativo de displasia o carcinoma. Los genes antiapoptósicos, como *BCL2,* no participan en la carcinogenia del cérvix.

16 **C** Los carcinomas epidermoides microinfiltrantes del cérvix son lesiones en estadio I, cuya supervivencia es parecida a la descrita en lesiones *in situ.* Esta mínima invasividad no exige tratamientos más intensivos. La probabilidad de metástasis o recidiva es mínima.

17 **F** La lesión cervical que muestra esta figura es grande y ulcerada, y se proyecta hacia la vagina. Posiblemente se trate de un carcinoma epidermoide infiltrante, que ha invadido la región subepitelial. Los cambios displásicos limitados al epitelio se denominan neoplasia intraepitelial cervical y no forman masas. Las lesiones infiltrantes de tipo glandular sugieren un

adenocarcinoma, que es mucho menos frecuente que los carcinomas epidermoides cervicales. La cervicitis crónica produce eritema, pero no masa. El carcinoma de células claras es poco frecuente y se suele originar en la vagina. La enfermedad de Paget extramamaria suele originarse en la vulva y ocasiona una lesión eccematosa, pero no una masa, dado que las células neoplásicas quedan limitadas al epitelio y a los anejos cutáneos adyacentes.

18 **F** Esta paciente tiene varios factores de riesgo para desarrollar un carcinoma epidermoide cervical, incluidas múltiples parejas sexuales, infección demostrada del cérvix por un virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo de tipo 16 y diagnóstico de una lesión intraepitelial escamosa de alto grado (HSIL). Las demás opciones no se relacionan con la infección por el VPH. El carcinoma de células claras de cérvix es infrecuente y algunos se asocian al uso de dietilestilbestrol (DES) por parte de la madre durante el embarazo. El teratoma inmaduro se origina en el ovario. Un tumor de Krukenberg es una forma de metástasis en el ovario. Los leiomiosarcomas son infrecuentes y se originan típicamente en el miometrio, aunque pueden localizarse en el cérvix. El sarcoma botrioideo es una lesión vaginal que afecta típicamente a niñas pequeñas.

19 **A** Los ciclos anovulatorios son una causa frecuente de hemorragia uterina disfuncional en mujeres jóvenes que están empezando a tener menstruación y en las mujeres que se aproximan a la menopausia. Se produce una estimulación estrogénica prolongada que no se sigue de secreción de progesterona. En el embarazo ectópico se producen alteraciones agudas y no tiene una evolución prolongada. Los carcinomas endometriales son infrecuentes en pacientes de esta edad. Los pólipos son más frecuentes en las mujeres ancianas. Los leiomiomas submucosos son una causa de hemorragia menos variable y son más habituales en mujeres ancianas.

20 **B** La endometritis aguda de este caso es consecuencia de la retención de los productos de la concepción tras el parto. La endometritis también puede asociarse a la rotura prematura de las membranas con una infección ascendente hacia la cavidad uterina. Con frecuencia se trata de infecciones polimicrobianas

por microorganismos presentes en la vagina. Algunos casos de endometritis crónica pueden asociarse a infección por *Neisseria* y *Chlamydia,* y ocasionan infiltrados linfoplasmocíticos en el endometrio. Las displasias cervicales se limitan al epitelio y suelen ser asintomáticas, por lo que se detectan en la citología cervicovaginal. Es poco probable que una neoplasia miometrial produzca inflamación aguda. El endometrioma ovárico es una masa producida por una hemorragia continuada dentro de un foco de endometriosis, pero esta masa no se asocia a un embarazo y la endometriosis puede ser causa de esterilidad. La infección por *Mycobacterium tuberculosis* puede extenderse al aparato genital femenino, sobre todo a la trompa de Falopio, pero es poco probable que ocasione signos agudos y la inflamación tubárica puede producir esterilidad. La vaginitis puede provocar inflamación aguda con secreción vaginal, pero las infecciones por *Trichomonas* suelen originar una secreción acuosa de color gris verdoso.

21 **A** En el 30-40% de los casos la endometriosis produce esterilidad, irregularidades menstruales y dolor pélvico. La presencia de tejido endometrial en los nódulos confirma este diagnóstico. Las glándulas de los nódulos son hiperplásicas, pero no muestran datos de malignidad; además, todos los genes implicados en el cáncer endometrial son normales. En la endometriosis se encuentra hipometilación de los genes, *NR5A1 (factor esteroidogénico 1)* y *ESR2 (receptor de estrógenos β).* Estas alteraciones condicionan una hiperproducción de prostaglandinas y estrógenos. Los inhibidores de la aromatasa permiten suprimir la producción de estrógenos. Las lesiones endometriósicas no son neoplasias y no está indicada la quimioterapia o la cirugía mayor con extirpación del órgano. La endometriosis no es infecciosa, de forma que no están indicados los antibióticos.

22 **A** En la adenomiosis las glándulas endometriales se introducen desde el endometrio hacia el miometrio. El proceso puede ser superficial, pero a veces es extenso y el útero aumenta de tamaño hasta duplicar o cuadruplicar el normal por el engrosamiento reactivo del miometrio. La endometritis crónica no alcanza el miometrio ni aumenta el tamaño uterino. La

hiperplasia endometrial tampoco aumenta el tamaño del útero porque el proceso se limita al endometrio. En la endometriosis se encuentran glándulas y estroma endometrial fuera del útero, en localizaciones como el peritoneo, los ovarios y los ligamentos. Los leiomiomas son tumores miometriales que, cuando son grandes, producen una masa uterina asimétrica.

23 **C** La endometriosis es un cuadro en el que se encuentran glándulas endometriales funcionales fuera del útero. Las localizaciones más frecuentes son los ovarios, los ligamentos uterinos, el tabique rectovaginal y el peritoneo pélvico. Estas glándulas endometriales pueden responder a las hormonas ováricas, de forma que el dolor cíclico abdominal coincide con la menstruación. Las hemorragias repetidas pueden provocar cicatrices y formación de adherencias en la región pélvica, lo que puede distorsionar las trompas de Falopio y los ovarios, y ocasionar esterilidad. Una variación frecuente es la formación de un endometrioma o quiste de chocolate, que representa un foco de endometriosis que se expande para conformar una lesión quística, cuyo centro se llena de restos de color marrón achocolatado por la hemorragia de repetición. Las demás opciones no se asocian a endometriosis, aunque sobre los focos de endometriosis pueden aparecer tumores endometrioides.

24 **D** La hiperplasia endometrial con numerosas glándulas apiladas, como se muestra en la figura, es consecuencia de una estimulación estrogénica excesiva. Esta lesión suele ser consecuencia de un fallo de la ovulación en la etapa próxima a la menopausia. Las hiperplasias no se desarrollan a partir de la endometritis. Los tumores ováricos secretores de estrógenos también pueden provocar una hiperplasia endometrial, pero los teratomas no se asocian a este fenómeno. En el embarazo se encuentra un endometrio de patrón secretor, no el patrón proliferativo que se ve en la figura. Los anticonceptivos orales contienen dosis bajas de compuestos estrogénicos, que no producen hiperplasia.

25 **B** La paciente tiene un pólipo endometrial, lesión más frecuente en mujeres peri- o posmenopáusicas. La lesión puede producir una hemorragia anómala, pero es raro que origine un tumor maligno. Las glándulas endocervicales con metaplasia

escamosa se encuentran sobre todo en la cervicitis crónica. En el tipo seroso de carcinoma endometrial se identifican papilas con marcada atipia celular. Las células musculares lisas formando haces son características de las leiomiomas, que pueden ser submucosos. Las glándulas tubulares revestidas por células claras con glucógeno se encuentran en el infrecuente carcinoma de células claras.

26 **C** Posiblemente la masa produzca estrógenos y que esto haya causado la hiperplasia endometrial. Los tumores productores de estrógenos del ovario son típicamente los tumores de células de los cordones sexuales, como el tumor de células de la teca-granulosa o el tecoma-fibroma, y este último es el que con más frecuencia es funcionante. Los teratomas pueden contener diversos elementos histológicos, pero no tejidos que elaboren estrógenos. La endometriosis puede ocasionar una masa anexial que se llama *endometrioma* y que aumenta de tamaño con el tiempo. Las glándulas endometriales son sensibles a las hormonas, pero no las producen. Los quistes de cuerpo lúteo son frecuentes, pero es poco probable que elaboren estrógenos. Las metástasis al ovario no aumentan la producción de estrógenos. El síndrome del ovario poliquístico debería afectar a los dos ovarios.

27 **A** La hemorragia vaginal posmenopáusica debe alertar sobre el riesgo de carcinoma endometrial. Estos carcinomas suelen originarse asociados a hiperplasia endometrial. Se cree que el aumento de la estimulación estrogénica dirige este proceso, y los factores de riesgo son obesidad, diabetes mellitus de tipo 2, hipertensión y esterilidad. Los coriocarcinomas son de origen gestacional. El leiomiosarcoma submucoso podría ocasionar una hemorragia vaginal, pero el útero estaría aumentado de tamaño, dado que los leiomiosarcomas suelen ser masas voluminosas. Los tumores de Müller mixtos malignos son mucho menos frecuentes que los carcinomas endometriales, pero producen alteraciones parecidas. Los tumores de Müller mixtos malignos son neoplasias uterinas con componentes estromales y glandulares; el componente estromal maligno puede ser heterólogo y parecerse a células mesenquimatosas que, en condiciones normales, no se encuentran en el miometrio, como

el cartílago. Los carcinomas epidermoides de endometrio son poco frecuentes y es más probable que se originen en el cérvix.

28 **B** La mayor parte de los cánceres de endometrio son de tipo endometrioides y se clasifican como carcinomas endometriales de tipo I. Aparecen sobre una base de estimulación estrogénica no contrarrestada y pueden presentar mutaciones de *PTEN* e inestabilidad de microsatélites. Por el contrario, los carcinomas endometriales de tipo II aparecen en mujeres más ancianas sobre un endometrio atrófico; en general, tienen un patrón de carcinoma seroso, pero también se pueden encontrar carcinomas de células claras o lesiones de tipo de Müller mezcladas y es frecuente detectar mutaciones de *TP53*. Los leiomiosarcomas y los sarcomas del estroma son mucho menos frecuentes que los carcinomas endometriales y no se conocen los factores de riesgo.

29 **C** Los carcinomas endometriales pueden asociarse a estimulación estrogénica causada por ciclos anovulatorios, nuliparidad, obesidad y administración de estrógenos exógenos (en mayor cantidad que la presente en los anticonceptivos orales). Estos riesgos pueden provocar, en primer lugar, hiperplasia endometrial, que progresará a carcinoma endometrial si persiste la estimulación estrogénica. La hiperplasia endometrial atípica evoluciona a carcinoma de endometrio en el 25% de los casos. La adenomiosis aumenta el tamaño del útero y no es un factor de riesgo para el carcinoma endometrial. La endometritis crónica y la infección por el virus del papiloma humano (asociada a displasias y neoplasias de células escamosas) no causan este cáncer.

30 **C** La paciente presenta obesidad y diabetes mellitus y es nulípara —factores que contribuyen al desarrollo de hiperplasia endometrial y carcinoma de endometrio en relación con el hiperestronismo—. Presenta hiperplasia endometrial compleja con atipia celular, que es una lesión precursora del carcinoma endometrial de tipo I. Estas lesiones a menudo cursan con pérdida del gen supresor de tumores *PTEN*. En muchos cánceres, aunque no en todos, se activa la glucólisis aeróbica (es decir, glucólisis en presencia de una cantidad de oxígeno suficiente) –el denominado efecto Warburg–. Este efecto se

relaciona con la pérdida de *PTEN* y ofrece una ventaja de crecimiento a las células tumorales. Cuando se estimula la glucólisis aeróbica, se produce una reducción recíproca de la fosforilación oxidativa. Los tumores tienen actividad metabólica, de forma que la captación de glucosa y la utilización de glucógeno están aumentadas, no reducidas. Esta captación es la base de la tomografía por emisión de positrones (PET) en la que la fluorodesoxiglucosa F18 que emite positrones es captada de forma preferencial por los focos de malignidad. En muchos cánceres se produce una regulación al alza de la enzima COX-2 (p. ej., cáncer de colon), con el consiguiente incremento de las prostaglandinas, pero este efecto no se relaciona con la pérdida de *PTEN.*

31 **C** Las masas que se muestran están bien delimitadas, lo que sugiere que existen múltiples tumores benignos. Los leiomiomas (fibroides) pueden afectar a un tercio o a la mitad de todas las mujeres. Suelen aumentar de tamaño durante los años fértiles y dejan de hacerlo o involucionan tras la menopausia. Aunque los leiomiomas suelen ser asintomáticos, los submucosos pueden producir menometrorragia con pérdida crónica de sangre, que se traduce en anemia ferropénica. Aproximadamente el 10% de las molas completas se complican con una mola invasiva, que es poco probable que produzca una masa grande y delimitada. Los leiomiosarcomas aparecen *de novo,* no sobre un leiomioma, y en general son masas grandes e irregulares constituidas por células fusiformes pleomorfas con muchas mitosis. La pérdida de función ovárica tras la menopausia acelera la pérdida de hueso, que puede ser lo bastante grave como para considerarla *osteoporosis,* pero este proceso no guarda relación con ninguna neoplasia del aparato genital femenino. La preeclampsia con hipertensión y proteinuria se asocia a vascularización anómala de la decidua y a isquemia placentaria.

32 **D** Los leiomiosarcomas originados en el cuerpo del útero representan aproximadamente el 5% de todos los tumores malignos ginecológicos y suelen afectar a mujeres posmenopáusicas. La atipia celular, la necrosis coagulativa y las abundantes mitosis distinguen esta neoplasia de los

leiomiomas, que son mucho más frecuentes (sobre los cuales no se originan los leiomiosarcomas), lesiones derivadas ambas del músculo liso. El citotrofoblasto anaplásico se encuentra en los coriocarcinomas. Las estriaciones se observan en los rabdomiosarcomas. Los adenocarcinomas se originan en el epitelio glandular. Las células germinales originan tumores ováricos, como el teratoma o el disgerminoma. Los carcinomas epidermoides son mucho más frecuentes, pero se originan en la porción cervical del útero.

33 **A** Entre las causas de hemorragia uterina posmenopáusica están la atrofia, los carcinomas, la hiperplasia y los pólipos endometriales. No se debería dejar sin diagnosticar un carcinoma endometrial precoz cuya curación sea posible. Aunque la RM sea normal, se debería indicar una biopsia. Las infecciones en esta edad son infrecuentes y es poco probable que ocasionen una hemorragia. La citología cervicovaginal es poco sensible para la detección de lesiones endometriales. La paciente es posmenopáusica y no es probable que esté embarazada ni que presente una enfermedad trofoblástica gestacional.

34 **A** Las enfermedades de transmisión sexual son la causa más frecuente de inflamación de la trompa de Falopio. Cuando la incidencia de gonorrea causada por *Neisseria gonorrhoeae* disminuye en una población, el porcentaje de casos de salpingitis causada por *Chlamydia* y *Mycoplasma* aumenta. La trompa se puede distender y adherir al ovario con formación de un absceso tuboovárico. Estos son rasgos de la enfermedad inflamatoria pélvica. *Haemophilus ducreyi* produce el chancroide, que puede provocar pápulas eritematosas en los genitales externos o la vagina, aunque en las mujeres pueden no encontrarse lesiones macroscópicas visibles. El virus del herpes simple suele afectar a los genitales externos, aunque puede producir lesiones vaginales o cervicales; es raro que avance más. *Mycobacterium tuberculosis* es una causa poco frecuente de salpingitis. *Treponema pallidum* produce sífilis, que no se asocia a inflamación florida con efecto de masa, sino que solo causa un chancro.

35 **C**Los quistes foliculares y del cuerpo lúteo ovárico son tan

frecuentes que se consideran normales y son incidentalomas en las pruebas diagnósticas. Aunque la mayor parte de estas lesiones miden menos de 2 cm y son asintomáticas, a veces alcanzan gran tamaño (4-5 cm) e incluso aumentan en relación con las hormonas en la mitad del ciclo, con la consiguiente rotura, a la que sigue la aparición de dolor y hemorragia. El resultado negativo de la prueba de embarazo ayuda a descartar un embarazo intrauterino o ectópico. La endometriosis suele producir dolor crónico y, aunque existe hemorragia en las lesiones, suele quedar contenida dentro de ellas. La prueba de embarazo debería ser positiva en la mola invasiva y el útero estaría aumentado de tamaño por la presencia de una masa de vellosidades parecidas a un racimo de uvas. La enfermedad inflamatoria pélvica suele producir dolor crónico y es poco probable que sangre.

36 **D** El síndrome del ovario poliquístico (SOPQ) es un trastorno de origen desconocido que normalmente se asocia a oligomenorrea, obesidad e hirsutismo. La RM muestra un ovario aumentado de tamaño con múltiples quistes redondeados con una intensidad de señal incrementada. Hasta el momento, se cree que se produce por una regulación anómala de la síntesis de andrógenos. Los teratomas son masas, que pueden ser bilaterales, aunque generalmente no son simétricas y no se asocian a trastornos hormonales, excepto en el caso del estruma ovárico. Los tumores de Krukenberg son metástasis que afectan a los ovarios, en general de un tumor primario digestivo, pero son infrecuentes en las pacientes de esta edad. El cistoadenocarcinoma puede ser bilateral, pero la producción de andrógenos por los tumores ováricos es poco frecuente, salvo en los tumores de células de Sertoli-Leydig. Los abscesos normalmente son unilaterales y no explican los cambios hormonales que presenta esta paciente.

37 **B** Los cistoadenocarcinomas son tumores ováricos frecuentes, a menudo bilaterales. El tipo seroso es más habitual que el mucinoso y normalmente es unilocular, mientras que los mucinosos son multiloculares. Los cistoadenocarcinomas serosos representan más de la mitad de los cánceres de ovario. Como su propio nombre indica, se trata de lesiones de aspecto

quístico. Pueden ser de tres tipos: benignos, intermedios *(borderline)* o malignos. Los cistoadenomas benignos tienen una pared quística lisa con papilas pequeñas o ausentes. Los tumores *borderline* tienen más cantidad de proyecciones papilares. Los tumores endometrioides se parecen a los carcinomas endometriales y pueden originarse en focos de endometriosis. Los disgerminomas son tumores sólidos de origen germinal. El tumor de células de la granulosa puede ser sólido y quístico y elaborar estrógenos. Los teratomas quísticos maduros contienen abundante pelo y un líquido sebáceo pastoso en el interior de la cavidad quística; los tejidos circundantes están formados por las diversas capas germinales. Los tumores de células de Sertoli-Leydig son infrecuentes; se trata de masas sólidas de color pardo amarillento que pueden secretar andrógenos o estrógenos.

38 **D** Los tumores mucinosos ováricos son lesiones epiteliales, menos frecuentes que los tumores serosos y que suelen ser multiloculadas. La aparición de ascitis es sugestiva de metástasis, que es más frecuente en las neoplasias derivadas del epitelio de superficie del ovario. Los coriocarcinomas no suelen alcanzar este tamaño porque producen metástasis precoces y son lesiones típicamente hemorrágicas. Los tumores de células de la granulosa y los disgerminomas suelen cursar como masas sólidas. Los teratomas son tumores de células germinales que se diferencian en las tres capas germinales; la transformación neoplásica es infrecuente y suele ser un carcinoma epidermoide originado en el componente ectodérmico.

39 **A** Algunos casos familiares de carcinoma de ovario (en general cistoadenocarcinomas serosos) se asocian a pérdida homocigota del gen *BRCA1*. Este gen supresor de tumores también participa en la aparición de cánceres de mama familiares. Los síndromes familiares representan menos del 5% de todos los cánceres de ovario. El gen *ERBB2* puede estar sobreexpresado en los cánceres de ovario; sin embargo, las mutaciones de este gen no originan cánceres familiares y se conoce más por su asociación con los carcinomas de mama. Las mutaciones de los oncogenes *RAS* y *MYC* se producen de forma esporádica en muchos tipos de cáncer. El gen *RB1*, un supresor

de tumores, puede estar implicado en los tumores malignos familiares, incluidos el retinoblastoma y el osteosarcoma.

40 **D** Se trata de un tumor seroso intermedio *(borderline)* de ovario y la figura muestra una proyección papilar completa en la luz del quiste. Es el tipo de tumor ovárico más frecuente y aunque la mayor parte de ellos tienden a comportarse de forma benigna, incluso en presencia de implantes peritoneales, algunos recidivan, sobre todo cuando tienen mutaciones de *KRAS* o *BRAF* y los implantes son invasivos. Es poco probable que produzca metástasis a distancia. Los tumores serosos no tienen efectos hormonales ni estrogénicos como para producir hiperplasia endometrial, así como tampoco tienen efectos androgénicos como para estimular la masculinización. Los carcinomas de ovario no evolucionan a sarcomas, y los sarcomas de esta localización son infrecuentes.

41 **A** Un tumor quístico con una masa de pelo en la luz es la imagen típica de un teratoma quístico maduro. Este tumor se denomina también *quiste dermoide* porque es quístico y está lleno de pelo y sebo procedente de estructuras ectodérmicas bien diferenciadas. Los teratomas con elementos tisulares maduros son tumores benignos de origen germinal y pueden contener tejidos derivados del ectodermo, del endodermo y del mesodermo. Las estructuras papilares con cuerpos de psamoma serían características de un cistoadenocarcinoma. El neuroepitelio en una masa más sólida y menos quística sería compatible con un teratoma inmaduro. Los sarcomas ováricos son infrecuentes; un elemento de rabdomiosarcoma podría ser parte de un tumor de Müller mixto uterino. El coriocarcinoma con células trofoblásticas suele ser de origen gestacional y tiene un aspecto hemorrágico.

42 **D** Los teratomas inmaduros no son quísticos, como sí lo son los maduros. Existen tejidos derivados de todas las capas de células germinales, como sucede en los teratomas, pero al menos debe encontrarse un elemento tisular inmaduro. Con frecuencia este se corresponde con tejido neuroectodérmico. Cuanto menos diferenciado y más abundante sea el componente neuroepitelial, mayor será el grado y peor será el pronóstico. La máxima tasa de respuestas se consigue con quimioterapia y

radioterapia adyuvantes. El tumor de Brenner ovárico es un tumor sólido poco frecuente, que contiene nidos epiteliales parecidos a las células transicionales de la vía urinaria; la mayor parte de estos tumores son benignos. Los disgerminomas son el equivalente femenino de los seminomas testiculares. El tumor de células de la granulosa está constituido por células parecidas a las de los folículos ováricos y pueden secretar estrógenos. Los leiomiosarcomas son tumores sólidos derivados de células musculares lisas y se suelen encontrar en el miometrio. Los tumores de Müller mixtos malignos son neoplasias uterinas típicas con un componente glandular y otro estromal; el componente estromal puede ser heterólogo y parecerse a células mesenquimatosas que no se suelen encontrar en el miometrio, como el cartílago.

43 **C** Los fibromas y los tecomas son tumores de los cordones sexuales-estroma que pueden tener actividad hormonal y secretar estrógenos, que pueden producir hiperplasia endometrial e incluso carcinoma de endometrio. Los fibromas pueden asociarse a síndrome de Meigs (tumor ovárico con ascitis y derrame pleural derecho). La mayor parte de estos tumores son benignos y no provocan metástasis. En la mayor parte de los casos, la salpingitis crónica se relaciona con infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea. El condiloma acuminado se relaciona con la infección por el virus del papiloma humano, es más frecuente en mujeres jóvenes sexualmente activas, y se localiza en los genitales externos y el periné. La mola parcial es una forma infrecuente de enfermedad trofoblástica gestacional con un cariotipo triploide y se produce exclusivamente en mujeres en edad fértil.

44 **E** Las neoplasias de células de Sertoli ováricas remedan la diferenciación testicular y pueden elaborar andrógenos. Estas neoplasias suelen estar bien diferenciadas y tienen un comportamiento benigno. El tumor de Brenner es una masa sólida; se trata de una lesión infrecuente que en general es benigna y que se puede asociar a hiperplasia endometrial, aunque no produce de forma directa hormonas estrogénicas, salvo que contenga células parecidas a las de la teca. Los disgerminomas y los carcinomas endometrioides no suelen

producir efectos hormonales. Los tumores de células de la teca-granulosa son conocidos por sus efectos estrogénicos.

45 **F** Los abortos espontáneos se producen al menos en una tercera parte de los embarazos, la mayoría de ellos durante el primer trimestre. Los problemas fetales son la causa más probable de los abortos precoces, mientras que los maternos explican la mayor parte de los tardíos. La mitad de los abortos precoces tienen una alteración cromosómica, muchas de las cuales son incompatibles con una supervivencia prolongada, como la trisomía 16. Si se producen abortos precoces de forma repetida, se puede sospechar una alteración cromosómica en la línea germinal de los progenitores. Las infecciones, los trastornos uterinos, masas como los leiomiomas y la toxemia son las causas más probables de aborto en fases tardías del embarazo. El síndrome del ovario poliquístico suele ser más bien causa de esterilidad. El consumo de tabaco por parte de la madre influye principalmente sobre el peso del feto, pero es menos probable que induzca abortos precoces.

46 **A** Las infecciones placentarias se suelen producir por vía ascendente desde la vagina y no suelen ser hematógenas. La rotura prematura de membranas puede predisponer a una infección ascendente o relacionarse con las prostaglandinas liberadas por las células inflamatorias agudas en la infección, según indica el exudado purulento. El parto prematuro puede producirse en las 24 h siguientes. De las infecciones TORCH, la más probable en este caso es la *O*, que incluye bacterias como estreptococos del grupo B, mientras que *Listeria monocytogenes* produce inflamación más crónica.

47 **B** Entre los trastornos que predisponen a un embarazo ectópico están la salpingitis crónica (que puede deberse a la gonorrea, pero el cultivo solo sería positivo en caso de infección aguda), los tumores intrauterinos y la endometriosis. En aproximadamente la mitad de los casos no se identifica causa. La enfermedad trofoblástica gestacional asociada a un cariotipo triploide con una mola parcial que se desarrolla fuera del útero es infrecuente. *Candida* provoca cervicitis y vaginitis y no suele ser invasiva ni extensa en las pacientes inmunocompetentes. La sífilis no suele producir una masa tubárica con síntomas agudos

(el goma es infrecuente).

48 **D** La toxemia gestacional, en este caso, se debería clasificar como preeclampsia, porque la paciente tiene hipertensión, proteinuria y edema, pero no convulsiones. La placenta suele ser pequeña porque el flujo de sangre materno es escaso y se produce insuficiencia uteroplacentaria. Pueden aparecer infartos y hemorragias retroplacentarias. Microscópicamente, las arteriolas deciduales pueden mostrar aterosis aguda y necrosis fibrinoide. La corioamnionitis se suele deber a infecciones bacterianas ascendentes y provoca una rotura prematura de las membranas o se produce después de esta. La vellositis crónica es característica de las infecciones congénitas, como el citomegalovirus. La hidropesía placentaria suele asociarse a la hidropesía fetal en procesos como infecciones y anemias fetales. En la mola parcial existe un feto, pero está malformado y no suele nacer vivo.

49 **E** La eclampsia se caracteriza clínicamente por hipertensión, edema y proteinuria, que suelen iniciarse en el tercer trimestre. La definición de eclampsia se completa cuando aparecen también convulsiones. Las mujeres primigrávidas son las que presentan un mayor riesgo. En este caso no existe evidencia de que una nefropatía primaria pudiera ser la causa de la hipertensión, y la enfermedad debutó de forma abrupta. Aunque no se conoce la causa exacta de la preeclampsia/eclampsia, se cree que la isquemia placentaria es el mecanismo de base. Esta se asocia a una placentación poco profunda con conversión incompleta de los vasos deciduales en los canales de alto volumen necesarios para perfundir de forma adecuada la placenta. Las pacientes no tratadas pueden desarrollar coagulación intravascular diseminada. El síndrome de Cushing con hiperplasia de la corteza suprarrenal podría ocasionar hipertensión con retención de sodio, pero no se asocia a hipopotasemia o hiperglucemia. La enfermedad trofoblástica gestacional predispone a las pacientes al desarrollo de preeclampsia, pero la presencia de feto descarta la mola hidatídica y sería improbable que una mola parcial persistiera hasta el tercer trimestre. Los tumores ováricos funcionantes, sobre todo los secretores de estrógenos, como los tumores de

células de la granulosa o los tecomas, no ocasionan hipertensión ni proteinuria. La diabetes gestacional puede aumentar el riesgo de aborto, pero en este caso la glucemia es normal.

50 **D** En la figura se muestra una mola hidatídica o completa, con presencia de vellosidades grandes y a modo de racimo de uvas, que forman una masa tumoral dentro de la cavidad endometrial. Estos tumores trofoblásticos secretan gran cantidad de gonadotropina coriónica humana (hCG). Los embarazos molares se producen como consecuencia de una fecundación anómala, en la que solo existen cromosomas paternos. Los defectos del tubo neural se pueden distinguir de otros defectos fetales (defectos de la pared abdominal) usando la prueba de acetilcolinesterasa en el líquido amniótico obtenido mediante una amniocentesis. Si se encuentra elevación de la acetilcolinesterasa y de la α-fetoproteína sérica materna, será probable que exista un defecto del tubo neural. Cuando no se detecta acetilcolinesterasa, se deberá sospechar otra malformación fetal. La α-fetoproteína es un marcador de algunos tumores de células germinales, que contienen elementos del saco vitelino. Los estrógenos pueden elaborarse en distintos tumores del estroma ovárico, incluidos los tecomas y los tumores de células de la granulosa. Una disminución del estriol sérico materno es sugestiva de un aborto incipiente. El lactógeno placentario humano se produce en pequeñas cantidades en la placenta en desarrollo y no suelen determinarse sus concentraciones séricas.

51 **E** La mola hidatídica parcial se desarrolla por una triploidía (69 cromosomas). A diferencia de la mola completa que solo contiene cromosomas paternos y en la que no existe ningún feto, en la mola parcial existe feto porque aparecen cromosomas maternos. La supervivencia de un feto triploide hasta el término de la gestación es infrecuente. En la mola parcial pueden encontrarse algunas vellosidades a modo de racimos de uvas o no. El feto suele estar malformado y con frecuencia tiene una sindactilia 3,4. Podría encontrarse un cariotipo 46,XX en una mola completa o en un feto normal de sexo femenino. El feto con síndrome de Turner (monosomía X) tiene un cariotipo 45,X. La mayor parte de los fetos de sexo femenino que pierden un

cromosoma X terminan en abortos espontáneos, aunque algunos sobreviven. El síndrome de Klinefelter tiene un cariotipo 47,XXY, y los lactantes de sexo masculino nacen vivos sin problemas placentarios. El cariotipo 47,XY, + 18 de la trisomía 18 se asocia a múltiples malformaciones congénitas, pero no a una mola parcial.

52 **E** Los coriocarcinomas son tumores trofoblásticos malignos de comportamiento invasivo. Algunos de ellos se originan sin evidencia de embarazo. Las metástasis en la pared vaginal y los pulmones, y el aspecto hemorrágico son característicos. Las células del sincitiotrofoblasto grandes, pleomorfas e hipercromáticas producen la gonadotropina coriónica humana. El tratamiento con fármacos como etopósido, metotrexato, actinomicina D, ciclofosfamida y vincristina consigue, con frecuencia, que el tumor remita y se cure. Las células amnióticas no originan neoplasias. Los rabdomioblastos se encuentran en los rabdomiosarcomas embrionarios de la vagina de chicas jóvenes. El epitelio seroso no da origen a ninguna enfermedad trofoblástica gestacional. Las células musculares lisas originan leiomiomas y, con menos frecuencia, leiomiosarcomas, que suelen aparecer en el útero.

53 **D** Se trata de un tumor trofoblástico del lecho placentario (TTLP), que es la forma menos frecuente de la enfermedad trofoblástica gestacional. Las células del trofoblasto intermedio no elaboran cantidades elevadas de hCG, pero producen lactógeno placentario humano (hPL). La mayor parte de estas lesiones son tratadas quirúrgicamente, con lo que se consigue controlarlas, aunque algunas recidivan y responden mínimamente a la quimioterapia y la radioterapia. La α-fetoproteína se produce en algunas neoplasias testiculares y en los carcinomas hepatocelulares. La cromogranina es un marcador de los tumores neuroendocrinos. La desmina puede encontrarse en tumores de origen mesenquimatoso. La enolasa neuronal específica puede asociarse a tumores de estirpe neural y neuroendocrina.

CAPÍTULO

23

Mama

PEF9 Capítulo 23: Mama

PH9 Capítulo 18: Aparato genital femenino y mama



1 Una mujer de 21 años ha dado a luz una lactante a término normal hace 1 semana y actualmente está lactando. Observa en la axila derecha una masa que ha aumentado de tamaño en la última semana. En la exploración se identifica una masa móvil elástica, de 1,5 cm por debajo de la piel en la línea axilar anterior derecha. Se extirpa la masa y la figura se corresponde con la imagen histológica de la misma. ¿Cuál de las siguientes hormonas es más probable que haya ejercido el máximo efecto sobre este tejido?

A Cortisol

B Hormona de crecimiento

C Oxitocina
D Prolactina
E Testosterona

2 Una mujer de 24 años está amamantando a su hijo, nacido a término hace 3 semanas. La paciente nota fisuras en la piel del pezón izquierdo. Durante los 3 días siguientes, una región próxima al pezón de 5 cm de diámetro se vuelve eritematosa y dolorosa. Se produce un drenaje de exudado purulento originado en un absceso pequeño a través de la fisura. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que se cultive de este exudado?

A *Candida albicans*
B *Lactobacillus acidophilus*
C *Listeria monocytogenes*
D *Staphylococcus aureus*
E Estreptococos viridans

3 Una mujer de 30 años recibió un golpe en la mama derecha. Inicialmente presentó una contusión de 3 cm por debajo de la piel, que se resolvió en 3 semanas, pero posteriormente se notó un bulto indoloro y firme que persistió debajo de la zona del hematoma durante el mes siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para este bulto?

A Absceso
B Necrosis grasa
C Fibroadenoma
D Carcinoma inflamatorio
E Adenosis esclerosante

4 Se realiza un estudio sobre los hallazgos mamográficos en mujeres en edad fértil. El estudio identifica las mamografías que presentan quistes de 1-5 cm con microcalcificaciones focales y densidades circundantes. La punción-aspiración con aguja fina extrae líquido turbio con escasas células. ¿Cuál de los siguientes cambios histológicos es más probable que se encuentre en estas lesiones?

A Metaplasia apocrina
B Carcinoma ductal *in situ*
C Necrosis grasa
D Papilomatosis
E Adenosis esclerosante

5 Una mujer de 27 años se nota un bulto en la mama derecha. Tiene menstruaciones normales, su historia reproductiva es G3, P3, y tuvo su último parto hace 5 años. En la exploración se encuentra un área firme e irregular de 2 cm por debajo del margen lateral de la aréola. Esta tumoración es indolora y móvil. No se reconocen lesiones en la piel suprayacente ni adenopatías axilares. La biopsia muestra presencia de un mayor número de conductos dilatados rodeados por tejido conjuntivo fibroso. También se observan conductos llenos de líquido con metaplasia apocrina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Fibroadenoma
B Cambios fibrosos quísticos
C Carcinoma ductal infiltrante
D Ectasia de los conductos mamarios
E Necrosis grasa traumática

6 Una mujer de 47 años se realiza una revisión habitual. No se encuentran alteraciones significativas, salvo una masa apenas palpable en la mama derecha. La mamografía presenta una zona de densidad irregular de 1,5 cm con microcalcificaciones dispersas en el cuadrante superoexterno. Se obtiene una biopsia de la zona y el estudio histológico revela hiperplasia de los ductos. ¿Cuál de las siguientes opciones es más adecuada para el seguimiento de esta paciente?

A Abandono del consumo de tabaco
B Seguir con la detección selectiva del cáncer de mama
C Realización de una mastectomía simple
D Determinación del oncogén *BRCA1*
E Prescripción de tratamiento con antibióticos de amplio espectro

7 Una mujer de 34 años ha observado una telorrea sanguinolenta en la mama izquierda en los últimos 3 días. La exploración física muestra piel normal en las mamas sin presencia de masas palpables. No se encuentran adenopatías axilares. La paciente tiene ciclos regulares y utiliza anticonceptivos orales. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más probable que se encuentre en la biopsia escisional de la mama izquierda de esta paciente?

A Mastitis aguda
B Fibroadenoma

C Papiloma intraductal
D Tumor filodes
E Adenosis esclerosante

8 Un hombre de 57 años ha desarrollado un aumento de tamaño mamario bilateral durante los últimos 2 años. En la exploración presenta un aumento de tamaño simétrico e indoloro a la palpación. No se encuentran masas. El paciente no está obeso ni toma medicación. ¿Cuál de los siguientes trastornos explica mejor estos hallazgos?

A Adenoma hipofisario secretor de ACTH
B Coriocarcinoma testicular
C Glomerulonefritis crónica
D Diabetes mellitus
E Cirrosis micronodular
F Artritis reumatoide

9 Una mujer de 58 años acude a un naturópata para una revisión habitual. No se encuentran alteraciones significativas en la exploración. La mamografía de detección selectiva identifica un área irregular de 0,5 cm con densidad aumentada y microcalcificaciones dispersas en el cuadrante superior externo de la mama izquierda. La biopsia escisional muestra una hiperplasia lobulillar atípica. La paciente ha recibido tratamiento con estrógenos y progesterona tras la menopausia durante los últimos 10 años. La paciente lleva 35 años fumando un paquete diario. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que influya en el desarrollo de un carcinoma lobulillar en las pacientes con este tipo de lesión?

A Cambios citológicos atípicos
B Antecedentes de tabaquismo
C Tratamiento hormonal sustitutivo
D Edad posmenopáusica
E Mutación del gen *BRCA1*



10 Una mujer judía de 25 años acude al médico porque se nota un bulto en la mama derecha. En la exploración se palpa una masa inmóvil firme de 2 cm en el cuadrante superior externo. No se encuentran lesiones cutáneas ni adenopatías axilares. La figura se corresponde con la biopsia escisional. Los antecedentes familiares indican que la madre del paciente, su tía y su abuela maternas presentaron lesiones similares. La hermana de la paciente, de 18 años, le pide al médico que determine si tiene riesgo genético de desarrollar una enfermedad similar. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que esté mutado en la hermana?

A *BRCA1*
B Receptor de estrógenos *(RE)*
C *HER2/neu*
D *TP53*
E *Receptor de progesterona (RP)*
F *RB1*

11 Se realiza un estudio clínico en mujeres posmenopáusicas residentes en París, Francia, con edades comprendidas entre 45 y 70 años. Todas ellas están diagnosticadas de carcinoma ductal infiltrante con expresión de receptores de estrógenos (RE) y progesterona (RP), pero negativo para *HER2,* confirmado mediante biopsia y estudio histológico del tejido. Ninguna de ellas presenta mutaciones de *BRCA1* o *BRCA2.* ¿Cuál de las siguientes

condiciones es más probable que indique un riesgo relativo mayor de desarrollar carcinomas en este grupo de mujeres?

A Edad de la menarquia superior a 16 años
B Edad de la menopausia inferior a 45 años
C Familiar de primer grado con cáncer de mama
D Multiparidad
E Antecedentes de mastitis



12 Una mujer de 54 años se nota un bulto en la mama izquierda. En la exploración presenta una masa irregular firme en el cuadrante inferoexterno. La mamografía identifica una densidad de 2 cm con microcalcificaciones focales. La biopsia escisional identifica un carcinoma intraductal e infiltrante. El estudio inmunohistoquímico muestra negatividad para los receptores de estrógenos (RE). El análisis con técnica de FISH (verde = *HER2;* rojo = centrómero del cromosoma 17) muestra los hallazgos que refleja esta figura. ¿Cuál de los siguientes fármacos combinado con la doxorubicina es más probable que sea útil en el tratamiento de esta paciente?

A Hidroxiurea
B Letrozol

C Raloxifeno
D Tamoxifeno
E Trastuzumab

13 Una mujer de 66 años nulípara recibió tratamiento hormonal sustitutorio durante 7 años tras la menopausia (que se produjo a los 53 años). Su IMC es 33. En este momento se está realizando una mamografía de cribado, que identifica una masa irregular en la mama derecha. La biopsia escisional muestra una masa de 1,5 cm, cuyo estudio histológico revela células infiltrantes que expresan receptores de estrógenos, pero no *HER2;* la expresión de marcadores de proliferación es baja y se encuentra una mutación del gen *PIK3CA.* Tras la extirpación quirúrgica de la masa, ¿cuál de las siguientes evoluciones clínicas es más probable encontrar en el próximo año?

A Detección de un cáncer en la mama izquierda
B Necesidad de quimioterapia
C Probabilidad de recidiva muy baja
D Necesidad de tratamiento con trastuzumab
E Aparición de metástasis diseminadas



14 Una mujer de 63 años se somete a una mamografía de cribado que muestra una densidad irregular con microcalcificaciones. La exploración no revela lesiones en la piel ni tampoco adenopatías

axilares. La biopsia escisional no muestra masas. El estudio histológico identifica los hallazgos que se reflejan en la figura. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Carcinoma coloide
B Carcinoma ductal *in situ*
C Carcinoma ductal infiltrante
D Carcinoma lobulillar infiltrante
E Carcinoma medular
F Carcinoma papilar



15 Una mujer de 48 años se ha notado un área de descamación rojiza en la piel de la mama izquierda, que ha aumentado de tamaño ligeramente en los últimos 4 meses. En la exploración se encuentra un área de piel eccematosa de 1 cm adyacente a la aréola. La figura se corresponde con el aspecto histológico de la biopsia cutánea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Metaplasia apocrina
B Necrosis grasa
C Carcinoma inflamatorio
D Carcinoma lobulillar *in situ*
E Enfermedad de Paget mamaria



16 Una mujer de 54 años se notó un bulto en la mama derecha. En la exploración presenta una masa mal delimitada, de 1 cm en el cuadrante superoexterno. La ecografía indica que la masa es quística. Se extirpa y el estudio microscópico de la misma revela principalmente cambios fibrosos quísticos, aunque también se identifica la lesión que muestra la figura. La punción-aspiración de las dos mamas revela focos adicionales con células parecidas. ¿Cuál de las siguientes lesiones mamarias es más probable que produzca estos hallazgos?

A Carcinoma ductal infiltrante
B Carcinoma lobulillar *in situ*
C Tumor filodes maligno
D Carcinoma medular
E Carcinoma mucinoso (coloide)



17 Una mujer de 49 años se notó hace 1 semana un bulto en la mama izquierda. En la exploración se palpa una masa firme e irregular en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, sin lesiones cutáneas. En la figura se observa el aspecto macroscópico de la biopsia escisional. ¿Cuál de los siguientes hallazgos adicionales es más probable que se encuentre durante la exploración física?

A Adenopatías axilares
B Telorrea sanguinolenta
C Dolor en la pared torácica
D Facies cushingoide
E Masa en la mama contralateral



18 Una mujer de 57 años se nota un bulto en la mama izquierda desde hace 4 meses. Ha presentado cefaleas de reciente aparición asociadas a náuseas durante el último mes. El médico palpa una masa de 2 cm, firme e irregular en la mama izquierda. La TC craneal revela realce de las leptomeninges. Se realiza una tumorectomía con biopsia de los ganglios axilares. El estudio inmunohistoquímico de las células revela ausencia de expresión de E-cadherina y HER2, con presencia de receptores de estrógenos (RE) y progesterona (PR). La figura muestra un corte de la lesión teñida con H-E. No se reconocen metástasis ganglionares. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Carcinoma lobulillar
B Carcinoma medular
C Carcinoma metaplásico
D Glioblastoma metastásico
E Tumor filodes

19 Una mujer de 39 años se ha notado una masa de tamaño creciente en la mama izquierda durante los últimos 2 años. El médico palpa una masa firme de 4 cm. Tras la biopsia, se realiza una mastectomía simple con muestreo de los ganglios axilares. En el corte se reconoce una masa blanda parda y carnosa. Histológicamente está constituida por células grandes de núcleos vesiculosos y llamativos nucléolos. Se reconoce un importante infiltrado linfocítico en el seno del tumor y este tiene un límite

neto no infiltrante. No se encuentran metástasis ganglionares axilares. El tumor es triple negativo y no expresa HER2, receptores de estrógenos (RE) ni receptores de progesterona (RP). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Carcinoma coloide
B Carcinoma ductal infiltrante
C Carcinoma lobulillar infiltrante
D Carcinoma medular
E Carcinoma papilar
F Tumor filodes

20 Se realiza un estudio epidemiológico en hombres diagnosticados de cáncer de mama. Se revisan los datos demográficos, médicos, familiares y analíticos para identificar los factores que aumentan el riesgo de malignidad. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que se asocie al mayor número de carcinomas de mama masculinos?

A Edad superior a 70 años
B Origen asiático
C Mutación del gen *ATM*
D Alcoholismo crónico
E Ginecomastia

21 Se realiza un estudio en mujeres con carcinoma de mama para determinar la presencia y la intensidad de la expresión de receptores de estrógenos (RE) y progesterona (RP) en las células neoplásicas. Se encuentra gran cantidad de RE y RP en las células tumorales de algunas pacientes, mientras que estos receptores no se expresan en otros casos. ¿Cuál de los siguientes rasgos es más probable que expresen las pacientes cuyos tumores son positivos para RE y RP?

A Mayor inmunogenicidad
B Mayor probabilidad de metástasis
C Mayor riesgo de cáncer de mama familiar
D Mayor respuesta al tratamiento
E Estadio tumoral más alto
F Mayor grado tumoral

22 Una mujer de 26 años lleva 1 mes notando un bulto en la mama y se siente asustada por los antecedentes familiares de cánceres de mama de inicio precoz y bilaterales. En la exploración se identifica

una masa firme de 2 cm en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda. Se realiza una biopsia y el estudio histológico confirma un carcinoma. El análisis genético demuestra que esta paciente es portadora de una mutación del gen *BRCA1*, igual que su madre y su hermana. ¿Cuál de los siguientes tipos de carcinoma mamario tiene una incidencia máxima en las familias de este tipo?

A Carcinoma lobulillar
B Carcinoma medular
C Carcinoma metaplásico
D Carcinoma papilar
E Carcinoma tubular

23 Una mujer de 79 años, previamente sana, se nota un bulto en la mama derecha. El médico palpa una masa firme de 2 cm en el cuadrante superoexterno. Se acompaña de adenopatías axilares derechas indoloras. Se realiza una tumorectomía con disección de los ganglios linfáticos axilares. El estudio histológico demuestra que la masa corresponde a un carcinoma ductal infiltrante. Se identifican metástasis en 2 de 10 ganglios axilares. La citometría de flujo sobre las células del carcinoma revela un pico aneuploide pequeño y una fase S alta. La determinación inmunohistoquímica muestra positividad de las células neoplásicas para receptores de estrógenos y progesterona (RE/RP), siendo negativa para *HER2/neu* y positiva para catepsina D. ¿Cuál de los siguientes factores pronósticos es más importante en esta paciente?

A Edad en el momento del diagnóstico
B Contenido de ADN en el carcinoma
C Positividad para los receptores de estrógenos
D Expresión de proteasas estromales en el carcinoma
E Subtipo histológico del carcinoma
F Ausencia de expresión de *HER2/neu* en el carcinoma
G Presencia de metástasis ganglionares

24 Se realiza un estudio sobre el perfil de expresión génica de biopsias de mama con carcinoma infiltrante no específico (NOS). Un subgrupo de estos casos, que representa aproximadamente un 15% del total, presenta las características siguientes: receptores de estrógenos (RE) y progesterona (RP) negativos, *HER2/neu* negativo, queratina de células basales positiva, citometría de flujo con aneuploidía y elevada tasa de proliferación, y asociación a

mutaciones en *BRCA1.* ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más probable que sea eficaz en este subgrupo de cánceres de mama NOS?

A Quimioterapia
B Radioterapia
C Cirugía sola
D Tamoxifeno
E Trastuzumab

25 Una mujer de 51 años se ha notado una zona de tumefacción con dolor en la mama derecha, que ha empeorado durante los últimos 2 meses. En la exploración se reconoce una zona de 7 cm de piel eritematosa, con una superficie firme y rugosa, que recuerda a la piel de una naranja. La paciente muestra tumefacción de la mama derecha, retracción del pezón y adenopatías indoloras en la axila derecha. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más probable que se encuentre en una biopsia escisional de la piel y la mama?

A Mastitis aguda
B Hiperplasia epitelial atípica
C Necrosis grasa
D Carcinoma ductal infiltrante
E Adenosis esclerosante


A
1
2
3
4
B

26 Una mujer de 26 años se ha notado un bulto en la mama derecha durante el último año. Se palpa una masa firme circunscrita y móvil de 2 cm en el cuadrante inferoexterno. La figura corresponde a la masa resecada *(A)* y la mamografía *(B).* ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Necrosis grasa
B Fibroadenoma
C Cambios fibrosos quísticos
D Carcinoma ductal infiltrante
E Mastitis
F Tumor filodes

27 Una mujer de 27 años en el tercer trimestre de su tercer embarazo se descubre un bulto en la mama izquierda. En la exploración se palpa una masa de 2 cm, delimitada y móvil por debajo del pezón. Tras el parto del lactante a término, parece que la masa disminuye de tamaño y la madre puede amamantar al niño sin dificultad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Fibroadenoma
B Papiloma intraductal
C Carcinoma lobulillar *in situ*
D Carcinoma medular
E Tumor filodes

28 Una mujer de 24 años se nota un bulto en la mama derecha durante el último mes. Está preocupada porque a su hermana se le diagnosticó un tumor de mama poco diferenciado «triple negativo» a los 31 años. La ecografía identifica una masa sólida. Se intenta una punción-aspiración con aguja fina, pero no se consiguen células diagnósticas. Se realiza una mamografía y se observa una densidad única de 1 cm de diámetro con pequeñas calcificaciones acumuladas en la mama derecha, sin lesiones en la mama contralateral. ¿Cuál de las siguientes actitudes es más adecuada para esta paciente?

A Biopsia para tener tejido lesional
B Mantener la autoexploración mamaria mensual
C Pruebas genéticas de las mutaciones de *BRCA1*
D Tratamiento hormonal con tamoxifeno
E Estudios radiológicos para detectar metástasis



29 Una mujer de 48 años se ha notado un bulto mal delimitado en la mama derecha en el último año. En la exploración presenta una masa firme indolora de 6 cm en el cuadrante superointerno de la mama derecha. No se encuentran lesiones en la piel suprayacente ni adenopatías axilares. Se realiza una biopsia y la figura se corresponde con la imagen histológica de la muestra. Se extirpa la masa con un margen amplio, pero recidiva al año. Tras extirparla de nuevo, la lesión no recidiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Fibroadenoma
B Cambios fibrosos quísticos
C Carcinoma lobulillar
D Tumor filodes
E Carcinoma tubular

Respuestas

1 **D** Se trata de tejido mamario accesorio con cambio lactacional. La secreción de prolactina en la adenohipófisis aumenta durante el posparto para fomentar la producción de leche en los lobulillos mamarios. La oxitocina liberada en la neurohipófisis estimula la contracción de las células mioepiteliales durante la lactancia. Las demás hormonas que se enumeran no tienen

efecto directo sobre el tejido mamario. La presencia de tejido mamario en la axila indica tejido mamario accesorio y puede explicar la aparición de cáncer de mama en mujeres sometidas a una mastectomía simple.

2 **D** La mastitis aguda por estafilococos produce típicamente abscesos localizados, mientras que las infecciones estreptocócicas suelen diseminarse por toda la mama, dado que los estreptococos a menudo producen estreptolisinas. La mastitis aguda puede asociarse a los primeros meses de la lactancia. Las cándidas pueden producir cierta irritación de la piel local, pero solo se vuelven infiltrantes en pacientes inmunodeprimidos. *Lactobacillus acidophilus* es el microorganismo empleado para producir leche fermentada no humana. La listeriosis se contagia a través de alimentos contaminados, incluidos los derivados lácteos, pero no a través de la leche materna.

3 **B** La necrosis grasa se produce típicamente por un traumatismo mamario. La grasa necrótica dañada es fagocitada por los macrófagos, que se llenan de lípidos. La lesión se resuelve cuando se forma una cicatriz colágena en semanas o meses. Esta cicatriz firme se puede ver en la mamografía y se confunde con un carcinoma macroscópicamente. Los abscesos pueden formar una masa palpable, pero dolorosa, y cuando son localizados se suelen relacionar con la infección por *Staphylococcus aureus.* El fibroadenoma es una neoplasia y los tumores no se inducen por traumatismos. El carcinoma inflamatorio es la infiltración de los linfáticos dérmicos por un carcinoma de mama subyacente, lo que da un aspecto rojizo a anaranjado y rugoso a la piel. La adenosis esclerosante es una característica de los cambios fibrosos quísticos, una causa frecuente de tumoraciones mamarias no traumáticas.

4 **A** Los quistes no proliferativos son bastante frecuentes en la mama. Cuando se llenan de líquido, es poco probable que contengan elementos proliferativos. Las células que revisten estos quistes pueden estar aplanadas y ser cúbicas o atróficas, pero con frecuencia contienen abundante citoplasma rosado que recuerda a un cambio apocrino. Pueden encontrarse microcalcificaciones en las lesiones mamarias benignas y

malignas, pero, en el caso de los quistes, se deben a calcificación de las secreciones. Cuando se extirpan, los quistes intactos tienen un color azul parduzco. Los carcinomas ductales suelen ser lesiones sólidas. La necrosis grasa puede contener muchos macrófagos, pero también tejido conjuntivo, y esto da lugar a una lesión firme. La papilomatosis es un rasgo proliferativo en los cambios fibrosos quísticos y tiende a formar una lesión sólida. La adenosis esclerosante produce una lesión fibrosa firme.

5 **B** Los cambios no proliferativos (fibrosos quísticos) son responsables de la categoría más extensa de tumoraciones mamarias. Estas lesiones posiblemente guardan relación con los cambios cíclicos en la mama que se producen durante el ciclo menstrual. En un 30% de los tumores de mama no se consigue establecer un diagnóstico patológico específico. Los cambios fibrosos quísticos incluyen la proliferación ductal, la dilatación ductal (a veces asociada a metaplasia apocrina) y la fibrosis. El fibroadenoma es una masa delimitada formada por la proliferación de estroma fibroso con conductillos comprimidos. Los carcinomas son proliferaciones de células neoplásicas atípicas que rellenan los conductos y pueden infiltrar el estroma. Las secreciones condensadas dentro del conducto pueden producir ectasia ductal con un infiltrado linfoplasmocítico circundante. Los traumatismos con la consiguiente necrosis grasa pueden provocar una lesión firme localizada, que se confunde con un carcinoma, pero con el microscopio se identifican macrófagos y neutrófilos alrededor de adipocitos necróticos, y su cicatrización deja una cicatriz fibrosa.

6 **B** Los cambios fibrosos quísticos sin hiperplasia epitelial no indican un riesgo aumentado de cáncer de mama de forma significativa. La hiperplasia moderada a florida incrementa el riesgo al doble, y las hiperplasias ductales o lobulillares atípicas aumentan el riesgo cinco veces. El riesgo de esta paciente no es lo bastante elevado como para sugerir una mastectomía radical o simple en este momento, pero es preciso seguirla. Los cánceres de mama no se asocian al tabaco. El gen *BRCA1* explica un pequeño porcentaje de cánceres de mama, sobre todo en familias en las que el cáncer debuta en edades precoces y no está

indicado realizar pruebas genéticas en todos los pacientes con riesgo de cáncer de mama. Estos cambios proliferativos no son consecuencia de la infección.

7 **C** Los papilomas intraductales suelen ser solitarios y miden menos de 1 cm. Se originan en los senos o conductos galactóforos de mayor calibre y tienen tendencia a sangrar, aunque son benignos. Los abscesos que complican una mastitis se organizan con una pared fibrosa. Los fibroadenomas contienen conductos con estroma y no son muy vasculares; estas lesiones no se localizan en los conductos. El tumor filodes también se origina a partir del estroma intralobulillar y puede ser maligno, pero no infiltra los conductos ni provoca hemorragia. La adenosis esclerosante, una lesión asociada a los cambios fibrosos quísticos, presenta abundante colágeno, pero no vascularización.

8 **E** La cirrosis micronodular suele ser consecuencia del alcoholismo crónico y altera la capacidad de metabolismo hepático de los estrógenos, lo que puede culminar en una ginecomastia bilateral. Los adenomas hipofisarios secretores de ACTH producen una obesidad troncal por el síndrome de Cushing. Los coriocarcinomas testiculares producen gonadotropina coriónica humana y pueden provocar cierto aumento del tamaño mamario. Los coriocarcinomas son neoplasias muy agresivas que no podrían seguir indolentes durante 2 años. Es raro que la insuficiencia renal crónica tenga esta consecuencia. La diabetes mellitus aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama en las mujeres. Los nódulos reumatoides pueden aparecer en diversas localizaciones en la artritis reumatoide, pero es raro que afecten a la mama y no suelen ser bilaterales.

9 **A** Las hiperplasias lobulillar y ductal atípicas aumentan el riesgo de cáncer de mama cinco veces; el riesgo afecta a las dos mamas y es máximo en las mujeres premenopáusicas y en aquellas con antecedentes familiares de cáncer de mama. El tabaquismo y la administración de estrógenos exógenos no son factores de riesgo establecidos de cáncer de mama. La mutación de *BRCA1* es responsable de un 10-20% de los carcinomas de mama familiares y solo de un pequeño porcentaje de todos los

cánceres de mama.

10 **A** La muestra de biopsia corresponde a un carcinoma infiltrante de mama. Dada la juventud de la paciente y los sólidos antecedentes familiares de cáncer de mama, es razonable asumir que la paciente ha heredado un gen alterado que predispone al cáncer de mama. Se conocen dos genes de susceptibilidad al cáncer de mama: *BRCA1* y *BRCA2.* Ambos son genes supresores de tumores. Las mutaciones específicas de *BRCA1* son frecuentes en algunos grupos étnicos, como los judíos askenazíes. Los receptores de estrógenos se expresan en un 50-75% de los cánceres de mama. Su presencia indica buena respuesta al tratamiento con antagonistas del receptor hormonal. No se conoce relación entre la estructura del gen del receptor de estrógenos y la sensibilidad al cáncer de mama. De un modo parecido, la presencia de receptores de progesterona en las células tumorales indica una posible respuesta al tratamiento hormonal, pero no marca un riesgo de desarrollar un cáncer de mama. *HER2/neu* es un gen del receptor del factor de crecimiento que se amplifica en algunos cánceres de mama y es marcador de mal pronóstico, pero no de susceptibilidad. Muchos cánceres tienen alteraciones de *TP53,* que son típicamente adquiridas y no familiares, incluidos los cánceres de mama, pero no tienen valor predictivo de riesgo. La herencia de mutaciones de *RB1* aumenta el riesgo de desarrollar retinoblastomas y osteosarcomas, pero no carcinoma de mama.

11 **C** El riesgo relativo de desarrollar un cáncer de mama aumenta con distintos factores, pero los antecedentes familiares son uno de los más potentes. Los antecedentes de enfermedad mamaria bilateral y la edad precoz de aparición del cáncer aumentan el riesgo. La edad temprana aumenta el riesgo de identificar una mutación de *BRCA1* o *BRCA2.* Una vida fértil prolongada, con menarquia temprana (< 11 años) y menopausia tardía (> 55 años), y la nuliparidad aumentan el riesgo de cáncer de mama, posiblemente porque aumenta la exposición a los estrógenos. Los factores de riesgo «blandos» incluyen los estrógenos exógenos y la obesidad. La mastitis no influye sobre el riesgo de cáncer de mama.

12 **E** La expresión de *HER2/neu,* un receptor del factor de

crecimiento epidérmico, sugiere que el tratamiento biológico con trastuzumab puede tener cierta eficacia. Los fármacos cuyo nombre termina con el sufijo *-mab* son anticuerpos monoclonales dirigidos de forma específica contra un componente bioquímico concreto de las células. Este tipo de tratamiento biológico es útil porque las células mamarias normales no expresan *HER2/neu.* La doxorubicina es un quimioterápico convencional que forma parte de los protocolos de poliquimioterapia. La hidroxiurea es un fármaco que actúa sobre el ciclo y no es útil en el cáncer de mama. El letrozol es un inhibidor de la aromatasa, útil para el tratamiento de los cánceres de mama que expresan RE. El raloxifeno es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos (MSRE), que reduce el riesgo de cáncer de mama y de osteoporosis. El tamoxifeno es un fármaco antiestrógenos eficaz en el tratamiento de los cánceres de mama positivos para RE/RP.

13 **C** Este tumor luminal A representa más de la mitad de todos los cánceres de mama infiltrantes, y suele ser de bajo grado, que no presenta mutaciones de los genes familiares *BRCA1, BRCA2, TP53* y *CHEK2.* Con frecuencia responde al tratamiento con antiestrógenos, aunque la cirugía por sí misma puede ser curativa. Incluso con metástasis, la evolución es prolongada. Esta paciente presenta múltiples riesgos de cáncer de mama, como la nuliparidad, la obesidad y el tratamiento hormonal sustitutivo. El cáncer de mama en esta edad tiene menos probabilidades de ser familiar. El trastuzumab es útil en los cánceres de mama positivos para HER2.

14 **B** El carcinoma intraductal o carcinoma ductal *in situ* (CDIS) puede no generar una masa palpable. En la figura se observan conductos que contienen células grandes atípicas, que adoptan un patrón cribiforme. Si la lesión es blanda, se observa la salida de un material blanquecino de los conductos pequeños cuando se presiona sobre la lesión, lo que indica que las células neoplásicas de los conductos están necróticas (lo que se traduce en una calcificación distrófica) y se puede emplear el término *comedocarcinoma.* Los carcinomas intraductales representan aproximadamente una cuarta parte de todos los cánceres de mama. Si no se extirpan, estas lesiones se vuelven infiltrantes.

Los carcinomas intraductales pueden adoptar otros patrones histológicos, incluido el CDIS no comedoniano y la enfermedad de Paget del pezón, proceso en el que la extensión de las células malignas hacia la piel del pezón y la aréola provoca una lesión que recuerda a una dermatitis seborreica. Los carcinomas coloides son igual de frecuentes que los carcinomas medulares, pero a menudo expresan receptores de estrógenos y progesterona, y el pronóstico es mejor que el promedio. Los carcinomas ductales infiltrantes suelen producir lesiones firmes e irregulares, a modo de masa porque son más infiltrantes. Los carcinomas lobulillares infiltrantes pueden adoptar un crecimiento difuso sin causar un efecto de masa significativo. Los carcinomas medulares suelen ser masas grandes; histológicamente están formados por nidos de células grandes rodeados por un infiltrado linfoide. Los carcinomas papilares puros son infrecuentes, aunque en otros tipos de cáncer de mama puede existir un componente papilar.

15 **E** Las células de Paget son grandes y tienen un citoplasma claro y mucinoso, e infiltran la piel que reviste la mama. Son malignas y se extienden hacia la piel desde un carcinoma de mama subyacente, que puede ser oculto, de forma que la enfermedad de Paget puede ser el primer signo de un tumor maligno. La metaplasia apocrina afecta a las células que revisten unos conductos quistificados en el cambio fibroso quístico. Los macrófagos de la necrosis grasa no infiltran la piel ni muestran los núcleos atípicos que se observan en la figura. El *carcinoma inflamatorio* no es un tipo de cáncer de mama específico, sino que alude a la afectación de los linfáticos dérmicos por un carcinoma infiltrante y puede determinar un engrosamiento con aspecto rojo anaranjado de la piel. En el carcinoma lobulillar *in situ,* los conductos terminales o los ácinos de la mama están llenos de células neoplásicas.

16 **B** Dentro de los tumores malignos primarios de la mama, el carcinoma lobulillar *in situ* (CLIS) tiene más probabilidades de ser bilateral. El CLIS puede preceder a las lesiones infiltrantes varios años. El carcinoma lobulillar puede mezclarse con un carcinoma ductal, y puede resultar difícil distinguir ambos histológicamente. Las demás neoplasias que se enumeran no

suelen ser bilaterales y normalmente producen un efecto de masa única.

17 **A** Esta masa irregular e infiltrante es un carcinoma ductal infiltrante (invasivo), que es la variante más frecuente de cáncer de mama. Los carcinomas de mama tienen más riesgo de ocasionar metástasis a los ganglios regionales. Cuando el cáncer de mama se vuelve palpable, existen metástasis ganglionares en más del 50% de los casos. La telorrea sanguinolenta suele asociarse a un papiloma intraductal. La aparición de dolor en la pared torácica podría sugerir metástasis óseas, pero es menos probable que indique infiltración local, y en la imagen de la masa que se muestra se reconoce un margen de tejido adiposo alrededor de la misma. Los cánceres de mama se asocian en casos infrecuentes a la producción de corticotropina ectópica o síndrome de Cushing. Los carcinomas lobulillares son con más frecuencia bilaterales, pero son lesiones menos frecuentes que los carcinomas ductales infiltrantes.

18 **A** Observe que en este carcinoma lobulillar, las células pleomorfas que infiltran el estroma lo hacen en fila india. El perfil metastásico de este tipo de neoplasia incluye la meningitis carcinomatosa (sugerida por el realce de las leptomeninges) y también la afectación intraabdominal metastásica. La E-cadherina es una molécula de adhesión que se comporta como un supresor de tumores, y su pérdida caracteriza a otro tipo de carcinoma infiltrante, el carcinoma de células en anillo de sello gástrico. Los carcinomas medulares son masas sólidas de células con poca desmoplasia, pero se asocian a llamativos infiltrados linfoides. Los carcinomas metaplásicos son infrecuentes en las personas y presentan un componente parecido a otros tejidos, como los carcinomas epidermoides. En presencia de una masa mamaria maligna, cualquier lesión cerebral será sospechosa de metástasis. Aunque el glioblastoma puede producir metástasis extracraneales, es infrecuente y debería identificarse una voluminosa masa cerebral. El tumor filodes puede ser maligno con un componente estromal, pero se trata típicamente de masas voluminosas y se observa un patrón histológico foliáceo de espacios quísticos revestidos por epitelio.

19 **D** Los carcinomas medulares representan aproximadamente

un 1-5% de todos los cánceres de mama. Suelen afectar a mujeres más jóvenes que los demás cánceres mamarios. A pesar de tener indicadores de mal pronóstico (ausencia de HER2, RE y RP), los carcinomas medulares se asocian a un pronóstico mejor que la mayor parte de los restantes cánceres de mama. Quizá los linfocitos infiltrantes indican una respuesta inmunitaria útil. Los carcinomas coloides son igual de frecuentes que los medulares aproximadamente, pero suelen expresar RE, y el pronóstico es mejor que la media. Los carcinomas ductales y lobulillares infiltrantes no suelen producir lesiones grandes localizadas, porque son más invasivos y no presentan un infiltrado linfoide definido. Los carcinomas papilares puros son bastante infrecuentes, aunque otros tipos de carcinomas de mama pueden tener un componente papilar. El tumor filodes es típicamente grande, pero tiene un componente estromal y otro glandular.

20 **A** Los cánceres de la mama masculina son infrecuentes y afectan sobre todo a ancianos. Los factores de riesgo adicionales incluyen un familiar de primer grado con cáncer de mama, una reducción de la función testicular, la exposición a los estrógenos exógenos, la infertilidad, la obesidad, los antecedentes de patología mamaria benigna, la exposición a la radiación ionizante y vivir en países occidentales. De los casos que afectan a hombres, entre el 4 y el 14% se atribuyen a mutaciones en línea germinal de *BRCA2,* siendo menos frecuentes las de *BRCA1.* Las mutaciones de *ATM* aparecen en menos del 1%. No parece que la ginecomastia sea un factor de riesgo.

21 **D** Los receptores de estrógenos y progesterona (RE y RP) ayudan a predecir si la quimioterapia con compuestos como el tamoxifeno puede resultar eficaz; sin embargo, la correlación no es perfecta. Los RE y RP no influyen sobre la inmunogenicidad y no son dianas de la inmunoterapia. Sin embargo, sí se está empleando inmunoterapia frente al gen de *HER2/neu* sobreexpresado. Es posible predecir el pronóstico global en función de diversos factores, como el tipo y grado histológico, la presencia de metástasis, el grado de aneuploidía y el estadio tumoral. Los antecedentes familiares y la existencia de mutaciones específicas, como *BRCA1* o *BRCA2,* se correlacionan

con el riesgo de cáncer de mama familiar.

22 **B** Los pacientes con una mutación del gen *BRCA1* muestran una elevada incidencia de carcinomas con rasgos medulares, que son poco diferenciados y triple negativos (no expresan la proteína HER2/neu ni tampoco receptores de estrógenos o progesterona).

23 **G** Muchos factores influyen en la evolución del cáncer de mama. La afectación de ganglios axilares es el factor pronóstico más importante de los que se enumeran. Si el tumor no se ha extendido a los ganglios axilares, la supervivencia a los 10 años será casi del 80%. Esta supervivencia se reduce a un 35-40% cuando existe afectación de 1-3 ganglios y al 15% si se afectan más de 10 ganglios. La edad es un factor de riesgo para el cáncer de mama, pero la edad por sí misma no marca el pronóstico y es posible tratar con éxito cánceres en ancianos. El aumento del contenido de ADN con aneuploidía y aumento de la fase S sugiere un mal pronóstico, pero la estadificación sigue siendo más importante para determinar el pronóstico. La positividad para los receptores de estrógenos sugiere una mejor respuesta a la manipulación hormonal del tumor, mientras que la expresión de *HER2/neu* sugiere respuesta al tratamiento biológico con el anticuerpo monoclonal trastuzumab. Algunos tipos histológicos de cáncer de mama se asocian a un pronóstico mejor que otros, pero la estadificación resulta más importante que el tipo histológico. La expresión de las proteasas estromales, como la catepsina D, predice las metástasis, pero en este caso «la situación ha escapado de control» y ya se han producido metástasis.

24 **A** Este es un subtipo de cáncer de mama NOS parecido al basal, que es triple negativo con los marcadores habituales de inmunohistoquímica. La ausencia de expresión de RE predice que el tratamiento antihormonal con tamoxifeno no aportará beneficios, mientras que la ausencia de HER2/neu indica que el trastuzumab no tendrá eficacia. Los cánceres de tipo basal son muy agresivos y suelen producir metástasis precoces, de forma que es difícil controlarlos con cirugía o radioterapia. Sin embargo, algunos se curan con quimioterapia. Esto nos recuerda la importancia de los perfiles de expresión génica, que permiten

individualizar el tratamiento de cada paciente oncológico para tratar de aumentar las opciones de éxito.

25 **D** El aspecto macroscópico de la piel es compatible con la infiltración de los linfáticos dérmicos por un carcinoma, proceso que se denomina carcinoma inflamatorio y que no alude a un tipo histológico concreto de cáncer de mama, sino que se limita a describir un aspecto macroscópico (piel de naranja) que recuerda a un proceso inflamatorio. La retracción del pezón y las adenopatías axilares indoloras sugieren también un carcinoma ductal infiltrante. La hiperplasia ductal atípica puede incrementar el riesgo de carcinoma, pero no tiene capacidad infiltrante ni produce cambios visibles en la superficie cutánea. La mastitis aguda puede producir dolor y tumefacción, pero es más probable que aparezca en relación con la lactancia. Además, dado que se trata de un proceso inflamatorio, existe más probabilidad de que se asocie a adenopatías dolorosas. La necrosis grasa puede recordar a un carcinoma a la palpación, pero la piel no se ve afectada. La adenosis esclerosante es una característica de la enfermedad fibrosa quística benigna que produce tumoraciones mamarias, pero tampoco afecta a la piel.

26 **B** Esta paciente presenta una masa delimitada tanto macroscópica como radiológicamente, que, dada su edad, debería corresponder a un fibroadenoma. La necrosis grasa y los carcinomas infiltrantes son masas de límites irregulares. Los cambios fibrosos quísticos suelen ser lesiones irregulares, no masas delimitadas. La mastitis presenta una afectación más difusa, sin un efecto de masa. El tumor filodes suele ser mucho más grande, pero es menos frecuente.

27 **A** Los fibroadenomas son frecuentes y pueden aumentar de tamaño durante el embarazo o en las últimas fases del ciclo menstrual. La mayoría de los papilomas intraductales miden menos de 1 cm y no se ven influidos por cambios hormonales. El carcinoma lobulillar *in situ* produce típicamente una lesión mal delimitada, sin efecto de masa. Los carcinomas medulares suelen ser grandes y solo representan aproximadamente un 1% de todos los carcinomas de mama. El tumor filodes es infrecuente y suele medir más de 4 cm.

28 **A** La edad de la paciente sugiere que la lesión posiblemente

sea benigna, e incluso los fibroadenomas y los cambios fibrosos quísticos pueden presentar calcificaciones. El componente fibroso de un fibroadenoma o de los cambios fibrosos quísticos puede dificultar la punción-aspiración de las células. Sin embargo, los antecedentes familiares y el aspecto mamográfico de pequeñas calcificaciones agrupadas resultan sospechosos de carcinoma. El retraso en el diagnóstico y tratamiento de los cánceres de mama disminuye la supervivencia. Aunque las mutaciones de *BRCA1* se asocian a cánceres de mama negativos para RE y RP y HER2, todavía es preciso diagnosticar la lesión. A partir de los datos histológicos y los marcadores moleculares, se podría iniciar un plan de tratamiento, que puede incluir estudios complementarios y tratamientos farmacológicos.

29 **D** El tumor filodes, aunque se parece macroscópica y microscópicamente a los fibroadenomas, afecta a mujeres de edad más avanzada, alcanza mayor tamaño y es más celular que estos. Estas lesiones pueden recidivar localmente tras la extirpación, pero es raro que provoquen metástasis. La figura muestra un estroma celular, que protruye hacia unos espacios revestidos por una sola hilera de epitelio cúbico. Por el contrario, los cambios fibrosos quísticos pueden producir una tumoración mamaria, pero, en general, esta no alcanza 6 cm y no tiene áreas firmes de estroma celular. El carcinoma lobulillar está constituido por células epiteliales de aspecto maligno, que crecen formando cúmulos e hileras y pueden no producir un efecto de masa significativo. Los carcinomas tubulares de la mama son infrecuentes, la mayor parte miden menos de 1 cm de diámetro y la mayoría de ellos están constituidos por pequeñas estructuras tubulares en el seno de un estroma no celular.

CAPÍTULO
24

Sistema endocrino

PEF9 Capítulo 24: Sistema endocrino

PH9 Capítulo 19: Sistema endocrino

1 Una mujer de 25 años ha observado secreciones mamarias durante el último mes. No está lactando y no ha tenido gestaciones previas. Está sin menstruación desde hace 5 meses. En la exploración física no se encuentran alteraciones. La RM cerebral muestra una masa de 0,7 cm en la silla turca. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que sufra esta paciente?

A Acromegalia
B Enfermedad de Cushing
C Hipertiroidismo
D Infertilidad
E Disfunción neurológica

2 Los amigos más cercanos de un hombre de 20 años refieren que tiene un aspecto distinto desde hace 1 año, con rasgos más bastos. Se compró unos zapatos de su número habitual, pero no le venían. Un año después, su hermano de 23 años desarrolló problemas parecidos. Ambos tienen hiperglucemia. ¿Cuál de las siguientes alteraciones genéticas es más probable que presenten ambos hermanos?

A Mutación en línea germinal de *AIP*
B Sobreexpresión de *ciclina D1*
C Fusión de *PAX8-PPARG*
D Mutación con pérdida de función de *PTEN*
E Pérdida de heterocigosidad *VHL*

3 Una mujer de 39 años lleva sin menstruaciones 1 año y además refiere malestar, intolerancia al frío y pérdida del vello corporal. Presenta también jaquecas durante los últimos 5 meses. En la

exploración física se encuentra una reducción de los campos visuales laterales. ¿Cuál de los siguientes tipos celulares es más probable que constituya la neoplasia que padece esta paciente?

A Células β

B Células principales

C Células cromafines

D Células cromófobas

E Células de la zona glomerular

F Células parafoliculares

4 Una mujer de 41 años nota que las manos no le caben en los guantes que se compró el invierno anterior. Durante el último año sus características faciales se han vuelto más toscas y aparenta tener una voz más grave. En la exploración física tiene una presión arterial de 140/90 mmHg. La paciente tiene menos sensibilidad a la punción de las palmas siguiendo la distribución del pulgar y los dos primeros dedos. La radiografía de los pies identifica un aumento de tejidos blandos por debajo del calcáneo. La radiografía de tórax muestra una cardiomegalia. Las pruebas de laboratorio indican una glucemia en ayunas de 138 mg/dl, con una concentración de hemoglobina A_{1c} del 8,6%. ¿Cuál de los siguientes resultados de pruebas de laboratorio es más probable que nos oriente sobre la causa de sus hallazgos físicos y analíticos?

A Resultado anormal de la prueba de tolerancia a la glucosa

B Falta de supresión de la hormona de crecimiento

C Hiperprolactinemia

D Aumento de la concentración de TSH sérica

E Pérdida de las concentraciones diurnas de cortisol

5 Una mujer de 39 años G2, P2, que tuvo su último embarazo hace 14 años, presenta amenorrea desde hace 6 meses. También comenta que secreta leche de las mamas. En la exploración física está normotensa. Mide 150 cm y pesa 63 kg (índice de masa corporal de 28). Sus características sexuales secundarias son normales. Las pruebas de laboratorio destacan una concentración normal de la β-gonadotropina coriónica humana. La prueba de estimulación de la hormona de crecimiento es normal. La TC craneal no identifica alteraciones óseas o hemorragia. La RM cerebral muestra densidad de líquido en una silla turca de tamaño normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Craneofaringioma
B Síndrome de la silla vacía
C Hemocromatosis hereditaria
D Síndrome de Prader-Willi
E Prolactinoma
F Síndrome de Sheehan

6 Una mujer de 21 años da a luz un lactante a término tras un embarazo no complicado. Sin embargo, no se consigue extraer la placenta y la paciente sufre una hemorragia importante, por la que se tienen que transfundir 10 U de concentrado de eritrocitos. Se debe realizar una histerectomía. Durante los 3 meses siguientes no consigue suficiente leche para alimentar al bebé y se siente cada vez más cansada. Las pruebas de laboratorio destacan Na^+, 134 mmol/l; K^+, 5,2 mmol/l; Cl^-, 88 mmol/l; CO_2, 23 mmol/l; glucosa, 59 mg/dl; calcio, 9,3 mg/dl; fósforo, 3,5 mg/dl; y creatinina, 0,9 mg/dl. En los 5 meses siguientes se pierden sus ciclos menstruales. ¿Cuál de las siguientes alteraciones analíticas es más probable que se encuentre en esta paciente?

A Menor concentración de hormona liberadora de corticotropina
B Menor concentración de oxitocina
C Fallo en la liberación de hormona antidiurética
D Fallo de la estimulación de la hormona de crecimiento
E Aumento de corticotropina
F Aumento de dopamina

7 Un hombre de 42 años lleva con poliuria y polidipsia 4 meses. Los antecedentes médicos indican que se cayó de una escalera y se golpeó en la cabeza justo antes de comenzar con estos problemas. En la exploración física no se encuentran alteraciones específicas. Las pruebas de laboratorio destacan Na^+, 155 mmol/l; K^+, 3,9 mmol/l; Cl^-, 111 mmol/l; CO_2, 27 mmol/l; glucosa, 84 mg/dl; creatinina, 1 mg/dl; y osmolaridad, 350 mOsm/ml. La densidad urinaria es 1,002. ¿Cuál de las siguientes hormonas es más probable que sea deficitaria en este paciente?

A Corticotropina
B Melatonina
C Oxitocina
D Prolactina
E Vasopresina

8 Un hombre de 69 años ha desarrollado una obnubilación progresiva durante la última semana. Ha fumado 80 paquetes-año. En la exploración física está afebril y normotenso. La TC craneal no muestra hemorragias intracerebrales. Las pruebas de laboratorio destacan Na$^+$, 115 mmol/l; K$^+$, 4,2 mmol/l; Cl$^-$, 85 mmol/l; y bicarbonato, 23 mmol/l. La glucemia es 80 mg/dl, el nitrógeno ureico, 19 mg/dl; y la creatinina, 1,7 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que tenga este paciente?

A Adenoma de la adenohipófisis
B Carcinoma corticosuprarrenal
C Feocromocitoma
D Carcinoma de células pequeñas pulmonar
E Carcinoma de células renales

9 Un hombre de 23 años presenta cefaleas, poliuria y problemas visuales desde hace 3 meses. En la exploración física se encuentran deficiencias en los campos visuales temporales de ambos lados. La TC craneal revela una gran masa quística, parcialmente calcificada, que ocupa las áreas selar y supraselar. Las pruebas de laboratorio indican una concentración de prolactina sérica de 60 ng/ml y un nivel de sodio de 152 mEq/l. Las concentraciones de calcio, fosfato y glucosa séricas son normales. Se extirpa la masa, y el estudio histológico muestra una mezcla de elementos epiteliales escamosos y restos ricos en lípidos, con cristales de colesterol. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más compatible con los datos clínicos y analíticos de este paciente?

A Craneofaringioma
B Metástasis de una neoplasia pulmonar
C Neoplasia endocrina múltiple de tipo 1
D Neoplasia endocrina múltiple de tipo 2
E Prolactinoma

10 Una mujer de 42 años consulta por la aparición súbita de fiebre, con cefaleas, náuseas, sudoración y palpitaciones. En la exploración física tiene 39,2 °C de temperatura; una frecuencia cardíaca de 115 latidos/min; una frecuencia respiratoria irregular de 30 respiraciones/min; y una presión arterial de 150/85 mmHg. Los reflejos tendinosos profundos son 4+ en ambos lados. Al extender las manos se reconoce un temblor de alta frecuencia. ¿Cuál de los siguientes fármacos se le debe administrar de forma

urgente?

A Ácido acetilsalicílico
B Hidrocortisona
C Insulina
D Propranolol
E Tetraciclina

11 Una mujer de 47 años ha presentado fatiga progresiva con disnea y menor tolerancia al esfuerzo durante el último año. En la exploración física se observa edema sin fóvea en las extremidades inferiores. Las pruebas de laboratorio destacan una concentración de TSH sérica de 10 mU/l y de T_4 de 2 µg/dl. ¿Cuál de las siguientes células es más probable que presente cambios patológicos?

A Basófilas hipofisarias
B Pituicitos hipofisarios
C Células gliales del hipotálamo
D Neuronas hipotalámicas
E Células C tiroideas
F Células foliculares tiroideas

12 Un niño de 2 años tiene retraso de crecimiento desde la lactancia. La exploración física muestra talla baja y características faciales bastas, con protrusión de la lengua y hernia umbilical. Al madurar el niño, se hace evidente una discapacidad intelectual profunda. ¿Cuál de las siguientes hormonas es más probable que sea deficitaria en un paciente con estas características?

A Cortisol
B Insulina
C Noradrenalina
D Somatostatina
E Tiroxina (T_4)



13 Una mujer de 43 años refiere letargo y debilidad progresivos en los últimos 3 años. Presenta intolerancia al frío y usa un jersey incluso en verano. Hace 1 año presentó un episodio de menorragia, pero actualmente tiene una oligomenorrea. Tiene dificultad para concentrarse y mala memoria. Además, tiene estreñimiento crónico. L En la exploración física tiene una temperatura de 35,5 °C; frecuencia cardíaca, 54 latidos/min; frecuencia respiratoria, 13 respiraciones/min; y presión arterial, 110/70 mmHg. Muestra alopecia y una piel seca y gruesa. Las manos, pies y cara están edematosos, con una piel pastosa. Las pruebas de laboratorio destacan hemoglobina, 13,8 g/dl; hematocrito, 41,5%; glucosa, 73 mg/dl; y creatinina, 1,1 mg/dl. La figura corresponde con el aspecto histológico representativo de la enfermedad de esta paciente. ¿Cuál de las siguientes pruebas serológicas es más probable que sea positiva en esta paciente?

A Anticuerpos anticentrómero
B Anticuerpos frente al ADN bicatenario
C Anticuerpos frente a Jo-1
D Anticuerpos antimitocondriales
E Anticuerpos antirribonucleoproteína
F Anticuerpos frente a la peroxidasa tiroidea

14 Una mujer de 37 años lleva 1 semana con dificultad para tragar y sensación de plenitud en la parte anterior del cuello. Se está recuperando de una infección respiratoria alta que padeció hace 1

mes. En la exploración física destaca una temperatura de 37,4 °C; frecuencia cardíaca, 74 latidos/min; frecuencia respiratoria, 16 respiraciones/min; y presión arterial, 122/80 mmHg. En la palpación del tiroides, que está aumentado de tamaño de forma difusa, la paciente refiere dolor. Las pruebas de laboratorio muestran un aumento de la concentración de T_4 con disminución de TSH. A los 2 meses, la paciente ya no tiene estos síntomas y la concentración de T_4 se ha normalizado. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que haya ocasionado estos hallazgos?

A Tiroiditis de Hashimoto
B Carcinoma medular de tiroides
C Tiroiditis granulomatosa subaguda
D Adenoma folicular tóxico
E Bocio multinodular tóxico

15 Una mujer de 30 años ha dado a luz a su segundo hijo. Durante el posparto desarrolla intolerancia al calor y pierde más peso del esperado. En la exploración física destaca un aumento de tamaño indoloro del tiroides, sin otras alteraciones significativas. En las pruebas de laboratorio se encuentra una concentración de T_4 de 12 μg/dl y una TSH de 0,4 mU/l. Un año más tarde la paciente es eutiroidea. ¿Cuál de los siguientes datos indica mejor la patogenia de la enfermedad de esta paciente?

A Mutaciones activadoras del protooncogén *RET*
B Anticuerpos frente a la peroxidasa tiroidea
C Irradiación cervical durante la infancia
D Deficiencia prolongada de yoduro
E Infección vírica reciente de la vía respiratoria alta

16 Una mujer de 20 años y su hermana gemela presentan una diplopía progresiva, que comenzó con 3 años de diferencia entre ambas. En la exploración física se observan exoftalmos y una debilidad de los músculos extraoculares. El tiroides muestra un aumento de tamaño difuso indoloro en ambos casos, sin adenopatías. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio en suero es más probable que presenten estas hermanas?

A Menor concentración de tiroxina libre
B Menor concentración de hormona estimuladora del tiroides
C Mayor título de autoanticuerpos frente a la peroxidasa tiroidea
D Aumento de la concentración de hormona liberadora de

tirotropina

E Aumento de la concentración de triyodotironina



17 Una mujer de 21 años ha observado una fatiga progresiva con pérdida involuntaria de 7 kg de peso durante los últimos 4 meses. También ha presentado una ansiedad y nerviosismo cada vez más importantes con diarrea. En la exploración física se identifica un tiroides aumentado de tamaño de forma difusa. Muestra una temperatura de 37,5 °C; frecuencia cardíaca, 103 latidos/min; frecuencia respiratoria, 28 respiraciones/min; y presión arterial, 140/75 mmHg. La gammagrafía tiroidea confirma un aumento de captación difuso. La figura se corresponde con el aspecto microscópico representativo de la glándula tiroides. ¿Qué más probable que ocasione estos hallazgos?

A Anticuerpos frente al receptor de TSH

B Deficiencia de yoduro en la dieta

C Irradiación del cuello

D Deficiencia materna de T_4

E Mutación del protooncogén *RET*

18 Un hombre de 40 años refiere pérdida de peso, hiperorexia y visión doble durante los últimos 6 meses. En la exploración física destacan una temperatura de 37,7 °C; frecuencia cardíaca, 106 latidos/min; frecuencia respiratoria, 20 respiraciones/min; y

presión arterial, 140/80 mmHg. Al extender los brazos se encuentra un temblor fino. Presenta proptosis bilateral y úlceras corneales. Las pruebas de laboratorio incluyen una concentración de TSH sérica de 0,1 mU/l. La gammagrafía indica un aumento difuso de la captación en todo el tiroides. Se le administra tratamiento con propiltiouracilo y su cuadro mejora. ¿Cuál de las siguientes descripciones es la que mejor se corresponde con el aspecto microscópico del tiroides antes del tratamiento?

A Destrucción de folículos, agregados linfoides y metaplasia de células de Hürthle
B Folículos tiroideos grandes revestidos por células epiteliales aplanadas
C Destrucción folicular con infiltrados inflamatorios, que contienen células gigantes
D Nódulos con nidos de células separados por estroma hialino, que se tiñe con el rojo Congo
E Proyecciones papilares en los folículos tiroideos y agregados linfoides en el estroma

19 Una mujer de 45 años procedente de Katmandú, Nepal, refiere sensación de plenitud en el cuello, sin otras alteraciones. El aumento de tamaño se ha producido de forma gradual e indolora durante más de 1 año. La exploración física confirma el aumento de tamaño difuso del tiroides sin masas ni adenopatías aparentes. Las pruebas de laboratorio de función tiroidea muestran una concentración normal de T_4 libre con un ligero aumento de la concentración de TSH. ¿Cuál de las siguientes entidades más probable que cause estos hallazgos?

A Bocio difuso no tóxico
B Adenoma folicular
C Tiroiditis de Hashimoto
D Carcinoma papilar
E Tiroiditis granulomatosa subaguda
F Bocio multinodular tóxico

20 Una niña de 14 años ha notado un aumento de tamaño gradual del cuello durante los últimos 8 meses. En la exploración física destaca un aumento de tamaño difuso del tiroides. La concentración de TSH sérica es normal. ¿Cuál de los siguientes alimentos es más probable que esté ingiriendo en mayor cantidad

si se realiza una anamnesis dietética?

A Coliflor
B Habas
C Pescado
D Llantén
E Pan de centeno

21 Un hombre de 70 años ha presentado una disfagia progresiva durante los últimos 2 años. En los últimos 6 meses ha perdido 3 kg de peso. En la exploración física tiene una temperatura de 37,3 °C y una frecuencia cardíaca de 102 latidos/min. Nota plenitud en la parte anterior del cuello y en la palpación se encuentra una masa irregular de 5 × 10 cm. Las pruebas de laboratorio destacan una TSH sérica de 0,2 mU/l. La gammagrafía tiroidea identifica un nódulo de 1,5 cm con aumento de la captación en el lóbulo tiroideo derecho y una reducción de la captación en el resto del tiroides, que está aumentado de tamaño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Adenoma folicular
B Enfermedad de Graves
C Tiroiditis de Hashimoto
D Carcinoma papilar
E Bocio multinodular tóxico

22 Una mujer de 38 años se notó un pequeño bulto en la parte lateral derecha del cuello hace 1 mes; el bulto no ha cambiado desde ese momento. La exploración física revela un nódulo indoloro de 1 cm en el polo inferior derecho del tiroides, sin ganglios. La gammagrafía muestra que el nódulo no capta yodo radiactivo y que no hay más nódulos. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina del nódulo, cuyas características corresponden a una neoplasia folicular. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que se encuentre en este paciente?

A Inmunoglobulinas frente al receptor de TSH
B Elevada concentración de T_4 libre
C T_3 baja
D TSH normal
E Anticuerpos frente a la peroxidasa tiroidea

23 Una mujer de 30 años refiere antecedentes de pérdida de peso

(3 kg), temblor de manos, diarrea acuosa leve e intolerancia al calor durante los últimos 6 meses. En la exploración física, sus constantes vitales son: temperatura, 37,3 °C; frecuencia cardíaca, 103 latidos/min en ritmo sinusal; frecuencia respiratoria, 20 respiraciones/min; y presión arterial, 125/85 mmHg. La paciente presenta un nódulo indoloro firme de 1 cm en la parte lateral izquierda del cuello, sin adenopatías. No se encuentran otras alteraciones. Las pruebas de laboratorio identifican una concentración sérica total de T_4 de 11,6 µg/dl y una TSH de 0,2 mU/l. La gammagrafía muestra más captación de yodo radiactivo en el nódulo que en el tiroides circundante. Se procede a una tiroidectomía parcial, y el estudio histológico del nódulo extirpado revela folículos tiroideos bien diferenciados sin invasión capsular o vascular. ¿Cuál de los siguientes cambios genéticos es más probable que se encuentre en el análisis molecular de este nódulo?

A Mutación activadora de sentido erróneo del gen *GNAS1*
B Gen de fusión formado por los genes *PAX8* y *PPARG*
C Mutación con ganancia de función del gen del receptor de TSH
D Activación mediante mutación del receptor de tirosina cinasa *RET*
E Sobreexpresión del gen de la ciclina D1 *(CCND1)*
F Mutación con codón de finalización del gen del receptor autoinmunitario *(AIRE)*

24 Una mujer de 44 años, sana, se nota un pequeño bulto en la parte izquierda del cuello. Se palpa un ganglio cervical firme e indoloro de 1,5 cm. El tiroides no está aumentado de tamaño. La radiografía de tórax no revela alteraciones. Las pruebas de laboratorio séricas indican glucemia, 83 mg/dl; creatinina, 1,2 mg/dl; calcio, 9,1 mg/dl; fósforo, 3,3 mg/dl; tiroxina, 8,7 µg/dl; y TSH, 2,3 mU/l. La hemoglobina es 14 g/dl, el recuento plaquetario, 240.400/mm^3, y el recuento leucocítico, 5.830/mm^3. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina del tiroides. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Carcinoma anaplásico
B Carcinoma folicular
C Carcinoma medular
D Carcinoma papilar
E Carcinoma paratiroideo

F Linfoma linfocítico



25 Un hombre de 45 años ha notado un bulto en la parte izquierda del cuello durante los últimos 4 meses. La exploración física revela un nódulo indoloro en el lóbulo izquierdo del tiroides. Se encuentra un ganglio cervical adyacente aumentado de tamaño e indoloro. Las pruebas de laboratorio no revelan autoanticuerpos frente al tiroides en el suero, y las concentraciones de T_4 y TSH son normales. Se realiza la tiroidectomía y la figura refleja el aspecto microscópico del nódulo. ¿Cuál de los siguientes factores etiológicos es más probable que esté implicado en la patogenia del nódulo tiroideo en este paciente?

A Autoinmunidad

B Deficiencia crónica de yoduro en la dieta

C Consumo de sustancias bociógenas

D Mutación del gen *RET*

E Infección vírica



26 Una mujer de 62 años ha notado notó un bulto en la parte derecha del cuello durante los últimos 5 meses. En la exploración física no tiene adenopatías palpables. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina y luego una tiroidectomía. La masa sólida de 3 cm en el lóbulo tiroideo derecho presenta el aspecto histológico que muestra la figura. A los 6 meses desarrolla dolor en el muslo derecho y la radiografía confirma una fractura del fémur derecho en una zona de lisis ósea. La gammagrafía revela captación aumentada en la región de la fractura. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Carcinoma papilar
B Carcinoma folicular
C Tiroiditis granulomatosa
D Tiroiditis de Hashimoto
E Linfoma no hodgkiniano

27 Un hombre de 44 años sin enfermedades previas ha presentado una disfonía progresiva, con disnea y estridor durante las últimas 3 semanas. La exploración física revela una gran masa firme y dolorosa, que afecta a todo el lóbulo tiroideo derecho. La TC muestra que la masa se extiende posterior a la tráquea y al mediastino superior. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina, que identifica células fusiformes pleomorfas. En la cirugía se ve que la masa ha infiltrado el músculo esquelético adyacente. Cuatro de los siete ganglios linfáticos cervicales tienen metástasis.

En la radiografía de tórax se identifican, además, metástasis pulmonares. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que presente este paciente?

A Carcinoma anaplásico
B Carcinoma folicular
C Carcinoma medular
D Linfoma no hodgkiniano
E Carcinoma papilar

28 Una mujer de 42 años ha notado una sensación de plenitud progresiva en el cuello durante los últimos 7 meses. La exploración física revela un aumento de tamaño difuso y asimétrico nodular del tiroides, sin adenopatías. Se realiza una tiroidectomía. La exploración macroscópica del tiroides observa una neoplasia tiroidea multicéntrica, que histológicamente aparece constituida por células poligonales a fusiformes, que forman nidos y trabéculas. Se observa un estroma hialino rosado, muy llamativo, que es positivo con rojo Congo. La microscopia electrónica revela una cantidad variable de gránulos intracitoplásmicos electrodensos rodeados de membrana. ¿Cuál de los siguientes antígenos es más útil para diagnosticar esta neoplasia mediante tinción inmunohistoquímica?

A Calcitonina
B CD3
C Citoqueratina
D Receptor de estrógenos
E Hormona paratiroidea
F Vimentina

29 Un hombre de 40 años desarrolla debilidad y fatigabilidad fácil durante los últimos 2 meses. En la exploración física no se encuentra alteraciones. Las pruebas de laboratorio destacan una calcemia de 11,5 mg/dl, con un fósforo inorgánico de 2,1 mg/dl y una concentración de hormona paratiroidea de 58 pg/ml, próxima al límite superior de la normalidad. Con gammagrafía ósea no se reconocen áreas de captación. ¿Cuál es la causa más probable de estos hallazgos?

A Insuficiencia renal crónica
B Hipervitaminosis D
C Carcinoma medular de tiroides

D Adenoma de paratiroides
E Carcinoma paratiroideo
F Hiperplasia de paratiroides

30 Una mujer de 63 años ha presentado cefaleas frecuentes durante el último mes. De forma abrupta presenta una convulsión generalizada y queda obnubilada. Es trasladada a urgencias, donde la exploración física revela una frecuencia cardíaca irregular. Las pruebas de laboratorio muestran una calcemia de 15,4 mg/dl, con un fósforo sérico de 1,9 mg/dl y una albúmina de 4,2 g/dl. La radiografía de tórax identifica múltiples masas pulmonares y lesiones líticas en la columna vertebral. ¿Cuál de los siguientes trastornos es el que mejor explica estos hallazgos?

A Insuficiencia renal crónica
B Tuberculosis diseminada
C Carcinoma de mama metastásico
D Carcinoma paratiroideo
E Toxicidad de la vitamina D

31 Una mujer de 40 años refiere letargo, debilidad y estreñimiento desde hace 6 meses. En la exploración física está afebril y normotensa, con una frecuencia cardíaca irregular. Aparece dolor en la palpación del tercer dedo proximal. El ECG revela una prolongación del intervalo QT (corregido). Las pruebas de laboratorio indican glucemia, 73 mg/dl; creatinina, 1,2 mg/dl; calcio, 11,6 mg/dl; fósforo, 2,1 mg/dl; proteínas totales, 7,1 g/dl; albúmina, 5,3 g/dl; y fosfatasa alcalina, 202 U/l. La radiografía de la mano izquierda revela una expansión focal por una lesión quística de la tercera falange proximal. La gammagrafía con tecnecio identifica un área de 1 cm de captación aumentada en la parte lateral derecha del cuello. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que esté mutado en esta paciente?

A *GNAS1*
B *MEN1*
C *TP53*
D *RET*
E *VHL*

32 Un hombre de 68 años ha observado malestar progresivo durante los últimos 3 años. La exploración física es anodina. Las pruebas de laboratorio muestran una creatinina sérica de 4,9 mg/dl

y una concentración de nitrógeno ureico en sangre de 45 mg/dl. La TC abdominal revela unos riñones pequeños. ¿Cuál de las siguientes lesiones de glándulas endocrinas se ha desarrollado de forma secundaria a la enfermedad de base de este paciente?

A Atrofia suprarrenal
B Hiperplasia de células de los islotes
C Bocio multinodular
D Hiperplasia de paratiroides
E Microadenoma hipofisario

33 Una mujer de 47 años se notó un bulto en el cuello hace 1 semana. En la exploración física se identifica un nódulo de 2 cm en el lóbulo tiroideo derecho. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina y el estudio histológico de la muestra observa células compatibles con una neoplasia folicular. Se le realiza una tiroidectomía subtotal. ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio se debería analizar en el postoperatorio inmediato de esta paciente?

A Anticuerpos frente a la tiroglobulina
B Calcitonina
C Calcio
D Hormona paratiroidea
E TSH

34 Un hombre de 27 años ha controlado la diabetes durante los últimos 10 años con inyecciones de insulina. Esta mañana su compañero de piso no ha conseguido despertarle y el paciente llega inconsciente a urgencias. En la exploración física tiene una temperatura de 37 °C, una frecuencia cardíaca de 91 latidos/min, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones/min y una presión arterial de 90/65 mmHg. Las pruebas de laboratorio revelan una concentración alta de insulina plasmática sin presencia de péptido C. El análisis de orina no encuentra proteínas, sangre ni glucosa, pero sí una cetonuria 4+. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que presente?

A Infarto agudo de miocardio
B Bacteriemia
C Insuficiencia hepática
D Síndrome hiperosmolar
E Coma hipoglucémico

F Cetoacidosis

35 Se estudia durante 10 años a familiares directos de pacientes diagnosticados de diabetes mellitus de tipo 1 o 2. De forma periódica se determinan las concentraciones de glucosa e insulina y la aparición de autoanticuerpos, y también los tipos de HLA de estos sujetos. Una cohorte de pacientes que tienen entre 8 y 22 años no presenta una enfermedad franca ni hiperglucemia, pero tienen autoanticuerpos frente a la ácido glutámico descarboxilasa. Muchos de estos pacientes tienen los alelos HLA-DR3 y HLA-DR4. ¿Cuál de las siguientes alteraciones pancreáticas es más probable que se encuentre en esta cohorte de pacientes del estudio?

A Inflamación aguda y necrosis del ácino
B Fibrosis acinar y sustitución grasa
C Depósito de amiloide en los islotes
D Hiperplasia de los islotes
E Insulitis
F Islotes normales en un estroma fibroso

36 Una mujer de 23 años se somete a una revisión de salud sanitaria. Tiene un índice de masa corporal de 22. Las pruebas de laboratorio incluyen una glucemia de 130 mg/dl. El análisis de orina revela una glucosuria leve, sin cetonuria ni proteinuria. No tiene autoanticuerpos frente a la insulina. Su padre tuvo un cuadro similar a los 20 años. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que tenga una mutación?

A Gen que codifica el glucagón
B Gen que codifica la glucocinasa
C Gen que codifica la GLUT4
D Gen que codifica la insulina
E Gen que codifica el MHC DR

37 Una niña de 13 años se desmaya durante un partido de baloncesto. Cuando llega a urgencias está obnubilada. En la exploración física está hipotensa y taquicárdica, con una respiración rápida, profunda y dificultosa. Las pruebas de laboratorio séricas revelan Na^+, 151 mmol/l; K^+, 4,6 mmol/l; Cl^-, 98 mmol/l; CO_2, 7 mmol/l; y glucosa, 521 mg/dl. El análisis de orina muestra glucosuria 4+ y cetonuria 4+, sin presencia de proteínas, sangre o nitritos. ¿Cuál es la alteración patológica más probable que se identificara en el páncreas de esta niña cuando se desmayó?

A Pérdida de células β de los islotes
B Inflamación aguda de los islotes
C Sustitución por amiloide de las células β de los islotes
D Inflamación crónica de los islotes
E Hiperplasia de las células α
F Tumor neuroendocrino pancreático

38 Se realiza un estudio sobre pacientes de más de 25 años con índice de masa corporal superior a 30, dislipidemia, hipertensión y glucemia en ayunas con un valor medio de 115 mg/dl. Tienen alteraciones del tejido adiposo, incluido aumento de la liberación de ácidos grasos no esterificados, alteración de las adipocinas con disminución de la adiponectina, mayor liberación de citocinas proinflamatorias y menor actividad del receptor γ del peroxisoma activado por proliferador (PPARγ). ¿Cuál de los siguientes tratamientos iniciales es el mejor en estos pacientes?

A Suprarrenalectomía
B Restricción calórica
C Inyección de insulina
D l-tiroxina
E Liposucción

39 Un lactante nace de forma prematura. Se encuentran múltiples malformaciones congénitas y al poco tiempo de nacer sufre una convulsión. La glucemia es 19 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes enfermedades maternas es más probable que cause los hallazgos encontrados en este lactante?

A Fibrosis quística
B Diabetes mellitus de tipo 2
C Diabetes gestacional
D Diabetes juvenil de inicio en la madurez
E Tumor neuroendocrino pancreático

40 Se realiza un estudio clínico sobre pacientes diagnosticados de diabetes mellitus de tipo 1 o 2. Los pacientes con ambos procesos desarrollan complicaciones secundarias a una ateroesclerosis acelerada y avanzada. Todos los pacientes no tratados presentan una concentración elevada de hemoglobina A_{1c}. ¿Cuál de las siguientes características, común a los pacientes con diabetes mellitus de tipo 1 o 2, es más probable que se encuentre en este estudio?

A Asociación a determinados alelos del CPH de clase II
B Elevada concordancia en gemelos monocigotos
C Marcada resistencia a la acción de la insulina
D Glucosilación no enzimática de las proteínas
E Presencia de anticuerpos frente a las células de los islotes

41 Un hombre de 50 años que ha presentado una glucemia en ayunas > 140 mg/dl dos veces inicia una dieta hipocalórica y tratamiento con agonista del receptor del péptido 1 parecido al glucagón (GLP-1). ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio es más probable que sea el mejor método para monitorizar el control de la enfermedad en este paciente?

A Colesterol, total
B Glucemia en ayunas
C Hemoglobina glucosilada
D Microalbuminuria
E Determinación aleatorizada de la glucosa plasmática
F Fructosamina sérica

42 Un hombre de 50 años presenta una úlcera que no se cura en la parte inferior del pie desde hace 2 meses. En la exploración física la úlcera mide 2 cm y se encuentra encima de la cabeza del primer metatarsiano derecho. El paciente tiene una sensibilidad a la punción reducida y también se observa una disminución de la agudeza visual bilateral. Las pruebas de laboratorio revelan una creatinina sérica de 2,9 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes resultados de las pruebas de laboratorio es más probable que tenga?

A Glucosuria
B Hipoalbuminemia
C Hipopotasemia
D Leucopenia
E Esteatorrea
F Uricosuria

43 Un hombre de 52 años está preocupado porque ha aumentado de peso durante los últimos 30 años de forma gradual. Mide 174 cm y pesa 91 kg (índice de masa corporal de 30). No toma fármacos. En la exploración física se observa una reducción de la sensibilidad a la punción y al tacto superficial en las extremidades inferiores. Los reflejos rotulianos están disminuidos. La potencia motora parece normal en todas las extremidades. Las pruebas de

laboratorio revelan una glucemia de 169 mg/dl; creatinina, 1,9 mg/dl; colesterol total, 220 mg/dl; colesterol de HDL, 27 mg/dl; y triglicéridos, 261 mg/dl. La radiografía de tórax encuentra una cardiomegalia leve. A los 5 años desarrolla claudicación de las extremidades inferiores al hacer ejercicio. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable encontrar en este paciente según estos hallazgos?

A Gangrena
B Coma hipoglucémico
C Cetoacidosis
D Mucormicosis
E Pancreatitis
F Amiloidosis sistémica



44 Una mujer de 45 años presenta angina de pecho, poliuria y polidipsia desde hace 5 años. En la exploración física su índice de masa corporal es 32. Las pruebas de laboratorio revelan una hemoglobina A_{1c} del 10%. El análisis de orina identifica proteinuria, sin cetonuria. La figura se corresponde con el aspecto histológico representativo de sus riñones. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que haya provocado la enfermedad responsable de estos hallazgos?

A Pancreatitis crónica

B Mutación del gen de la glucocinasa
C Resistencia a la insulina
D Amiloidosis sistémica
E Destrucción de los linfocitos B mediada por linfocitos T

45 Un hombre de 50 años tiene diabetes mellitus desde hace 35 años. Durante este período, las concentraciones de hemoglobina A_{1c} de este paciente han oscilado entre el 7 y el 10%. Actualmente refiere dificultades sexuales, incluida dificultad para conseguir la erección. También presenta una diarrea leve, pero recidivante, de escaso volumen, y dificultades para la micción. Presenta un retraso del vaciamiento gástrico. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de lesión celular es más probable que provoque estos problemas?

A Entrecruzamiento de las proteínas de la matriz extracelular
B Producción del factor de crecimiento endotelial vascular
C Alteraciones en la transmisión de señales del factor de crecimiento transformante β
D Aumento de la actividad procoagulante endotelial
E Glucosilación no enzimática
F Susceptibilidad al estrés oxidativo inducida por polioles

46 Una mujer de 74 años ingresa en el hospital con obnubilación. La temperatura es de 37 °C; la frecuencia cardíaca, 95 latidos/min; la frecuencia respiratoria, 22 respiraciones/min; y la presión arterial, 90/60 mmHg. Parece deshidratada y tiene escasa turgencia de la piel. La glucemia es de 872 mg/dl. El análisis de orina revela una glucosuria 4 +, sin cetonas, proteínas ni sangre. ¿Cuál de los siguientes factores es más importante en la patogenia del cuadro de esta paciente?

A Insulitis autoinmunitaria
B Mutación del gen de la glucocinasa
C Genotipo HLA-DR3/HLA-DR4
D Resistencia periférica a la insulina
E Daño inducido por virus de las células β de los islotes

47 Una mujer de 40 años lleva con dolor torácico de esfuerzo 2 meses. Hace 1 mes tuvo una neumonía y se cultivó *Streptococcus pneumoniae* en el esputo. La exploración física revela un índice de masa corporal de 35. La glucemia medida al azar es 132 mg/dl. Al día siguiente, la glucemia en ayunas es 120 mg/dl y a los dos días, 122 mg/dl. Se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa oral y la

glucemia es 240 mg/dl a las 2 h de recibir la dosis de glucosa convencional de 75 g. En función de estos datos, se le prescribe una tiazolidinediona (TZD) oral. Tras 2 meses de tratamiento, la glucemia en ayunas pasa a ser 90 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que guarde relación con el efecto beneficioso de la TZD en esta paciente?

A Activación de los receptores nucleares PPARγ en los adipocitos
B Menor producción de autoanticuerpos frente a la insulina
C Mayor densidad de receptores para la insulina en los adipocitos
D Aumento de la semivida de la insulina plasmática circulante
E Menor secreción de glucagón por una célula de los islotes de Langerhans
F Regeneración de las células β en los islotes de Langerhans

48 Se realiza un seguimiento longitudinal de una familia durante dos generaciones. Cuatro de ocho hijos desarrollan una hiperglucemia antes de los 18 años. Se demostró que tenían autoanticuerpos frente a los islotes en el suero. Los *loci* del CPH I y II eran parecidos. El tratamiento con inyecciones de insulina normaliza la concentración de HbA_{1c}. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que produzca esta enfermedad?

A Alteración del ión para el canal cloruro
B Trisomía del cromosoma 21
C Mutación del gen de la glucocinasa
D Resistencia periférica a la insulina
E Pérdida de tolerancia de los linfocitos T



49 Una mujer de 33 años ha presentado varios episodios de desmayo durante los últimos 6 meses. Todas las veces presentó un pródromo de mareo tras el cual se produjo una breve pérdida de consciencia. Después de cada episodio, la paciente se despierta y no tiene pérdida de la función motora ni sensitiva. La exploración física realizada después del episodio actual indica que está afebril, con una frecuencia cardíaca de 72 latidos/min, frecuencia respiratoria de 17 respiraciones/min y presión arterial de 120/80 mmHg. Las pruebas radiológicas encuentran una lesión de 0,5 cm en la cabeza del páncreas. La figura se corresponde con el aspecto histológico de esta lesión. ¿Cuál de los siguientes trastornos pancreáticos es más probable que tenga esta paciente?

A Pancreatitis necrosante aguda
B Adenocarcinoma
C Fibrosis quística
D Tumor neuroendocrino
E Seudoquiste

50 Un hombre de 43 años de Estocolmo, Suecia, lleva 3 meses con diarrea acuosa de bajo volumen. Actualmente presenta dolor epigástrico medio. El dolor no mejora con antiácidos de venta sin receta. En la exploración física se encuentra afebril y la palpación no identifica dolor abdominal ni masas. La endoscopia digestiva alta identifica múltiples úlceras poco profundas y bien delimitadas, de 0,5-1,1 cm de diámetro en la primera y segunda

porción del duodeno. Se le prescribe omeprazol. A los 3 meses se repite la endoscopia y se comprueba que todavía persisten las úlceras. ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio es más probable que esté elevado en el suero o el plasma?

A Gastrina
B Glucagón
C Insulina
D Somatostatina
E Polipéptido intestinal vasoactivo (VIP)

51 Un hombre de 39 años presenta cefalea, debilidad y aumento de 5 kg de peso durante los últimos 3 meses. En el mismo período ha tenido también depresión mental. La exploración física muestra edema facial. La temperatura es 36,9 °C y la presión arterial es 160/75 mmHg. Tiene estrías cutáneas en la parte inferior del abdomen y equimosis por todas las extremidades. La radiografía vertebral muestra una fractura por compresión de T11. Las pruebas de laboratorio indican una glucemia en ayunas de 200 mg/dl con un Na^+ sérico de 150 mmol/l y K^+ sérico de 3,1 mmol/l. La concentración de cortisol plasmático es 38 µg/dl a las 8 de la mañana y 37 µg/dl a las 6 de la tarde. La administración de dosis bajas y altas de dexametasona no consigue suprimir la concentración de cortisol plasmático y la excreción de 17-hidroxicorticoesteroides urinarios. La concentración de corticotropina plasmática es 0,8 pg/ml. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más probable que sufra este paciente?

A Adenoma de la adenohipófisis
B Adenoma de la corteza suprarrenal
C Feocromocitoma extrasuprarrenal
D Carcinoma de células pequeñas pulmonar
E Carcinoma medular de tiroides

52 Una mujer de 43 años refiere amenorrea y debilidad progresiva con aumento de peso durante los últimos 5 meses. En la última semana ha notado lumbalgia. Las constantes vitales incluyen una presión arterial de 155/95 mmHg. Muestra una prominente almohadilla grasa en la parte posterior del cuello y la espalda, además de plétora facial, hirsutismo y estrías en la piel abdominal. Las pruebas de laboratorio muestran Na^+, 139 mmol/l; K^+, 4,1 mmol/l; Cl^-, 96 mmol/l; CO_2, 23 mmol/l; glucosa, 163 mg/dl;

creatinina, 1,3 mg/dl; calcio, 8,9 mg/dl; y fósforo, 4,1 mg/dl. La concentración de ACTH sérica es baja. La radiografía vertebral muestra una reducción de la densidad ósea y una fractura por compresión de T9. ¿Cuál de los siguientes hallazgos radiológicos es más probable que se encuentre en esta paciente?

A Masa suprarrenal sólida de 10 cm en la TC abdominal
B Nódulo tiroideo frío en la gammagrafía tiroidea
C Masa hiliar pulmonar de 6 cm en la radiografía de tórax
D Masa de 5 cm retroperitoneal en la bifurcación aórtica en la RM pélvica
E Aumento de tamaño de la silla turca con erosión en la TC craneal

53 Una mujer de 73 años ha presentado malestar y pérdida de 10 kg de peso en los últimos 4 meses. También ha desarrollado tos crónica durante este período. Ha fumado 100 paquetes-año. La exploración física revela atrofia muscular y potencia motora 4/5 en todas las extremidades. La TC abdominal muestra un aumento de tamaño de ambas glándulas suprarrenales. La radiografía de tórax identifica una masa perihiliar de 6 cm en el pulmón derecho con llamativas adenopatías hiliares. Las pruebas de laboratorio muestran Na^+, 118 mmol/l; K^+, 6 mmol/l; Cl^-, 95 mmol/l; CO_2, 21 mmol/l; y glucosa, 49 mg/dl. La concentración de cortisol sérico a las 8 de la mañana es 9 ng/ml. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Amiloidosis
B Síndrome por corticotropina ectópica
C Meningococemia
D Carcinoma metastásico
E Adenoma hipofisario



54 Un hombre de 28 años, sano, refiere cefaleas durante las últimas 2 semanas. La exploración física no identifica ninguna alteración, salvo una presión arterial de 174/116 mmHg. La TC abdominal revela un aumento de tamaño de la suprarrenal derecha. Se realiza la suprarrenalectomía derecha y la figura se corresponde con el aspecto macroscópico de la muestra. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que tuviera el paciente en la sangre antes de la intervención?

A Hiperglucemia

B Hiperpotasemia
C Hiponatremia
D Baja concentración de corticotropina
E Baja concentración de insulina
F Baja concentración de renina

55 Una mujer de 40 años ha presentado episodios cada vez más frecuentes de debilidad con parestesias y hormigueo en las manos y pies durante el último año. La exploración física revela una presión arterial de 168/112 mmHg. Las pruebas de laboratorio muestran sodio, 142 mmol/l; potasio, 2,9 mmol/l; cloruro, 104 mmol/l; HCO_3^-, 28 mmol/l; y glucosa, 74 mg/dl. La actividad de la renina plasmática está reducida. ¿Cuál de los siguientes datos radiológicos es más probable que se encuentre en esta paciente?

A Hiperplasia nodular de la suprarrenal
B Masa pancreática
C Masa retroperitoneal
D Hiperplasia nodular de tiroides
E Masa mediastínica

56 Un niño de 5 años ha desarrollado durante los últimos 6 meses rasgos indicativos de pubertad. La exploración física revela presencia de características sexuales secundarias, como vello púbico y aumento de tamaño del pene. ¿Cuál de las siguientes características morfológicas es más probable que se encuentre en sus glándulas suprarrenales?

A Atrofia cortical
B Hiperplasia cortical
C Nódulo cortical
D Atrofia medular
E Hiperplasia medular
F Nódulo medular

57 Una lactante nace a término de una madre de 41 años de raza yupik tras un embarazo no complicado. Al poco tiempo del parto, el neonato desarrolla una hipotensión. La exploración física revela genitales ambiguos con un clítoris prominente. Las pruebas de laboratorio muestran Na^+, 131 mmol/l; K^+, 5,1 mmol/l; Cl^-, 93 mmol/l; CO_2, 18 mmol/l; glucosa, 65 mg/dl; creatinina, 0,4 mg/dl; testosterona, 50 mg/dl (normal: < 30 mg/dl); y cortisol, 2 µg/dl. La ecografía abdominal muestra aumento de tamaño de ambas

glándulas suprarrenales. ¿Cuál de las siguientes deficiencias enzimáticas es más probable que se encuentre en esta lactante?

A Aromatasa
B 11-hidroxilasa
C 21-hidroxilasa
D 17-α-hidroxilasa
E Oxidasa

58 Una mujer de 19 años, sana, se desmayó después de presentar un catarro leve el día previo. La exploración física muestra que está hipotensa y febril y tiene un exantema purpúrico. El frotis de sangre periférica identifica esquistocitos. Los estudios radiológicos observan un aumento de tamaño de las glándulas suprarrenales y extensas hemorragias corticales suprarrenales. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que sea responsable de la infección que explica estos hallazgos?

A Citomegalovirus
B *Histoplasma capsulatum*
C *Mycobacterium tuberculosis*
D *Neisseria meningitidis*
E *Streptococcus pneumoniae*

59 Una mujer de 29 años con lupus eritematoso sistémico ha recibido tratamiento con corticoesteroides sistémicos varios años por una nefritis lúpica recidivante. Se realiza una apendicectomía de urgencia por una apendicitis aguda. El segundo día del postoperatorio, la paciente desarrolla somnolencia, y presenta náuseas y vómitos graves. Posteriormente presenta hipotensión. Los hemocultivos son negativos y los datos de laboratorio incluyen Na^+, 128 mmol/l; K^+, 4,9 mmol/l; Cl^-, 89 mmol/l; CO_2, 19 mmol/l; glucosa, 52 mg/dl; y creatinina, 1,3 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes hallazgos morfológicos es más probable que se encuentre en la suprarrenal de esta paciente?

A Adenoma
B Atrofia
C Carcinoma
D Granulomas caseificantes
E Necrosis hemorrágica
F Hiperplasia nodular

60 Un hombre de 55 años ha presentado letargo progresivo

durante los últimos 7 meses. La exploración física muestra hiperpigmentación cutánea. Las constantes vitales incluyen temperatura de 36,9 °C, frecuencia cardíaca de 70 latidos/min, frecuencia respiratoria de 14 respiraciones/min y presión arterial de 95/65 mmHg. Las pruebas de laboratorio muestran una concentración de cortisol sérico de 3 µg/ml a las 8 de la mañana con una concentración de corticotropina sérica de 65 pg/ml. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que afecte a los pacientes con este trastorno?

A Diabetes mellitus de tipo 2
B Panarteritis nudosa clásica
C Tiroiditis de Hashimoto
D Lupus eritematoso sistémico
E Colitis ulcerosa

61 Una mujer de 44 años ha presentado debilidad e intranquilidad progresivas, además de diarrea crónica y pérdida de 5 kg de peso, en los últimos 7 meses. También dice que la piel parece más oscura, aunque no sale casi a la calle porque se siente demasiado cansada para las actividades lúdicas. En la exploración física, la paciente está afebril, con una presión arterial de 85/50 mmHg. La radiografía de tórax no revela alteraciones. Las pruebas de laboratorio incluyen Na^+, 120 mmol/l; K^+, 5,1 mmol/l; glucosa, 58 mg/dl; nitrógeno ureico, 18 mg/dl; y creatinina, 0,8 mg/dl. La concentración de corticotropina sérica es 82 pg/ml. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que explique estos hallazgos?

A Adenoma de adenohipófisis
B Destrucción autoinmunitaria de las suprarrenales
C Tumor neuroendocrino pancreático
D Carcinoma metastásico de origen pulmonar
E Infección suprarrenal por *Neisseria meningitidis*
F Sarcoidosis pulmonar y suprarrenal

62 Una mujer de 37 años afirma que, aunque la mayor parte del tiempo se encuentra bien, ha presentado episodios de palpitaciones, taquicardia, temblor, diaforesis y cefalea durante los últimos 3 meses. Cuando los síntomas empeoran, la presión arterial registrada se encuentra en valores de 155/90 mmHg. Un día se desmaya de forma súbita y es ingresada en el hospital, donde se consigue convertir con éxito una fibrilación ventricular a ritmo

sinusal. La exploración física no revela alteraciones significativas. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que se encuentre en este paciente?

A Menor concentración de cortisol sérico
B Reducción de la glucemia sérica
C Reducción de la potasemia
D Aumento de la concentración de T_4 libre en suero
E Aumento de las catecolaminas libres urinarias
F Aumento de la concentración urinaria de ácido homovainíllico (HVA)

63 Una mujer de 25 años da a luz a término tras un embarazo no complicado. La exploración física del neonato revela un abdomen aumentado de tamaño, sin otras alteraciones, salvo un ligero aumento de la presión arterial. La ecografía abdominal identifica una masa retroperitoneal en la suprarrenal. ¿Qué concentración es más probable que esté aumentada en relación con la lesión en este neonato?

A Concentración de corticotropina (ACTH) sérica
B Concentración de cortisol sérico
C Concentración de hormona de crecimiento sérica
D Concentración de prolactina sérica
E Concentración de catecolaminas libres en orina
F Concentración de ácido homovainíllico (HVA) urinario

64 Un hombre de 27 años ha tenido cefaleas frecuentes durante los últimos 3 meses. La exploración física revela que está afebril con una presión arterial de 140/85 mmHg. No presenta alteraciones neurológicas ni visuales, pero tiene un aumento de tamaño del tiroides. Las pruebas de laboratorio muestran un incremento de la concentración de calcitonina sérica. Se realiza una tiroidectomía total y en el corte se encuentran múltiples nódulos tumorales en ambos lóbulos. El estudio histológico de los nódulos indica que están constituidos por nidos de células neoplásicas separados por un estroma rico en amiloide. El endocrinólogo informa a los familiares del paciente de que pueden tener riesgo de desarrollar tumores similares y les recomienda someterse a un cribado genético. ¿Cuál de los siguientes hallazgos morfológicos es más probable que se encuentre en las glándulas suprarrenales de este paciente?

A Masas medulares bilaterales de 4 cm
B Atrofia cortical bilateral
C Hiperplasia cortical nodular bilateral
D Granuloma caseificante solitario
E Masa cortical solitaria de 1 cm con atrofia cortical contralateral
F Masa cortical hemorrágica solitaria de 12 cm de diámetro

65 Un hombre de 26 años desarrolla dolor abdominal grave de forma súbita. La exploración física encuentra intensa hipersensibilidad abdominal con defensa. Las pruebas de laboratorio muestran glucemia, 76 mg/dl; calcio, 12,2 mg/dl; fósforo, 2,6 mg/dl; creatinina, 1,1 mg/dl; y hormona paratiroidea, 62 pg/ml (valores normales 9-60 pg/ml). Durante la cirugía se identificaron y extirparon cuatro glándulas paratiroideas aumentadas de tamaño y se reimplantó la mitad de una. Tras la intervención se normalizó la calcemia. A los 3 años este paciente presentó un episodio de hemorragia digestiva alta. La endoscopia encontró múltiples úlceras gástricas, que fueron benignas en la biopsia. La RM abdominal identificó múltiples masas de 1-2 cm en el páncreas. Se intervino al paciente y se encontraron múltiples tumores. ¿Cuál de las siguientes neoplasias adicionales es más probable que tenga este paciente?

A Feocromocitoma suprarrenal
B Carcinoma endometrial
C Adenoma hipofisario
D Carcinoma anaplásico de células pequeñas pulmonar
E Carcinoma medular de tiroides

66 Un niño de 10 años ha tenido cefaleas frecuentes durante los últimos 5 meses. La exploración física no encuentra datos específicos. Las pruebas de laboratorio muestran electrólitos normales. La TC craneal no revela alteraciones óseas ni una hemorragia intracraneal. La RM cerebral muestra una masa sólida de 2 cm sin calcificaciones ni cambio quístico en la región inferior al esplenio del cuerpo calloso, superior a la lámina colicular y entre las regiones pulvinares talámicas derecha e izquierda. Dada su localización, es difícil extirpar por completo esta masa. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que tenga este paciente?

A Craneofaringioma
B Glioma hipotalámico

C Linfoma linfoblástico
D Carcinoma metastásico
E Pineoblastoma
F Prolactinoma

Respuestas

1 **D** Los prolactinomas son más frecuentes que otros adenomas hipofisarios secretores de hormonas. Además de galactorrea e infertilidad, esta paciente podría tener una reducción de la libido, y la amenorrea es secundaria a una secreción excesiva de prolactina. Los microadenomas pueden no ejercer un efecto compresivo sobre las estructuras circundantes, como el quiasma óptico, pero se pueden descubrir por sus efectos hormonales. La acromegalia se debe a un adenoma hipofisario secretor de hormona de crecimiento en un adulto. La enfermedad de Cushing es consecuencia de un adenoma hipofisario secretor de ACTH. El adenoma hipofisario secretor de hormona estimuladora del tiroides (TSH) es infrecuente, pero explicaría un aumento de las concentraciones de T_4 y TSH en un paciente hipertiroideo. La disfunción neurológica con hiponatremia secundaria a un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética suele ser consecuencia de un síndrome paraneoplásico asociado a un carcinoma de células pequeñas anaplásico pulmonar, aunque también podría relacionarse con un traumatismo craneal que lesiona las vías nerviosas y la neurohipófisis con liberación incontrolada de vasopresina (hormona antidiurética, ADH).

2 **A** Las mutaciones del gen que codifica la proteína que interacciona con el receptor de arilo hidrocarburo (AIP) explica la minoría de los adenomas hipofisarios productores de hormona de crecimiento (GH), pero puede aparecer en personas jóvenes en los casos familiares. La GH contrarresta el efecto de la insulina, y el exceso de GH puede conducir a una diabetes mellitus secundaria. En los adultos con epífisis cerradas no se produce gigantismo, pero sí acromegalia de los tejidos blandos. Pueden encontrarse mutaciones de ciclina D1 en algunos adenomas de paratiroides. El gen de fusión *PAX8-PPARG* se

puede encontrar en algunas neoplasias foliculares tiroideas. El gen supresor de tumores *PTEN* puede estar mutado en algunos tumores neuroendocrinos pancreáticos. El gen supresor de tumores *VHL* puede asociarse a algunos feocromocitomas.

3 **D** Esta paciente tiene un adenoma hipofisario no funcionante (de células nulas), que ha aumentado de tamaño comprimiendo y obliterando las células normales de la adenohipófisis con el consiguiente hipopituitarismo; el adenoma comprime también el quiasma óptico, produciendo una hemianopsia bitemporal. Aproximadamente un 25% de todos los tumores hipofisarios no son funcionantes. Las células β de los islotes de Langerhans pancreáticos elaboran la insulina. Las células principales de las paratiroides elaboran parathormona que aumenta la calcemia. Las células cromafines de la médula suprarrenal elaboran catecolaminas. Las células de la granulosa de la corteza suprarrenal elaboran corticoesteroides. Las células parafoliculares (células C) del intersticio tiroideo elaboran la calcitonina.

4 **B** La incapacidad de suprimir las concentraciones de hormona de crecimiento (GH) mediante la infusión de glucosa sugiere una producción autónoma de esta sustancia. Los síntomas del paciente indican acromegalia, y la causa más probable es un adenoma secretor de GH. La acromegalia provoca un aumento global de los tejidos blandos en adultos por los efectos anabólicos del aumento de GH. Dado que las epífisis de los huesos largos están cerradas en los adultos, no se observa un aumento de la talla o gigantismo, como cabría esperar en los niños con un adenoma hipofisario secretor de un exceso de GH. El aumento de la masa de los tejidos blandos se manifiesta con un aumento del número de pie o la talla de guante, síndrome del túnel del carpo y características faciales groseras. Esta mujer posiblemente tenga alterada la prueba de tolerancia a la glucosa, pero no nos indica la causa responsable de la diabetes mellitus, que en este caso es secundaria a la acromegalia. El prolactinoma cursaría con amenorrea y galactorrea en una mujer. El adenoma hipofisario secretor de hormona estimuladora del tiroides (TSH) podría provocar un hipertiroidismo con aumento del metabolismo basal, lo que debería traducirse en una pérdida de

peso; además, la intolerancia a la glucosa no es una característica del hipertiroidismo. Los tumores hipofisarios funcionantes se pueden detectar clínicamente antes de que alcancen un tamaño suficiente para producir síntomas por presión, como trastornos visuales. El síndrome de Cushing secundario a una neoplasia cortical suprarrenal productora de cortisol se debería asociar a intolerancia a la glucosa, hipertensión y obesidad troncal, pero no a un aumento global de los tejidos blandos.

5 **B** El síndrome de la silla vacía es un proceso poco frecuente, que suele afectar a mujeres obesas, y que se debe a la herniación de la aracnoides a través del diafragma de la silla. Aunque el aumento de presión puede reducir el tejido hipofisario por una atrofia compresiva, típicamente existe una cantidad suficiente de tejido adenohipofisario para prevenir el hipopituitarismo. Sin embargo, esta herniación puede producir un efecto de «sección del tallo» con pérdida de la inhibición de la prolactina e hiperprolactinemia. Un craneofaringioma es un tumor destructivo, que suele aparecer en edades más tempranas. La hemocromatosis puede interferir en la función de los órganos y ocasionar hipopituitarismo; la enfermedad suele aparecer de forma más tardía en las mujeres que en los hombres (en la séptima década en ellas y la quinta en ellos), dadas las diferencias en la pérdida fisiológica de hierro (hemorragia menstrual). El síndrome de Prader-Willi es un ejemplo de impronta genómica con disfunción hipotalámica que afecta a niños prepuberales. El prolactinoma puede ser un microadenoma, pero la RM en este caso descarta este diagnóstico por la densidad líquida de la silla (en la RM potenciada en T_2). Si la paciente tuviera un síndrome de Sheehan tras el embarazo, habría presentado un hipopituitarismo en meses, no en años.

6 **D** El síndrome de Sheehan o necrosis hipofisaria posparto se debe al aumento de tamaño de la hipófisis durante el embarazo, que condiciona que la irrigación quede más comprometida, de forma que la hipotensión intraparto con complicaciones hemorrágicas obstétricas (placenta *accreta* en este caso) predispone al infarto. La adenohipófisis tiene el máximo riesgo comparada con la neurohipófisis. Las pruebas de laboratorio de

esta paciente sugieren una insuficiencia suprarrenal, y su incapacidad para amamantar al niño se debe a la falta de prolactina; la amenorrea sugiere que las concentraciones de hormona estimuladora de los folículos y luteinizante son deficientes. Si la paciente sufriera una insuficiencia suprarrenal primaria, las concentraciones de corticotropina (ACTH) estarían aumentadas, pero en este caso la concentración de ACTH es baja por la insuficiencia de la adenohipófisis. Dado que el hipotálamo no está afectado, la hormona liberadora de corticotropina seguiría presente. Posiblemente, la liberación de oxitocina de la neurohipófisis no se afecte. La paciente no tiene una diabetes insípida por falta de hormona antidiurética, porque es menos probable que se afecte la neurohipófisis. La producción hipotalámica de dopamina no está afectada.

7 **E** La diabetes insípida se produce por la falta de hormona antidiurética (ADH), denominada también *arginina vasopresina*. No se reabsorbe agua libre en los túbulos colectores renales, lo que explica el aumento de excreción de una orina diluida con una mayor osmolalidad del suero e hipernatremia. La corticotropina estimula las suprarrenales, sobre todo aumentando la secreción de cortisol. La prolactina está implicada en la lactancia. Las deficiencias de prolactina y melatonina no producen efectos clínicos específicos reconocibles en los hombres.

8 **D** El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) determina un aumento de la reabsorción de agua libre en el riñón, con la consiguiente hiponatremia. El SIADH suele ser paraneoplásico y el candidato más probable de entre todos los tumores malignos es el carcinoma anaplásico de células pequeñas (en avena) pulmonar (de origen neuroendocrino y que afecta de forma casi exclusiva a los fumadores). Los adenomas de la adenohipófisis no producen hormona antidiurética (ADH), que se libera en la neurohipófisis. Los carcinomas corticosuprarrenales pueden secretar cortisol o esteroides sexuales, pero no ADH. Los feocromocitomas secretan catecolaminas. Los carcinomas de células renales se asocian a diversos efectos paraneoplásicos, pero el SIADH no es muy probable.

9 **A** Los craneofaringiomas son neoplasias infrecuentes, habitualmente supraselares; se producen típicamente en individuos jóvenes. Se cree que se originan a partir de restos embriológicos de la bolsa de Rathke en la región hipofisaria. Se trata de neoplasias agresivas, que infiltran y destruyen los tejidos circundantes, lo que dificulta la extirpación completa. A pesar de su comportamiento agresivo, están constituidos por estructuras escamoides de aspecto benigno o tejidos parecidos al diente primitivo. El aumento de prolactina se produce por el efecto de «sección del tallo», y la hipernatremia es consecuencia de una diabetes insípida causada por la destrucción del hipotálamo, la neurohipófisis o ambas estructuras. Es muy poco probable una metástasis en esta localización en un paciente joven. La neoplasia endocrina múltiple (MEN) de tipo 1 incluye adenomas hipofisarios, pero no craneofaringiomas. La MEN 2 no afecta a la hipófisis. Los prolactinomas, igual que los adenomas hipofisarios, pueden hacer que la silla aumente de tamaño cuando son macroadenomas, pero no son supraselares ni destruyen las estructuras circundantes.

10 **D** La tormenta tiroidea es una urgencia médica. No se dispone de suficiente tiempo para esperar a los resultados confirmatorios de las pruebas tiroideas. Se encuentra un aumento de las concentraciones de catecolaminas y el β-bloqueante propranolol ayuda a prevenir la muerte por insuficiencia cardíaca. El paracetamol y las compresas de hielo son mejores opciones para el tratamiento de la fiebre aislada. El propiltiouracilo (PTU) es el fármaco antitiroideo que muestra una acción más rápida (horas) y se administra con yodo para reducir la liberación de hormona tiroidea preformada. La fiebre y los datos complementarios no se corresponden con lo que cabría esperar en una infección aguda.

11 **F** El circuito de retroalimentación normal de las hormonas tiroideas periféricas (T_3 y T_4) sobre las células basófilas (tirótropas) de la adenohipófisis regula la liberación de TSH (que está sometida al control trópico por parte de la TRH hipotalámica). Cuando los pacientes con una insuficiencia tiroidea primaria, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo con mixedema en adultos, no tienen suficientes

células foliculares tiroideas funcionantes para elaborar hormonas tiroideas, se producirá un aumento de TSH, como sucede en este caso, acompañado de una concentración de T_4 baja. Las concentraciones de TRH del hipotálamo son muy inferiores y resulta más difícil medirlas para estimar la correlación con la función tiroidea. La determinación de TSH es la herramienta de cribado más útil para el hipertiroidismo. Los axones de la neurohipófisis liberan ADH y oxitocina producidas en el hipotálamo, mientras que las células gliales modificadas denominadas pituicitos no liberan hormonas. Las células parafoliculares tiroideas o células «C» elaboran la calcitonina.

12 **E** El cretinismo es un proceso infrecuente en los lugares en los que se dispone de cribado neonatal habitual para la determinación y tratamiento desde el momento del parto del hipotiroidismo. El hipotiroidismo que afecta a niños mayores y adultos se llama *mixedema.* La falta de cortisol por una insuficiencia suprarrenal primaria produce la enfermedad de Addison, o la deficiencia de 21-hidroxilasa podría conducir a una hiperplasia suprarrenal congénita. La deficiencia absoluta de insulina provoca la diabetes mellitus de tipo 1, pero esta enfermedad se desarrolla, en general, en la infancia o más tarde y se asocia a pérdida de peso. No se conocen cuadros clínicos secundarios a la deficiencia de noradrenalina o somatostatina.

13 **F** Los folículos linfoides y los grandes nódulos rosados de células de Hürthle que se muestran en esta microfotografía son típicos de la tiroiditis de Hashimoto. Los títulos de anticuerpos frente a la peroxidasa tiroidea (antimicrosómicos) y frente a la tiroglobulina están típicamente aumentados en los pacientes con una tiroiditis de Hashimoto cuando el tiroides sigue siendo hiperplásico. En la fase tardía «quemada» de la tiroiditis de Hashimoto, los anticuerpos pueden ser indetectables y solo se encuentra hipotiroidismo. La concentración de la hormona estimuladora del tiroides (TSH) indica si se trata de un proceso tiroideo primario. Cuando el paciente está hipotiroideo y se sospecha un proceso tiroideo primario (como una tiroiditis de Hashimoto), la concentración de TSH será elevada. Cuando el paciente tiene un hipertiroidismo y se sospecha un proceso tiroideo primario (como la enfermedad de Graves), la

concentración de TSH será baja. Los anticuerpos frente al centrómero son característicos de la esclerodermia limitada (síndrome CREST). Los anticuerpos frente al ADN bicatenario son muy específicos del lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos anti-Jo-1 se pueden encontrar en la polimiositis. El aumento de anticuerpos antimitocondriales indica una cirrosis biliar primaria. Los anticuerpos frente a las ribonucleoproteínas se encuentran en algunas enfermedades del colágeno vascular, como la enfermedad mixta del tejido conjuntivo.

14 **C** La tiroiditis granulomatosa subaguda (tiroiditis de de Quervain) es un proceso autolimitado, que puede tener un origen vírico, dado que muchos casos vienen antecedidos por una infección respiratoria alta. El hipertiroidismo transitorio se debe a la destrucción inflamatoria de los folículos tiroideos con liberación de hormona tiroidea. El coloide liberado se comporta como un cuerpo extraño y provoca una inflamación granulomatosa florida en el tiroides. La tiroiditis de Hashimoto produce un aumento de tamaño transitorio del tiroides, pero, en general, no se asocia a dolor ni hipertiroidismo. Las neoplasias tiroideas no se asocian típicamente a signos ni síntomas inflamatorios y no suelen ser funcionantes. El bocio multinodular tóxico no produce signos inflamatorios y no impide la funcionalidad.

15 **B** La existencia de autoanticuerpos séricos en este paciente con un hipertiroidismo transitorio sugiere una tiroiditis de Hashimoto («hashitoxicosis»), pero la variante denominada *tiroiditis linfocítica subaguda indolora* puede afectar a 1 de cada 20 mujeres tras el parto, y una minoría de ellas evolucionan a un hipotiroidismo. Las mutaciones del protooncogén *RET* se asocian a carcinoma papilar y medular de tiroides. La radioterapia sobre el tiroides puede ocasionar un hipotiroidismo, pero es poco probable que la radioterapia durante la infancia ocasionara un hipotiroidismo a los 60 años. La radioterapia también puede predisponer al desarrollo de un carcinoma papilar, pero estos tumores no suelen afectar a la secreción de hormona tiroidea. La deficiencia de yodo puede provocar también un hipotiroidismo, pero debería acompañarse de bocio. Los antecedentes de infección vírica preceden en

ocasiones a una tiroiditis granulomatosa subaguda, que es típicamente una enfermedad autolimitada que dura desde semanas a 2 meses.

16 **B** El exoftalmos es una característica que afecta aproximadamente a un 40% de los pacientes con una enfermedad de Graves. El tiroides hiperfuncionante condiciona un aumento de la concentración de T_4 y la retroalimentación positiva sobre la hipófisis reduce la secreción de hormona estimuladora del tiroides (TSH). Se encuentra una concordancia aproximada del 50% para la enfermedad de Graves entre los gemelos idénticos. La naturaleza autoinmunitaria de este trastorno se pone de manifiesto en la asociación al HLA-DR3 y en la presencia de un autoanticuerpo frente al receptor de TSH, que activa la secreción de T_4. El aumento de la concentración de hormona liberadora de tirotropina (TRH) aumentará la concentración de TSH y de T_4, pero se producirá una retroalimentación en la hipófisis y el hipotálamo, y es infrecuente que haya incrementos anormales de TRH. Los anticuerpos frente a la peroxidasa tiroidea pueden encontrarse en la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves, aunque los títulos son máximos en la primera. Es menos probable encontrar concentraciones elevadas de T_3 que de T_4.

17 **A** El epitelio cilíndrico alto con repliegues papilares y el aspecto festoneado del coloide son característicos de la enfermedad de Graves, que produce un hipertiroidismo. La enfermedad se debe a autoanticuerpos que se unen al receptor de la hormona estimuladora del tiroides (TSH) e imitan la acción de la TSH. La deficiencia de yodo en la dieta puede producir un aumento de tamaño compensador difuso en el tiroides, pero no provoca hipertiroidismo. La radioterapia del cuello es un factor predisponente para la aparición de un carcinoma papilar de tiroides. La deficiencia de hormonas tiroideas maternas puede afectar al desarrollo mental del niño. Las mutaciones del protooncogén *RET* pueden asociarse al carcinoma papilar y medular de tiroides. Estas neoplasias no condicionan un aumento de tamaño difuso del tiroides, hipertiroidismo ni aumento difuso de la captación de yodo radiactivo. Los tumores suelen ser «nódulos fríos» en la gammagrafía tiroidea.

18 **E** Los hallazgos clínicos de este caso sugieren un hipertiroidismo y el aumento de captación difusa confirma que la enfermedad de Graves es la causa probable, porque la concentración de la hormona estimuladora del tiroides (TSH) es bastante baja. Las inmunoglobulinas estimuladoras del tiroides que se asocian a este proceso autoinmunitario provocan una hiperplasia difusa del tiroides con hiperfunción del mismo, y aparecen proyecciones papilares revestidas por células epiteliales cilíndricas altas. La destrucción de los folículos tiroideos con agregados linfoides y metaplasia de células de Hürthle caracteriza a la tiroiditis de Hashimoto. En el bocio aparecen folículos grandes y células epiteliales aplanadas; la mayor parte de los pacientes son eutiroideos. La destrucción folicular y la presencia de células gigantes se describen en la tiroiditis granulomatosa. Los nidos de células en el seno de un estroma hialino que se tiñe con rojo Congo son característicos del carcinoma medular, que puede ser multifocal, pero no es difuso ni produce un hipertiroidismo.

19 **A** El bocio difuso no tóxico se debe, en general, a una deficiencia de yodo en la dieta. Este proceso es endémico en regiones del mundo con deficiencia de yodo (áreas montañosas de interior), pero también puede aparecer de forma esporádica. Como sucede en este caso, los pacientes son típicamente eutiroideos. El adenoma folicular no suele tener una hiperfunción como para producir un exceso de hormona tiroidea; la mayor parte de estas lesiones son nódulos no funcionantes «fríos», que no afectan al tiroides de forma difusa. La tiroiditis linfocítica crónica, como la tiroiditis de Hashimoto, puede producir inicialmente un aumento de tamaño tiroideo, pero al final se observa atrofia del tiroides con el consiguiente hipotiroidismo. Los carcinomas papilares suelen producir un efecto de masa o causan metástasis y no influyen sobre la función tiroidea. La tiroiditis granulomatosa subaguda puede ocasionar una hiperplasia difusa y a veces un hipertiroidismo transitorio, aunque la evolución típica de esta enfermedad no supera las 6-8 semanas. La enfermedad de Plummer, o bocio multinodular tóxico, se produce cuando existe un nódulo tiroideo hiperfuncionante en un bocio.

20 **A** La paciente ha desarrollado un bocio esporádico. Las verduras de la familia *Brassicaceae,* entre las que se incluyen las coliflores, los nabos y las coles de Bruselas, contienen glucosinolato, que puede descomponerse y liberar tiocianato, un producto intermedio que interfiere en la síntesis de hormona tiroidea. Este tipo de sustancia se denomina *bociógena.* Las personas jóvenes con mayor necesidad de hormona tiroidea tienen más riesgo. Las habas contienen componentes oxidantes, que inducen la hemólisis en personas con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (6GPD). Además, las habas contienen azúcares de cadena larga, que no pueden ser digeridos con las enzimas intestinales humanas, por lo que se quedan para fermentación por las bacterias cólicas liberadoras de gas (flatulencia). El pescado contiene ácidos grasos ω-3, que protegen frente a la aterogenia. El llantén contiene almidón, como pronto descubre aquella persona que los toma confundiéndolos con plátanos; se pueden encontrar casos infrecuentes de alergia alimentaria frente a esta sustancia. Los hongos que crecen en el centeno mohoso producen una intoxicación por derivados ergotamínicos.

21 **E** Un bocio difuso de larga evolución puede convertirse en un bocio multinodular, y uno de los nódulos puede hacerse hiperfuncionante y ocasionar la denominada enfermedad de Plummer. Este nódulo «tóxico» ha adquirido características de crecimiento y funcionales parecidas a una neoplasia benigna, como el adenoma folicular, pero con funcionalidad. Algunos adenomas foliculares tóxicos infrecuentes pueden tener más función y cursar como nódulos «calientes», pero el resto de la glándula suele ser atrófica, no hiperplásica. En la enfermedad de Graves, el tiroides está aumentado de tamaño, pero en general de forma difusa, sin aumento de la nodularidad, por lo que toda la glándula muestra una captación aumentada. Además, algunas características, como la dermopatía y la oftalmopatía, se asocian a la enfermedad de Graves y faltan en la enfermedad de Plummer. Puede encontrarse una hiperplasia tiroidea difusa en las fases iniciales de una tiroiditis de Hashimoto con hiperfuncionamiento transitorio, pero con el tiempo el tiroides se atrofia y se produce un hipotiroidismo. Es muy raro que un

carcinoma papilar sea funcionante y, aunque esto provocara un nódulo caliente, el resto del tiroides no estaría hiperplásico.

22 **D** Los nódulos tiroideos solitarios «fríos» y sólidos (no quísticos) pueden ser neoplásicos y, en general, se corresponden a adenomas foliculares benignos, que no modifican la función tiroidea. Si el nódulo fuera hiperfuncionante y ocasionara un hipertiroidismo, sería «caliente» en la gammagrafía y suprimiría la hormona estimuladora del tiroides (TSH). Las inmunoglobulinas frente al receptor de TSH pueden encontrarse en la enfermedad de Graves, y en este cuadro también existe una concentración elevada de T_4 y baja de TSH, pero la enfermedad tiroidea sería difusa. Las concentraciones de T_3 no suelen medirse. En la tiroiditis de Hashimoto (y la enfermedad de Graves) se pueden identificar anticuerpos antimicrosómicos y frente a la tiroglobulina, pero la tiroiditis es difusa y no suele ocasionar un nódulo solitario. Al evolucionar la tiroiditis de Hashimoto, la reducción de la función tiroidea puede disminuir la concentración de T_4 y aumentar la de TSH, dato típico de la insuficiencia tiroidea primaria.

23 **C** Un nódulo tiroideo bien diferenciado, no infiltrante e hiperfuncionante sugiere un adenoma folicular «tóxico», y un porcentaje elevado de estos adenomas tienen mutaciones activadoras de la vía de transmisión de señales del receptor de la hormona estimuladora del tiroides (TSH), que afectan al propio receptor de TSH o la proteína G asociada. La mutación del gen *GNAS1* se encuentra en el síndrome de McCune-Albright y algunos adenomas hipofisarios. El gen de fusión *PAX8-PPARG* se describe en algunos carcinomas foliculares de tiroides. La activación del gen *RET* se produce en los carcinomas papilares de tiroides. La sobreexpresión del gen de la ciclina D1 *(CCND1)* es característica de los adenomas de paratiroides. El gen *AIRE* regula la expresión de los autoantígenos del timo, y la mutación de este gen provoca la poliendocrinopatía autoinmunitaria, que afecta a las glándulas suprarrenales, paratiroides, gónadas y células parietales gástricas con destrucción y consiguiente hipofunción de estos tejidos.

24 **D** Los carcinomas papilares de tiroides pueden presentarse inicialmente con metástasis y los ganglios linfáticos locales son

su localización más frecuente. Puede que el tumor primario no se detecte como nódulo palpable. El carcinoma papilar es el tumor tiroideo maligno más frecuente. Las metástasis tiroideas son poco frecuentes. Los carcinomas anaplásicos son infrecuentes, pero se trata de lesiones agresivas y localmente invasivas. Los carcinomas foliculares y medulares suelen diseminarse por vía hematógena. El carcinoma de paratiroides suele ser una masa infiltrativa local y el calcio sérico está normalmente bastante elevado en estos pacientes. El linfoma linfocítico, que es la variante tisular de la leucemia linfática crónica, es raro a la edad de esta paciente y suele afectar a múltiples ganglios, y se asocia a un aumento del recuento leucocítico.

25 **D** La arquitectura papilar de este nódulo, con presencia de células de núcleos claros, es típica del carcinoma papilar. No existe una entidad que se llame adenoma papilar. Estos cambios nucleares confirman el diagnóstico de carcinoma papilar, aunque el patrón sea folicular. Aproximadamente un 30% de todos los carcinomas papilares de tiroides presentan una mutación activadora de los protooncogenes *RET* o *NTRK1,* que pertenecen a la familia de tirosina cinasas receptoras, que transducen las señales extracelulares para el crecimiento y la diferenciación celular, y que ejercen muchos de los efectos distales a través de la vía de la MAP cinasa, que es ubicua. La deficiencia de yoduro determina una hiperplasia uniforme del tiroides, porque la secreción de hormona estimuladora del tiroides (TSH) aumenta cuando disminuye la síntesis de T_4. La autoinmunidad juega un papel en la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves, lesiones que no evolucionan a carcinoma, aunque la primera puede asociarse a un linfoma no hodgkiniano. Los bociógenos interfieren en la síntesis de hormona tiroidea y tienen efectos parecidos a la deficiencia de yoduros, con riesgo de hipotiroidismo, pero no se malignizan. Las infecciones víricas pueden provocar una tiroiditis subaguda, no un carcinoma.

26 **B** Puede resultar difícil diferenciar el carcinoma folicular del adenoma folicular, salvo que existan datos microscópicos de invasión, como muestra la figura, de forma que en las muestras

de punción-aspiración con aguja fina se debería emplear el término *neoplasia folicular.* Los carcinomas foliculares suelen ser indolentes, pero pueden provocar metástasis y se distinguen entonces con facilidad de los adenomas foliculares. Los carcinomas foliculares muestran mucha menos tendencia a afectar los ganglios que los carcinomas papilares, pero suelen metastatizar en sitios lejanos, como hueso, pulmón e hígado. Si las lesiones metastásicas son funcionantes, absorberán el yodo radiactivo. Es poco probable que la tiroiditis curse como una masa, porque se afecta típicamente toda la glándula. El carcinoma medular es menos frecuente que el folicular. En los pacientes con una tiroiditis de Hashimoto aumenta el riesgo de linfoma no hodgkiniano, pero los linfomas no suelen destruir el hueso, aunque pueden afectar a la médula.

27 **A** Las características histológicas, el tamaño grande y la agresividad de esta neoplasia son compatibles con un carcinoma anaplásico. El pronóstico es malo. Otros tumores tiroideos malignos suelen formar masas solitarias o multifocales (en el caso de los carcinomas medulares o papilares) sin células fusiformes; es menos probable que infiltren de forma extensa, aunque pueden producirse metástasis, sobre todo a los ganglios locales en el caso de los carcinomas papilares o el pulmón en los carcinomas foliculares. Los linfomas no contienen células fusiformes y no suelen ser infiltrantes.

28 **A** Los carcinomas medulares se originan en las células C o parafoliculares del tiroides, que se originan en la cresta neural. Por tanto, se trata de células neuroendocrinas, que sintetizan calcitonina. En este tumor es frecuente encontrar un estroma amiloide. Estos tumores son esporádicos en un 70% de los casos, pero pueden ser familiares y formar parte de las neoplasias endocrinas múltiples de tipo 2A y 2B. El CD3 es un marcador útil de algunas neoplasias linfoides. Aunque diversos tejidos pueden mostrar positividad para los receptores de estrógenos, este dato no tiene importancia clínica en el tiroides. La tinción con la hormona paratiroidea permite distinguir un carcinoma de paratiroides. La vimentina marca las neoplasias sarcomatosas y la citoqueratina permite determinar si la neoplasia es epitelial.

29 **D** Cuando un paciente desarrolla una hipercalcemia, se debe

plantear un trastorno de las paratiroides o un tumor maligno visceral. El aumento de la hormona paratiroidea (PTH) sugiere un hiperparatiroidismo primario. La causa más frecuente de este cuadro es el adenoma de paratiroides. El hiperparatiroidismo secundario, que suele deberse a una insuficiencia renal, se descarta cuando la concentración de fosfato inorgánico sérico es baja, porque el fosfato se retiene en la insuficiencia renal crónica. La hipervitaminosis D puede provocar una hipercalcemia por aumento de la absorción de calcio, pero en este caso se espera que las concentraciones de PTH se encuentren cerca del límite inferior de la normalidad, porque se suprimen por retroalimentación. Las concentraciones de PTH sérica cerca del límite superior de la normalidad indican una secreción autónoma de PTH no regulada por la hipercalcemia. Aunque los carcinomas medulares de tiroides suelen expresar la calcitonina en inmunohistoquímica y en ocasiones la concentración plasmática de esta sustancia está aumentada, típicamente no se encuentra una reducción importante del calcio sérico como consecuencia.

30 **C** Una causa frecuente de hipercalcemia con repercusión clínica en los adultos son los tumores malignos. Cuando un paciente consulta por una hipercalcemia, se debería descartar un trastorno de las paratiroides o un tumor visceral maligno. La hipercalcemia asociada a los tumores malignos puede deberse a la presencia de metástasis osteolíticas o a un síndrome paraneoplásico por la secreción de una proteína relacionada con la hormona paratiroidea en la neoplasia. Las metástasis de tumores frecuentes, como los carcinomas de mama, pulmón o riñón, son mucho más frecuentes que los carcinomas de paratiroides, que suelen ser localmente agresivos. La insuficiencia renal crónica provoca la retención de fosfato, que suele reducir la concentración de calcio sérico y produce un hiperparatiroidismo secundario; la calcemia se mantiene en valores casi normales. La tuberculosis, una enfermedad granulomatosa, puede asociarse a hipercalcemia por la regulación al alza del 1,25-dihidroxicolecalciferol en los macrófagos activados; las lesiones óseas líticas secundarias a una tuberculosis son infrecuentes. El carcinoma de paratiroides

es una causa poco frecuente de hiperparatiroidismo y las metástasis óseas de estos tumores son raras. En teoría, la toxicidad por la vitamina D puede producir una hipercalcemia, pero este cuadro es infrecuente.

31 **B** Una neoplasia de paratiroides, posiblemente un adenoma, está produciendo una hipercalcemia complicada por una osteítis fibrosa quística en el dedo. La hiperplasia de paratiroides con afectación de todas las glándulas es menos probable. Los carcinomas de paratiroides son infrecuentes, por suerte, dado que son tumores agresivos y las concentraciones de calcio sérico pueden ser tan elevadas que aparezcan arritmias cardíacas. La mutación de *MEN1* es la segunda mutación más frecuente en los tumores de paratiroides, tras la inversión con sobreexpresión de *CCND1*, el gen que codifica la ciclina D1. *MEN1* es un gen supresor de tumores, cuya pérdida no solo se describe en los tumores paratiroideos esporádicos, sino también en la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 (MEN). Las mutaciones de *GNAS1* se describen en un 40% de los adenomas hipofisarios de células somatótropas (productores de hormona de crecimiento). La mutación de *TP53* puede encontrarse en los carcinomas anaplásicos de tiroides. La mutación del gen *RET* se describe en los carcinomas medulares de tiroides. La mutación *VHL* puede encontrarse en algunos feocromocitomas de pacientes con enfermedad de von Hippel-Lindau.

32 **D** La lesión renal crónica, que suele producir una nefropatía terminal, con insuficiencia renal crónica puede producir un hiperparatiroidismo secundario en relación con una menor excreción renal de fosfato. La consiguiente hiperfosfatemia reduce la concentración de calcio sérico y estimula la actividad de las glándulas paratiroideas. Dada la disminución de la función del parénquima renal, también se reducirá la vitamina D activa, con la consiguiente disminución de la absorción del calcio de la dieta. La insuficiencia renal no provoca ninguna de las otras lesiones endocrinas enumeradas.

33 **C** La extirpación o lesión inadvertida de las paratiroides durante la cirugía del tiroides puede producir una hipocalcemia secundaria a un hipoparatiroidismo. Esta es la causa más frecuente de hipoparatiroidismo. Los pacientes con una

hipocalcemia presentan irritabilidad neuromuscular, espasmo carpopedio y, a veces, convulsiones. Las concentraciones de anticuerpos frente a la tiroglobulina no tienen utilidad para el diagnóstico de las enfermedades tiroideas quirúrgicas. La determinación de la calcitonina no resulta útil para valorar la situación del metabolismo del calcio. Las concentraciones de la hormona paratiroidea disminuyen cuando se produce la extirpación inadvertida de las glándulas paratiroides durante la cirugía tiroidea, pero la calcemia es el mejor indicador inmediato de hipoparatiroidismo y es una prueba más accesible en los laboratorios. La concentración de la hormona estimuladora del tiroides (TSH) puede aumentar cuando el paciente queda hipotiroideo después de la cirugía y no recibe aporte de hormona tiroidea exógena, pero no se trata de un problema inmediato.

34 **E** La sobredosis de insulina produce un coma hipoglucémico. Este paciente no tiene péptido C detectable, lo que indica que no existe una producción endógena de insulina, algo típico de la diabetes de tipo 1. La elevada concentración de insulina es consecuencia del uso de insulina exógena por parte del paciente como tratamiento de su diabetes mellitus. Dado que no ha comido suficiente para mantener una glucemia adecuada, este paciente ha desarrollado una hipoglucemia. La cetosis en este caso se debe a una menor ingesta alimentaria y cualquier persona que no consuma suficientes calorías desarrollará una cetosis. La cetoacidosis de la diabetes mellitus de tipo 1 se asociaría a una hiperglucemia. El infarto agudo de miocardio es una complicación que suele aparecer en fases tardías de la diabetes, cuando existe más ateroesclerosis. Este paciente no tiene una fuente de sepsis evidente. La insulina no se inyecta en el torrente circulatorio y las inyecciones casi nunca se complican con una infección. La insuficiencia hepática no es una complicación típica de la diabetes mellitus. El coma hiperosmolar puede complicar la diabetes mellitus de tipo 2.

35 **E** La presencia de los alelos HLA-DR3 y HLA-DR4 de la región del CPH de clase II se asocia a la diabetes mellitus de tipo 1 de forma muy importante. Los autoanticuerpos frente a los antígenos de las células de los islotes, como la ácido glutámico

descarboxilasa, aparecen años antes de que se desarrolle una diabetes franca clínicamente. La insulitis causada por la infiltración por linfocitos T ocurre antes de que existan síntomas o en fases muy precoces de la evolución de la diabetes mellitus de tipo 1. La insulitis de la diabetes mellitus de tipo 1 se asocia a un aumento de la expresión de moléculas del CPH de clase I y expresión aberrante de las moléculas del CPH de clase II en las células β de los islotes. Estos cambios vienen mediados por citocinas, como el interferón γ elaborado por los linfocitos CD4+ (junto con los linfocitos CD8+). La infiltración aguda por neutrófilos con necrosis y la hemorragia caracterizan a la pancreatitis aguda. La fibrosis extensa con sustitución grasa del páncreas es propia de los pacientes con una fibrosis quística que sobreviven durante décadas. La hiperplasia de los islotes se describe en lactantes de madres diabéticas. Puede depositarse amiloide en los islotes de algunos pacientes con diabetes mellitus de tipo 2. El estroma fibroso con mínima inflamación crónica e islotes normales dispersos es propio de la pancreatitis crónica.

36 **B** Esta paciente presenta una diabetes juvenil de inicio en la madurez (MODY), que representa menos del 5% de los casos de diabetes mellitus y que se relaciona con defectos genéticos específicos que afectan a las células de los islotes y se heredan de forma autosómica dominante. En esta paciente con MODY2, existe una mutación inactivadora de la glucocinasa, que aumenta el umbral de las células β para la liberación de insulina, y la hiperglucemia es leve. La MODY3 es más frecuente y se debe a mutaciones en el factor nuclear de los hepatocitos 1α; este cuadro se asocia a un defecto grave de la secreción de insulina en respuesta a la glucosa y condiciona una hiperglucemia más grave. La pérdida de la secreción de glucagón no tiene efectos significativos ni produce hiperglucemia. Los receptores de GLUT4 se encuentran en las células diana de la insulina, como los adipocitos y los miocitos, pero los casos de diabetes secundarios a mutaciones de los receptores de GLUT son infrecuentes. Las mutaciones que afectan a la propia insulina son raras. Determinados alelos del CPH predisponen a la diabetes mellitus de tipo 1 y 2, pero no están implicados en las

vías del metabolismo de la insulina.

37 **A** La diabetes mellitus de tipo 1 no desarrolla clínica franca hasta que se produce una depleción importante de las células β y las concentraciones de insulina están muy reducidas. En este caso, la niña tiene cetoacidosis. La sustitución por amiloide de los islotes caracteriza a la diabetes mellitus de tipo 2; la cetoacidosis no es una característica de este tipo de diabetes mellitus. La pancreatitis aguda o crónica reduce la función exocrina pancreática, pero en raras ocasiones destruye una cantidad de islotes suficiente para producir una diabetes mellitus franca. La insulitis con células inflamatorias, sobre todo linfocitos T, puede encontrarse en los islotes de los pacientes con diabetes mellitus de tipo 1 *antes* de que la clínica sea evidente. Sin embargo, los eosinófilos son raros en la insulitis, aunque pueden aparecer en los islotes de lactantes diabéticos que no sobreviven al período posnatal inmediato. Un tumor neuroendocrino pancreático puede tener actividad hormonal y producir una hipoglucemia si produce insulina en exceso; la producción excesiva de glucagón en un adenoma puede originar una diabetes mellitus secundaria porque el glucagón antagoniza los efectos de la insulina, pero la secreción de insulina seguiría siendo suficiente para evitar la cetoacidosis. El hallazgo más frecuente en el glucagonoma es el eritema necrolítico migratorio. La hiperplasia de células α es bastante infrecuente.

38 **B** Los hallazgos en este caso se deben a la resistencia a la insulina por la obesidad con síndrome metabólico. La resistencia a la insulina provoca una disfunción de las células β, pero otros factores, como el gen *TCF7L2,* juegan un papel en la aparición final de una diabetes mellitus de tipo 2 franca. El exceso de ácidos grasos libres puede estimular la liberación de citocinas por las células β, que induce la inflamación y la disfunción de las células de los islotes. Los cambios en las costumbres vitales con modificación de la dieta para conseguir reducir el peso y el aumento de la actividad física contribuyen a revertir la resistencia a la insulina de forma que no sea necesario tratamiento farmacológico para controlar la hiperglucemia. El síndrome de Cushing puede deberse a lesiones corticosuprarrenales independientes de ACTH, como la

hiperplasia primaria, el adenoma o el carcinoma, y provoca una diabetes secundaria por una resistencia a la insulina inducida por glucocorticoides, pero las lesiones suprarrenales primarias son menos frecuentes que el síndrome metabólico asociado a la obesidad aislada y los pacientes del estudio no tienen las características adicionales del síndrome de Cushing, como el hirsutismo, la osteoporosis y la tendencia al desarrollo de hematomas con facilidad. La reducción absoluta de la insulina en la diabetes mellitus de tipo 1 se debe tratar con inyecciones de insulina. En el hipotiroidismo se produce un modesto aumento de peso, sin alteraciones en los adipocitos que provoquen resistencia a la insulina. La liposucción es una técnica de cirugía plástica empleada para el modelado del cuerpo, pero no ayuda a reducir el peso.

39 **B** Los hallazgos descritos son complicaciones de la diabetes asociada al embarazo y las malformaciones sugieren que la hiperglucemia era previa a la gestación, y actualmente la diabetes de tipo 2 es bastante frecuente, incluso en mujeres de edad fértil. La hipoglucemia neonatal es consecuencia de una función excesiva de las células β de los islotes por encontrarse en un entorno de hiperglucemia. Aunque la fibrosis quística aparece desde el nacimiento, la pérdida de función exocrina del páncreas tarda años y la pérdida de los islotes es un hallazgo tardío. La diabetes gestacional es la intolerancia a la glucosa durante el embarazo y los recién nacidos pueden sufrir una hipoglucemia como consecuencia de la hiperfunción de sus propias células β, pero no por alteraciones en las mismas. La diabetes juvenil de inicio en la madurez (MODY; pero no durante la lactancia) se parece a la diabetes de tipo 2 y puede asociarse a diversos defectos genéticos en las vías que controlan la glucemia, aunque es mucho menos frecuente. Los tumores neuroendocrinos pancreáticos son infrecuentes, pero podrían secretar glucagón y provocar una diabetes secundaria.

40 **D** La glucosilación no enzimática de las proteínas depende de la glucemia, más que ser una causa de hiperglucemia. Esta es la base del aumento de la hemoglobina A_{1c}. Las diabetes mellitus de tipos 1 y 2 se caracterizan por hiperglucemia, pero los mecanismos patogénicos de base son distintos. La diabetes

mellitus de tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria que se asocia a determinados alelos de las moléculas de clase II del CPH. Se caracteriza por una tasa de concordancia en gemelos muy elevada y presencia de autoanticuerpos frente a los islotes. La resistencia a la insulina es un rasgo clave de la diabetes mellitus de tipo 2.

41 **C** La glucosilación no enzimática alude al proceso químico mediante el cual la glucosa se une a las proteínas sin ayuda de enzimas. El grado de glucosilación es proporcional a la glucemia. Muchas proteínas, incluida la hemoglobina, sufren una glucosilación no enzimática. Dado que los eritrocitos viven como media unos 120 días, la cantidad de hemoglobina glucosilada depende de la glucemia que hubiera durante los 120 días previos. La concentración de hemoglobina glucosilada no se ve afectada de forma apreciable por los cambios a corto plazo de la glucemia plasmática. La determinación al azar de la glucemia es una forma inmediata de monitorizar los ajustes a corto plazo con la dieta y con fármacos, como la insulina y los antidiabéticos orales. La glucemia en ayunas permite diagnosticar mejor la diabetes mellitus inicialmente. La determinación del colesterol y la fructosamina no es útil para el manejo de la diabetes mellitus. La microalbuminuria puede anteceder al desarrollo de una nefropatía diabética. El «efecto incretina» está disminuido en los pacientes con diabetes de tipo 2, y el uso de agonistas del receptor GLP-1 puede ayudar a recuperar la función de la incretina, y mejorar el control glucémico y perder peso por aumento de la saciedad.

42 **A** En este hombre se describen las complicaciones de la diabetes mellitus: enfermedad vascular, neuropatía, nefropatía y retinopatía. La hiperglucemia supera la capacidad de reabsorción del túbulo renal, por lo que aparece glucosa en la orina. Los otros hallazgos enumerados afectan a órganos que no se afectan típicamente en la diabetes mellitus: la hepatopatía con reducción de la síntesis de albúmina, la hiperaldosteronemia con hipopotasemia, la reducción de la función medular con leucopenia, la enfermedad del páncreas exocrino con esteatorrea o el trastorno del metabolismo del ácido úrico.

43 **A** La enfermedad ateroesclerótica periférica grave es una complicación frecuente de la diabetes mellitus de larga evolución. La estenosis por ateroesclerosis de las arterias de las extremidades inferiores puede ocasionar isquemia y gangrena. Los pies suelen afectarse por la gangrena, lo que a veces obliga a la amputación. La neuropatía diabética con reducción de la sensibilidad incrementa el riesgo de traumatismos de repetición, lo que fomenta el riesgo de ulceraciones que causan infecciones y de inflamación que conduce a la gangrena. Los pacientes con diabetes mellitus de tipo 2, obesidad o ambos trastornos tienen un riesgo aumentado de sufrir una esteatohepatitis no alcohólica. Dado que este paciente no recibe fármacos como la insulina, es poco probable que desarrolle una hipoglucemia importante. Como tiene sobrepeso, es más probable que tenga una diabetes mellitus de tipo 2; la cetoacidosis es poco probable. Las infecciones por *Mucor circinelloides* también son más probables en la cetoacidosis. Aunque los islotes pancreáticos pueden presentar depósitos de amiloide, la pancreatitis crónica (que afecta a los ácinos parenquimatosos) y la amiloidosis sistémica no se asocian a la diabetes mellitus de tipo 2.

44 **C** La glomeruloesclerosis nodular, que muestra la figura, es una característica típica de la afectación renal en la diabetes mellitus y explica la proteinuria de esta paciente (que puede evolucionar a un síndrome nefrótico). La resistencia periférica a la insulina se relaciona mucho con la diabetes mellitus de tipo 2. La anamnesis de esta paciente es típica de una diabetes de tipo 2, como lo es la elevación de la hemoglobina A_{1c}. Observe que, aunque las mujeres premenopáusicas tienen una protección relativa frente a la cardiopatía isquémica, la diabetes desequilibra la balanza y puede fomentar la arteriopatía coronaria en mujeres más jóvenes. La pancreatitis crónica afecta típicamente más a la función exocrina pancreática que a la endocrina. Las mutaciones del gen de la glucocinasa pueden producir una diabetes juvenil de inicio en la madurez (MODY), que es mucho menos frecuente que la diabetes de tipo 2. Aunque es posible encontrar depósitos localizados en los islotes de amiloide en la diabetes de tipo 2, no se asocian a trastornos

como el mieloma múltiple, en el que se afectan más órganos por los depósitos de amiloide. La destrucción mediada por los linfocitos T de las células β de los islotes caracteriza a la diabetes de tipo 1.

45 **F** La diabetes mellitus de larga evolución puede producir una neuropatía periférica, incluida la neuropatía autónoma. Se cree que las células nerviosas no necesitan insulina para captar la glucosa. Cuando existe una hiperglucemia, el exceso de glucosa difunde dentro del citoplasma de las células y se acumula. El exceso de glucosa se metaboliza a través de la vía de los polioles por la enzima aldosa reductasa intracelular a sorbitol y luego a fructosa, una reacción que utiliza el NADPH como cofactor. El NADPH también es necesario para una reacción que regenera el glutatión reducido (GSH). El GSH aporta importantes mecanismos antioxidantes en la célula. Por tanto, la persistencia de la hiperglucemia intracelular mediante la reducción de GSH condiciona que las células nerviosas sean sensibles al estrés oxidativo. Los productos terminales de la glucosilación avanzada (AGE) pueden producir de forma directa enlaces cruzados entre las proteínas de la matriz extracelular y predisponer así a los vasos al estrés por cizallamiento y la lesión endotelial. La glucosilación suele afectar a las paredes vasculares y fomentar la ateroesclerosis. Los efectos distales de la activación de la proteína C cinasa son numerosos e incluyen la producción de VEGF, TGF-β y la proteína procoagulante llamada inhibidor del activador del plasminógeno 1 por el endotelio vascular.

46 **D** Una complicación de la diabetes mellitus de tipo 2 es el coma hiperosmolar no cetósico. En la diabetes mellitus de tipo 2, el defecto fundamental es la resistencia a la insulina, que se traduce al final en una reducción de la concentración plasmática de esta sustancia o una carencia relativa de la misma, aunque todavía exista suficiente insulina para evitar la cetosis. La consiguiente hiperglucemia suele producir una poliuria, que causa deshidratación, lo que contribuye a aumentar todavía más la glucemia. Cuando no se ingiere una cantidad adecuada de líquidos, la deshidratación condiciona que la glucemia alcance concentraciones muy elevadas. Las mutaciones del gen de la glucocinasa pueden asociarse a la diabetes juvenil de inicio en la

madurez (MODY). El genotipo HLA-DR3/HLA-DR4 es un factor predisponente para la diabetes mellitus de tipo 1. La pérdida grave de células β con insulitis, que puede estimularse tras una infección vírica, es un rasgo de la diabetes mellitus de tipo 1 o autoinmunitaria.

47 **A** La característica clínica de obesidad con angina e intolerancia a la glucosa en esta paciente sugiere una diabetes de tipo 2. Este diagnóstico se confirma con una prueba de tolerancia oral a la glucosa (> 200 mg/dl a las 2 h), que en este caso es útil porque las glucemias en ayunas de 120 y 122 mg/dl no cumplen los criterios diagnósticos establecidos en 126 mg/dl. La principal alteración en la diabetes mellitus de tipo 2 es la resistencia a la insulina. Varias moléculas derivadas de los adipocitos, como la adiponectina y la resistina, se han vinculado con la aparición de resistencia a la insulina y han permitido establecer un vínculo entre la obesidad y la diabetes mellitus de tipo 2. El receptor nuclear llamado receptor γ del peroxisoma activado por proliferador (PPARγ) ha resultado ser una molécula clave en la regulación de la resistencia a la insulina gracias a su acción sobre las hormonas de los adipocitos. Los TZD se unen a PPARγ en los adipocitos y los activan, y aumentan las concentraciones de la hormona sensibilizante a la insulina adiponectina, a la vez que reducen las concentraciones de ácidos grasos libres y resistina, sustancias ambas que aumentan la resistencia a la insulina. En la diabetes mellitus de tipo 1 se encuentran autoanticuerpos frente a la insulina. La pérdida de células β y la densidad de receptores de la insulina no son factores importantes en la patogenia de la diabetes mellitus de tipo 2. Los TZD no influyen sobre el metabolismo de la insulina. El exceso de glucagón empeora la diabetes, pero los TZD no influyen sobre su secreción. Las células β no se regeneran, pero muchos fármacos antidiabéticos de los empleados en la diabetes mellitus de tipo 2 están diseñados para funcionar sobre las células β residuales.

48 **E** Estos hallazgos sugieren una diabetes mellitus de tipo 1 de inicio en la infancia, relación con el CPH y evidencia de disfunción autoinmunitaria mediada por linfocitos T; la pérdida de los islotes determina una carencia absoluta de insulina, que

obliga a administrar tratamiento con insulina. Las demás opciones no se asocian a autoinmunidad. La fibrosis quística con mutaciones del gen de *CFTR* y afectación de los canales de cloruro puede ocasionar una pérdida crónica de ácinos y, en ocasiones, de islotes pancreáticos en pacientes de mediana edad. El síndrome de Down puede asociarse a diabetes, pero es poco probable que múltiples niños estén afectados. Las mutaciones del gen de la glucocinasa provocan una variante de diabetes juvenil de inicio en la madurez (MODY). La resistencia periférica a la insulina con obesidad es la base de la diabetes mellitus de tipo 2.

49 **D** La figura muestra una lesión celular delimitada en el páncreas, sugestiva de tumor neuroendocrino pancreático (PanNET). La secreción de insulina por estas lesiones produce hipoglucemia y los síntomas descritos. Muchos de estos tumores miden menos de 1 cm de diámetro, lo que dificulta su detección. La mayoría de los pacientes con un PanNET secretor de insulina solo tienen una leve hipersecreción de insulina. El hallazgo en el laboratorio del aumento de la relación insulina:glucosa es útil. Es preciso extirpar la lesión en los pacientes con síntomas importantes. Es poco probable que la pancreatitis aguda aumente la liberación de insulina por las células de los islotes. Los adenocarcinomas de páncreas derivan del epitelio ductal y no tienen función endocrina. La sustitución grasa del páncreas puede ocurrir en la fibrosis quística, pero el número de islotes disminuye también de forma gradual. Los seudoquistes son complicaciones de la pancreatitis, pero son focales y no se asocian a hipersecreción de insulina.

50 **A** El síndrome de Zollinger-Ellison se puede deber a uno o más tumores neuroendocrinos pancreáticos (PanNET) secretores de gastrina (gastrinoma). Esta secreción provoca una enfermedad ulcerosa péptica intratable, con múltiples úlceras gástricas o duodenales. La incidencia en Suecia oscila entre 1-3 por millón de habitantes. Los inhibidores de la bomba de protones pueden ayudar a controlar la enfermedad mientras se procede a valorar la posibilidad de resección de las lesiones. Los PanNET pueden secretar diversos compuestos con actividad hormonal. Los insulinomas pueden producir una hipoglucemia.

Los glucagonomas y somatostatinomas pueden ocasionar un síndrome caracterizado por una diabetes mellitus leve. Los VIPomas pueden cursar con una intensa diarrea acuosa, hipopotasemia y aclorhidria.

51 **B** Los rasgos clínicos y analíticos de este caso orientan a un síndrome de Cushing. La prueba de supresión con dexametasona se emplea para localizar el origen del exceso de cortisol. Cuando las pruebas con dosis altas y bajas de dexametasona no consiguen suprimir la secreción de cortisol, es poco probable que la fuente del exceso de glucocorticoides sea un adenoma hipofisario secretor de corticotropina. En ese caso se debe plantear una fuente ectópica de corticotropina, como un cáncer de pulmón, o un tumor de la corteza suprarrenal secretor de glucocorticoides. La concentración de corticotropina plasmática ayuda a diferenciar estos dos diagnósticos. Cuando la fuente es ectópica, las concentraciones de corticotropina serán elevadas, mientras que la secreción de glucocorticoides por una neoplasia suprarrenal suprimiría la secreción de corticotropina hipofisaria, causando la atrofia de la corteza suprarrenal contralateral. El feocromocitoma secreta catecolaminas, lo que provoca hipertensión, pero no osteoporosis ni los cambios electrolíticos descritos. Los carcinomas medulares de tiroides tienen células neuroendocrinas, pero es poco probable que elaboren corticoesteroides.

52 **A** La presencia de síntomas de un síndrome de Cushing con masculinización sugiere un carcinoma corticosuprarrenal, que es más probable que tenga actividad endocrina en las mujeres. Una concentración baja de ACTH ayuda a descartar la posibilidad de un adenoma hipofisario secretor de ACTH en la silla turca o una producción ectópica de ACTH por una neoplasia, como el carcinoma pulmonar. Un nódulo tiroideo «frío» puede representar un carcinoma medular de tiroides de una neoplasia endocrina múltiple tipo 2 asociado a feocromocitomas suprarrenales, pero el síndrome de Cushing no es parte de este complejo. La localización de una masa en la bifurcación aórtica podría indicar un «infame» feocromocitoma extrasuprarrenal del confuso órgano de Zuckerkandl, lo que podría explicar la hipertensión por la excesiva liberación de catecolaminas, pero no

los demás rasgos del síndrome de Cushing.

53 **D** La masa pulmonar posiblemente corresponda a un carcinoma primario de pulmón y el aumento de tamaño de ambas suprarrenales puede explicarse por metástasis a las mismas. La destrucción de más del 90% de las cortezas suprarrenales explica la insuficiencia suprarrenal, que se pone de manifiesto con malestar y reducción de la concentración sérica de cortisol y trastornos electrolíticos. La amiloidosis puede aumentar el tamaño de las suprarrenales, pero no ocasionar una masa pulmonar. En el síndrome por producción ectópica de corticotropina es probable que exista un carcinoma pulmonar y típicamente existe un aumento de tamaño de las suprarrenales, pero también debería existir un hipercortisolismo. El síndrome de Waterhouse-Friderichsen, debido a una infección por *Neisseria meningitidis,* puede aumentar el tamaño de las suprarrenales por una hemorragia intensa (hasta alcanzar un tamaño doble a triple del normal), pero este fenómeno no justifica la masa pulmonar. Este síndrome debuta de forma abrupta. El adenoma hipofisario secretor de corticotropina aumentaría el tamaño de las dos suprarrenales, pero también asociaría un hipercortisolismo.

54 **F** La figura muestra un tumor bien delimitado, originado en la corteza suprarrenal. En los pacientes jóvenes y sanos, que tienen hipertensión, siempre se debería buscar una causa susceptible de tratamiento quirúrgico para este proceso, porque la hipertensión esencial, que es mucho más frecuente, se encuentra en personas de mayor edad. Este paciente presenta un adenoma de la corteza suprarrenal secretor de aldosterona (síndrome de Conn). El hiperaldosteronismo reduce la síntesis de renina por el aparato yuxtaglomerular renal. Los adenomas suprarrenales pueden ser no funcionantes o secretar glucocorticoides o mineralocorticoides. Si este paciente tuviera un adenoma secretor de glucocorticoides, debería tener hipertensión, pero también mostraría algunos rasgos clínicos de síndrome de Cushing. No tiene efecto sobre las concentraciones sanguínea de glucosa o insulina. Los pacientes con un hiperaldosteronismo muestran unas concentraciones de potasio sérico bajas y se produce una retención de sodio. La aldosterona no muestra

supresión por retroalimentación en la adenohipófisis y las concentraciones de corticotropina no se afectan.

55 **A** La hipopotasemia con irritabilidad neuromuscular, hipertensión y concentración baja de renina plasmática sugiere un hiperaldosteronismo. La causa más frecuente de hiperaldosteronismo primario es la hiperplasia nodular cortical suprarrenal idiopática. Un insulinoma originado en el páncreas podría justificar la debilidad episódica, pero la glucemia debería ser baja. Aproximadamente un 10% de los feocromocitomas son extrasuprarrenales, incluidos paraaórticos, y podrían producir hipertensión por exceso de catecolaminas, pero no hipopotasemia. La hiperplasia del tiroides podría corresponder a una enfermedad de Graves, aunque esta suele ser difusa y podría justificar la debilidad y la hipertensión, pero la presión diferencial debería ser más amplia y no debería asociarse a una hipopotasemia. Un tumor maligno torácico es una causa probable de síndrome paraneoplásico, pero es poco probable que lo sea la hipopotasemia.

56 **B** El síndrome adrenogenital puede producir una pubertad precoz, que se suele asociar a una deficiencia de 21-hidroxilasa. La ausencia de esta enzima reduce la producción de cortisol, responsable del control de la producción de corticotropina, lo que determina hiperplasia suprarrenal y producción de hormonas esteroideas sexuales. La atrofia bilateral de la corteza suprarrenal se produce típicamente en los casos de enfermedad de Addison o tras la administración a largo plazo de glucocorticoides exógenos. Un nódulo en la corteza suprarrenal que contenga células de la zona glomerular producirá un hiperaldosteronismo primario; si contiene células de la zona fascicular, producirá un síndrome de Cushing. La mayor parte de los nódulos suprarrenales no son funcionantes y se encuentran de forma incidental. Un nódulo en la médula suprarrenal produce catecolaminas cuando es funcionante y las personas mayores con este tipo de nódulos sufren hipertensión. La atrofia medular es poco frecuente, pero puede deberse a infecciones o toxinas. La hiperplasia medular es infrecuente, pero también podría secretar catecolaminas.

57 **C** La deficiencia completa de 21-hidroxilasa produce la

variante clásica pierde sal del síndrome adrenogenital, porque la deficiencia enzimática bloquea la formación de aldosterona y cortisol. Las mutaciones pueden ser deleciones o duplicaciones o corresponder a una recombinación entre el gen *CYP21* y un seudogén. Estas mutaciones pueden producir una deficiencia grave con pérdida de sal y virilización prenatal o una deficiencia parcial con virilización posnatal, con un aparente patrón de herencia autosómico recesivo. La deficiencia de 11-hidroxilasa bloquea también la producción de cortisol y aldosterona, aunque se sintetizan algunos metabolitos intermedios con cierta actividad glucocorticoide. La aromatasa participa en la conversión de la androstenodiona a estrona, una vía de síntesis de esteroides que no influye sobre la producción de cortisol. La deficiencia de 17-α-hidroxilasa determinaría la reducción de la síntesis de cortisol y de esteroides sexuales. La oxidasa es la enzima final de la vía de producción de aldosterona.

58 **D** Este es el hallazgo típico en la suprarrenal durante el síndrome de Waterhouse-Friderichsen y la meningococemia es la causa más probable de esta evolución tan rápida. La insuficiencia corticosuprarrenal puede asociarse también a una tuberculosis diseminada y a infecciones fúngicas, como la histoplasmosis, que afectan a las glándulas suprarrenales. Las infecciones por citomegalovirus de las suprarrenales pueden aparecer en pacientes inmunodeprimidos y pueden ser lo bastante graves como para reducir la función suprarrenal, aunque no ocasionan una insuficiencia aguda. *Streptococcus pneumoniae* puede ocasionar una septicemia, pero es poco probable que afecte de forma específica a las suprarrenales.

59 **B** Esta mujer presenta datos de insuficiencia corticosuprarrenal aguda (crisis addisoniana aguda). El tratamiento prolongado con corticoesteroides inhibe la estimulación de corticotropina sobre la glándula suprarrenal y produce atrofia de la misma. Cuando no se obtiene este detalle en la anamnesis y no se mantiene el tratamiento con corticoesteroides, aparece la crisis, que en este caso se agrava por el estrés de la cirugía. Cuando la tuberculosis es más prevalente y grave sin tratamiento farmacológico, la diseminación a las suprarrenales se encuentra con mayor

frecuencia. El adenoma corticosuprarrenal sin atrofia de la corteza suprarrenal contralateral puede asociarse a un adenoma no funcionante o un adenoma secretor de aldosterona. Si la corteza contralateral muestra una atrofia franca, posiblemente el adenoma de la contralateral esté secretando un exceso de glucocorticoides. El carcinoma suele destruir una de las suprarrenales, no es funcionante y mantiene intacta la otra suprarrenal. La enfermedad de Addison por la destrucción granulomatosa de las suprarrenales era más frecuente, pero se trata de un proceso crónico. La necrosis hemorrágica sugiere un síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que puede complicar la septicemia por microorganismos como *Neisseria meningitidis.* La hiperplasia nodular cortical puede depender de un adenoma hipofisario secretor de ACTH o ser idiopática; en ambos casos se produce un hipercortisolismo, no una enfermedad de Addison.

60 **C** La enfermedad de Addison (insuficiencia corticosuprarrenal crónica primaria) suele ocurrir como consecuencia de un trastorno autoinmunitario idiopático (en las regiones del mundo donde la incidencia de tuberculosis activa es baja). La suprarrenalitis autoinmunitaria se asocia a la presencia de otros procesos autoinmunitarios en la mitad de los casos aproximadamente. Estos fenómenos autoinmunitarios afectan con frecuencia a otros órganos endocrinos, como el tiroides. Otros cuadros de posible origen autoinmunitario, como el lupus eritematoso sistémico, la colitis ulcerosa y las vasculitis, no suelen anteceder a una insuficiencia suprarrenal, aunque el tratamiento de estos procesos con corticoesteroides puede provocar una atrofia yatrógena de las suprarrenales. La diabetes mellitus de tipo 2 no tiene una base autoinmunitaria, a diferencia de la de tipo 1.

61 **B** La insuficiencia suprarrenal crónica (enfermedad de Addison) determina una reducción de la producción de cortisol y de la actividad de los mineralocorticoides. La hiperpigmentación cutánea se debe a la producción aumentada de la hormona precursora de la corticotropina, que también estimula a los melanocitos. La causa más frecuente de enfermedad de Addison, en las regiones que no son endémicas para la tuberculosis, es la suprarrenalitis autoinmunitaria. Este

proceso determina la destrucción gradual de la corteza suprarrenal, mediada posiblemente por los linfocitos infiltrantes. Un tumor neuroendocrino pancreático (adenoma de células de los islotes) secretor de insulina podría explicar la hipoglucemia, pero no los demás cambios metabólicos. Las metástasis pueden llegar a veces a destruir una cantidad suficiente de corteza suprarrenal como para producir insuficiencia de la misma, pero el origen primario más frecuente es el carcinoma de pulmón y en la radiografía de tórax de esta paciente no se observa ninguna masa pulmonar. Las hemorragias bilaterales con la consiguiente destrucción de las suprarrenales son típicas de la meningococemia y provocan una insuficiencia corticosuprarrenal aguda. La sarcoidosis también puede involucrar las suprarrenales, pero este cuadro es menos frecuente y en esta paciente la radiografía de tórax es normal, lo que descarta esta opción diagnóstica, dado que en la sarcoidosis casi siempre se encuentran adenopatías hiliares.

62 **E** Estos hallazgos indican un feocromocitoma de la médula suprarrenal. Se trata de una neoplasia poco frecuente, pero se debería plantear este diagnóstico en casos de hipertensión episódica. La determinación de catecolaminas libres, metanefrina y ácido vainillilmandélico (VMA) en la orina permite establecer este diagnóstico. Hasta un 25% de los casos pueden asociarse a una mutación en un gen supresor de tumores, como *RET, NF1* o *VHL.* La concentración de HVA suele estar aumentada en el neuroblastoma, un tumor que afecta a los niños. El cortisol sérico está aumentado en la enfermedad de Addison, que se asocia a hipotensión. Puede aparecer una hipoglucemia en la enfermedad de Addison y también en los tumores de células de los islotes. La potasemia puede estar disminuida en los adenomas suprarrenales secretores de aldosterona. La concentración de T_4 aumenta en los pacientes con enfermedad de Graves; esta enfermedad puede cursar con pérdida de peso, intolerancia al calor, ansiedad, taquicardia, temblores y arritmias cardíacas.

63 **F** Los neuroblastomas son neoplasias infantiles, que pueden ser congénitas. Se originan sobre todo en el retroperitoneo en las glándulas suprarrenales o en paraganglios

extrasuprarrenales. Se trata de tumores de células azules y redondas primitivos, que pueden producir elevadas concentraciones de precursores de catecolaminas y sus metabolitos, como HVA y ácido vainillilmandélico (VMA). HVA es el más específico. Dado que los neuroblastomas suelen ser unilaterales, no es probable que se altere la producción de cortisol ni la ACTH. Los neuroblastomas no modifican las concentraciones de prolactina o de hormona de crecimiento en el suero. Los feocromocitomas de adultos se suelen detectar por el incremento de las catecolaminas libres urinarias, pero es poco probable que las células primitivas de un neuroblastoma elaboren cantidades de catecolaminas en el mismo orden que los feocromocitomas.

64 **A** Estos hallazgos sugieren una neoplasia endocrina múltiple (MEN) de tipo 2A (síndrome de Sipple) o posiblemente de tipo 2B (síndrome de Williams). Estos pacientes presentan carcinoma medular de tiroides, feocromocitomas y adenomas de paratiroides. Las cefaleas de este paciente podrían deberse a la hipertensión causada por el feocromocitoma originado en la médula suprarrenal. Más del 70% de los feocromocitomas son bilaterales cuando son familiares. El carcinoma medular suele ser también multifocal en este síndrome. Este síndrome se asocia a mutaciones en la línea germinal del protooncogén *RET.* Los familiares que hereden la misma mutación tendrán un riesgo aumentado de desarrollar cánceres parecidos. Se recomienda cribado genético seguido de una vigilancia activa de los familiares afectados. La atrofia cortical bilateral secundaria a la destrucción autoinmunitaria de las suprarrenales es la causa más frecuente de la enfermedad de Addison en este momento. La hiperplasia cortical nodular puede depender de un adenoma hipofisario secretor de ACTH o ser idiopática; en ambos casos se produce un hipercortisolismo, no una enfermedad de Addison. La destrucción granulomatosa de las suprarrenales sugiere una tuberculosis diseminada como causa de la enfermedad de Addison, lo que podría determinar una insuficiencia suprarrenal en caso de ser bilateral, pero no unilateral. El adenoma corticosuprarrenal con atrofia de la corteza suprarrenal contralateral podría secretar un exceso de glucocorticoides. Una

gran masa con hemorragia y necrosis en una suprarrenal sugiere un carcinoma corticosuprarrenal.

65 **C** La neoplasia endocrina múltiple (MEN) de tipo 1 se denomina también *síndrome de Wermer.* Recuerde que se denomina «enfermedad de las tres *P*» porque se asocia a neoplasias o hiperplasias de *p*áncreas, *p*aratiroides y *p*ituitaria (o hipófisis). Los feocromocitomas suprarrenales se asocian a la MEN 2B. Los carcinomas endometriales pueden aparecer en pacientes que presentan una secreción no contrarrestada de estrógenos, algo que puede encontrarse en los tumores ováricos productores de estrógenos. Este proceso no es parte de la MEN 1. Los carcinomas de células pequeñas pulmonares producen diversos síndromes paraneoplásicos, pero, en general, no se asocian a hipercalcemia. También cabe dudar de que esta paciente hubiera podido sobrevivir 5 años con un carcinoma de células pequeñas. Si la hipercalcemia observada hubiera sido un síndrome paraneoplásico, las glándulas paratiroides no habrían estado aumentadas de tamaño y la calcemia no se habría normalizado tras la cirugía. Los carcinomas medulares de tiroides forman parte de las MEN 2A o 2B.

66 **E** La masa se localiza en la glándula pineal. En los niños, el tumor más frecuente en esta localización es el pineoblastoma, mientras que en los adultos es el pineocitoma. Ambas lesiones son bastante infrecuentes y por su localización resulta bastante difícil extirparlas por completo. Los craneofaringiomas son neoplasias agresivas que suelen ser supraselares y difíciles de extirpar. Los gliomas hipotalámicos también son supraselares. Los linfomas del sistema nervioso central son infrecuentes en niños y raros a este nivel. Los carcinomas metastásicos son infrecuentes en niños en cualquier localización, dado que los niños no suelen tener muchos tumores malignos y los que tienen no son habitualmente carcinomas. El prolactinoma afecta a la silla turca.

CAPÍTULO
25

Piel

PEF9 Capítulo 25: Piel

PH9 Capítulo 23: Piel

1 Un hombre de 20 años ha notado un cúmulo de pequeñas lesiones en el labio superior en los últimos 5 días. En la exploración física se identifican cuatro lesiones, con diámetros entre 0,2 y 0,5 cm, que son sobreelevadas y están llenas de líquido claro. ¿Cuál de los siguientes términos descriptivos es el que mejor se aplica a estas lesiones?

A Bullas
B Máculas
C Pápulas
D Pústulas
E Vesículas

2 Una niña de 5 años se somete a un chequeo de salud rutinario. En la exploración física se observan máculas pardas claras dispersas, de 1-3 mm de diámetro en la cara, el tronco y las extremidades. Los padres afirman que estas máculas se vuelven más numerosas en los meses de verano y aclaran durante el invierno. No son pruriginosas, sangran ni duelen. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Pecas
B Lentigo
C Melasma
D Nevo
E Vitíligo

3 Una mujer de 74 años se ha notado unas placas pardas oscuras en el dorso de las manos que han aumentado de número y tamaño en los últimos 15 años. No se modifican con la exposición solar y no son pruriginosas ni dolorosas. En la exploración se observan

lesiones de 0,5-1 cm ligeramente pigmentadas y planas. ¿Cuál de los siguientes hallazgos microscópicos es más probable que se encuentre en estas lesiones?

A Hiperplasia melanocítica basal
B Células névicas dérmicas
C Pérdida de melanina en la piel circundante
D Proliferación de mastocitos
E Hifas de hongos pigmentadas



4 Una niña de 10 años se somete a un chequeo rutinario. En la exploración física se observa una lesión cutánea de 2 cm plana y de color marrón uniforme, justo encima de la nalga derecha. La lesión se encuentra presente desde su nacimiento y no ha sufrido modificaciones. La figura muestra el aspecto microscópico representativo de la lesión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Acantosis *nigricans*
B Carcinoma basocelular
C Nevo displásico
D Lentigo
E Melanoma
F Nevo melanocítico
G Queratosis seborreica

5 Una chica de 17 años presenta cientos de lesiones en la piel que

llevan apareciendo desde la infancia. En la exploración física se reconocen lesiones pigmentadas maculares o ligeramente sobreelevadas, a modo de placas, de color pardo oscuro, con diámetros oscilantes entre 0,4 y 1,7 cm, que se localizan tanto en áreas expuestas al sol como no expuestas. Los contornos de las lesiones son irregulares y se observa variabilidad de la pigmentación. Dice que un hermano de 15 años presenta lesiones similares. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que tenga una mutación hereditaria en esta paciente?

A *CDKN2A*
B *FGFR3*
C *NF1*
D *PTCH*
E *TSC1*

6 Se estudian las asociaciones epidemiológicas entre los cánceres cutáneos y los factores raciales y medioambientales. La incidencia de carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide y melanoma se ha incrementado durante los últimos 50 años. ¿Cuál de los siguientes países presenta una incidencia máxima?

A Australia
B Bolivia
C Corea
D Nigeria
E Noruega
F Túnez

7 Una mujer de 39 años presenta un nódulo en la espalda que ha crecido durante los últimos 2 meses. En la exploración física se observa una lesión pigmentada de 2,1 cm, de márgenes irregulares con áreas irregulares pardas a negruzcas. Se hace una biopsia escisional con márgenes amplios y el estudio histológico de la misma identifica un melanoma constituido por células epitelioides, que se extienden 2 mm dentro de la dermis reticular. Se observa una banda de linfocitos por debajo de la lesión. ¿Cuál de los siguientes factores es más importante para determinar el pronóstico de esta paciente?

A Edad en el momento del diagnóstico
B Profundidad de la lesión
C Extensión del crecimiento radial

D Respuesta inflamatoria
E Localización en la piel

8 Un hombre de 77 años presenta una lesión en el lado derecho de la cara que ha aumentado de tamaño lentamente durante los últimos 5 años. La exploración física revela una lesión de márgenes irregulares, de 3 cm, con una pigmentación irregular parda a negruzca y un nódulo central negro azulado sobreelevado de 2 mm. Se extirpa la lesión y el estudio microscópico identifica un crecimiento radial de células malignas grandes redondeadas, algunas sueltas y otras en forma de nidos dentro de la epidermis y la dermis papilar superficial. Las células presentan un llamativo nucléolo rojizo y pigmento citoplásmico pulverulento. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que se encuentre mutado en este paciente?

A *ATM*
B *BRAF*
C *NF1*
D *TYR*
E *XPA*



9 Un hombre de 53 años ha notado aumento de tamaño de una lesión situada en la parte superior externa del brazo derecho en los últimos 2 meses; la lesión se corresponde con la figura. La

exploración física no revela más alteraciones. ¿Cuál de las siguientes profesiones es más probable que ejerciera este paciente en su juventud?

A Mecánico de automóviles
B Químico en una empresa
C Socorrista de playa
D Minero de una mina de carbón
E Oncólogo radioterápico en un centro oncológico



10 Un hombre de 75 años ha notado unas lesiones en el tronco que han aumentado de tamaño lentamente durante los últimos 20 años, parecidas a las que muestra la figura. Se extirpa una de ellas y el estudio histológico revela láminas de células basaloides ligeramente pigmentadas, que rodean a quistes llenos de queratina. La lesión está bien delimitada respecto de la epidermis circundante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Carcinoma basocelular
B Nevo intradérmico
C Melanoma
D Queratosis seborreica
E Carcinoma epidermoide
F Verruga vulgar

11 Un hombre de 64 años ha observado cambios en la textura y

color de la piel de axilas e ingles durante los últimos 3 meses. En la exploración física se identifica una piel engrosada y muy oscura en las axilas y flexuras del cuello y la ingle. Estas áreas no son dolorosas ni pruriginosas. La muestra de biopsia por sacabocados de piel axilar muestra una acantosis epidérmica ondulante con hiperqueratosis e hiperpigmentación de la capa basal. ¿Cuál de las siguientes enfermedades de base es más probable que tenga como marcador cutáneo estas lesiones?

A Sida
B Adenocarcinoma de colon
C Histiocitosis de células de Langerhans
D Mastocitosis
E Lupus eritematoso sistémico

12 Una mujer de 52 años observa varias pequeñas lesiones a modo de protrusiones, que han aparecido en la piel de las axilas durante los últimos 2 años. Se encuentran localizadas en el punto donde le roza el sujetador. En la exploración física destacan cinco pequeñas pápulas bandas en la línea axilar anterior, recubiertas por una piel arrugada y unidas a la superficie cutánea por un delgado pedículo. Miden 0,5-0,8 cm de longitud y unos 0,3 cm de diámetro. Una lesión está torsionada y más eritematosa y dolorosa que las demás al tacto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Pólipo fibroepitelial
B Hemangioma
C Lentigo senil
D Melasma
E Quiste pilar
F Xantoma

13 Un hombre de 31 años nota un bulto en la piel de la parte inferior del abdomen que ha aumentado de tamaño durante los últimos 4 años y que desde hace 1 semana le duele. La exploración física muestra un nódulo subcutáneo, blando y móvil en la parte anterior de la línea del cinturón, que duele con la presión. La piel suprayacente está intacta. El paciente afirma que el nódulo comenzó a dolerle aproximadamente 1 día después de estrujarlo con fuerza. La lesión se extirpa la lesión y no recidiva. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Acné vulgar

- B Dermatofibroma
- C Quiste de inclusión epidérmico
- D Pólipo fibroepitelial
- E Tricoepitelioma
- F Xantoma

14 Una mujer de 69 años está preocupada por presentar un área de decoloración en la piel de la frente que no ha desaparecido en los últimos 3 años. La exploración física revela una lesión de superficie rugosa, rojiza, de 0,8 cm de diámetro en la frente derecha por encima de la ceja. La biopsia muestra una hiperplasia de células basales. Algunas de estas células basales presentan atipia nuclear con marcada hiperqueratosis y paraqueratosis, y adelgazamiento de la epidermis. El colágeno de la parte superior de la dermis y las fibras elásticas aparecen homogeneizados con elastosis. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas es más adecuada para esta paciente?

- A Aplicación de una crema de hidrocortisona
- B Reducción de la ingesta de grasa en la dieta
- C Extirpación quirúrgica de la lesión con márgenes amplios
- D Uso de antioxidantes
- E Uso de un sombrero cuando está por la calle



15 Un hombre de 53 años con una miocardiopatía dilatada idiopática se sometió a un trasplante cardíaco ortotópico. Durante los 5 años siguientes presentó dos episodios de rechazo celular mínimo, que se trataron bien incrementando la inmunodepresión. Ha desarrollado múltiples lesiones cutáneas en la cara y parte superior del tronco durante los últimos 6 meses. En la exploración física se identifican lesiones parecidas a las que recoge esta figura. Algunas de las lesiones más grandes se han ulcerado. ¿Cuál de las

siguientes lesiones es más probable que se encuentre en la biopsia?

A Dermatofibroma
B Eritema multiforme
C Liquen plano
D Psoriasis
E Carcinoma epidermoide

16 Un niño de 6 años ha notado un nódulo en la oreja que ha crecido durante el último mes. En la exploración física se identifica un nódulo cupuliforme, de color carne, de 1,2 cm en el lóbulo de la oreja derecha. Se extirpa y el estudio histológico revela nidos de células escamosas poco diferenciadas que infiltran la dermis. El niño sigue desarrollando lesiones parecidas. ¿Cuál de las siguientes funciones celulares es más probable que esté afectada por una mutación genética en este caso?

A Inducción de la apoptosis
B Transmisión de señales por los factores de crecimiento
C Adhesión de queratinocitos
D Reparación mediante escisión de nucleótidos
E Amplificación de oncogenes



17 Un hombre de 76 años ha presentado un nódulo en el párpado derecho que ha ido aumentando de tamaño lentamente durante los últimos 4 años. En la exploración física se identifica un nódulo perlado de 0,3 cm en el párpado superior cerca del limbo lateral del ojo derecho. Se extirpa la lesión y durante la cirugía se realizan múltiples estudios intraoperatorios en congelación para limitar la extensión de la resección y conservar el párpado. La figura muestra el aspecto histológico de la lesión a pequeño aumento. ¿Cuál es el

diagnóstico más probable?

- A Queratosis actínica
- B Carcinoma basocelular
- C Dermatofibroma
- D Melanoma
- E Nevo nevocelular

18 Una mujer de 22 años presenta desde hace 1 año un nódulo pardo claro en la pierna izquierda. En la exploración física se trata de un nódulo firme e indoloro de 0,7 cm. Se extirpa y su estudio histológico revela una proliferación de células fusiformes localizada en la dermis, con hiperplasia de la epidermis suprayacente y elongación en sentido descendente de unas crestas epidérmicas hiperpigmentadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A Dermatofibroma
- B Leiomioma
- C Carcinoma de células de Merkel
- D Neurofibroma
- E Schwannoma

19 Un hombre de 46 años ha notado un nódulo en el tronco que ha aumentado de tamaño lentamente durante los últimos 10 meses. En la exploración física la lesión mide 5 cm y se encuentra en la línea axilar anterior en el pezón y tiene una placa ulcerada central. Se realiza una resección amplia y el estudio histológico muestra una densa población de células fusiformes con un patrón estoriforme, que infiltran el tejido adiposo dérmico. La lesión recae en 1 año y el paciente recibe tratamiento con un inhibidor de tirosina cinasa. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que esté activado con sobreexpresión en el análisis molecular de esta lesión?

- A *TSC1*
- B *PDGFB*
- C *FGFR3*
- D *KIT*
- E *PTCH1*

20 Una niña de 9 años se ha rascado un grupo de pequeños bultitos en la piel del antebrazo durante el último mes. En la exploración física se observan cinco lesiones planas o ligeramente

papulosas, de 0,4-0,9 cm de diámetro, pardas claras en la superficie volar. Las lesiones se vuelven pruriginosas con tumefacción y eritema cuando se rascan. El estudio histológico de la biopsia de una de estas lesiones identifica un infiltrado en la parte superior de la dermis constituido por células con abundante citoplasma rosado, que se tiñe de color púrpura intenso con azul de toluidina. ¿Cuál de los siguientes tipos celulares es más probable que forme estas lesiones?

A Linfocito CD4+
B Linfocito CD8+
C Célula de Langerhans
D Macrófago
E Mastocito
F Célula de Merkel

21 Un hombre de 30 años tiene fama de comer mucho. Durante una comida se da cuenta de que todas las galletas contienen frutos secos, algo que han solicitado los demás comensales porque saben que no puede comerlas, ya que desarrollaría placas pruriginosas, eritematosas, tumefactas y ligeramente edematosas en la piel. Estas placas aparecerían y desaparecerían en 2 h. ¿Cuál de las siguientes células sensibilizadas liberaría un mediador responsable de estas lesiones cutáneas si al paciente se le ocurriera comer estas galletas?

A Linfocito CD4+
B Mastocito
C Célula citolítica natural
D Neutrófilo
E Células plasmáticas

22 Una mujer de 31 años prueba un nuevo producto cosmético facial y al día siguiente desarrolla pápulas rojizas de 0,2-0,5 cm por toda la piel. Acude a un curandero a los 2 días; en la exploración física se observa que algunas de las lesiones han pasado a ser vesiculosas y rezuman un líquido claro, mientras que otras están costrosas. Se aplica un producto de herbolario sobre las lesiones durante 3 días y estas mejoran. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable en este caso?

A Dermatitis eccematosa
B Eritema multiforme

C Impétigo
D Liquen simple crónico
E Urticaria

23 Una mujer de 43 años desarrolló un exantema rojizo en el tronco y las extremidades a la semana de estar ingresada para tratamiento de una infección respiratoria alta complicada por una neumonía. En la exploración física se observan lesiones eritematosas, papulovesiculosas, exudativas y costrosas de 2-4 mm. Las lesiones empiezan a desaparecer cuando recibe el alta hospitalaria a la semana. ¿Cuál de las siguientes patogenias es más probable en estas lesiones?

A Septicemia bacteriana
B Reacción medicamentosa
C Infección por el virus del papiloma humano
D Fotosensibilidad
E Hipersensibilidad de tipo I

24 Un hombre de 28 años infectado por el VIH presenta fiebre cada vez más alta, tos y disnea desde hace 3 días que culminan en una insuficiencia respiratoria aguda. En el ingreso tiene 37,8 °C de temperatura. La exploración física revela una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones/min y crepitantes difusos con disminución del murmullo vesicular en todos los campos pulmonares. Se realiza un lavado broncoalveolar, que identifica *Pneumocystis jiroveci* en la prueba de antígeno por fluorescencia directa. A la semana de comenzar el tratamiento, desarrolla unas lesiones diana cutáneas, constituidas por máculas rojizas con un centro vesicular pálido. Las lesiones de 2-5 cm se distribuyen de forma simétrica por la parte superior de los brazos y el tórax. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más probable que esté implicado en la aparición de estas lesiones?

A Dapsona
B Pentamidina
C Ritonavir
D Sulfametoxazol
E Zidovudina

25 Una mujer de 44 años ha desarrollado unas lesiones cutáneas en los codos y las rodillas durante el último año. Las lesiones comienzan como pústulas de 4 mm con eritema circundante, pero

luego se convierten en placas de 1-5 cm recubiertas por una escama plateada. Las lesiones debutan en las áreas de traumatismo local, pero regresan con la exposición solar. La biopsia de una de estas lesiones muestra adelgazamiento del estrato granuloso con una importante escama paraqueratósica encima, en la que se reconocen microabscesos. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que se asocie a esta lesión cutánea?

A Atopia con aumento de las concentraciones de IgE
B Autoanticuerpos frente a la desmogleína epidérmica
C Exposición de la piel a alérgenos de las plantas
D Herencia de determinados alelos HLA-Cw
E Infección por el virus del herpes simple

26 Una mujer de 27 años ha desarrollado áreas de descamación durante el último mes. En la exploración física presenta placas rosadas claras de 1-3 cm, recubiertas por una escama plateada en los brazos y el tórax. El estudio histológico de la biopsia en sacabocados de una de las lesiones revela presencia de núcleos de queratinocitos dentro de las células del estrato córneo. ¿Cuál de los siguientes términos descriptivos se aplica mejor a este hallazgo histológico?

A Acantosis
B Disqueratosis
C Hiperqueratosis
D Paraqueratosis
E Espongiosis



27 Un hombre de 28 años ha presentado las lesiones evanescentes que muestra esta figura durante 10 años. También están afectados el cuero cabelludo, la región sacrolumbar y el glande. Durante los últimos 2 años ha sufrido una artritis crónica de rodillas y caderas. ¿Cuál de los siguientes hallazgos físicos es más probable que se encuentre en este paciente?

A Soplo por fricción
B Sangre oculta en heces
C Hiperreflexia
D Hipertensión
E Ausencia de cambios

28 Una mujer de 39 años acude al odontólogo para una revisión habitual. El odontólogo descubre áreas reticuladas blanquecinas dispersas, de entre 0,2 y 1,5 cm de diámetro, en la mucosa oral. La paciente dice que tiene estas lesiones desde hace 1 año. También presenta múltiples pápulas pruriginosas púrpura de 0,3 cm en los dos codos. Se obtiene una biopsia de la lesión cutánea y el estudio histológico revela un infiltrado a modo de banda de linfocitos en la unión dermoepidérmica con degeneración de queratinocitos basales. ¿Cuál de las siguientes evoluciones es más probable en este caso?

A Infección oportunista diseminada
B Alergias múltiples a los medicamentos
C Progresión a una nefropatía crónica

D Resolución de las lesiones
E Aparición de tumores anexiales cutáneos

29 Una mujer de 39 años ha desarrollado lesiones cutáneas vesiculosas durante la semana previa. En la exploración física presenta múltiples vesículas y ampollas de 0,2-1 cm en la piel del cuero cabelludo, las axilas, las ingles y las rodillas. Muchas parecen haberse roto y dejar una erosión poco profunda cubierta por una costra de suero seco. Se estudia al microscopio la biopsia de una lesión axilar, y se observa acantólisis epidérmica con formación de una ampolla intraepidérmica. La capa basal se encuentra intacta. ¿Cuál de las siguientes pruebas adicionales es más probable que explique la patogenia de la enfermedad de esta paciente?

A Microscopia de campo oscuro del líquido de la vesícula
B Genotipado HLA
C Inmunotinción con anticuerpos frente a la desmogleína
D Cuantificación de la concentración de IgE sérica
E Cultivo para virus del líquido de la vesícula

30 Un hombre de 65 años ha presentado prurito seguido de lesiones ampollosas cutáneas en el tronco, los brazos y las piernas durante el último mes. En la exploración física destaca la presencia de ampollas tensas de 1-4 cm, sobre todo en las flexuras cutáneas. Se realiza un estudio con inmunofluorescencia directa de la biopsia de una lesión y se observa una ampolla subepidérmica con depósitos lineales de IgG y C3 a lo largo de la unión dermoepidérmica. Se trata con corticoesteroides tópicos y al mes las lesiones se han curado sin cicatrices. ¿Cuál de los siguientes componentes cutáneos es más probable que sea diana para los autoanticuerpos en este paciente?

A Hemidesmosoma
B Membrana de los queratinocitos
C Lámina densa
D Núcleo
E Reticulina

31 Un hombre de 35 años ha presentado un brote de lesiones pruriginosas en las superficies extensoras de los codos y las rodillas durante el último mes. Refiere antecedentes de malabsorción, por lo que sigue una dieta especial, pero no ha tenido problemas cutáneos previos. En la exploración física, las

lesiones corresponden a vesículas de 0,4 a 0,7 cm. Se realiza una biopsia en sacabocados de 3 mm de una de estas lesiones del codo y el estudio histológico revela acumulación de neutrófilos en las puntas de las papilas dérmicas con formación de pequeñas ampollas secundarias a la separación de la unión dermoepidérmica. La inmunofluorescencia revela depósitos granulares de IgA localizados en las puntas de las papilas dérmicas. Las pruebas de laboratorio encuentran anticuerpos frente a la gliadina en el suero. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Penfigoide ampolloso
B Dermatitis de contacto
C Dermatitis herpetiforme
D Lupus eritematoso discoide
E Eritema multiforme
F Pénfigo vulvar

32 Se realiza un estudio con pacientes que desarrollan lesiones cutáneas tras la exposición solar. No se encuentran lesiones en la piel protegida de la luz ultravioleta. La biopsia de la piel afectada muestra depósitos de inmunoglobulina G a lo largo de la unión dermoepidérmica, con vacuolización de la capa basal e infiltrado linfocítico perivascular. No se observa afectación de otros órganos. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que tengan estos pacientes?

A Penfigoide ampolloso
B Enfermedad celíaca
C Lupus eritematoso discoide
D Síndrome del nevo displásico
E Necrólisis epidérmica tóxica

33 Un hombre de 18 años presenta lesiones faciales y en la parte superior de la espalda que aparecen y desaparecen durante los últimos 6 años. En la exploración física se encuentran comedones, pápulas eritematosas, nódulos y pústulas de 0,3 a 0,9 cm de diámetro, que se localizan sobre todo en la parte inferior de la cara y superior del tronco en la parte posterior. Otros familiares mostraron afectación por este cuadro a la misma edad. Las lesiones empeoran durante un crucero de 5 días por el mar Adriático. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más

probable que desempeñe un papel clave en la patogenia de estas lesiones?

A Estreptococo β-hemolítico del grupo A
B Virus del herpes simple de tipo 1
C *Mycobacterium leprae*
D *Propionibacterium acnes*
E *Staphylococcus aureus*

34 Un hombre de 29 años con antecedentes de enfermedad de Crohn ha notado la aparición de un nódulo rojo doloroso en la parte inferior de la pierna izquierda durante la semana previa. En la exploración física su temperatura es de 37,3 °C. Se encuentra un nódulo rojo oscuro, extremadamente doloroso, de 0,4 cm, rodeado de una zona de piel roja pálida de 5 cm. Esta lesión se resuelve en las 3 semanas siguientes, pero aparece otra en la pantorrilla contralateral. Se estudia histológicamente la biopsia cutánea de la segunda lesión y se encuentra un infiltrado inflamatorio mixto en la dermis con neutrófilos, células redondas y células gigantes, que afectan al tejido adiposo, además de intenso edema. Las lesiones se resuelven sin cicatriz, pero durante el año siguiente aparecen más. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Acné vulgar
B Dermatitis herpetiforme
C Eritema nudoso
D Impétigo
E Molusco contagioso

35 Una niña de 13 años presenta dos lesiones indoloras en los dedos, que han aparecido durante los últimos 5 meses. La exploración física revela pápulas de color blanco grisáceo ligeramente sobreelevadas, de superficie empedrada de 0,5 cm, una en el dorso del índice derecho distal y otra periungueal en el meñique. Estas lesiones desaparecen de forma gradual en los 18 meses siguientes. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que esté implicado en la patogenia de estas lesiones?

A Mutación del gen *BRAF*
B Infección por el virus del papiloma humano
C Depósitos de anticuerpos IgA
D Reacción de hipersensibilidad de tipo IV
E Deficiencia de vitamina B_3



36 Un hombre de 26 años ha observado lesiones que han aumentado lentamente de tamaño durante los últimos 3 años en las manos. En la exploración física, las lesiones se parecen a la que muestra la figura. No presenta otras alteraciones significativas. Las lesiones no han sufrido cambios de color, no son pruriginosas ni sangran y no duelen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Condiloma acuminado
B Dermatofibroma
C Nevo intradérmico
D Molusco contagioso
E Queratosis seborreica
F Carcinoma epidermoide
G Verruga vulgar

37 Un hombre de 35 años ha observado un pequeño bulto en la parte superior del tronco en las últimas 6 semanas. La exploración física revela un nódulo único de color carnoso y 0,4 cm de diámetro en la parte superior del tronco. La lesión con forma de cúpula está umbilicada y al exprimirlo se obtiene un material parecido a la nata. Se realiza una extensión de este material sobre un portaobjetos y se tiñe con Giemsa, y se observan muchas inclusiones citoplásmicas rosadas y homogéneas. La lesión remite en los 2 meses siguientes. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que produjera esta lesión?

A *Histoplasma capsulatum*

B Virus del papiloma humano
C Molusco contagioso
D *Staphylococcus aureus*
E Tiña del cuerpo
F Virus de la varicela-zóster

38 Un niño de 6 años desarrolló máculas eritematosas de 1-2 cm y pústulas de 0,5-1 cm en la cara durante la semana previa. En los 2 días siguientes, algunas de las pústulas se rompen y forman erosiones poco profundas revestidas por una costra melicérica. Se forman nuevas lesiones alrededor de la costra. El tío de 40 años del paciente desarrolla lesiones parecidas tras visitar al niño durante 1 semana mientras estaba enfermo. La retirada de las costras de la cara del niño se sigue de la curación en 1 semana. El tío no consulta a ningún médico y desarrolla pústulas adicionales en la periferia de las costras. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que explique estos hallazgos?

A Acné vulgar
B Penfigoide ampolloso
C Dermatitis de contacto
D Eritema multiforme
E Impétigo
F Liquen plano

39 Un hombre de 23 años y otros miembros de su club de tenis han notado prurito en los pies durante los últimos 2 meses. En la exploración física, este paciente presenta lesiones cutáneas difusas eritematosas y descamativas entre los dedos de los dos pies. No se encuentran otras alteraciones significativas. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que haya provocado estos hallazgos?

A Estreptococos β-hemolíticos del grupo A
B Virus del herpes simple
C Virus del papiloma humano
D *Propionibacterium acnes*
E *Sarcoptes scabiei*
F *Staphylococcus aureus*
G *Trichophyton rubrum*

40 Una niña de 10 años presenta múltiples escoriaciones que han aparecido en la piel de las manos durante la última semana. La

niña dice que se ha rascado las manos porque le pican. En la exploración física se identifican múltiples trayectos lineales de 0,2-0,6 cm en las regiones interdigitales. El tratamiento con una loción de lindano tópico resuelve el cuadro. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que explique estos hallazgos?

A *Ixodes scapularis*
B Poxvirus
C *Staphylococcus aureus*
D *Sarcoptes scabiei*
E Tiña del cuerpo

41 Una mujer de 32 años ha observado áreas decoloradas en el tronco que aparecen y desaparecen en los últimos 3 meses. Dice que no le pican ni sangran y tampoco le duelen. La exploración física revela máculas de tamaño variable, entre 0,3 y 1,2 cm, en la parte superior del tronco. Estas máculas tienen un color más claro que el resto de la piel y muestran una ligera descamación periférica. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que ocasione estos hallazgos?

A Especies de *Epidermophyton*
B Virus del papiloma humano
C *Malassezia furfur*
D *Mycobacterium leprae*
E *Propionibacterium acnes*
F *Sarcoptes scabiei*

42 Una niña sana de 11 años presenta una placa descamativa eritematosa en la parte superior del tórax desde hace 2 días. En el momento de la exploración física, que se realiza 2 días después, la lesión anular de 7 cm presenta eritema periférico ligeramente sobreelevado y está cubierta por descamación. Se realiza un raspado de la piel de la lesión y se administra después ketoconazol tópico. La familia tiene un cachorro de pastor alemán desde la semana anterior. ¿Qué es más probable que se identifique en el estudio microscópico del raspado de esta lesión teñido con hidróxido de potasio (KOH)?

A Bacterias en cadenas largas
B Levaduras en gemación
C Cuerpos de molusco
D Hifas ramificadas tabicadas

E Vacuolización de los queratinocitos

Respuestas

1 **E** Las vesículas miden como máximo 5 mm. Es fácil que sufran traumatismos y pierdan su techo, dejando ulceraciones poco profundas. En este caso es más probable que se trate de vesículas herpéticas. Las ampollas también están llenas de líquido, pero miden más de 0,5 cm. Las máculas no están sobreelevadas y se trata de áreas planas, de menos de 0,5 cm, que se distinguen por una diferencia de color. Cuando el área mide más de 0,5 cm, se habla de placa. Las pápulas son sobreelevadas y miden menos de 0,5 cm, pero, si miden más, se habla de *nódulo.* Estas lesiones pueden tener una superficie cupuliforme o plana. Las pústulas son lesiones sobreelevadas y están llenas de leucocitos, por lo que tienen un color amarillento.

2 **A** Las pecas son frecuentes. Los individuos de piel clara y/o pelo rojizo tienen más probabilidad de presentar pecas. Estas lesiones pueden ser un problema estético, pero no tienen más importancia. Un lentigo es una mácula parda, cuya pigmentación no se relaciona con la exposición solar. El melasma es una zona parecida a una máscara de hiperpigmentación facial asociada al embarazo. Los nevos no cambian con la exposición solar. Las áreas de la piel con vitíligo están despigmentadas.

3 **A** A diferencia de las pecas, que se oscurecen con la exposición a la luz, los lentigos no lo hacen. Se encuentra un aumento focal del número de melanocitos en la capa basal, con adelgazamiento de la epidermis y elongación de las crestas epidérmicas. Los lentigos pueden aparecer a cualquier edad y los que afectan a personas ancianas se llaman *lentigos seniles* o *manchas de la edad.* El nevo típicamente forma un nódulo y suele aparecer en etapas muy anteriores de la vida. La pérdida de melanina se llama *vitíligo* y es un proceso distinto de la hiperplasia melanocítica. La colección de mastocitos puede producir una urticaria pigmentaria, que suele tener un color pardo claro, pero el prurito es frecuente. Algunas infecciones fúngicas superficiales (piedra negra) pueden ser pigmentadas, pero típicamente no persisten durante años.

4 **F** La figura muestra células névicas de la unión (siguiendo la unión dermoepidérmica) e intradérmicas en una variante de nevo melanocítico que se denomina *nevo congénito.* Los nevos más grandes se asocian a un riesgo aumentado de que se desarrolle un melanoma; sin embargo, la falta de lesiones adicionales y el aspecto histológico inocente de este caso no sugieren un síndrome del nevo displásico. La acantosis *nigricans* es un proceso poco frecuente que cursa con lesiones hiperpigmentadas en los pliegues de la piel; pueden asociarse a endocrinopatías o neoplasias. Los carcinomas basocelulares aparecen en la piel expuesta al sol de adultos, y las células tienen núcleos oscuros y escaso citoplasma. Un lentigo es una lesión pigmentada focal, que puede aparecer a cualquier edad; se trata de una hiperplasia de melanocitos. El melanoma afecta a adultos y muestra signos de crecimiento y cambio rápido, con infiltración de la dermis por células muy atípicas. Las queratosis seborreicas son lesiones de ancianos y se corresponden con lesiones pigmentadas y sobreelevadas con una epidermis engrosada.

5 **A** El aspecto clínico, la distribución y la afectación de dos hermanos indican que se trata de lesiones de un síndrome del nevo displásico. Los nevos displásicos son lesiones precursoras del melanoma. El gen más importante en los casos familiares es el del inhibidor 2 de la ciclina dependiente de cinasa *(CDKN2A),* que codifica varios supresores de tumores, incluido p16/INK4A. Las mutaciones de *FGFR3* pueden encontrarse en las queratosis seborreicas de ancianos. El gen *PTCH* está implicado en la patogenia de los carcinomas basocelulares esporádicos y el síndrome del carcinoma basocelular nevoide familiar. Las mutaciones de *TSC1* se asocian a la esclerosis tuberosa.

6 **A** La mayor parte de la población australiana son inmigrantes europeos de piel clara. Este hecho, junto con la pérdida de ozono en las capas superiores de la atmósfera, que permite la entrada de más radiación ultravioleta, y la vida callejera propia de un clima cálido, han producido un aumento del número de casos. Los cánceres distintos del melanoma no contribuyen de forma significativa a las muertes, algo que sí hace el melanoma. Los otros países enumerados tienen poblaciones de piel más oscura

o menos expuestas al sol.

7 **B** La extensión descendente hasta la dermis reticular indica un crecimiento vertical (nodular). Cuando un melanoma tiene un patrón de crecimiento nodular en lugar de radial, existe más probabilidad de que un clon de células neoplásicas sea más agresivo y existe más riesgo de metástasis. Cuando la lesión mide más de 2 mm de profundidad, la supervivencia a los 5 años será del 65%, mientras que esta supera el 90% cuando la profundidad es inferior a 1 mm. Aunque se ha producido una respuesta linfocítica frente a este tumor, resulta insuficiente para destruirlo o contenerlo por completo. La mayoría de los melanomas son esporádicos y no familiares, y se relacionan con la exposición solar. Pueden aparecer a diversas edades, aunque el diagnóstico precoz y la extirpación son claves para mejorar el pronóstico. Los melanomas pueden originarse en múltiples localizaciones, incluidas las mucosas y el ojo, pero la profundidad es el factor con más importancia pronóstica.

8 **B** Este paciente presenta un melanoma de tipo lentigo maligno, que tiene una fase de crecimiento radial indolente durante muchos años antes de entrar en una fase de crecimiento vertical nodular acelerada. La mayor parte de estas lesiones se originan en la piel de la cabeza y el cuello de ancianos. Las mutaciones activadoras de *BRAF* se encuentran distales a las mutaciones de *RAS* y se describen en la mayor parte de los melanomas. Las mutaciones del gen *ATM* se asocian a la ataxia-telangiectasia, proceso en el que existen vasos subepidérmicos dilatados, que forman las lesiones denominadas *telangiectasias.* Las mutaciones de *NF1* se asocian a la aparición de muchos neurofibromas dérmicos. Las mutaciones de *TYR* se asocian al albinismo; *TYR* codifica la enzima tirosinasa, parte de la vía inicial de producción de melanina por los melanocitos. Las mutaciones de los genes de la familia *XP* se asocian a la xerodermia pigmentaria, proceso en el que los defectos de la reparación de la rotura del ADN predisponen al cáncer de piel (carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide, melanoma) desde la infancia y en relación con la luz ultravioleta.

9 **C** La figura muestra un melanoma con las típicas características *ABC: A*simetría, *B*ordes irregulares y *C*olor variable. Un cambio

rápido en una lesión pigmentada debe sugerir un posible melanoma. Algunos melanomas son familiares y aparecen en situaciones como el síndrome del nevo displásico. La mayor parte de los melanomas se producen de forma esporádica y se relacionan con la exposición al sol, como puede ocurrir en un socorrista. Las demás profesiones enumeradas no se exponen de forma significativa al sol.

10 **D** Las queratosis seborreicas son lesiones planas, redondeadas, pigmentadas y muy bien delimitadas, y se trata de tumores benignos. Están constituidos por células basaloides pigmentadas. Son frecuentes en ancianos. Las lesiones aumentan de tamaño de forma gradual, pero no duelen ni se ulceran. Se trata fundamentalmente de un problema estético. Los carcinomas basocelulares son lesiones nodulares, que aumentan de tamaño lentamente y que afectan sobre todo al tronco y la cabeza, y se relacionan con la exposición solar. Un nevo intradérmico puede provocar un nódulo pigmentado, pero microscópicamente aparece constituido por nidos de pequeñas células névicas y las lesiones aumentan de tamaño mínimamente con el tiempo. Los melanomas están constituidos por células fusiformes a epitelioides muy atípicas, que infiltran la dermis y suelen cambiar de aspecto en semanas a meses, no en años. Las células de un carcinoma epidermoide son atípicas y pueden infiltrar la dermis. La verruga vulgar también presenta una superficie irregular, pero son lesiones más frecuentes en las manos y los pies y pueden remitir pasados unos años.

11 **B** La acantosis *nigricans* puede ser un marcador cutáneo de neoplasias benignas y malignas. Las lesiones cutáneas suelen anteceder a los signos y síntomas de los cánceres asociados. Se cree que esta lesión aparece por la acción de unos factores promotores del crecimiento epidérmico elaborados por las neoplasias. Diversas lesiones cutáneas se asocian al sida, incluidas las infecciones diseminadas y las dermatosis papuloescamosas, aunque no se asocian a lesiones pigmentadas. La afectación de la piel en la histiocitosis de células de Langerhans se produce típicamente en los niños y produce pápulas o nódulos rojizos o placas eritematosas descamativas por la presencia de infiltrados de células de Langerhans en la

dermis. Las lesiones cutáneas de la mastocitosis suelen provocar urticaria en adultos. Los exantemas eritematosos que se asocian al lupus eritematoso sistémico son consecuencia del depósito de complejos antígeno-anticuerpo y suelen presentar fotosensibilidad.

12 **A** Denominado también *acrocordón* o *pólipo cutáneo,* el pólipo fibroepitelial es una lesión frecuente constituida por un eje central de tejido conjuntivo fibrovascular revestido por epitelio escamoso de aspecto normal. Puede irritarse, pero por lo demás es un hallazgo incidental. El hemangioma forma un nódulo rojizo constituido por espacios vasculares en la dermis superior. El lentigo es un foco de hiperplasia melanocítica que genera una mácula parda; en los ancianos, los lentigos se llama *lentigos seniles* o *manchas por edad,* y se suelen localizar en las manos. El melasma suele cursar como un área parecida a una máscara de hiperpigmentación facial y se asocia al embarazo. El quiste pilar (triquilemal) es un quiste epitelial formado en el cuero cabelludo. El xantoma es una colección localizada en la dermis de macrófagos cargados de lípidos asociados a hiperlipidemia.

13 **C** El quiste de inclusión epidérmico es la variante más frecuente de quiste epitelial, que es una estructura quística formada por el crecimiento en sentido descendente del epitelio o la expansión de un folículo piloso. Se reviste de epitelio escamoso, que descama restos de queratina hacia el centro del quiste en expansión. La rotura del quiste provoca una reacción inflamatoria local. El acné produce comedones, sobre todo en la cara y la parte superior del tronco de adolescentes y adultos jóvenes. El dermatofibroma es una lesión solitaria, firme y de localización dérmica. El pólipo fibroepitelial es un pólipo cutáneo, que se proyecta desde la superficie de la piel a través de un estrecho pedículo. El tricoepitelioma es una variante de tumor anexial benigno, poco frecuente; se trata de un nódulo subcutáneo, que suele localizarse en la cabeza, el cuello y la parte superior del tronco. Los xantomas son nódulos blandos amarillentos, que se pueden formar en la dermis por la presencia de colecciones de macrófagos cargados de lípidos en pacientes con una hiperlipidemia.

14 **E** Las queratosis actínicas son lesiones premalignas asociadas

a la exposición solar. Los ancianos tienen más probabilidades de sufrir queratosis actínicas por su mayor exposición acumulada al sol, no solo por el envejecimiento. Las queratosis actínicas más extensas pueden ser tratadas con 5-fluorouracilo tópico. La hidrocortisona puede aliviar los síntomas de muchos procesos dermatológicos, pero no puede revertir la lesión actínica. Reducir la grasa de la dieta siempre es buena idea, pero no afecta mucho a la piel de la cara. La resección quirúrgica con márgenes amplios está indicada en las lesiones más agresivas, como los melanomas. Muchos fármacos pueden producir una dermatitis eccematosa aguda y el eritema multiforme, pero no un cáncer de piel. Los antioxidantes retrasan los efectos del envejecimiento, pero no pueden revertir la lesión actínica.

15 **E** Los factores de riesgo de carcinoma epidermoide incluyen la exposición a la luz ultravioleta, las cicatrices por quemaduras previas, la radioterapia y la inmunodepresión. Este paciente estaba inmunodeprimido para prevenir el rechazo del injerto y la desregulación inmunitaria favorece la carcinogenia en pacientes trasplantados. Los carcinomas epidermoides también aparecen en trastornos poco frecuentes de la reparación del ADN, como la xerodermia pigmentaria. El dermatofibroma es típicamente una lesión solitaria, firme y de localización dérmica. El eritema multiforme es una respuesta de hipersensibilidad frente a las infecciones o los fármacos; las lesiones adoptan múltiples formas, incluidas pápulas, máculas, vesículas y ampollas. El liquen plano es un trastorno inflamatorio autolimitado, que se manifiesta con «pápulas purpúricas, pruriginosas y poligonales», pero no con lesiones sobreelevadas ulceradas. La psoriasis es una dermatosis inflamatoria, que puede asociarse a una artritis, miopatías, enteropatías o cardiopatía ateroesclerótica de base.

16 **D** La aparición de un carcinoma epidermoide en un niño en una zona expuesta al sol sugiere el infrecuente proceso llamado xerodermia pigmentaria (XP), que es un proceso hereditario derivado de la mutación de uno de los distintos genes *XP.* La radiación UV determina el entrecruzamiento de los residuos de pirimidina y evita la replicación normal del ADN. Este daño del ADN es reducido gracias al sistema de reparación de errores de

los nucleótidos. Los pacientes con XP pueden presentar cualquiera de los tumores malignos secundarios a la exposición solar, de forma que tienen que permanecer en el interior o emplear extensa protección solar. Las otras respuestas no están implicadas en este mecanismo.

17 **B** Los carcinomas basocelulares se originan como pápulas perladas en las áreas de la piel expuestas al sol, sobre todo en la cara. Infiltran lentamente los tejidos circundantes y aumentan de tamaño de forma gradual. Aunque es raro que produzca metástasis, el carcinoma basocelular puede tener graves efectos locales, sobre todo en la región del ojo. La queratosis actínica es una lesión premaligna de la epidermis, que no infiltra el tejido circundante. El dermatofibroma es una lesión dérmica benigna constituida por células parecidas a los fibroblastos. Los melanomas suelen ser pigmentados y están constituidos por células poligonales o fusiformes que suelen crecer en láminas e infiltran, lo que provocan una lesión de margen irregular. Un nevo es una lesión pequeña localizada y benigna.

18 **A** El fibrohistiocitoma benigno o dermatofibroma es una lesión indolente, que puede variar de tamaño con el tiempo. Podría considerarse una respuesta localizada frente a un traumatismo. La variante maligna que crece más y se comporta de forma más agresiva es el dermatofibrosarcoma protuberante. Los leiomiomas, que son neoplasias benignas de músculo liso, pueden aparecer en muchas localizaciones (parecen originarse en el músculo liso vascular), pero son infrecuentes en la piel. Las células de Merkel son de origen neuroendocrino y el carcinoma de células de Merkel recuerda a un carcinoma de células pequeñas pulmonar. Los neurofibromas pueden ser solitarios o múltiples en la neurofibromatosis, pero no se asocian a los cambios epidérmicos histológicos que se muestran en la imagen. Los schwannomas suelen originarse en un nervio periférico.

19 **B** El dermatofibrosarcoma protuberante es la forma maligna del dermatofibroma. El gen *PDGFB* está yuxtapuesto a la región promotora de *COL1A1,* lo que se traduce en la regulación al alza de un factor promotor del crecimiento. Es posible emplear el mesilato de imatinib para inhibir el receptor de tirosina cinasa PDGF para controlar las lesiones recidivantes o metastásicas.

Las mutaciones de *FGFR3* son más características de las queratosis seborreicas. Las mutaciones de *KIT* se encuentran en las proliferaciones de mastocitos. Los carcinomas basocelulares presentan mutaciones de *PTCH1.* Las mutaciones de *TSC1* se encuentran en la esclerosis tuberosa, con manifestaciones cutáneas, como las manchas cenicientas, las placas achagrinadas, los fibromas subungueales y los angiofibromas.

20 **E** La urticaria pigmentaria es una forma localizada de mastocitosis. Las lesiones cutáneas suelen mostrar el signo de Darier típico cuando se frota sobre ellas. Algunos pacientes pueden tener una mastocitosis sistémica. Pueden existir mutaciones puntuales del oncogén *KIT.* Las demás células inmunitarias que se recogen, incluidos linfocitos, células de Langerhans y macrófagos, participan en las reacciones inflamatorias, como la dermatitis de contacto. Los macrófagos y las células de Langerhans son células presentadoras de antígenos. Las células de Merkel son de estirpe neuroendocrina y derivan de la cresta neural, y pueden dar origen al peculiar tumor de células de Merkel, que se parece a un carcinoma de células pequeñas.

21 **B** Si este paciente se come las galletas, desarrollará habones, o urticaria, en relación con una alergia frente a los antígenos de los frutos secos. Esto provoca una reacción de hipersensibilidad de tipo I en la que los anticuerpos IgE se unen al receptor IgE en los mastocitos. Los mastocitos sensibilizados con IgE se desgranulan cuando se encuentran con el antígeno. Los linfocitos colaboradores CD4+ forman parte fundamentalmente de las reac- ciones inmunitarias humorales o mediadas por células de la respuesta inmunitaria adaptativa. Las células citolíticas naturales intervienen en la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos y lisan las células diana con deficiencia del complejo principal de histocompatibilidad de clase I. Los neutrófilos pueden ser atraídos hasta este sitio, pero no son las células sensibilizadas. Las células plasmáticas secretan los anticuerpos IgE, pero no liberan los mediadores de las reacciones alérgicas.

22 **A** La dermatitis eccematosa aguda es una reacción frecuente frente a muchos irritantes cutáneos. La epidermis presenta una

llamativa espongiosis. Si se retira el irritante, las lesiones se resuelven en pocos días. La dermatitis por contacto es un tipo de lesión que aparece tras una exposición y sensibilización previa. ¿Le ayudó la hierba medicinal? Dado que las lesiones desaparecen por sí mismas, no resulta sencillo demostrarlo. Si los remedios no producen daño y no son caros, pueden resultar beneficiosos porque tienen un efecto placebo, algo que puede ser potente (y carecer de efectos adversos). Los curanderos suelen dedicar más tiempo a los pacientes que los médicos y, si son capaces de reconocer los problemas graves, que exigen tratamientos farmacológicos o quirúrgicos, la situación de bienestar del paciente mejorará. El eritema multiforme puede ser también una reacción frente a una sustancia química, a menudo un fármaco, pero tiene un efecto sistémico y las lesiones suelen tener inicialmente un aspecto dianiforme. El impétigo suele iniciarse en la cara y las lesiones forman costras, pero se deben a una infección (en general por estafilococos o estreptococos). El eccema puede convertirse en un liquen simple crónico si no se retira el irritante y el paciente se rasca o frota mucho las lesiones pruriginosas. La urticaria cursa con habones por una reacción de hipersensibilidad de tipo I, típicamente en relación con una picadura de insecto o la ingesta de un alimento u otra sustancia.

23 **B** La evolución temporal de este caso sugiere una reacción farmacológica que ha producido una dermatitis eritematosa aguda. La sepsis no suele afectar a la piel como una dermatitis eritematosa. La infección por el virus del papiloma humano se asocia a la formación de una verruga vulgar. La fotosensibilidad puede agravarse por los fármacos, pero la luz ultravioleta es el componente clave de la luz que produce la fotodermatitis, de forma que no es probable que aparezca fotosensibilidad con la iluminación de interior de una habitación hospitalaria. La mayor parte de los empresarios no compran las costosas bombillas que imitan la luz solar, lo que se traduce en un aumento de la prevalencia de trastorno afectivo estacional y una reducción de la productividad de la plantilla. La urticaria de la hipersensibilidad de tipo I no es tan grave ni duradera.

24 **D** El eritema multiforme (EM) es una respuesta de

hipersensibilidad frente a determinadas infecciones y fármacos, como las sulfonamidas y la penicilina. Otros factores que inducen un EM incluyen las infecciones por el virus del herpes simple, micoplasmas y hongos, las enfermedades malignas y las enfermedades del colágeno vascular, como el lupus eritematoso sistémico. Los otros fármacos antirretrovíricos o antimicrobianos enumerados tienen un riesgo mucho menor de producir reacciones cutáneas. El paracetamol y la dapsona se asocian a menos riesgo de EM, pero muchos fármacos pueden producir exantemas y erupciones cutáneas.

25 **D** La paciente presenta una psoriasis y la aparición de las lesiones en relación con traumatismos se denomina *fenómeno de Koebner.* Aunque dos tercios de los pacientes afectados tienen el alelo HLA-Cw*0602, solo el 10% de las personas que presentan este alelo desarrollan una psoriasis. Se produce una activación anormal de los linfocitos CD4+ y CD8+ con liberación de muchas citocinas, incluido el factor de necrosis tumoral, que media la lesión cutánea. La atopia aumenta el riesgo de reacciones alérgicas mediadas por la hipersensibilidad de tipo I, a menudo con aparición de lesiones urticariales cutáneas que desaparecen en pocas horas. Los autoanticuerpos frente a la desmogleína en el pénfigo vulgar determinan la formación de ampollas suprabasales. Los alérgenos de las plantas, como el urusiol de la ortiga, provocan una dermatitis por contacto, que típicamente cede en pocos días. La infección por el virus del herpes simple puede producir erupciones vesiculosas o puede ser la base de un eritema multiforme, que se manifiesta con lesiones dianiformes.

26 **D** Las lesiones se corresponden con una psoriasis, determinada por la elaboración por parte de los linfocitos T de citocinas responsables de la proliferación celular, lo que se traduce en una alteración de la secuencia normal de maduración de los queratinocitos. La acantosis es una hiperplasia de la epidermis, con aumento del grosor de toda la epidermis. La disqueratosis es una queratinización prematura por debajo de la capa granulosa. La hiperqueratosis es un aumento del grosor de la capa córnea con una queratina anormal; el *callo* es un engrosamiento de la capa córnea secundario a fuerzas mecánicas, como sucede en las manos de un carpintero que

trabaja con herramientas o las plantas de un niño que camina descalzo. La espongiosis es un edema entre las células epidérmicas.

27 **E** La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel con marcada hiperplasia epitelial y presencia de una escama paraqueratósica. Los linfocitos CD4+, como parte de la respuesta T_H17 y T_H1, elaboran citocinas, que estimulan la proliferación celular, y los linfocitos CD8+ producen daño celular. Los cambios ungueales, como la coloración parduzco-amarillenta, la formación de punteado, hoyuelos y la separación de la placa ungueal respecto del lecho (onicólisis), aparecen en un tercio de los pacientes. Otras manifestaciones de la psoriasis incluyen artritis (parecida a la artritis reumatoide), miopatía, enteropatía y cardiopatía ateroesclerótica. En la psoriasis no aparece un soplo por fricción relacionado con una pericarditis fibrinosa, porque este cuadro no afecta a las superficies mesoteliales. La afectación de la mucosa digestiva con hemorragia no caracteriza a la psoriasis. La laxitud articular con hiperreflexia caracteriza al síndrome de Ehlers-Danlos. La psoriasis no se asocia a nefropatía o hipertensión.

28 **D** Aparecen las clásicas «pápulas poligonales purpúricas y pruriginosas» del liquen plano con el característico infiltrado en banda de linfocitos en la unión dermoepidérmica. Los linfocitos citotóxicos CD8+ reaccionan frente a los antígenos de la capa basal y la unión dermoepidérmica. Las lesiones del liquen plano son típicamente autolimitadas, aunque pueden evolucionar durante varios años. Las lesiones orales duran más tiempo. Las lesiones crónicas pueden asociarse a un carcinoma epidermoide. Aunque existe un infiltrado linfocítico, no participa ninguna infección ni proceso autoinmunitario. La erupción medicamentosa no debería durar tanto tiempo y el liquen plano no es una reacción de hipersensibilidad. Es más probable que las lesiones del eritema multiforme aparezcan después de infecciones, fármacos, enfermedades autoinmunitarias o procesos malignos. Los tumores anexiales cutáneos son típicamente benignos y a menudo tienen origen apocrino, por lo que se localizan en regiones donde existen este tipo de glándulas, como el cuero cabelludo o la axila. En general no se

asocian a otras enfermedades.

29 **C** Las lesiones del pénfigo vulgar se deben a autoanticuerpos IgG frente a la sustancia presente en el cemento intercelular llamada desmogleína, lo que justifica un aspecto parecido a una red en el estudio con microscopio de inmunofluorescencia. El depósito de anticuerpos rompe los puentes intercelulares y determina que las células epidérmicas se desprendan entre ellas (acantólisis). Esta acción produce una ampolla intraepidérmica. La tinción con anticuerpos IgG resalta las uniones intercelulares en los focos de acantólisis incipiente. La microscopia de campo oscuro se emplea de forma casi exclusiva para identificar las espiroquetas causantes de la sífilis. Algunos tipos de HLA aumentan el riesgo de determinadas enfermedades cutáneas, pero esto no permite predecir quién desarrollará la enfermedad. La hipersensibilidad de tipo I con presencia de IgE fija los mastocitos y la urticaria no produce una vesícula acantolítica. Las infecciones por el virus del herpes simple pueden ocasionar brotes de vesículas, pero una distribución tan amplia sería rara.

30 **A** Las ampollas subepidérmicas del penfigoide ampolloso suelen curarse sin cicatriz. Luego pueden aparecer lesiones orales. La mayoría aparecen en ancianos y la enfermedad se debe al depósito de IgG en las placas de anclaje entre las células basales y la membrana basal (hemidesmosomas) que contienen el antígeno del penfigoide ampolloso (BPAG). La lámina densa de la membrana basal no se afecta de forma directa y la ampolla del penfigoide ampolloso en realidad se forma en la lámina lúcida. Por el contrario, los anticuerpos del pénfigo vulgar atacan a los desmosomas que unen los queratinocitos epidérmicos. Los anticuerpos frente a los antígenos nucleares son más típicos de las enfermedades autoinmunitarias sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos frente a la gliadina de la dermatitis herpetiforme muestran una reactividad cruzada con la reticulina dérmica y se forman microabscesos en las puntas de las papilas dérmicas.

31 **C** La dermatitis herpetiforme puede asociarse a la enfermedad celíaca. Los anticuerpos IgA o IgG frente a la proteína gliadina del gluten que se ingiere (habitualmente en el trigo, centeno o avena) muestran una reactividad cruzada con la reticulina. La

reticulina es un componente de las fibrillas de anclaje que unen la membrana basal de la epidermis con la dermis superficial. Esto explica que la IgA se localice en las puntas de las papilas dérmicas y la localización de la inflamación. La dieta exenta de gluten puede aliviar los síntomas. El penfigoide ampolloso puede afectar a ancianos y los anticuerpos frente a los queratinocitos provocan ampollas flácidas, pero no se asocia a la enfermedad celíaca. La dermatitis por contacto suele afectar a las manos y los antebrazos. Se trata de una reacción de hipersensibilidad de tipo IV sin depósito de inmunoglobulinas y no debería durar 1 mes. El lupus eritematoso discoide afecta a regiones expuestas al sol y recuerda a un exantema eritematoso. El eritema multiforme es una respuesta de hipersensibilidad frente a infecciones y fármacos, y produce máculas y pápulas con un centro rojo o vesiculoso, aunque probablemente viene mediada por linfocitos citotóxicos, no por depósito de inmunoglobulinas. El pénfigo vulgar es una enfermedad autoinmunitaria en la que la IgG depositada en las regiones acantolíticas forma vesículas, que se rompen y generan erosiones; no guarda relación con la enfermedad celíaca.

32 **C** El lupus discoide más benigno solo afecta a la piel, a diferencia del lupus eritematoso sistémico, aunque ambos son una reacción de hipersensibilidad de tipo III con depósito de complejos antígeno-anticuerpo a lo largo de la membrana basal de la epidermis. Las otras opciones enumeradas no se asocian a la exposición solar. Las lesiones del penfigoide ampolloso se producen en la unión dermoepidérmica por depósito de anticuerpos frente al colágeno de tipo XVII como componente de los hemidesmosomas. La dermatitis herpetiforme asociada a la enfermedad celíaca se asocia al depósito de anticuerpos IgA en las puntas de las papilas dérmicas. Los nevos displásicos se desarrollan en relación con mutaciones de genes que codifican proteínas implicadas en el control del crecimiento. La necrólisis epidérmica tóxica es una forma grave de eritema multiforme mediada por linfocitos citotóxicos CD8+ frente a las células basales de la epidermis. Las lesiones precoces del lupus eritematoso discoide aparecen como máculas o pápulas púrpuras descamativas bien delimitadas, que luego crecen para

formar placas discoides. Histológicamente se reconoce degeneración vacuolar de la basal, áreas de atrofia epidérmica, acantosis, tapones foliculares queratósicos, engrosamiento de la membrana basal, e infiltrados linfocíticos perivasculares superficiales y profundos.

33 **D** El acné vulgar afecta más a adolescentes y adultos jóvenes que a los demás grupos de edad, y los hombres lo sufren con más frecuencia que las mujeres. *Propionibacterium acnes* degrada las grasas en las glándulas sebáceas y produce ácidos grasos irritantes, lo que puede fomentar este proceso. La comida del crucero posiblemente no guarda relación, pero el estrés determina que las lesiones empeoren. *Staphylococcus aureus* y los estreptococos del grupo A están implicados en el proceso inflamatorio cutáneo denominado impétigo, que cursa con pústulas y una costra parduzco-amarillenta pálida característica. El virus del herpes simple provoca erupciones cutáneas vesiculosas, sobre todo de distribución genital o perioral. *Mycobacterium leprae* causa la lepra, que es un trastorno crónico que puede ocasionar despigmentación focal y áreas de anestesia en la piel.

34 **C** El eritema nudoso es una variante de paniculitis que puede asociarse a infecciones, ingesta de fármacos, enfermedad inflamatoria intestinal y tumores malignos, pero no siempre se encuentra ninguna causa de base. La inflamación afecta principalmente al tejido adiposo dérmico. El acné vulgar suele aparecer en la cara y parte superior del tronco, centrado alrededor de los folículos pilosos; se suele resolver con cicatriz. La enfermedad celíaca se asocia a la dermatitis herpetiforme y los anticuerpos frente a la gliadina pueden tener reacciones cruzadas con la reticulina dérmica y ocasionar microabscesos en las puntas de las papilas dérmicas. El impétigo suele afectar a las manos y la cara con aparición de costras por las infecciones por *Staphylococcus aureus* y estreptococos β-hemolíticos, que ocasionan pústulas subcórneas. Las lesiones del molusco contagioso son nódulos firmes en el microscopio que contienen inclusiones rosadas en el citoplasma, que se denominan *cuerpos de molusco.*

35 **B** Las verrugas son bastante frecuentes, sobre todo en los

niños, y suelen persistir hasta un par de años. Existen subtipos de virus del papiloma humano (VPH) asociados a distintos aspectos clínicos: verruga vulgar de las manos, verruga plana de la cara y las manos, verruga palmar en las palmas, verruga plantar en las plantas de los pies y condilomas acuminados (verrugas venéreas) en los genitales. Pueden encontrarse mutaciones de *BRAF* en las proliferaciones melanocíticas, como los nevos displásicos. En la dermatitis herpetiforme existen depósitos de IgA. La dermatitis por contacto es una forma de hipersensibilidad de tipo IV. Puede aparecer una dermatitis fotosensible en la deficiencia de niacina.

36 **G** Las verrugas de este paciente son un problema frecuente, secundario a la infección por uno de los múltiples tipos de virus del papiloma humano (VPH). No se malignizan y suelen remitir en unos años. Los condilomas acuminados o verrugas genitales se deben a un tipo de VPH de transmisión sexual y las lesiones suelen ser rosadas o blancas. El dermatofibroma forma un nódulo subcutáneo, igual que el nevo intradérmico. El molusco contagioso es un cuadro autolimitado de aspecto nodular. Las queratosis seborreicas son lesiones pardas pálidas a oscuras, que aumentan de tamaño lentamente y tienen una superficie irregular; suelen encontrarse en el tronco y la cara de ancianos. El carcinoma epidermoide crece de forma irregular, infiltra los tejidos adyacentes y se ulcera.

37 **C** Esta lesión se caracteriza por unas inclusiones rosadas en el citoplasma, conocidas como *cuerpos de molusco.* Los pacientes inmunodeprimidos presentan múltiples lesiones de mayor tamaño. El microorganismo responsable es un poxvirus. Las infecciones diseminadas por hongos, como la histoplasmosis, son raras en la piel, salvo en inmunodeprimidos. La verruga vulgar se asocia al virus del papiloma humano (no a un sapo). *Staphylococcus aureus* está implicado en la aparición de las lesiones de impétigo y las infecciones pustulosas cutáneas. Existen diversas infecciones superficiales por hongos, sobre todo por dermatofitos, como la tiña corporal que produce placas descamativas. El virus de la varicela-zóster produce el herpes zóster, caracterizado por la aparición de vesículas claras, dolorosas, que siguen la distribución de un dermatoma.

38 **E** El impétigo es una infección cutánea superficial, que provoca erosiones poco profundas. Estas erosiones se recubren de un exudado de suero, que se seca y condiciona el aspecto melicérico característico de la costra. El cultivo de las lesiones del impétigo suele identificar *Staphylococcus aureus* o estreptococos β-hemolíticos del grupo A positivos para coagulasa. Las lesiones son muy infecciosas. El acné vulgar se encuentra típicamente durante la adolescencia y cursa con granos y pústulas, pero no costras. El penfigoide ampolloso puede aparecer en adultos más ancianos en los que existen anticuerpos frente a los queratinocitos, lo que causa ampollas flácidas. La dermatitis por contacto afecta sobre todo a las manos y los antebrazos. El eritema multiforme es una respuesta de hipersensibilidad frente a las infecciones y los fármacos, y cursa con máculas y pápulas, con un centro rojizo o vesiculoso. El liquen plano produce pápulas y placas violáceas.

39 **G** El pie de atleta es un proceso frecuente que se debe a una infección superficial por dermatofitos, que incluyen hongos de distintas especies, como *Trichophyton, Epidermophyton* y *Microsporum.* Las infecciones que afectan a los pies producen el cuadro denominado *tiña del pie.* Los estreptococos y estafilococos provocan el impétigo, que es más frecuente en la cara y las manos. Las infecciones herpéticas producen inicialmente brotes de vesículas claras, que pueden romperse y formar úlceras dolorosas poco profundas. El virus del papiloma humano se conoce por causar verrugas genitales (condilomas acuminados) y también por ser uno de los factores que provocan las displasias del epitelio escamoso cervical y anal. *Propionibacterium acnes* es un factor implicado en la aparición del acné. El pequeño ácaro de ocho patas llamado *Sarcoptes scabiei* circula por el estrato córneo, generalmente entre los dedos, y provoca prurito, en el proceso denominado *sarna.*

40 **D** Los ácaros de la sarna trazan unos surcos en el estrato córneo y esto explica las lesiones lineales de los pacientes, y tanto los ácaros como sus huevos y heces provocan un prurito intenso. La sarna se transmite con facilidad por contacto y son típicos los brotes comunitarios. *Ixodes scapularis* es una garrapata que sirve como vector para *Borrelia burgdorferi,*

responsable de la enfermedad de Lyme y el eritema crónico migratorio. El molusco contagioso se debe a un poxvirus, que produce un nódulo firme localizado. Las máculas y pústulas eritematosas del impétigo en niños se suelen deber a una infección por estafilococos y estreptococos del grupo A. La tiña del cuerpo es una infección superficial por hongos de tipo dermatofito, que puede producir eritema y costras.

41 **C** La tiña versicolor es un proceso frecuente causado por una infección superficial por el hongo *Malassezia furfur.* Las lesiones pueden ser más claras o más oscuras que la piel circundante. Los géneros *Epidermophyton, Trichophyton* y *Microsporum* son hongos dermatofitos, conocidos por ser la causa del pie de atleta y la tiña inguinal. El virus del papiloma humano es la causa de las verrugas genitales (condiloma acuminado) y es responsable de la displasia de células escamosas anal y cervical. *Mycobacterium leprae* es la causa de la enfermedad de Hansen, que puede manifestarse con áreas de anestesia cutánea que predisponen a los traumatismos de repetición. La infección por *Propionibacterium acnes* es un factor implicado en la aparición del acné. *Sarcoptes scabiei* causa la sarna, que cursa con lesiones pruriginosas rojizas.

42 **D** Estos hallazgos son compatibles con una tiña del cuerpo, una infección superficial por hongos muy frecuente. El aspecto anular con aclaramiento central puede recordar a los anélidos, pero no se trata de un cuadro por helmintos. La infección suele adquirirse de otras personas, animales y fómites. Aunque son molestas y antiestéticas, las infecciones por dermatofitos no invaden ni se diseminan. Los azoles tópicos pueden ser un tratamiento eficaz en humanos y también para los animales. En este caso se puede clasificar el dermatofito implicado como *Microsporum canis,* dada la participación de un perro. La presencia de cadenetas de cocos sugiere una infección por estreptococos, que podrían causar un impétigo. La presencia de levaduras con gemación sugiere candidiasis, una infección superficial frecuente, pero suele afectar más a los pliegues húmedos y calientes. El virus del molusco contagioso, del grupo de los poxvirus, produce una pápula umbilicada sobreelevada. La vacuolización del citoplasma es un efecto vírico típico, que

puede encontrarse en la verruga común.

CAPÍTULO
26

Huesos, articulaciones y tumores de tejidos blandos

PEF9 Capítulo 26: Huesos, articulaciones y tumores de partes blandas

PH9 Capítulo 20: Tumores de hueso, articulaciones y tejidos blandos

1 Cuando se aplica estrés mecánico sobre un hueso, las células osteoprogenitoras producen proteínas WNT que se ligan a receptores en los osteoblastos, aumentando la β-catenina. Según esto, ¿cuál de las siguientes proteínas es más probable que reduzca la actividad de los osteoclastos y aumente la formación ósea?

A Proteína morfogénica ósea
B Metaloproteinasa de matriz
C Factor nuclear κB
D Osteoprotegerina
E Ligando de RANK

2 Un hombre de 39 años se ve implicado en un accidente de esquí durante sus vacaciones y sufre una fractura de la diáfisis de la tibia derecha. Se resuelve la fractura mediante reducción abierta y fijación interna tras alinearla bien. ¿Cuál de las siguientes funciones es más probable que realicen los osteoclastos presentes en el lecho de la fractura 1 semana más tarde?

A Actividad mitótica
B Elaboración de citocinas
C Formación de colágeno
D Resorción de hueso
E Síntesis de osteoide

3 Una mujer de 29 años, G3, P2, da a luz un lactante tras un embarazo no complicado. La talla del lactante está por debajo del percentil 5. En la exploración física el tamaño de la cabeza y el torso es normal, pero las extremidades son cortas. La frente es prominente. Las radiografías revelan unos huesos largos cortos, ligeramente abombados, sin osteopenia. Los otros dos niños de la familia tienen una talla normal. El niño afectado no presenta dificultades en las actividades de la vida diaria tras introducir las modificaciones necesarias en la casa y la escuela para adaptarse a la talla baja, y se acaba convirtiendo en médico. ¿Cuál de los siguientes trastornos es probable que sufra este niño?

A Acondroplasia
B Síndrome de Hurler
C Osteogenia imperfecta
D Raquitismo
E Escorbuto
F Displasia tanatofórica

4 Una chica de 14 años normal al nacer ha desarrollado una hipoacusia bilateral. La audiometría revela una hipoacusia mixta de conducción y neurosensorial bilateral. La TC craneal muestra un mal desarrollo de los dos oídos medios con osificación deficiente. La anamnesis indica que su odontólogo ha empleado diversos blanqueadores para reducir el color pardo amarillento de los dientes, que tienen una morfología algo acampanada. El optometrista ha observado que las escleróticas de esta niña tienen un curioso color gris acero y la visión es 20/40. A los 30 años, la paciente se cae y se fractura el fémur izquierdo. Una radiografía muestra que el fémur está osteopénico. La densitometría ósea revela osteopenia en todas las localizaciones medidas. ¿Cuál de los siguientes mecanismos moleculares es más probable que ocasione estos hallazgos?

A Deficiencia de la actividad de hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa (HGPRT)
B Menor unión de la osteoprotegerina al receptor RANK de los macrófagos
C Fallo en la formación de colágeno de tipo I por los osteoblastos
D Inhibición por el receptor del factor de crecimiento

fibroblástico 3 de la proliferación del cartílago
E Aumento de la producción de interleucina 6 por los osteoblastos
F Menor número de receptores de vitamina D

5 Una mujer primigrávida de 23 años observa una reducción de los movimientos fetales, y la ecografía de cribado de la semana 18 de gestación muestra una disminución del tamaño fetal. Se produce el parto de un mortinato a las 25 semanas de gestación. En la autopsia se realiza una radiografía, que muestra una importante osteopenia y múltiples fracturas óseas. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que tenga alteraciones en el análisis de mutaciones en las células fetales?

A *COL1A1*
B *EXT*
C *FGFR3*
D *FBN1*
E *HGPRT*
F *RB*

6 Una primigrávida de 17 años da a luz de forma prematura a un lactante pequeño para la edad gestacional. El lactante sufre una dificultad respiratoria inmediata. En la exploración del neonato destaca acortamiento de los miembros, abombamiento de la parte frontal del cráneo y un tórax pequeño. La radiografía muestra una densidad ósea normal sin fracturas. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable que sufra este paciente?

A Acondroplasia
B Sífilis congénita
C Osteogenia imperfecta
D Raquitismo
E Displasia tanatofórica

7 Un niño de 2 años refiere antecedentes de múltiples fracturas óseas con traumatismos menores. En la exploración se observa hepatoesplenomegalia y parálisis de los pares craneales II, VII y VIII. Las pruebas de laboratorio indican pancitopenia. Las radiografías muestran huesos escleróticos de forma difusa y simétrica con metáfisis mal formadas. El análisis molecular del hueso revela un defecto en la producción de anhidrasa carbónica para solubilizar los cristales de hidroxiapatita. Se trata con

trasplante de células madre hematopoyéticas. ¿Cuál de las siguientes células óseas es más probable que tuviera una deficiencia funcional y haya sido sustituida tras el trasplante?

A Condroblasto
B Condrocito
C Osteoblasto
D Osteoclasto
E Osteocito

8 Una mujer de 77 años se tropieza con la alfombra en casa y se cae al suelo. De forma inmediata sufre dolor intenso en la cadera derecha. La exploración física revela un acortamiento de la pierna derecha con rotación externa y marcado dolor con cualquier movimiento. La radiografía confirma una fractura del cuello del fémur derecho, que se repara. A los 6 meses, la absorciometría con rayos X de energía dual (DEXA) de la cadera izquierda y las vértebras lumbares de la paciente muestra que la densidad mineral ósea está dos desviaciones estándar por debajo de los valores de referencia para adultos jóvenes. ¿Cuál de los siguientes procesos celulares es más probable que contribuya en mayor medida a la aparición de estos hallazgos?

A Menor secreción de interleucina 6 por los monocitos
B Aumento de la sensibilidad de los osteocitos a la hormona paratiroidea
C Insensibilidad de la matriz ósea al 1,25-dihidroxicolecalciferol
D Mutación en el gen del receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos 3
E Aumento de la actividad de los osteoclastos
F Síntesis de matriz osteoide con alteraciones químicas

9 Una mujer de 35 años con una nefritis lúpica activa se cae hacia delante y aterriza sobre la mano izquierda. Presenta dolor inmediato. La exploración física revela crepitantes en la muñeca. La radiografía muestra fracturas radiales y naviculares, además de una marcada osteopenia. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es más probable que haya contribuido a esta fractura?

A Hidrocortisona
B Ibuprofeno
C Lisinopril
D Losartán

E Metotrexato

10 Se realiza un estudio epidemiológico sobre mujeres posmenopáusicas. Se someten a un seguimiento periódico mediante absorciometría con rayos X de energía dual (DEXA) de la cadera y las vértebras lumbares durante los 10 años siguientes para evaluar la densidad mineral ósea. Las pacientes responden a una encuesta sobre el consumo actual o previo de fármacos, la dieta, el nivel de actividad, los antecedentes de fracturas óseas y los trastornos médicos. Se identifica una cohorte de pacientes cuya densidad mineral ósea se parece a los valores de referencia de los adultos jóvenes y en las que no se han producido fracturas óseas. ¿Cuál de las estrategias siguientes es más probable que consiga la mejor reducción global a largo plazo del riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas según este estudio?

A Aumento de la masa ósea mediante la práctica del ejercicio en los primeros años adultos

B Limitación del consumo de alcohol, evitando el tabaco

C Inicio del tratamiento de sustitución con estrógenos tras una fractura

D Aporte de suplementos en la dieta de calcio y vitamina D tras la menopausia

E Uso de tratamiento con corticoesteroides para los trastornos inflamatorios



11 Un hombre de 70 años refiere dolor en la cadera y el muslo derechos de 8 meses de evolución. En la exploración física se encuentra una reducción del arco de movilidad en las dos caderas, sin hipersensibilidad o tumefacción a la palpación. Las radiografías de la pelvis y la pierna derecha identifican un hueso cortical engrosado y esclerótico con estenosis del espacio articular cerca del acetábulo. Las pruebas de laboratorio séricas señalan fosfatasa alcalina de 173 U/l; calcio, 9,5 mg/dl; y fósforo, 3,4 mg/dl. Esta figura muestra el aspecto histológico representativo del hueso pélvico. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que produzca estos hallazgos?

A Artrosis degenerativa
B Hiperparatiroidismo
C Osteocondroma
D Enfermedad de Paget ósea
E Deficiencia de vitamina D

12 Un hombre de 82 años ha desarrollado una lumbalgia con dolor de ambas caderas y del hombro derecho progresivos durante los últimos 6 años. Dice que ahora utiliza sombreros de mayor tamaño. En la exploración física no se encuentra tumefacción, eritema, calor o hipersensibilidad articular, pero el arco de movilidad está reducido. Las radiografías revelan un estrechamiento del espacio articular con esclerosis del hueso adyacente. La radiografía de cráneo identifica engrosamiento de los huesos del cráneo, pero con una reducción de la densidad. La biopsia de hueso obtenida en la cresta ilíaca revela pérdida de las trabéculas normales con un patrón en mosaico y aumento del número de osteoclastos y osteoblastos. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que presente el paciente como consecuencia de este proceso?

A Espondilitis anquilosante
B Encondromatosis
C Displasia fibrosa
D Osteoma osteoide
E Osteosarcoma

13 Un hombre de 38 años ha presentado dolor crónico en la pierna durante los últimos 4 meses. Eliminó un cálculo urinario hace 1 mes. En la exploración física destaca tumefacción local con

hipersensibilidad justo por debajo de la rótula derecha. La radiografía de la pierna derecha revela un área quística de 4 cm en la diáfisis de la tibia derecha, sin erosión de la cortical o masa de tejidos blandos. Las pruebas de laboratorio muestran calcemia, 12,6 mg/dl; y fósforo, 2,1 mg/dl. Se obtiene una biopsia de la lesión que muestra un aumento de los osteoclastos y una proliferación de fibroblastos. ¿Cuál de los siguientes trastornos de base es más probable que explique estos hallazgos?

A Glomerulonefritis crónica
B Osteomielitis crónica
C Tumor de células gigantes del hueso
D Enfermedad de Paget ósea
E Adenoma de paratiroides

14 Un hombre de 28 años es volteado por encima de un vehículo todo terreno y aterriza sobre la pierna. En la exploración física presenta intenso dolor a la palpación de la pantorrilla derecha, pero el miembro no está acortado. La piel suprayacente está intacta. La radiografía muestra una fractura del tercio medio de la tibia y el peroné derechos en múltiples fragmentos óseos. ¿Cuál de los siguientes términos es el que mejor describe estas fracturas?

A Conminuta
B Compuesta
C Desplazada
D Incompleta
E Patológica

15 Una mujer de 26 años tiene malestar, artralgias y mialgias desde hace 2 meses. En la exploración física no se encuentra tumefacción ni deformidad articular. Las pruebas de laboratorio revelan una creatinina sérica de 3,9 mg/dl. La biopsia renal muestra una glomerulonefritis proliferativa. Se le administran glucocorticoides durante 3 meses. En este momento presenta dolor en la cadera izquierda con el movimiento, pero en la exploración física no se identifican tumefacción ni deformidad. La radiografía de la pierna y la pelvis izquierdas identifica una zona de transparencia y densidad parcheadas de la cabeza femoral con aplanamiento del hueso. Se realiza una artroplastia total de la cadera izquierda y el estudio macroscópico de la cabeza femoral seccionada muestra un colapso del cartílago articular en un área subcondral pálida y

cuneiforme. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable que tenga esta paciente?

A Necrosis avascular
B Encondroma
C Artrosis
D Osteomielitis
E Osteodistrofia renal

16 Un niño de 9 años ha tenido dolor en la cadera derecha durante las últimas 3 semanas. En la exploración física la temperatura es de 38,2 °C y presenta tumefacción con una notable hipersensibilidad a la palpación en la cadera derecha, con dolor y amplitud de movilidad limitada. Las radiografías de la pelvis y las piernas revelan áreas de osteólisis y erosión cortical que afectan a las metáfisis femorales, con tumefacción de los tejidos blandos adyacentes que se extiende desde la región subperióstica y con aparente formación de abscesos. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que ocasione estos hallazgos?

A *Haemophilus influenzae*
B *Neisseria gonorrhoeae*
C *Salmonella enterica*
D *Staphylococcus aureus*
E Estreptococos del grupo B

17 Un niño de 7 años sufrió una fractura abierta compuesta de la tibia y el peroné derechos tras caer desde el altillo de un pajar al suelo. En la exploración física se veía protruir la parte distal de la tibia y el peroné en la pierna. La fractura se redujo mediante manipulación externa y se suturó la herida de la piel, pero no se realizaron más intervenciones. Un año después, el paciente sigue con dolor en la pierna derecha y ha aparecido un trayecto fistuloso de drenaje en la parte lateral de la pierna derecha. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que se encuentre en una radiografía de la parte inferior de la pierna derecha?

A Nido cortical rodeado de esclerosis
B Involucro y secuestro
C Osteólisis con osteoesclerosis
D Hemorragia y tumefacción de los tejidos blandos
E Masa tumoral con destrucción ósea

18 Un hombre de 39 años lleva 3 meses con lumbalgia. Refiere tos

crónica durante 2 años. En la exploración física se observa hipersensibilidad a la palpación en las vértebras lumbares, sin calor, tumefacción ni eritema. La radiografía de la columna revela una fractura por compresión a nivel de L2. La TC abdominal identifica un absceso en el músculo psoas derecho. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que se identifique como causa de estos hallazgos?

A *Cryptococcus neoformans*
B *Mycobacterium tuberculosis*
C *Shigella flexneri*
D *Staphylococcus aureus*
E *Streptococcus pyogenes*
F *Treponema pallidum*

19 Una niña de 12 años desarrolla de forma súbita dolor intenso en la rodilla izquierda que la ha despertado por la noche varias veces en las últimas 6 semanas. En cada episodio, la madre le administró ácido acetilsalicílico con alivio del dolor. En la exploración física no se encuentran alteraciones significativas. La radiografía de la rodilla izquierda identifica un área clara bien definida de 1 cm rodeada de un delgado ribete de esclerosis ósea en la cortical de la tibia proximal. Se realiza una radioablación de la lesión, sin que reaparezca el dolor. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable en esta lesión?

A Encondroma
B Displasia fibrosa
C Tumor de células gigantes
D Osteoblastoma
E Osteocondroma
F Osteoma osteoide



20 Un hombre de 19 años se cae y golpea la pierna, y percibe un intenso dolor. En la exploración física se encuentra tumefacción de la parte inferior de la pierna. Se realiza una RM potenciada en T_1, que se muestra en la figura. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable que tenga este paciente?

A Condrosarcoma
B Sarcoma de Ewing
C Tumor de células gigantes
D Seminoma metastásico
E Osteosarcoma

21 Un niño de 16 años ha presentado dolor alrededor de la rodilla derecha durante los últimos 3 meses. No se encuentran

alteraciones, salvo dolor local en la zona distal del fémur derecho. La radiografía de la pierna derecha muestra una masa mal delimitada, que afecta a la metáfisis del fémur derecho distal con elevación del periostio adyacente. Se obtiene una biopsia ósea, y el estudio histológico revela grandes células fusiformes pleomorfas e hipercromáticas que forman matriz osteoide. ¿Cuál de los siguientes genes supresores de tumores es más probable que tenga mutado este niño?

A *APC*
B *BRCA1*
C *NF1*
D *PTEN*
E *RB*



22 Un hombre de 23 años ha presentado dolor en la rodilla derecha durante el último año. En la exploración física se encuentra hipersensibilidad puntual en un área focal de 2 cm situada justo por debajo de la rótula lateralmente por encima de la tibia. La radiografía de la pierna derecha identifica una excrecencia de 3 cm de base amplia, que se proyecta desde la región metafisaria de la tibia superior. Se extirpa la lesión y la figura muestra el aspecto macroscópico de la lesión cortada. ¿Cuál de los siguientes

diagnósticos es más probable?
- A Encondroma
- B Displasia fibrosa
- C Tumor de células gigantes
- D Osteoblastoma
- E Osteocondroma



23 Un hombre sano de 38 años nota dolor ocasional en el dedo índice derecho cuando manipula un martillo. A la palpación de la falange proximal derecha se encuentra una zona de hipersensibilidad puntual. La radiografía revela una zona de claridad ovalada de 1 cm en esta falange, con un ribete de hueso denso y brillante alrededor. En la figura se muestra el aspecto histológico de la lesión extirpada. ¿Cuál de las siguientes células es más probable que haya dado origen a esta lesión?
- A Condrocito
- B Célula gigante
- C Macrófago
- D Osteoblasto
- E Célula plasmática
- F Fibroblasto



24 Una mujer de 30 años ha notado dolor en la rodilla izquierda durante el último mes. La exploración física revela hipersensibilidad a la palpación de la parte distal del muslo y la rodilla izquierdos. La zona está firme, pero no se observa eritema ni calor. La radiografía de la pierna izquierda identifica una masa de 7 cm en la epífisis distal del fémur, con aspecto en «pompas de jabón». El estudio histológico del legrado de la lesión muestra los hallazgos de la figura. La lesión recidiva al año siguiente; es extirpada y no recae de nuevo. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Condrosarcoma
B Encondroma
C Tumor de células gigantes
D Osteítis fibrosa quística
E Osteoblastoma
F Plasmocitoma



25 Un hombre de 45 años ha notado dolor en el área de la cadera y la parte superior del muslo izquierdo durante los últimos 7 meses. En la exploración física se encuentra hipersensibilidad a la palpación profunda de la región izquierda de la ingle. La amplitud de movimiento de la cadera izquierda está reducida, pero no se observa tumefacción ni calor a la palpación. Las radiografías de la pelvis y la pierna izquierda revelan una masa metafisaria en la

parte superior del fémur que erosiona la cortical ósea circundante. Se extirpa el fémur proximal y al corte presenta el aspecto macroscópico que muestra la figura. ¿Cuál de los siguientes tipos celulares es más probable que prolifere en esta masa?

A Condrocito
B Osteoblasto
C Osteoclasto
D Célula plasmática
E Célula neuroectodérmica primitiva

26 Un niño de 13 años sano ha tenido dolor en la pierna derecha durante el último mes. No refiere antecedentes de traumatismos o enfermedades recientes. En la exploración física se encuentra una zona de calor e hipersensibilidad a la palpación de la parte inferior del muslo derecho en la parte anterior y el perímetro del muslo derecho es ligeramente más grande que el izquierdo. La temperatura es de 39 °C. La radiografía de la pierna derecha muestra una masa expansiva de 6 cm en la diáfisis del fémur inferior derecho, que se extiende hacia los tejidos blandos y se recubre por capas de hueso reactivo. Se biopsia la masa y el estudio histológico identifica láminas de células primitivas densamente agregadas, con núcleos pequeños y uniformes y escaso citoplasma. El estudio del cariotipo de las células tumorales encuentra una translocación t(11;22). ¿Cuál de los diagnósticos siguientes es más probable?

A Condrosarcoma
B Sarcoma de Ewing
C Tumor de células gigantes
D Carcinoma metastásico
E Osteosarcoma
F Plasmocitoma

27 Una niña de 14 años sufre dolor intenso en la pierna derecha después de realizar un ejercicio gimnástico de suelo. En la exploración física presenta notable dolor a la palpación en la parte inferior del muslo derecho justo por encima de la rodilla. Las radiografías identifican una fractura patológica que atraviesa una lesión diafisaria de 3 cm en la parte distal del fémur, con una zona clara central y un delgado ribete esclerótico. La lesión está bien delimitada y es totalmente intramedular. Se biopsia el hueso de la

región afectada y el estudio histológico revela trabéculas de hueso trenzado dispersas sobre un fondo de proliferación fibroblástica. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Sarcoma de Ewing
B Displasia fibrosa
C Callo de fractura
D Osteosarcoma
E Osteoma osteoide

28 Una mujer de 75 años ha desarrollado un dolor sordo progresivo, aunque constante, en la espalda, el tórax derecho, el hombro izquierdo y la parte superior del muslo izquierdo durante los últimos 6 meses. En la actualidad presenta dolor agudo súbito e intenso en el muslo izquierdo. La exploración física revela intenso dolor a la palpación de la parte superior del muslo, y la pierna izquierda está acortada en comparación con la derecha. La radiografía identifica una fractura en la región diafisaria superior del fémur izquierdo en una zona lítica de 5 cm de diámetro que afecta a todo el espesor del hueso. La gammagrafía ósea identifica múltiples áreas de aumento de la captación en el fémur izquierdo, la pelvis, las vértebras, las costillas tercera y cuarta derechas, la parte superior del húmero izquierdo y la escápula izquierda. Las pruebas de laboratorio indican creatinina sérica, 0,9 mg/dl; proteínas totales, 6,7 g/dl; albúmina, 4,5 g/dl; bilirrubina total, 1 mg/dl; AST, 28 U/l; ALT, 22 U/l; y fosfatasa alcalina, 202 U/l. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Hiperparatiroidismo
B Carcinoma metastásico
C Mieloma múltiple
D Osteocondromatosis
E Enfermedad de Paget ósea
F Displasia fibrosa poliostótica

29 Una mujer de 78 años presenta un dolor sordo constante en la espalda de más de 1 mes de evolución. Actualmente no refiere una situación aguda. La exploración física no encuentra alteraciones. Las pruebas de laboratorio indican creatinina, 0,9 mg/dl; nitrógeno ureico, 17 mg/dl; proteínas totales, 6,8 g/dl; albúmina, 4,2 g/dl; bilirrubina total, 0,8 mg/dl; AST, 25 U/l; ALT, 29 U/l; calcio, 10,8 mg/dl; fósforo, 2,3 mg/dl; y fosfatasa alcalina, 228 U/l. ¿Cuál de las

siguientes causas es más probable que explique la hipercalcemia?

A Condrosarcoma
B Artritis gotosa
C Carcinoma metastásico
D Artrosis
E Osteoporosis
F Enfermedad de Paget ósea

30 Un hombre de 71 años ha sufrido un dolor sordo en la rodilla derecha, la parte distal de la espalda, el quinto dedo derecho en su parte distal y el cuello en los últimos 10 años. El paciente observa rigidez articular por las mañanas, que luego cede con rapidez. El dolor empeora al final del día. En la exploración física no se encuentra tumefacción articular, calor ni deformidad. Se ausculta cierto grado de crepitación articular al mover la rodilla. Las pruebas de laboratorio muestran calcio, fósforo, fosfatasa alcalina y ácido úrico en concentraciones normales. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que explique la hipercalcemia?

A Espondilitis anquilosante
B Artritis gotosa
C Mieloma múltiple
D Artrosis
E Seudogota
F Artritis reumatoide

31 Una mujer de 83 años presenta dolor y limitación de la movilidad en la articulación de la cadera derecha que ha ido empeorando durante los últimos 15 años. La exploración física identifica una protrusión nodular ósea en la articulación interfalángica distal del índice derecho. Todas las demás articulaciones parecen normales. No se encuentran datos de enfermedad sistémica, y la exploración cardiológica y respiratoria es anodina. La radiografía de la cadera afectada muestra un estrechamiento del espacio articular con esclerosis subcondral. Las pruebas de laboratorio no muestran factor reumatoide ni anticuerpos antinucleares. La concentración de ácido úrico sérico es 5 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes factores es más importante en la patogenia de la enfermedad?

A Defectos en la función del condrocito articular
B Mutación de un gen implicado en la síntesis de colágeno de

tipo I
C Infiltración de la membrana sinovial por linfocitos T CD4+ activados
D Herencia del genotipo HLA-B27
E Deficiencia parcial de hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa (HGPRT)



32 Una mujer de 47 años ha presentado dolor y deformidad progresiva en las manos durante los últimos 10 años. En la exploración física muestra tumefacción de la articulación metacarpofalángica, eritema e hipersensibilidad. Se identifica un nódulo subcutáneo en la vertiente cubital del antebrazo derecho. La biopsia de este nódulo tiene el aspecto histológico que muestra la figura. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más probable que haga efecto en esta paciente?
A Bisfosfonatos
B Antibióticos de amplio espectro
C Fármacos anti-TNF
D Inhibidores del ciclo celular de tipo uricosúrico


A
B

33 Una mujer de 34 años ha sufrido malestar, fatiga y dolor articular durante los últimos 5 meses. Ha perdido de forma progresiva la movilidad articular, con dificultades para caminar y emplear las manos. La exploración física revela una afectación articular simétrica y la mayor parte de las articulaciones afectadas se encuentran en las manos y los pies. Las articulaciones implicadas están tumefactas y calientes al tacto. Los dedos segundo y tercero de la mano derecha presentan una deformidad en cuello de cisne y se encuentra una desviación cubital de las dos manos. Se realiza una cirugía de reconstrucción de la mano derecha. La figura muestra imágenes histológicas del tejido extirpado de la cápsula articular. ¿Cuál de las siguientes pruebas serológicas es más probable que sea positiva en esta paciente?

A Anticuerpo frente a la ADN topoisomerasa I
B Anticuerpos antinucleares
C *Borrelia burgdorferi*
D *Campylobacter jejuni*
E Péptidos citrulinados

34 Una niña de 10 años ha desarrollado dolor progresivo en las rodillas y los tobillos en los últimos 3 meses y actualmente tiene dificultad para la deambulación. La exploración física revela articulaciones tumefactas y calientes al tacto e hipersensibilidad difusa de los músculos. La temperatura es de 39,2 °C. Hay un exantema eritematoso en la piel del puente de la nariz y los dorsos de las manos. Se encuentra hepatoesplenomegalia y se ausculta un soplo por fricción en el tórax. Se obtiene un aspirado de la articulación de la rodilla izquierda y se realiza un cultivo del líquido que es negativo. El estudio microscópico del líquido articular identifica muchos linfocitos, pero pocos neutrófilos. El cuadro mejora en el año siguiente y no deja deformidad residual en las articulaciones. ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio es más probable que se encuentre en esta paciente?

A Título de serología de ANA 1:1024
B Serología de *Borrelia burgdorferi* positiva
C Urocultivo positivo para *Chlamydia trachomatis*
D Ferritina sérica de 7245 ng/ml
E Hemoglobina S en la electroforesis de la hemoglobina

F Título de factor reumatoide de 1:512
G Serología de la sífilis (STS) positiva
H Concentración de ácido úrico en suero de 15,8 mg/dl

35 Un hombre de 35 años de raza sami finlandesa ha presentado lumbalgia progresiva durante los últimos 6 años. En la exploración física tiene una movilidad reducida en la columna. Las radiografías revelan pérdida de la lordosis lumbar, estenosis con esclerosis de las dos articulaciones sacroilíacas y formación de sindesmofitos en la unión de las vértebras y los anillos fibrosos de los discos intervertebrales. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que presente este paciente?

A Glomerulonefritis
B Hepatitis
C Mala absorción
D Meningitis
E Uveítis

36 Un hombre de 30 años lleva 4 días con dolor cólico abdominal y diarrea sanguinolenta. La exploración física revela hipersensibilidad difusa a la palpación del abdomen, y se conservan los ruidos hidroaéreos. No se encuentran masas ni organomegalias. El coprocultivo es positivo para *Shigella flexneri.* El cuadro se resuelve de forma espontánea en 1 semana, pero a las 6 semanas desarrolla un dolor lumbar cada vez más intenso. La exploración física revela rigidez de la columna lumbar con hipersensibilidad de las articulaciones sacroilíacas. Recibe tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, pero a los 2 meses el dolor lumbar reaparece y el paciente refiere enrojecimiento del ojo derecho y visión borrosa. ¿Cuál de las siguientes pruebas serológicas es más probable que sea positiva en este paciente?

A *Borrelia burgdorferi*
B *Chlamydia trachomatis*
C Virus de Epstein-Barr
D HLA-B27
E Factor reumatoide

37 Una mujer de 47 años lleva 20 años preocupada por la aparición de lesiones recidivantes en los codos, rodillas, cuero cabelludo y región lumbosacra. Estas lesiones tienen un color plateado o

asalmonado y son placas descamativas de 1-4 cm. También ha notado dolor progresivo en la mano izquierda y las caderas, sobre todo izquierda, durante los últimos 2 años. En la exploración física se observa una coloración parduzco-amarillenta con presencia de fositas en las uñas. Las articulaciones interfalángicas distales de la mano izquierda muestran una ligera tumefacción e hipersensibilidad. Se observa una reducción mínima de la movilidad de la cadera izquierda, sin tumefacción ni calor al tacto. La radiografía de la cadera izquierda revela un mínimo estrechamiento del espacio articular y erosión superficial. La densidad ósea es normal para la edad. Durante los 10 años siguientes persiste el dolor articular, pero sin destrucción ni deformidad articular. La paciente sigue presentando las mismas lesiones cutáneas. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que se encuentre en la biopsia de las lesiones cutáneas?

A Infiltrado en banda de linfocitos en la dermis superior
B Espongiosis epidérmica con edema dérmico y eosinófilos
C Adelgazamiento de la epidermis con hiperqueratosis y paraqueratosis
D Apoptosis focal de los queratinocitos
E Depósitos de IgG a lo largo de la unión dermoepidérmica

38 Un niño de 15 años ha tenido múltiples ingresos hospitalarios desde la infancia por crisis de dolor abdominal. Durante la última semana ha referido dolor en la cadera derecha. En la exploración física destaca marcada hipersensibilidad y tumefacción a la palpación de la cadera derecha. Las pruebas de laboratorio revelan hemoglobina, 8,5 g/dl; hematocrito, 25,7%; recuento plaquetario, 199.900/mm^3; y recuento leucocítico, 12.190/mm^3. En el frotis de sangre periférica se observan drepanocitos y eritrocitos nucleados. La radiografía de la pelvis y la parte superior de la pierna derecha identifica cambios inflamatorios agudos en la cabeza del fémur y la metáfisis del fémur proximal derecho. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que ocasione estos hallazgos?

A Estreptococos del grupo B
B *Klebsiella pneumoniae*
C *Mycobacterium tuberculosis*
D *Salmonella enterica*
E *Staphylococcus aureus*

39 Una mujer de 48 años ha presentado dolor crónico en el hombro izquierdo y la cadera derecha durante 8 meses. El dolor se resolvió en 1 mes, pero a los 2 meses desarrolló dolor en la rodilla y el tobillo derechos, que se resolvió en 6 semanas. La exploración física actual indica que no tiene fiebre. Se encuentra dolor al mover el hombro izquierdo y la cadera derecha. La radiografía del brazo izquierdo revela una extensa erosión ósea en la cabeza del húmero. Se obtiene una biopsia de la sinovial y el estudio histológico identifica infiltrados linfoplasmocíticos intensos y arteritis con proliferación endotelial. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que ocasione estos hallazgos?

A *Borrelia burgdorferi*
B Estreptococos del grupo B
C *Mycobacterium tuberculosis*
D *Neisseria gonorrhoeae*
E *Treponema pallidum*

40 Un niño de 8 años lleva 3 días con dolor en la pierna izquierda. En la exploración física temperatura es de 38,9 °C y presenta irritabilidad al moverle dicha pierna. La radiografía de la zona identifica cambios sugestivos de una osteomielitis aguda en la porción proximal del fémur izquierdo. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que se cultive en el hueso infectado?

A *Haemophilus influenzae*
B *Neisseria gonorrhoeae*
C *Salmonella enterica*
D *Staphylococcus aureus*
E *Streptococcus pneumoniae*

41 Un hombre de 27 años desarrolla de forma aguda dolor y tumefacción de la rodilla izquierda a los 5 días de presentar un episodio de uretritis. La exploración física confirma una rodilla izquierda tumefacta, caliente y dolorosa al tacto. No se observa afectación de otras articulaciones. El examen de laboratorio del líquido aspirado de la articulación de la rodilla izquierda revela numerosos neutrófilos y la tinción con Gram identifica diplococos intracelulares gramnegativos. No se observan cristales. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que produzca este cuadro?

A *Borrelia burgdorferi*
B *Haemophilus influenzae*
C *Neisseria gonorrhoeae*
D *Staphylococcus aureus*
E *Treponema pallidum*



42 Un hombre de 55 años, sano, ha presentado episodios de dolor y tumefacción en la primera articulación metatarsofalángica derecha durante el último año. Estos brotes suelen producirse después de que el paciente consuma alcohol, típicamente vino de Oporto (gran reserva). En la exploración física se confirma una hipersensibilidad intensa con tumefacción y eritema en la primera articulación metatarsofalángica derecha. Se realiza una aspiración de la articulación y con el microscopio de luz polarizada (la *flecha* colocada en el eje del compensador rojo) se obtiene una imagen del líquido, que muestra la figura, con presencia de muchos neutrófilos en una pequeña cantidad de líquido. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más probable que resulte útil como primera línea de tratamiento?

A Antibióticos
B Corticoesteroides
C Fármacos antiinflamatorios no esteroideos
D Antagonista de folatos

E Inhibidor de la xantina oxidasa



43 Un hombre de 51 años presenta episodios prolongados de intenso dolor local en el pie izquierdo desde hace 4 meses. El dolor puede durarle de horas a días. La exploración física identifica que el foco de hipersensibilidad y tumefacción es la articulación metatarsofalángica derecha (MTF), pero la pérdida de movilidad articular es mínima. Se reconoce un nódulo indoloro de 2 cm de diámetro con ulceración de la piel suprayacente en la superficie lateral de la articulación MTF. Por debajo de la piel erosionada se encuentra un depósito blanquecino de material blando parecido a la tiza. Se extirpa un nódulo subcutáneo firme de 1 cm en la superficie extensora del codo izquierdo, cuyo aspecto histológico refleja la figura. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es el más importante en el origen de las lesiones articulares de este paciente?

A Activación de los neutrófilos por la fagocitosis de los cristales de urato

B Liberación de TNF que provoca inflamación articular aguda

C Depósito de colesterol sérico en la sinovial

D Inflamación granulomatosa en la infección por *Mycobacterium tuberculosis*

E Menor metabolismo del ácido homogentísico

44 Un hombre de 58 años diagnosticado de leucemia mieloide crónica recibe quimioterapia intensiva. Se consigue la remisión de la enfermedad, pero desarrolla dolor en la muñeca izquierda. La exploración física revela tumefacción y calor a la palpación de la muñeca. El estudio con microscopio de luz polarizada del líquido aspirado de la articulación de la muñeca muestra cristales aciculares con birrefringencia negativa. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que haya jugado un papel importante en la patogenia del dolor de la muñeca en este caso?

A Alteración de la función plaquetaria con hemorragias articulares
B Toxicidad sobre el cartílago articular de los quimioterápicos
C Proliferación de la sinovial inducida por citocinas
D Producción excesiva de ácido úrico
E Infiltración por células leucémicas de la sinovial



45 Un hombre de 48 años ha presentado dolor progresivo en la rodilla izquierda durante los últimos 4 años, pero el dolor ha empeorado en la última semana. En la exploración física la rodilla izquierda está ligeramente edematosa y caliente al tacto. El recuento celular en el aspirado articular muestra un aumento de los neutrófilos. La figura corresponde a un frotis del líquido analizado con microscopio de luz polarizada (*flecha* en el eje del

compensador rojo). El paciente pierde movilidad en la articulación de la rodilla en los 5 años siguientes. También presenta insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes mellitus y cirrosis hepática. ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio es más característico de este proceso patológico?

A Título serológico de ANA 1:1.024
B Concentración de ferritina sérica 7.245 ng/ml
C Título serológico de factor reumatoide 1:512
D Pruebas serológicas de la sífilis (STS) positivas
E Concentración de ácido úrico sérico de 15,8 mg/dl

46 Una mujer de 33 años está preocupada porque tiene un bulto en el dorso de la muñeca izquierda desde hace 4 meses. La exploración física revela un nódulo subcutáneo firme, pero fluctuante, de 1 cm encima del tendón extensor de la muñeca izquierda. El nódulo es doloroso a la palpación y con el movimiento. Se aspira líquido mucoide de su interior. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Ganglión
B Tumor de células gigantes
C Lipoma
D Fascitis nodular
E Nódulo reumatoide
F Tofo

47 Un hombre de 25 años ha tenido dolor en la rodilla derecha con sensación de «ruido y bloqueo» durante los últimos 2 años. En la exploración se observa una reducción del arco de movilidad de la rodilla derecha, sin hipersensibilidad o tumefacción. La RM identifica una masa de 3 cm en el espacio articular anterior. Se realiza una cirugía artroscópica con sinovectomía parcial y se extirpa una masa nodular encapsulada. El estudio histológico de dicha masa revela células neoplásicas parecidas a los sinoviocitos en el seno de un estroma hialinizado, que contiene células gigantes de tipo osteoclástico y hemosiderina. ¿Cuál de los siguientes factores de crecimiento es probable que resulte más útil antagonizar como tratamiento de esta lesión?

A EGF
B FGF
C M-CSF

D PDGF
E TGF-β
F VEGF

48 Un hombre de 33 años ha notado un bulto en el flanco derecho. El bulto es indoloro y ha aumentado de tamaño lentamente durante los últimos 3 años. La exploración física revela un nódulo de 2 cm blando en el tejido subcutáneo del flanco derecho, por encima de la cresta ilíaca. Se reseca la lesión, que macroscópicamente está bien delimitada y muestra una superficie de corte amarilla uniforme. ¿Cuál de las siguientes evoluciones es más probable en este caso?

A Será preciso tratamiento antibiótico
B Los familiares desarrollarán lesiones parecidas
C Aparecerán metástasis en los ganglios regionales
D Aparecerán más lesiones cutáneas con el tiempo
E No se espera una recidiva

49 Una mujer de 36 años ha notado un nódulo por debajo de la piel de la ingle izquierda desde la adolescencia. La exploración física revela una lesión de 2 cm de diámetro, indolora, blanda, elástica y móvil. ¿Cuál de los siguientes tipos celulares es más probable que constituya la lesión?

A Adipocito
B Célula endotelial
C Fibroblasto
D Músculo esquelético
E Músculo liso

50 Un hombre de 47 años lleva 4 meses con dolor sordo y constante en el tercio medio del muslo derecho. En la exploración física se confirma el dolor a la palpación en la parte anterior del muslo derecho, que se agrava con el movimiento. Parece que el muslo derecho tiene un perímetro mayor que el izquierdo. La radiografía de la pierna derecha y la pelvis no identifica fracturas, pero se observa una masa mal delimitada de tejidos blandos anterior al fémur. La RM encuentra una masa sólida de 10 × 8 × 7 cm, profunda al cuádriceps, sin afectación del fémur. El análisis cariotípico de las células tumorales muestra una t(12;16)(q13;p11) con amplificación del gen *MDM2*. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Condrosarcoma
B Liposarcoma
C Adenocarcinoma metastásico
D Fascitis nodular
E Osteosarcoma
F Rabdomiosarcoma

51 Un hombre de 26 años recibe un golpe en el brazo izquierdo por una viga de acero oscilante en una obra. En la exploración física se encuentra un área de 4 cm en la parte superolateral del brazo izquierdo, con tumefacción, enrojecimiento y dolor a la palpación. La radiografía del brazo izquierdo no identifica fracturas. A las 3 semanas se observa una masa subcutánea dolorosa bien delimitada de 2 cm en el lugar de la lesión original. La radiografía muestra una masa de tejidos blandos sólida. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más probable que presente este paciente?

A Lipoma
B Fascitis nodular
C Absceso en fase de organización
D Sarcoma fibroblástico pleomorfo
E Fibromatosis superficial

52 Una mujer de 57 años ha observado una deformidad y dificultad para el movimiento progresivas en la mano izquierda desde hace 6 meses. La exploración física revela una contractura en el tercer dedo de la mano izquierda, que le impide extenderlo por completo. Se palpa un área firme y dura a modo de cordón de 1 × 3 cm por debajo de la piel de la palma izquierda. ¿Cuál de las siguientes estructuras es más probable que esté más representada en el estudio histológico de esta lesión?

A Células fusiformes atípicas
B Colágeno
C Calcificación distrófica
D Tejido de granulación
E Lipoblastos



53 Un niño de 6 años refiere molestias en la parte superior derecha del cuello que se han agravado en los últimos 6 meses. La exploración física revela una masa firme de 5 cm que se palpa en la parte lateral derecha del cuello. La masa no es dolorosa ni está caliente. Se obtiene una biopsia y la figura se corresponde con el aspecto histológico de la masa. ¿Cuál de los siguientes antígenos es más probable que se tiña de forma positiva en el estudio inmunohistoquímico en las células de esta lesión?

A CD3
B Citoqueratina
C Distrofina
D Enolasa neuronal específica
E Vimentina

54 Una mujer de 66 años ha presentado dolor en la región que rodea a la rodilla izquierda durante las últimas 6 semanas. No recuerda traumatismos sobre la pierna. En la exploración física no se palpan masas, ni tampoco se encuentra calor, tumefacción ni pérdida del arco de movilidad. La RM identifica una masa de 4 cm bien delimitada, superior e inferior a la rótula. La masa se encuentra dentro de los tejidos blandos, sin erosiones óseas. Se obtiene una biopsia de la masa, cuyo estudio histológico revela un patrón bifásico de células fusiformes y epiteliales con formación de glándulas. El análisis del cariotipo de estas células neoplásicas identifica una translocación t(X;18). ¿Cuál de los siguientes

diagnósticos es más probable que tenga este paciente?

A Tumor desmoide
B Leiomiosarcoma
C Mesotelioma
D Osteoblastoma
E Sarcoma sinovial

Respuestas

1 **D** El remodelado óseo es el equilibrio entre la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos. La proteína de desintegración osteoprotegerina (OPG) puede ligarse al ligando RANK y reducir su unión a RANK, y disminuir la actividad del factor de transcripción nuclear κB y de los osteoclastos. La vía WNT/β-catenina puede incrementar la producción de OPG desplazando el equilibrio hacia la formación de hueso. Las proteínas morfógenas óseas se oponen a los factores de crecimiento fibroblástico para reducir la proliferación de condrocitos. Las metaloproteinasas de matriz generadas por los osteoclastos fomentan la resorción ósea.

2 **D** El remodelado óseo se produce cuando los osteoblastos producen hueso nuevo y los osteoclastos lo reabsorben. Este proceso es normal y se produce de forma lenta y constante coordinada en todos los huesos, pero se acelera en el callo de fractura. Las células osteoprogenitoras dan origen a los osteoblastos. Los osteoclastos proceden de las mismas células progenitoras hematopoyéticas que generan los macrófagos y los monocitos. Los osteoclastos con diferenciación terminal no sufren más mitosis. Las citocinas pueden elaborarlas los macrófagos y otras células inflamatorias en el callo. Los fibroblastos elaboran colágeno y los osteoblastos producen el osteoide.

3 **A** La acondroplasia suele aparecer como consecuencia de una mutación espontánea *de novo* en el gen del receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3 *(FGFR3),* lo que se traduce en una proliferación anormal del cartílago en las placas de crecimiento y afecta fundamentalmente al crecimiento del hueso endocondral. La variante homocigota resulta mortal dentro del útero. En el síndrome de Hurler, la mucopolisacaridosis de tipo

I, los niños nacen normales, pero luego desarrollan retraso del crecimiento, retraso mental, hepatoesplenomegalia y rigidez articular. La osteogenia imperfecta puede manifestarse en el momento del nacimiento con múltiples fracturas en relación con una osteopenia grave como consecuencia de una síntesis de colágeno de tipo I anormal. Puede producirse un raquitismo en la infancia en relación con una deficiencia de vitamina D, lo que provoca una mineralización deficiente del hueso, pero el enanismo no es típico. La deficiencia de vitamina C produce escorbuto y puede ocasionar una matriz ósea anormal con leve deformidad, pero no conduce a un enanismo. La displasia tanatofórica es la variante más frecuente de enanismo mortal y también se debe a una mutación de *FGFR3.*

4 **C** Esta paciente tiene una osteogenia imperfecta, posiblemente de tipo I. La variante de tipo II es la forma perinatal mortal, que produce la muerte intrauterina, en el momento del parto o poco tiempo después de nacer. La de tipo III se encuentra en niños y adultos y es más grave que la de tipo I. Resulta difícil distinguir la variante de tipo IV de la de III. La osteogenia imperfecta provoca osteopenia («huesos frágiles») y predispone a las fracturas. Los pacientes suelen tener escleróticas azuladas, alteraciones dentales e hipoacusia progresiva. La ausencia de HGPRT es un trastorno ligado a X, que se denomina *síndrome de Lesch-Nyhan* y se caracteriza por hiperuricemia. La menor unión de la osteoprotegerina al receptor RANK de los macrófagos es parte del mecanismo de la osteoporosis. Las mutaciones del gen del receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3 *(FGFR3)* se pueden encontrar en la acondroplasia. El aumento de la producción de interleucina 6 por los osteoblastos se encuentra en la enfermedad de Paget ósea y en la reducción posmenopáusica de la producción de estrógenos, que aumenta la pérdida de hueso. La menor absorción de la vitamina D en el intestino delgado provoca el raquitismo en niños; los glucocorticoides pueden disminuir la expresión de receptores en muchos tejidos, incluido el intestino.

5 **A** Este mortinato tiene evidencias de la variante mortal de tipo II de la osteogenia imperfecta con una deficiencia de la formación de colágeno de tipo 1, que provoca múltiples fracturas

intrauterinas con acortamiento de los huesos largos. Se encuentran mutaciones de *EXT* en los casos de osteocondromas hereditarios y esporádicos. El gen *FGFR3* está implicado en los casos de acondrogenia con acortamiento de los huesos largos, pero sin osteopenia ni fracturas. Las mutaciones del gen de la fibrilina 1 *(FBN1)* se asocian al síndrome de Marfan, que afecta de forma grave al aparato cardiovascular, incluida la disección aórtica. La hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa (HGPRT) es una enzima de la vía de recuperación de las purinas y se asocia al síndrome de Lesch-Nyhan ligado a X con hiperuricemia. El gen supresor de tumores *RB* se asocia a muchos casos de osteosarcoma.

6 **E** El enanismo tanatofórico es un proceso infrecuente vinculado a mutaciones del gen *FGFR3.* La marcada reducción del tamaño torácico produce una hipoplasia pulmonar, que es el factor que limita la supervivencia. Las demás opciones recogidas pueden producir alteraciones óseas en el momento del nacimiento, pero, salvo la variante mortal perinatal de osteogenia imperfecta, no se asocian a riesgo vital.

7 **D** La osteopetrosis (enfermedad de Albers-Schönberg) es una enfermedad ósea infrecuente secundaria a mutaciones de los genes reguladores de la actividad de los osteoclastos y la resorción ósea. La anhidrasa carbónica genera los protones empleados por la bomba de protones H^+-ATPasa localizada en el borde ondulado de los osteoclastos. La médula está reducida en el hueso esclerótico con la consiguiente hematopoyesis extramedular hepática y esplénica. La compresión nerviosa en los agujeros óseos estrechos provoca parálisis. Las demás células enumeradas proceden de las células madre mesenquimatosas, no de las hematopoyéticas. La osteopetrosis es el proceso contrario de la osteoporosis. Recuerde que en la osteoporosis se fomenta la formación y la acción de los osteoclastos, mientras que los osteoblastos elaboran menos osteoprotegerina y M-CSF y aumenta la interacción entre RANK y RANKL, lo que fomenta la diferenciación de los osteoclastos y su supervivencia.

8 **E** Conforme se envejece, la capacidad de los osteoblastos de dividirse y depositar osteoide disminuye, mientras que en algunas personas la actividad de los osteoclastos aumenta, lo

que condiciona una pérdida acelerada de hueso denominada *osteoporosis.* La diferenciación de las células progenitoras estromales a osteoclastos necesita la unión del ligando de RANK de los osteoblastos al receptor de RANK en los precursores de los osteoclastos, y la estimulación por M-CSF producido por los osteoblastos. La osteoprotegerina (OPG) es un «receptor de desintegración» para al ligando RANK, que ralentiza la formación y la acción de los osteoclastos. Cuando los osteoblastos elaboran menos OPG, se acelera la pérdida de hueso. Las células del estroma medular elaboran proteínas WNT, que se ligan a los receptores de los osteoblastos y activan la β-catenina y la producción de OPG. La osteoporosis posmenopáusica se caracteriza por una aceleración dependiente de las hormonas de la pérdida de hueso. La deficiencia de estrógenos condiciona un aumento de la secreción de interleucinas 1 y 6 y del factor de necrosis tumoral α por los monocitos-macrófagos. Estas citocinas actúan aumentando las concentraciones de RANK y RANKL y reduciendo las de OPG. En las mujeres ancianas, la pérdida ósea se acelera reduciendo la síntesis y aumentando la resorción. Los fármacos no hormonales, como los bisfosfonatos, están diseñados para reducir la resorción del hueso por los osteoclastos. No se producen cambios por la edad en la sensibilidad a la acción de la vitamina D o la hormona paratiroidea o en la composición del osteoide. Las mutaciones del gen del receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3 se describen en los síndromes de enanismo, como la acondroplasia.

9 **A** Pueden necesitarse corticoesteroides para tratar la nefritis lúpica grave y el tratamiento mantenido aumenta el riesgo de síndrome de Cushing con osteoporosis. Los corticoesteroides estimulan la expresión de RANKL, inhiben la síntesis de osteoprotegerina (OPG) por los osteoblastos y de este modo aumentan la proliferación de los osteoclastos y favorecen la resorción ósea. El ibuprofeno y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) no se deberían emplear en la insuficiencia renal. El lisinopril, un inhibidor de la enzima conversora de angiotensina (ECA), y el losartán, un bloqueante del receptor de angiotensina (BRA), pueden emplearse como

tratamiento de la hipertensión en presencia de nefropatía, pero no influyen de forma directa sobre la densidad ósea. El metotrexato es un quimioterápico que se emplea en la artritis reumatoide, pero no se suele emplear en el lupus eritematoso sistémico, y en dosis bajas es menos probable que provoque una osteoporosis.

10 **A** La masa ósea total es un importante determinante del riesgo posterior de osteoporosis y sus complicaciones. Un régimen proactivo de ejercicio que someta a estrés a los huesos para aumentar la masa de los mismos antes de la inevitable pérdida que ocurre a partir de los 30 años es el que más probabilidad tiene de reducir el riesgo de osteoporosis posterior. El consumo de alcohol y tabaco no se considera factor de riesgo importante de osteoporosis. La administración de tratamiento con estrógenos o raloxifeno tras la menopausia puede ayudar a conservar la masa ósea, pero, cuando se produce una fractura, ya existe una pérdida importante de hueso. De un modo parecido, los suplementos dietéticos tras la menopausia no son dañinos, pero como máximo se limitan a ralentizar la pérdida ósea asociada al envejecimiento. El tratamiento con corticoesteroides es uno de los múltiples factores de riesgo vinculados a la osteoporosis, pero los ciclos cortos de estos fármacos tienen un efecto mínimo sobre la formación de hueso.

11 **D** El patrón en mosaico del hueso laminar que muestra la figura es típico de la osteítis deformante (enfermedad de Paget ósea). La enfermedad evoluciona en tres fases. En fases iniciales se produce una fase lítica seguida de la fase mixta más clásica, que cursa con osteoesclerosis y osteólisis y produce el aspecto de hueso irregular en «mosaico». La última fase es la esclerótica «quemada». Suele afectar a personas ancianas de raza blanca y la enfermedad progresa en muchos años. Las articulaciones adyacentes a los huesos afectados presentan artrosis con dolor crónico por las erosiones articulares. La osteítis fibrosa quística se asocia al hiperparatiroidismo. Un osteocondroma es una proyección seudotumoral de hueso recubierta por cartílago, que se origina en la metáfisis de un hueso largo. La osteomalacia produce osteopenia por la deficiencia de vitamina D en un adulto.

12 **E** En un 5-10% de los pacientes con una enfermedad de Paget poliostótica grave, pueden aparecer sarcomas (incluido osteosarcoma) años después sobre el hueso afectado por el proceso. Se encuentran mutaciones de *SQSTM1* en los casos familiares y esporádicos de enfermedad de Paget ósea. La espondilitis anquilosante afecta a la columna y se asocia a riesgo de malignidad. Los encondromas no se asocian a la enfermedad de Paget. La displasia fibrosa es un defecto focal del desarrollo óseo que aparece en edades tempranas. El osteoma osteoide es una pequeña lesión benigna en la cortical ósea que puede ocasionar intenso dolor en niños y adultos jóvenes.

13 **E** Los adenomas de paratiroides secretan hormona paratiroidea (PTH) y producen un hiperparatiroidismo primario con una elevada concentración de calcio sérico y fosfato bajo. La secreción excesiva de PTH activa la resorción por los osteoclastos del hueso. Las microfracturas en las zonas de resorción ósea producen hemorragias, lo que condiciona la llegada de macrófagos y, en último término, la fibrosis reactiva. Estas lesiones pueden volverse quísticas y, en ocasiones, se denominan *tumor pardo del hueso.* Dado que contienen osteoclastos y fibroblastos, se pueden confundir estas lesiones con neoplasias primarias óseas, como el tumor de células gigantes óseo. La osteomielitis crónica es raro que produzca lesiones delimitadas. El hiperparatiroidismo secundario se describe en pacientes con insuficiencia renal crónica, pero el fósforo sérico debería estar elevado. Los tumores de células gigantes se localizan en las epífisis o las metáfisis y contienen células estromales aumentadas de tamaño, pero no fibroblastos. El paciente es demasiado joven para presentar una enfermedad de Paget ósea, que puede tener una fase inicial osteolítica, pero no se asocia a hipercalcemia.

14 **A** Cuando un hueso se fragmenta, se habla de fractura conminuta y posiblemente serán precisos dispositivos ortopédicos para alinear los fragmentos y que cicatricen. La fractura compuesta penetra en la piel. Las fracturas desplazadas tienen una falta de alineación del hueso con cierto grado de deformidad. El hueso sigue estando contiguo en una fractura incompleta que no atraviesa por completo el tallo del hueso. La

fractura patológica ocurre en una zona debilitada por una enfermedad preexistente, como una metástasis.

15 **A** La necrosis avascular ósea (osteonecrosis) representa un área localizada de infarto óseo, sobre todo en la cavidad medular de la metáfisis o en la epífisis subcondral. La zona más afectada es la cabeza femoral. Los trastornos de base asociados a osteonecrosis incluyen las hemoglobinopatías (sobre todo la drepanocitosis), las fracturas, los barotraumatismos, los cuadros de hipercoagulabilidad y la hiperlipidemia. El tratamiento con glucocorticoides reduce la osteoblastogenia y fomenta la necrosis avascular, como sucede en este paciente con un lupus eritematoso sistémico y glomerulonefritis. Un encondroma es un tumor benigno del cartílago hialino originado en el espacio medular de adultos jóvenes. La artrosis puede producir algo de erosión del cartílago, pero no colapso ni infarto óseo. La osteomielitis no es tan localizada típicamente y se produce una formación de hueso nuevo irregular (involucro). La evolución del paciente es demasiado corta para una osteodistrofia renal, que viene mediada por la insuficiencia renal crónica y produce lesiones como la osteítis fibrosa quística.

16 **D** La osteomielitis piógena puede producirse por la diseminación hematógena de una infección. En los niños sin antecedentes de enfermedades previas, el microorganismo más frecuente es *Staphylococcus aureus. Haemophilus influenzae* y los estreptococos del grupo B son más frecuentes en el período neonatal. La gonorrea puede en ocasiones diseminarse y afectar al hueso (osteomielitis) o las articulaciones (artritis séptica) en individuos con actividad sexual. Es raro que las infecciones por *Salmonella* afecten al hueso, salvo en pacientes con drepanocitosis.

17 **B** Este paciente presenta una osteomielitis crónica. La secuencia más probable de acontecimiento es que una fractura compuesta se infectara por la extensión directa de las bacterias al hueso. La asistencia posterior de este paciente fue inadecuada y desarrolló una osteomielitis crónica. La infección ósea y el compromiso vascular asociado provocaron una necrosis ósea, que dio origen a una porción de hueso muerto, llamado *secuestro.* Cuando se cronifica el proceso, se forma una cubierta de hueso

nuevo reactivo, llamado *involucro,* alrededor del hueso muerto. La presencia de un nido rodeado de esclerosis sugiere osteoma osteoide. La osteólisis y la osteoesclerosis son características del remodelado óseo de la enfermedad de Paget ósea. La hemorragia y la tumefacción en los tejidos blandos deberían ser mínimas y resolverse en cuanto se estabilice la fractura. Una masa sugiere un tumor maligno, y la neoplasia más frecuente que aparece en el trayecto de drenaje de una osteomielitis es un carcinoma epidermoide, aunque es poco frecuente.

18 **B** La presencia de una lesión destructiva en las vértebras, que se extiende siguiendo el psoas sin signos de inflamación aguda (absceso frío), es típica de la osteomielitis tuberculosa. La tuberculosis ósea se debe a la siembra hematógena de una infección pulmonar. Los huesos largos y las vértebras son las principales localizaciones de la tuberculosis en el sistema esquelético. La diseminación pulmonar de la infección por *Cryptococcus neoformans* es más frecuente en inmunodeprimidos, pero es raro que provoque una osteomielitis. Las especies de *Shigella* no suelen ocasionar osteomielitis, aunque pueden asociarse a una artritis reactiva. La osteomielitis por estafilococos es más frecuente que la causada por estreptococos, pero ambos microorganismos afectan más a los huesos largos y producen una articulación caliente de tipo agudo. *Treponema pallidum* puede ocasionar necrosis gomosa en la fase terciaria, pero esta suele afectar más a los tejidos blandos que al hueso.

19 **F** El osteoma osteoide es un tumor óseo benigno con un nido central de hueso trenzado y un ribete esclerótico. Suele afectar a niños y adultos jóvenes. Es típico un dolor desproporcionado al tamaño del tumor. Si las lesiones miden más de 2 cm, se denominan osteoblastomas, y la mayoría se originan en los elementos vertebrales posteriores. Puede tratarse de forma eficaz mediante un legrado. El dolor agudo viene mediado por la liberación de prostaglandinas, lo que explica que el ácido acetilsalicílico sea un analgésico eficaz. El encondroma es un tumor benigno del cartílago hialino originado en el espacio medular en adultos jóvenes. La displasia fibrosa es un área localizada de detención de la formación de hueso durante el desarrollo. El tumor de células gigantes es una lesión benigna,

pero localmente agresiva, que se origina en las epífisis de los huesos largos de adultos jóvenes y tiene un aspecto radiológico típico en «pompas de jabón». Un osteocondroma es una proyección de la placa de crecimiento cartilaginosa que forma una exostosis.

20 **E** Este osteosarcoma es una gran masa destructiva lítica y blástica originada en la región metafisaria del fémur distal y que se extiende a los tejidos blandos circundantes. Esta es su localización más frecuente. Este tumor puede detectarse por un traumatismo, pero este factor no participa en la patogenia. Los condrosarcomas pueden aparecer en una amplia gama de edades, sobre todo en la pelvis, el hombro y las costillas, y la mayor parte de las veces en pacientes mayores de 40 años. El sarcoma de Ewing se origina en la diáfisis. Los tumores de células gigantes también aparecen alrededor de la rodilla, pero son lesiones grandes líticas y excéntricas, con un delgado ribete de hueso reactivo esclerótico. Es poco probable que una masa tan grande como la que muestra la figura sea una metástasis en ningún grupo de edad; aunque los seminomas testiculares pueden afectar a hombres jóvenes, suelen metastatizar en ganglios regionales.

21 **E** La producción de osteoide en un sarcoma es diagnóstica de osteosarcoma. La localización metafisaria en un hueso largo, sobre todo en la región de la rodilla, es compatible con un osteosarcoma, igual que la presentación en un individuo joven. Los casos esporádicos de osteosarcoma deben haber perdido los dos alelos de *RB1,* mientras que en los casos familiares se hereda una copia mala y en estos casos parece que el retinoblastoma aparece en primer lugar. Las mutaciones de *TP53* se encuentran en muchos cánceres, incluidos los osteosarcomas, y en el infrecuente síndrome de Li-Fraumeni familiar. Las mutaciones de *APC* se asocian a los adenocarcinomas de colon, y las mutaciones de *BRCA1,* a los cánceres de mama y ovario. Las mutaciones de *NF1* producen la neurofibromatosis de tipo 1, en la que aparecen muchos tumores de tejidos blandos y neurales, pero son menos frecuentes los tumores óseos primarios. Las mutaciones de *PTEN* se suelen asociar a cánceres de próstata y endometrio.

22 **E** La figura muestra un osteocondroma con una cubierta cartilaginosa brillante que recubre el hueso esponjoso. Este proceso seudotumoral, llamado también *exostosis,* es benigno y, cuando es solitario, se trata fundamentalmente de un hallazgo incidental, porque es raro que el osteocondroma origine un sarcoma. Los osteocondromas múltiples pueden ser parte de un síndrome hereditario y el cuadro puede debutar en la infancia asociado a una deformidad ósea y un aumento del riesgo de aparición de un sarcoma. Los osteocondromas hereditarios y esporádicos muestran una pérdida de heterocigosidad en los genes *EXT1* o *EXT2.* Un osteocondroma es una proyección de la placa de crecimiento cartilaginosa con proliferación de hueso maduro revestido por cartílago. Cuando el crecimiento esquelético se detiene, los osteocondromas dejan de proliferar también. Estas lesiones pueden producir irritación local y dolor. Un encondroma es un tumor benigno de cartílago hialino que aparece en la cavidad medular de adultos jóvenes. La displasia fibrosa es un área localizada de detención de la formación ósea durante el crecimiento. Un tumor de células gigantes es una lesión benigna, pero localmente agresiva, que se origina en la epífisis de los huesos largos de adultos jóvenes y tiene un aspecto radiológico en «pompas de jabón». Un osteoblastoma es un osteoma osteoide de gran tamaño, que puede originarse sobre lesiones epifisarias y provoca un intenso dolor.

23 **A** Se trata de un encondroma. Las lesiones cartilaginosas pueden ser benignas cuando son periféricas (manos y pies) y localizadas, pero el condrosarcoma de bajo grado suele tener una localización central. El riesgo de malignidad es más elevado en los encondromas múltiples (enfermedad de Ollier o síndrome de Maffucci con mutaciones en los genes de la isocitrato deshidrogenasa). Las células gigantes aparecen en muchas masas óseas, pero son especialmente abundantes en los tumores de células gigantes y los quistes óseos aneurismáticos de los huesos largos. Los macrófagos pueden estar aumentados en las glucogenosis, como la enfermedad de Gaucher, que afectan a la médula ósea. Pueden encontrarse osteoblastos en el osteoma osteoide, que es más frecuente en los pacientes jóvenes y produce dolor nocturno. Las células plasmáticas del mieloma

no suelen aparecer a esta edad ni en esta localización. Pueden encontrarse fibroblastos en lesiones fibrosas localizadas, como los defectos fibrosos corticales que afectan a los huesos largos.

24 **C** Los tumores de células gigantes afectan típicamente a las epífisis de los huesos largos de pacientes de 20-40 años con un ligero predominio femenino. Los tumores pueden recidivar tras el legrado. Aunque la mayoría son benignos desde un punto de vista biológico e histológico, con presencia de células multinucleadas en un estroma compuesto sobre todo por células fusiformes mononucleares según muestra la figura, en pocas ocasiones puede aparecer un sarcoma sobre un tumor de células gigantes óseo. Los condrosarcomas son típicamente lesiones grandes destructivas. Los encondromas corresponden, en general, a lesiones esqueléticas periféricas que afectan a la metáfisis de los huesos tubulares pequeños de manos y pies. Los osteoblastomas suelen afectar a la columna. La osteítis fibrosa quística es una complicación del hiperparatiroidismo. El plasmocitoma constituido por células plasmáticas neoplásicas suele ser una lesión del mieloma múltiple, que aparece con más frecuencia en ancianos.

25 **A** El aspecto gris azulado brillante de la figura es típico del cartílago y es probable que esta lesión corresponda a una proliferación neoplásica de condrocitos. Este condrosarcoma ha infiltrado la cavidad medular e invadido la cortical suprayacente, algo típico de un proceso maligno. La mayor parte de los condrosarcomas son lesiones de bajo grado, que aparecen en una amplia gama de edad, a diferencia de muchos otros tumores primarios óseos, que suelen aparecer en las dos primeras décadas de la vida. La mayor parte de los condrosarcomas se originan en las porciones centrales del esqueleto. Puede encontrarse una proliferación de osteoblastos en una pequeña masa tumoral de la corteza denominada *osteoma osteoide,* mientras que una masa más grande en el esqueleto axial puede llamarse *osteoblastoma*. Los osteosarcomas se originan en los osteoblastos, pero son malignos. Suelen afectar a individuos más jóvenes y no tienen este aspecto blanco azulado porque se caracterizan por la producción de osteoide. El tumor de células gigantes se origina durante la tercera a quinta décadas y afecta a

la epífisis y la metáfisis. Macroscópicamente se trata de lesiones tumorales grandes, parduzco-rojizas y quísticas. Se encuentran células gigantes parecidas a osteoclastos en los tumores de células gigantes del hueso. Se cree que estos tumores se originan en células de estirpe monocito-macrófago. Las células plasmáticas atípicas se encuentran en el mieloma múltiple. Los mielomas son lesiones líticas rojas oscuras, redondeadas, con frecuencia múltiples. Las células neuroectodérmicas primitivas se encuentran en el sarcoma de Ewing.

26 **B** El aspecto histológico es típico de un sarcoma de Ewing. El aspecto radiológico de esta masa en niños es típico de un tumor maligno, con destrucción ósea y extensión a los tejidos blandos. Los dos tumores óseos malignos más frecuentes en niños son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Los osteosarcomas se originan típicamente en la región metafisaria, mientras que el sarcoma de Ewing aparece en la diáfisis de huesos tubulares largos, como sucede en este caso. Este tumor aparece, en general, en pacientes de 10-15 años. La translocación t(11;22) aparece aproximadamente en un 85% de los sarcomas de Ewing y los tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET) relacionados con el mismo, que se incluyen dentro de los tumores de células pequeñas y redondas de la infancia, que pueden ser difíciles de distinguir con el microscopio. La translocación origina un gen de fusión *EWS-FLI1,* que ahora se considera la prueba definitiva para el diagnóstico de estos tumores. Los sarcomas de Ewing suelen producir masas dolorosas asociadas a fiebre y leucocitosis, que recuerdan a una osteomielitis aguda. Pueden aparecer condrosarcomas en una amplia gama de edades, a diferencia de la mayor parte de tumores malignos primarios óseos, que se producen en las dos primeras décadas. La mayor parte de los tumores son lo bastante bien diferenciados como para observar matriz cartilaginosa en el estudio histológico. Un tumor de células gigantes es una lesión benigna, pero localmente agresiva, originada en la epífisis de los huesos largos de adultos jóvenes y con un aspecto radiológico característico en «pompas de jabón». El carcinoma metastásico es el tumor más frecuente en hueso en adultos, porque los carcinomas son mucho más frecuentes que

los tumores óseos primarios malignos; las metástasis óseas son infrecuentes en la infancia. El osteosarcoma se origina típicamente en la región metafisaria y las células fusiformes malignas producen una matriz osteoide. El plasmocitoma cursa como una lesión lítica focal dentro del hueso e histológicamente se reconocen células plasmáticas.

27 **B** Este foco solitario (monostótico) de displasia fibrosa debilita el hueso hasta provocar una fractura patológica. Este proceso benigno seudotumoral es infrecuente. El aspecto histológico de hueso trenzado en mitad de unos fibroblastos de aspecto benigno es característico. Un 70% de los casos son monostóticos y las zonas de afectación más frecuente son las costillas, el fémur, la tibia, la mandíbula y el cráneo. Puede producir deformidades locales y, a veces, fracturas. La displasia fibrosa poliostótica puede afectar a las regiones craneofacial, pélvica y de la cintura escapular, con deformidades graves y riesgo de fractura. El sarcoma de Ewing suele aparecer en la región diafisaria de los huesos largos y se identifica histológicamente por láminas de células pequeñas redondas. El callo de fractura no debería estar tan localizado dentro del hueso y no aparece con tanta rapidez tras un traumatismo. El osteosarcoma es típicamente una lesión destructiva grande sin claridad central. Un osteoma osteoide presenta un nido central pequeño rodeado de esclerosis.

28 **B** El incremento de la concentración de fosfatasa alcalina en un anciano debería plantear la sospecha de metástasis óseas, sobre todo si se produce una fractura «patológica» en relación con una lesión ósea en lugar de una fractura por un traumatismo. Los tumores primarios más probables incluyen la mama (en mujeres), la próstata (en hombres), el pulmón (en fumadores), los riñones y el tiroides. El hiperparatiroidismo puede ocasionar una osteítis fibrosa quística con lesiones líticas, que suelen ser pequeñas, afectan solo a la cortical y aparecen en las falanges en primer lugar. El mieloma múltiple puede ocasionar lesiones óseas líticas, pero la concentración de gammaglobulina sérica del paciente no está elevada. Los osteocondromas son exostosis y no provocan lesiones óseas líticas. La enfermedad de Paget se caracteriza por osteólisis

asociada a la formación de hueso, pero sin lesiones líticas. La displasia fibrosa asociada a manchas café con leche en la piel y endocrinopatías se denomina *síndrome de McCune-Albright*; este proceso es infrecuente y afecta a niñas jóvenes.

29 **C** La prevalencia de cáncer aumenta con la edad. Cuando no existen otras alteraciones, se debería sospechar un carcinoma metastásico. Además, el péptido relacionado con la hormona paratiroidea elaborado por las neoplasias puede ser causa de hipercalcemia en los tumores malignos. El condrosarcoma puede aparecer en muchas edades, pero estas lesiones focales que afectan al hueso no es probable que incrementen la calcemia. Las metástasis óseas son mucho más frecuentes que los tumores malignos óseos primarios. La obstrucción de la vía biliar o las enfermedades infiltrativas hepáticas suelen ser causa de un incremento de la fosfatasa alcalina de origen hepático. La artritis gotosa puede asociarse a cierto grado de destrucción ósea local, pero sin el aumento tan importante de la calcemia, y las lesiones se localizan típicamente en las articulaciones periféricas. La artrosis provoca dolor, que, en general, afecta a las articulaciones que soportan peso o las manos, pero sin alteraciones en las pruebas de laboratorio. Aunque se produce una pérdida acelerada de hueso en la osteoporosis, la fosfatasa alcalina y la calcemia son normales. La enfermedad de Paget ósea se asocia a un incremento de la fosfatasa alcalina, pero no a hipercalcemia.

30 **D** La artrosis es un problema frecuente del envejecimiento y pueden afectarse diversas articulaciones, desde las grandes que soportan peso a las pequeñas. La rigidez articular matutina es una característica frecuente, pero es mínima y cede con rapidez. La espondilitis anquilosante provoca lumbalgia con deformidad, pero en general no se afectan las extremidades distales. La artritis gotosa afecta a pacientes con un incremento de las concentraciones de ácido úrico sérico, mientras que la seudogota se relaciona con el depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidrato; ambos cuadros producen artritis aguda con dolor y tumefacción. El mieloma múltiple puede ocasionar lesiones óseas líticas, pero es típico que no se afecten las articulaciones. La artritis reumatoide puede afectar a las articulaciones grandes

o pequeñas y se asocia típicamente a afectación simétrica de las articulaciones pequeñas de las manos y los pies.

31 **A** La afectación progresiva de las articulaciones grandes de carga y la presencia de osteófitos en las articulaciones interfalángicas en una mujer anciana son típicas de una artrosis. La ausencia de factor reumatoide y la afectación articular asimétrica hacen que el diagnóstico de artritis reumatoide sea poco probable. La artrosis es una enfermedad multifactorial en la que la predisposición genética y las fuerzas biomecánicas afectan a los condrocitos. En la fase precoz de la artrosis se produce la proliferación de los condrocitos. Esta se asocia a cambios en la matriz cartilaginosa debida a la secreción de proteasas y mediadores inflamatorios por los condrocitos. Al final, la inflamación y las lesiones mantenidas condicionan la pérdida de cartílago, lo que produce una esclerosis subcondral reactiva. Los defectos hereditarios del colágeno de tipo I causan un grupo de trastornos poco frecuentes, que se denominan *osteogenia imperfecta*, que pueden ser mortales dentro del útero o en algunos casos producir una artrosis prematura. La infiltración de la sinovial por linfocitos T CD4+ se encuentra en la artritis reumatoide. La deficiencia parcial de HGPRT es causa de hiperuricemia y gota. La deficiencia de HGPRT está implicada en algunos casos de gota. HLA-B27 se asocia a la espondilitis anquilosante y otras espondiloartropatías seronegativas.

32 **C** La figura corresponde a un nódulo reumatoide. Los nódulos reumatoides subcutáneos, como este, se localizan típicamente en las superficies extensoras. Las características de la artritis reumatoide (AR) crónica incluyen una afectación simétrica bilateral de las articulaciones, con destrucción de las articulaciones y deformidades características y presencia de nódulos reumatoides. Aunque la patogenia de la AR es compleja, se cree que la lesión tisular viene mediada por una reacción autoinmunitaria en la que los linfocitos T CD4+ secretan citocinas que ejercen una cascada de efectos sobre los linfocitos B, los macrófagos y las células endoteliales. Los linfocitos B son estimulados para sintetizar los factores reumatoides, que forman inmunocomplejos en la articulación; los macrófagos secretan citocinas, como el factor de necrosis

tumoral (TNF) y la interleucina 1, que activan las células cartilaginosas, los fibroblastos y las células sinoviales; y la activación de las células endoteliales fomenta la acumulación de células inflamatorias en la sinovial. En conjunto, estos procesos culminan en la formación del paño y, al final, en la destrucción articular. El papel central que juega el TNF en la destrucción articular es la base del importante éxito del tratamiento de la AR con fármacos frente a TNF. Los bisfosfonatos reducen la actividad de los osteoclastos para tratar los procesos que cursan con pérdida ósea. La AR no es infecciosa, de forma que los antibióticos no están indicados. Los inhibidores del ciclo celular como parte de la quimioterapia se reservan para los tumores malignos; la AR no provoca cáncer. Aunque el tofo gotoso puede afectar a los tejidos blandos y recuerda a las lesiones que se muestran, la distribución de las lesiones no se corresponde con una gota.

33 **E** Además del factor reumatoide, la serología de los péptidos cíclicos citrulinados (PCC) es específica de la artritis reumatoide y puede indicar cronicidad de la enfermedad. La lesión de mecanismo inmunitario provoca inflamación crónica con proliferación de la sinovial, como muestra la figura, con formación de paño, que erosiona de forma gradual y destruye las articulaciones, con la consiguiente deformidad articular. La afectación articular es típicamente bilateral y simétrica, y se afectan con frecuencia las articulaciones pequeñas. Los anticuerpos frente a la topoisomerasa I son específicos de la esclerodermia (esclerosis sistémica). Pueden encontrarse anticuerpos antinucleares en diversas enfermedades autoinmunitarias, incluida la artritis reumatoide, pero no tienen especificidad. La enfermedad de Lyme, causada por una infección por *Borrelia burgdorferi*, puede ocasionar una artritis crónica que llega a destruir el cartílago, pero, en general, se afectan las articulaciones más grandes. Las especies de *Campylobacter* pueden guardar relación con algunos casos de artritis reactiva.

34 **A** La artritis reumatoide juvenil (AR) o artritis idiopática juvenil (AIJ) tiene más probabilidad de ser autolimitada y no deformante, a diferencia de la variante adulta de la enfermedad.

La AIJ es típicamente negativa para el factor reumatoide, pero positiva con ANA. La AIJ suele asociarse más que la adulta a manifestaciones sistémicas, como exantema, mialgias, miocarditis, pericarditis, uveítis y glomerulonefritis. La prueba serológica positiva para *Borrelia burgdorferi* se encuentra en la enfermedad de Lyme, que se suele asociar a una artritis migratoria de articulaciones grandes. Igual que la AIJ, la enfermedad de Lyme produce una artritis crónica deformante solo en aproximadamente un 10% de los casos. *Chlamydia trachomatis* es el microorganismo responsable de la uretritis no gonocócica que se asocia a una artritis reactiva y, al igual que sucede en otras espondiloartropatías, suele afectar a las articulaciones sacroilíacas. Las concentraciones de ferritina están muy aumentadas en la hemocromatosis hereditaria, en la que se producen depósitos de hierro en las articulaciones que ocasionan una artritis crónica parecida a una artrosis o una seudogota. La drepanocitosis con hemoglobina S puede ocasionar una necrosis aséptica, a menudo de la cabeza femoral, e infartos óseos y artritis crónica secundaria a la deformidad ósea. La artritis reumatoide suele ser recidivante y ocasiona deformidades articulares progresivas, típicamente de manos y pies. La sífilis congénita puede provocar una periostitis y una osteocondritis con deformidades óseas; la sífilis terciaria en adultos puede ocasionar una necrosis gomosa con destrucción articular y pérdida de sensibilidad, sobre todo de las extremidades inferiores, lo que se traduce en traumatismos repetidos con deformidad articular (articulación de Charcot). Algunos casos de artritis gotosa se asocian a hiperuricemia; la artritis gotosa suelen manifestarse como un ataque agudo en ancianos.

35 **E** La espondiloartritis anquilosante se asocia de forma importante al genotipo HLA-B27, que muestra una elevada prevalencia entre los nativos de las regiones árticas y subárticas cercanas a los polos de Eurasia y Norteamérica. Esta enfermedad progresiva afecta típicamente a la parte inferior de la espalda y la pelvis. La imagen radiológica de la columna de bambú es característica. Las espondiloartropatías pueden asociarse a manifestaciones extraarticulares, como uveítis anterior y aortitis.

La glomerulonefritis suele ser una complicación de las enfermedades del colágeno vascular, como el lupus eritematoso sistémico. La hepatitis autoinmunitaria no se relaciona con las enfermedades articulares. La mala absorción se suele asociar a diarrea con artritis enteropática de etiología infecciosa. La meningitis puede asociarse a la enfermedad de Lyme.

36 **D** Este paciente desarrolló una artritis asociada a enteritis con afectación de las articulaciones lumbares y sacroilíacas varias semanas después de una disentería por *Shigella*. Posteriormente, este paciente desarrolló una conjuntivitis y, con mayor probabilidad, una uveítis. Este complejo de síntomas es una representación clásica de un conjunto de trastornos relacionados, que se denominan *espondiloartropatías seronegativas*. En este grupo se incluyen la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la artritis psoriásica y la artritis enteropática (como sucede en este caso). Una característica común es una asociación muy potente con el genotipo HLA-B27. A pesar de las similitudes con la artritis reumatoide, estos pacientes siempre tienen un resultado negativo del factor reumatoide. La uretritis causada por *Chlamydia trachomatis* puede activar una artritis reactiva, otra variante de espondiloartropatía seronegativa. Esta infección precede a la aparición de la artritis. No se describe relación entre la infección por *Borrelia burgdorferi*, el microorganismo causante de la enfermedad de Lyme, y la artritis reactiva en individuos positivos para HLA-B27. La infección por el virus de Epstein-Barr tampoco es un estímulo que desencadene estos trastornos.

37 **C** La psoriasis con artritis psoriásica muestra rasgos de artritis reumatoide, pero sin una destrucción articular significativa. La psoriasis es frecuente y afecta a un 1-2% de los individuos, y aproximadamente un 5% de ellos sufren una artritis psoriásica. El resto de las opciones no se asocian a la artritis de forma significativa. El infiltrado dérmico en banda es típico del liquen plano, que produce placas o pápulas violáceas pruriginosas, pero suele desaparecer en 1-2 años aproximadamente. Puede encontrarse una espongiosis epidérmica con infiltrados de eosinófilos en la dermatitis eccematosa aguda como parte de una reacción farmacológica. La apoptosis focal de queratinocitos

se describe en la enfermedad injerto contra huésped. Pueden encontrarse depósitos de IgG en el lupus eritematoso sistémico y el penfigoide ampolloso.

38 **D** La infección por *Staphylococcus aureus* produce un 80-90% de todos los casos de osteomielitis en los que se consigue cultivar el microorganismo. La osteomielitis por *Salmonella* es especialmente frecuente en los pacientes con una drepanocitosis. Las infecciones por estreptococos del grupo B responsables de osteomielitis son más habituales en los neonatos. La osteomielitis por *Klebsiella pneumoniae* puede aparecer en raras ocasiones en adultos con infecciones urinarias causadas por este microorganismo. La tuberculosis es una causa poco frecuente de osteomielitis en adultos con una enfermedad pulmonar activa diseminada, posiblemente por una mala respuesta inmunitaria.

39 **A** La artritis crónica de esta paciente es la manifestación tardía o en estadio 3 de la enfermedad de Lyme, que suele ser remitente y migratoria, como sucede en este caso, con afectación principalmente de las grandes articulaciones. La presencia de infiltrados linfoplasmocíticos con proliferación endotelial es característica (pero no diagnóstica) de una artritis de Lyme. El agente infeccioso, *Borrelia burgdorferi,* es una espiroqueta que se transmite por la garrapata del ciervo *(Ixodes).* Este estadio se alcanza a los 2-3 años de la picadura inicial de la garrapata y pueden afectarse las articulaciones aproximadamente en un 80% de los pacientes. Los estreptococos del grupo B pueden ocasionar una osteomielitis o una artritis aguda en neonatos. La artritis tuberculosa puede afectar a las articulaciones grandes de carga y puede ser progresiva, culminando en anquilosis. La característica histológica de la artritis tuberculosa incluye granulomas caseificantes. *Neisseria gonorrhoeae* puede producir una artritis supurativa aguda. En ambos casos, el infiltrado inflamatorio contiene principalmente neutrófilos. *Treponema pallidum* puede producir necrosis gomosa, que puede afectar a las articulaciones grandes, y pueden aparecer infiltrados linfoplasmocíticos con endoarteritis, pero la artritis sifilítica es bastante infrecuente.

40 **D** *Staphylococcus aureus* es la causa más frecuente de

osteomielitis en niños y adultos. Las infecciones por *H. influenzae* pueden aparecer en niños menores de 2 años, pero la vacunación ha reducido la incidencia de estos casos. Estos dos microorganismos pueden producir infecciones congénitas. La gonorrea se debería considerar entre las causas de una osteomielitis aguda en adultos sexualmente activos y puede ser transmitida al feto en el conducto del parto, pero típicamente afecta a los ojos. La osteomielitis por *Salmonella* es más característica de los pacientes con una drepanocitosis. La osteomielitis por neumococos es infrecuente.

41 **C** La gonorrea se debería considerar la causa más probable de artritis supurativa aguda en individuos sexualmente activos; en algunos casos se afectan múltiples articulaciones. En los hombres puede aparecer una uretritis en relación con la infección por gonorrea. *Borrelia burgdorferi* produce la enfermedad de Lyme, caracterizada por una artritis crónica, similar a la artritis reumatoide. *Haemophilus influenzae* es un bacilo corto gramnegativo que puede ser causa de osteomielitis en niños. *Staphylococcus aureus* es la causa más frecuente de osteomielitis, pero la tinción con Gram debería mostrar cocos grampositivos. La infección por *Treponema pallidum,* que también es una infección de transmisión sexual, puede producir gomas sifilíticos en la fase terciaria de la sífilis, y puede ocasionar deformidad articular. Sin embargo, no existen antecedentes de uretritis. El chancro sifilítico primario puede anteceder años a la sífilis terciaria.

42 **C** La inflamación aguda de la primera articulación MF, causada por la precipitación de los cristales de ácido úrico aciculares con birrefringencia negativa (amarilla) en el espacio articular, es típica de la gota. La hiperuricemia es una condición *sine qua non* para la aparición de la gota. No todos los pacientes con una hiperuricemia desarrollan gota, ni todos los pacientes con gota presentan una hiperuricemia, sin embargo. Otros factores mal conocidos intervienen en la patogenia. Es clásica la afectación del dedo gordo, pero otras articulaciones también pueden afectarse. Aunque las crisis de gota se suelen precipitar por un consumo intenso de alcohol, la hepatopatía (caracterizada por el incremento de las transaminasas) no es una

característica de la artritis gotosa. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son el tratamiento de primera línea de las crisis agudas. Se produce una reacción inflamatoria inducida por mecanismo químico, pero no es infecciosa, de forma que no están indicados los antibióticos. Los glucocorticoides tienen un efecto más prominente sobre los procesos inflamatorios crónicos y su uso mantenido producirá cambios artríticos degenerativos. El metotrexato se puede plantear como tratamiento de la artritis reumatoide. Los inhibidores de la xantina oxidasa reducen la formación de ácido úrico, y los fármacos uricosúricos ayudan a aumentar la secreción de ácido úrico, pero no actúan de forma aguda.

43 **A** La imagen histológica corresponde a un agregado amorfo central de cristales de urato rodeado por fibroblastos reactivos y células inflamatorias mononucleares. Se trata de un tofo gotoso. Los tofos son grandes colecciones de cristales de urato monosódico que pueden aparecer en las articulaciones o los tejidos blandos de pacientes con gota. Los tofos superficiales grandes pueden erosionar la piel que los recubre. La precipitación de los cristales de urato en las articulaciones provoca una reacción inflamatoria aguda, en la que pueden encontrarse neutrófilos y monocitos. Los neutrófilos fagocitan los cristales de urato, que no se pueden digerir, pero determinan la liberación de enzimas lisosómicas neutrofílicas destructivas y radicales libres del oxígeno. La liberación de los cristales de los neutrófilos perpetúa este ciclo de respuesta inflamatoria. La inflamación articular implica mecanismos distintos según la etiología. En la artritis reumatoide, la liberación del factor de necrosis tumoral (TNF) por los macrófagos juega un papel central, lo que se traduce en un importante alivio conseguido por los fármacos frente a TNF. La hipercolesterolemia importante, como se encuentra en la hipercolesterolemia familiar, puede producir depósitos de colesterol en los tendones y otras localizaciones. Cuando se depositan en los tendones, las lesiones amarillentas se denominan *xantomas;* en este tejido se identifican los cristales de colesterol como hendiduras en el estudio histológico. La infección extrapulmonar por *Mycobacterium tuberculosis* puede ocasionar una inflamación

granulomatosa y artritis crónica con lesiones cutáneas, pero se caracteriza por necrosis caseosa con células epitelioides, no por la presencia de cristales de urato. La artritis tuberculosa, a diferencia de la gotosa, casi nunca comienza en la articulación MF. En la *alcaptonuria*, un trastorno congénito del metabolismo que cursa con una reducción de la degradación metabólica del ácido homogentísico, se producen depósitos de este compuesto en el cartílago (ocronosis), con la consiguiente artritis que afecta típicamente a las articulaciones grandes, como las rodillas, los discos intervertebrales, las caderas y los hombros, pero las articulaciones pequeñas de manos y pies están respetadas.

44 **D** Puede producirse una gota secundaria en pacientes con leucemia, sobre todo cuando muestran un elevado recuento leucocítico (como ocurre en la leucemia mieloide crónica), que reciben tratamiento quimioterápico que provoca una lisis masiva de los núcleos de las células leucémicas y producción de gran cantidad de urato. La hiperuricemia condiciona el depósito de cristales en el espacio articular, lo que desencadena una respuesta inflamatoria local. Pueden encontrarse hemorragias articulares en pacientes con una trombocitopenia, pero son más típicas de los pacientes con hemofilia y ninguna de ellas induce la formación de cristales aciculares. Es más probable que los cristales romboideos de colesterol sean consecuencia de la degradación de la sangre. Pueden encontrarse lesiones del cartílago articular en cualquier tipo de artritis crónica, pero es una característica importante de la artrosis, no de la quimioterapia. La proliferación sinovial es también un cambio inespecífico que es llamativo en la inflamación de la artritis reumatoide, no de la leucemia. Las células leucémicas pueden infiltrar diversos órganos viscerales, pero no suelen infiltrar los tejidos blandos.

45 **B** Este paciente tiene evidencia de pigmentación cutánea, insuficiencia cardíaca, diabetes y cirrosis en relación con una hemocromatosis. La figura muestra los cristales de pirofosfato cálcico romboideo con birrefringencia negativa (azul) que se han depositado en la matriz articular. Al progresar la enfermedad, los cristales se pueden extender por el espacio articular y ocasionar una seudogota o enfermedad por depósito de cristales

de pirofosfato cálcico dihidrato (EDPCD), que también se llama *condrocalcinosis*. La EDPCD puede ser primaria (hereditaria) o, con más frecuencia, secundaria a diversas enfermedades sistémicas, como la hemocromatosis, o en ancianos secundaria a una lesión articular previa por otros trastornos. En la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias que tienen ANA positivos, como el lupus eritematoso sistémico, se producen artralgias, pero no artritis, y la tumefacción, destrucción o deformidad articular son mínimas o nulas. La artritis reumatoide suelen ser recidivante y provoca una deformidad articular progresiva, típicamente en las manos y los pies. La sífilis congénita puede producir periostitis y osteocondritis con deformidades óseas; la sífilis terciaria en adultos puede ocasionar una necrosis gomosa con destrucción articular y pérdida de la sensibilidad, sobre todo en las extremidades inferiores, lo que produce traumatismos repetidos que pueden deformar las articulaciones (articulación de Charcot). Algunos casos de artritis gotosa se asocian a hiperuricemia; esta suele manifestarse con ataques agudos en ancianos.

46 **A** El ganglión tiene una pared delgada con un contenido claro mucoide. Se origina en el tejido conjuntivo de una cápsula articular o una vaina tendinosa. Las superficies extensoras de las manos y los pies son la localización más frecuente, sobre todo la muñeca. Los ganglios posiblemente se originan tras un traumatismo por degeneración mixoide focal del tejido conjuntivo, que produce un espacio quístico. Pueden regresar, pero, si no lo hacen y son dolorosos, se pueden extirpar. Los tumores de células gigantes tenosinoviales (sinovitis vellonodular) son una variante más difusa de tumor de células gigantes de vaina tendinosa (una masa sólida), y se produce una proliferación de células mononucleares parecidas a los sinoviocitos. El lipoma es una masa de adipocitos y no es quístico. La fascitis nodular es una proliferación reactiva sólida de fibroblastos, que aparece en las extremidades superiores y el tronco de adultos jóvenes, a veces después de un traumatismo. Los nódulos reumatoides son masas sólidas y firmes, que típicamente aparecen en individuos que ya presentan afectación articular por una artritis reumatoide. El tofo es una masa sólida

de cristales de urato sódico a modo de tiza en pacientes con antecedentes de gota.

47 **C** El tumor de células gigantes tenosinovial (denominado antes *sinovitis vellonodular pigmentada*) es el tumor de tejidos blandos más frecuente de la mano, pero puede aparecer también alrededor de la rodilla en forma de una proliferación localizada o difusa. En estas lesiones existe una translocación adquirida, que coloca la secuencia codificante de M-CSF adyacente al promotor del gen del colágeno *COL6A3.* Aunque son benignas histológicamente, las lesiones pueden ser localmente agresivas y extenderse hacia el hueso y los tejidos blandos adyacentes. Las demás opciones enumeradas no son parte de la patogenia de esta lesión.

48 **E** El lipoma es la neoplasia benigna de tejidos blandos más frecuente. Se trata de masas extremadamente bien diferenciadas y delimitadas. Pueden encontrarse lipomas múltiples en algunos casos familiares, pero son infrecuentes. Estos tumores benignos no producen metástasis. Las neoplasias mesenquimatosas no suelen metastatizar por vía linfática. Algunos lipomas atípicos o liposarcomas pueden recidivar, pero los lipomas benignos no. La infección secundaria de una intervención de resección no complicada es poco probable.

49 **A** La neoplasia más frecuente es el lipoma, constituido por adipocitos maduros. Son lesiones de crecimiento lento y no suelen generar problemas. En los hemangiomas se encuentran células endoteliales; estas lesiones son frecuentes y más firmes. En la región inguinal es probable que se localicen en la superficie de la piel. Pueden encontrarse fibroblastos en lesiones reactivas, como las fibromatosis, que son firmes e inmóviles. Las células musculares lisas forman leiomiomas firmes. Las neoplasias parecidas al músculo esquelético (rabdomiomas) son bastante infrecuentes.

50 **B** Una masa grande y profunda en los tejidos blandos sugiere cáncer, posiblemente un sarcoma. Los liposarcomas se localizan en los tejidos blandos profundos, pueden ser indolentes y alcanzar gran tamaño. Son los sarcomas más frecuentes en adultos. Los condrosarcomas aparecen en una amplia gama de edades, pero se originan en el hueso. Los carcinomas son mucho

más frecuentes en adultos que los sarcomas y pueden producir metástasis, pero es poco probable que una lesión de este tamaño en los tejidos blandos sea metastásica. La fascitis nodular es una lesión reactiva de los fibroblastos de adultos jóvenes y suele localizarse en las extremidades superiores y el tronco, y puede aparecer unas semanas después de un traumatismo local. Los osteosarcomas suelen afectar a personas menores de 20 años y se originan típicamente en las metáfisis de los huesos largos. El rabdomiosarcoma aparece en niños y suele localizarse en la cabeza y el cuello, la vía genitourinaria o el retroperitoneo.

51 **B** La fascitis nodular es una proliferación reactiva de fibroblastos que aparece en las extremidades superiores y el tronco de adultos jóvenes, a veces después de un traumatismo. El lipoma es un tumor benigno frecuente de los tejidos blandos que no duele ni se produce tras un traumatismo. Es poco probable que una contusión determine la formación de un absceso, porque no se produce una solución de continuidad en la piel que permita la entrada de agentes infecciosos. El sarcoma pleomorfo fibroblástico suele originarse en el retroperitoneo y los tejidos blandos profundos de las extremidades de adultos ancianos. La fibromatosis superficial es una lesión deformante en los planos fasciales que se desarrolla en un período de tiempo largo, y la forma más frecuente es la fibromatosis o contractura de Dupuytren, que afecta a la palma de la mano.

52 **B** La paciente tiene una fibromatosis superficial que ha ocasionado la lesión denominada *contractura de Dupuytren.* Estas lesiones están constituidas por fibroblastos maduros rodeados de colágeno denso. Es poco probable que una lesión dura y firme de este tamaño sea maligna. Aunque existen algunas células fibroblásticas fusiformes, no son abundantes y, en general, no tienen atipia significativa. Se produce calcificación distrófica en los tejidos necróticos, pero no suelen producir una masa localizada. El tejido de granulación secundario a una lesión daría lugar a una cicatriz estable sin este grado de retracción tan importante. En el liposarcoma se encuentran lipoblastos, y esta lesión es más frecuente en los tejidos blandos profundos, como el muslo o el retroperitoneo.

53 **E** El rabdomiosarcoma es el sarcoma más frecuente en los

niños. Los sarcomas son positivos con el anticuerpo frente a la vimentina, un filamento intermedio del citoplasma, en el estudio inmunohistoquímico. Observe que las células neoplásicas son fusiformes, pero muy pleomorfas, con citoplasma rosado en el que se reconocen estriaciones sutiles que recuerdan a las presentes en el músculo esquelético. El CD3 es un marcador de los linfocitos T. La citoqueratina marca los tumores de origen epitelial (carcinomas). La distrofina es una proteína estabilizadora de la membrana en el músculo estriado y está ausente en la distrofia muscular de Duchenne. La enolasa neuronal específica es un marcador de neoplasias con diferenciación neural.

54 **E** Los sarcomas sinoviales representan un 10% de todos los sarcomas en adultos y pueden localizarse alrededor de las articulaciones o en los tejidos blandos profundos, porque se originan en las células mesenquimatosas, no en la sinovial. La mayor parte de estos tumores tienen la translocación t(X;18). El tumor desmoide es una fibromatosis constituida por fibroblastos y colágeno. Los leiomiosarcomas no presentan el patrón bifásico y es raro encontrarlos en los tejidos blandos. El mesotelioma puede ser bifásico, pero lo más habitual es que se origine en la pleura o, con menos frecuencia, el revestimiento mesotelial peritoneal o pericárdico. El osteoblastoma es una masa ósea que se origina en la región epifisaria.

CAPÍTULO

27

Nervios periféricos y músculos esqueléticos

PEF9 Capítulo 27: Nervios periféricos y músculos esqueléticos

PH9 Capítulo 21: Nervios periféricos y músculos

1 Una mujer de 62 años presenta una masa anterior a la oreja derecha que ha aumentado de tamaño lentamente. Se realiza una cirugía para extirpar un adenoma pleomorfo de la parótida. El tumor ha infiltrado el tejido blando suprayacente y el cirujano debe extirpar una parte del nervio facial para conseguir márgenes adecuados. El médico coloca un injerto nervioso de 2 cm en el área de resección. ¿Cuál de las siguientes características describe mejor la evolución probable durante la primera semana tras la intervención?

A Células inflamatorias agudas alrededor del injerto
B Formación de un neuroma traumático
C Recaída del tumor siguiendo el injerto nervioso
D Desmielinización segmentaria y pérdida de axones en el nervio proximal al injerto
E Fragmentación de los axones distales y las vainas de mielina

2 Un niño de 16 años ha sufrido una profunda laceración en la parte inferior del muslo izquierdo. Se ha contenido la hemorragia. En la exploración física muestra pérdida de sensibilidad en la parte lateral del pie izquierdo y también pérdida de movimiento de dicho pie. Se procede a la reparación quirúrgica de la herida, incluido el nervio, y se le realiza fisioterapia. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperar la función del pie izquierdo?

A 1 día

B 1 semana
C 1 mes
D 6 meses

3 Un hombre de 60 años refiere dolor en el cuello, el hombro y el antebrazo izquierdos que lleva 1 mes empeorando. Durante el mes siguiente presenta debilidad progresiva en el pectoral mayor, dorsal ancho y tríceps izquierdos. También tiene parestesias en las puntas de los dedos pulgar, medio y anular. No se describe calor, dolor o tumefacción. ¿Cuál de las siguientes estructuras es más probable que esté lesionada en este paciente?

A Vasculatura
B Axón
C Ganglión
D Miofibrillas
E Células de Schwann

4 Un hombre de 41 años ha tenido un proceso seudogripal durante 1 semana y a los 4 días ha desarrollado una debilidad motora ascendente rápidamente progresiva que ha obligado al uso de respiración mecánica. En la exploración física está afebril, con una potencia motora 3/5 en las extremidades. Se realiza una punción lumbar, y se obtiene líquido cefalorraquídeo incoloro claro con una presión normal. Este líquido tiene una concentración de proteínas ligeramente elevada con una glucosa normal y un recuento celular de solo unas pocas células mononucleares. Se recupera en 3 semanas. Si se hubieran encontrado infiltrados linfocíticos en los nervios periféricos y desmielinización segmentaria cuando consultó al médico por vez primera, ¿cuál de los siguientes diagnósticos habría sido más probable?

A Esclerosis lateral amiotrófica
B Síndrome de Guillain-Barré
C Esclerosis múltiple
D Infección por el virus de la varicela-zóster
E Deficiencia de vitamina B_{12} (cobalamina)

5 Un hombre de 37 años positivo para el VIH ha presentado problemas sensitivos y motores recidivantes durante el último año, entre los que se incluyó dificultad para deambular, y parestesias y hormigueo simétricos en todas las extremidades. Las pruebas de conducción nerviosa identificaron datos de desmielinización y

remielinización. Se realiza tratamiento con plasmaféresis. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que produzca la enfermedad neurológica de este paciente?

A Infección bacteriana
B Carcinoma
C Hiperglucemia
D Desregulación inmunitaria
E Daño traumático

6 Una mujer de 93 años ha presentado brotes continuados de lesiones dolorosas en la piel del tórax derecho durante el último año. En la exploración física presenta una erupción vesiculosa en un área de 1 × 8 cm de la séptima costilla derecha. Recibe aciclovir y se resuelven parcialmente las lesiones cutáneas, aunque el dolor persiste durante los 3 meses siguientes. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que explique estos hallazgos?

A Envejecimiento
B Diabetes mellitus
C Esclerosis múltiple
D Trastorno somatomorfo doloroso
E Infección por el virus de la varicela zóster
F Deficiencia de vitamina B_{12} (cobalamina)

7 Un hombre de 66 años tratado con hemodiálisis por una insuficiencia renal crónica ha notado una pérdida de sensibilidad progresiva en las piernas durante los últimos 4 años. En la exploración física se confirma una pérdida simétrica de sensibilidad en ambos miembros inferiores, sin pérdida de fuerza o alteraciones de la marcha. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que provoque estos hallazgos?

A Astrocitoma cerebral
B Diabetes mellitus
C Enfermedad de Hansen
D Demencia multiinfarto
E Esclerosis múltiple
F Uremia

8 Un hombre de 55 años ha presentado una úlcera en el pie que no ha cicatrizado durante 2 meses. En la exploración física se identifica una úlcera superficial sin cicatrización de 2 cm en el maléolo medial izquierdo. También se observa una reducción

simétrica de la sensibilidad en las regiones distales de las extremidades inferiores. El paciente refiere antecedentes de múltiples infecciones urinarias en relación con la dificultad para vaciar por completo la vejiga y también es impotente. ¿Cuál de las siguientes alteraciones patológicas es más probable que se encuentre en los nervios periféricos de este paciente?

A Inflamación aguda
B Neuropatía axónica
C Formación de bulbos de cebolla
D Desmielinización segmentaria
E Degeneración walleriana

9 Una mujer de 24 años ha presentado episodios de parestesias y hormigueo en las dos manos durante los últimos 5 meses. El problema empeora al final del día y le dificulta el uso del teclado del ordenador. La afectación es máxima en el pulgar y los dos dedos primeros. No se asocian a edema o dolor y no recuerda haber sufrido ningún traumatismo en las extremidades superiores. En la exploración física se encuentra un signo de Tinel positivo y una reducción de la sensibilidad al tacto ligero y la punción en la superficie palmar de las dos manos siguiendo la distribución de los tres primeros dedos. Se observa atrofia de los músculos tenares. ¿Cuál de las causas siguientes es más probable que produzca esta neuropatía?

A Porfiria intermitente aguda
B Diabetes mellitus de tipo 2
C Atrapamiento con compresión
D Lupus eritematoso sistémico
E Infección por el virus de la varicela-zóster

10 Una mujer de 41 años ha notado un intenso dolor en el pie derecho durante los últimos 2 meses. El dolor le dificulta el uso de zapatos de tacón y parece peor al final del día. En la exploración física muestra un intenso dolor a la palpación del espacio interdigital entre los dedos segundo y tercero. No se observa edema ni eritema en el pie. La potencia motora de las extremidades inferiores parece normal. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que haya ocasionado estos hallazgos?

A Beriberi
B Diabetes mellitus de tipo 2

C Neuropatía por atrapamiento
D Intoxicación por plomo
E Degeneración walleriana

11 Un hombre de 58 años ha presentado una visión doble con caída del párpado cada vez más intensa, sobre todo al final de la jornada, durante el último mes. También refiere dificultad para masticar por la noche. Se le diagnosticó un síndrome de Sjögren hace más de una década. La exploración física muestra una potencia motora 5/5 en las extremidades, que se reduce a 4/5 con los movimientos repetidos. La administración de edrofonio recupera la potencia muscular. No existe dolor a la palpación ni reducción de la movilidad articular. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que presente este paciente?

A Positividad de los anticuerpos frente al receptor de acetilcolina
B Anti-histidilo ARNt sintetasa (anti-Jo-1) en título 1:512
C Aumento de la concentración de creatina cinasa sérica
D Aumento de la concentración de cortisol sérico
E Eosinofilia en sangre periférica

12 Un hombre de 72 años ha perdido 7 kg de peso, con aparición de debilidad proximal y dificultad miccional durante los últimos 4 meses. En la exploración física tiene una potencia muscular 4/5 en la parte proximal de las extremidades, que no disminuye con los movimientos repetidos. No refiere dolor muscular ni pérdida de movilidad. Las pruebas de laboratorio indican que no tiene anticuerpos séricos frente al receptor de acetilcolina. Se le prescribió un fármaco anticolinesterásico, sin observar mejoría. ¿Cuál de los siguientes trastornos de base es más probable que tenga este paciente?

A Hepatitis crónica C
B Diabetes mellitus
C Distrofia muscular de Duchenne
D Intoxicación por plomo
E Carcinoma de células pequeñas pulmonar

13 Un hombre de 40 años, sano, y su esposa, de 42 años, han observado visión borrosa y debilidad progresivas desde ayer. En la exploración física no tienen fiebre, pero muestran hipotensión

ortostática. Se observa debilidad muscular 3/5 en todas las extremidades y dificultad respiratoria. Se les intuba y somete a ventilación mecánica. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que produzca esta parálisis?

A Botulismo
B Ingesta de cocaína
C Diabetes mellitus
D Síndrome de Guillain-Barré
E Timoma

14 Un hombre de 42 años ha notado debilidad muscular progresiva en los brazos y las piernas con disartria y dificultad para la deglución durante los últimos 2 años. Ahora se encuentra confinado a una silla de ruedas. La exploración física muestra una potencia motora 3/5 en todas las extremidades. No tiene dolor muscular a la palpación, deformidades ni pérdida de la movilidad articular, y tampoco se objetiva temblor. Se obtiene una biopsia del músculo cuádriceps y su estudio histológico no identifica inflamación, pero sí atrofia de las miofibrillas. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Esclerosis lateral amiotrófica
B Distrofia muscular de Becker
C Miopatía mitocondrial
D Miastenia grave
E Enfermedad de Werdnig-Hoffmann

15 Una mujer de 30 años ha presentado debilidad muscular progresiva con mialgias durante el último año. Actualmente encuentra dificultades para levantarse de las sillas y subir escaleras. No tiene debilidad en los músculos de las manos. La exploración física revela un exantema violáceo fino en la cara, sobre todo a nivel palpebral. Presenta placas rojizas, planas, en los codos, rodillas y nudillos. Las pruebas de laboratorio encuentran una creatina cinasa de 620 U/l. Se obtiene una biopsia de deltoides y su estudio histológico revela un infiltrado inflamatorio mononuclear alrededor de pequeños vasos con grupos de miofibrillas atróficas en la periferia de los fascículos. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que sea responsable de esta enfermedad?

A Lesión mediada por anticuerpos y complemento de la

microvasculatura
- B Expansión de secuencias de repetición CTG en el cromosoma 19q13.2
- C Mutación de un gen que codifica los canales de calcio regulados por voltaje
- D Lesión de las miofibrillas por linfocitos CD8+ frente a los antígenos musculares
- E Lesión nerviosa mediada por linfocitos T e inducida por la infección por *Mycoplasma pneumoniae*

16 Una mujer de 56 años presenta una debilidad muscular generalizada progresiva desde hace 2 meses. En la exploración física tiene una potencia motora 4/5 en las extremidades superiores e inferiores. Presenta una redistribución de la grasa en la parte superior del tronco, con cara redondeada. Además, se encuentran equimosis por todas las extremidades. Está afebril con una presión arterial de 155/90 mmHg. Se obtiene una biopsia del gastrocnemio y la tinción histoquímica para ATPasa revela atrofia de fibras musculares de tipo II. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

- A Síndrome de Cushing
- B Enfermedad de McArdle
- C Distrofia muscular de Duchenne
- D Miastenia grave
- E Polimiositis

17 Una mujer de 71 años recibe un fármaco para reducir la concentración de colesterol sérico. Durante la última semana ha presentado dolor y debilidad muscular sin relación con la actividad física. En la exploración se confirma una hipersensibilidad muscular leve, pero difusa. Las pruebas de laboratorio encuentran una creatina cinasa sérica de 2.049 U/l y una creatinina de 2 mg/dl. La tira reactiva en orina muestra presencia de sangre sin eritrocitos en el estudio microscópico de la misma. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más probable que provoque estos hallazgos?

- A Colestiramina
- B Clofibrato
- C Ecetimiba
- D Lovastatina

E Ácido nicotínico



18 Un hombre de 44 años refiere una intolerancia progresiva al ejercicio desde hace 1 año. En la exploración física tiene una potencia motora 4/5 en las extremidades, sin dolor muscular ni pérdida de movilidad articular. Presenta edema con fóvea que llega a las rodillas. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia con edema pulmonar y derrame pleural. Se obtiene una biopsia del deltoides. La figura se corresponde con la tinción inmunohistoquímica con anticuerpos frente a la distrofina (*A*,

normal; *B,* paciente). ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

- A Esclerosis lateral amiotrófica
- B Distrofia muscular de Becker
- C Miastenia grave
- D Polimiositis
- E Enfermedad de Werdnig-Hoffmann



19 Un niño de 5 años desarrolla una debilidad muscular progresiva. No consigue jugar con otros niños porque se cansa enseguida y no consigue mantener el ritmo de los demás. La exploración física indica que no tiene fiebre. No se observan deformidades. La potencia muscular es 4/5 en las extremidades y parece existir más debilidad en los músculos proximales. Las pruebas de laboratorio revelan una creatina cinasa sérica de 689 U/l. Se realiza una biopsia muscular, cuyo aspecto histológico muestra la figura. ¿Cuál de las siguientes pruebas es más probable que permita confirmar el diagnóstico de este paciente?

- A Recuento absoluto de eosinófilos en la sangre periférica
- B Tinción inmunohistoquímica para la distrofina
- C PCR para detectar la expansión de tripletes CGG en el cromosoma Xq27.3
- D Presencia de bandas oligoclonales de inmunoglobulinas en el

líquido cefalorraquídeo

E Título de anticuerpos frente a la acetilcolinesterasa sérica

20 Un niño de 16 años ha sufrido dos episodios de pérdida súbita de función motora con debilidad residual en el brazo y la pierna derechos durante los últimos 2 años. Desde la infancia ha presentado debilidad muscular y convulsiones. El año pasado ha tenido también dificultades con la memoria y para realizar las actividades de la vida diaria. La exploración física revela talla baja. La potencia motora es 4/5 en todas las extremidades, sin hipersensibilidad muscular. Las pruebas de laboratorio muestran glucosa, 71 mg/dl; creatinina, 1,1 mg/dl; y ácido láctico, 9,2 mmol/l. Se obtiene una biopsia del gastrocnemio y el estudio histológico identifica fibras rojas rasgadas. En el estudio con microscopia electrónica, las miofibrillas contienen inclusiones en «aparcamiento». La madre y la abuela del niño tienen alteraciones parecidas, pero su padre y su abuelo no. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que explique la patogenia de esta enfermedad?

A Alteración de un canal de calcio regulado por voltaje

B Anticuerpos frente al receptor de acetilcolina

C Linfocitos T citotóxicos CD8+ frente a las miofibrillas

D Disminución de la distrofina en el sarcolema

E Deficiente producción de ATP mitocondrial

F Aumento de las secuencias de repetición CTG en 19q13.2-13.3

21 Una niña de 10 años ha presentado debilidad muscular desde los primeros años infantiles, pero no ha empeorado. Puede caminar sin ayuda, pero no participar en actividades físicas agotadoras. La exploración muestra una potencia muscular 4/5 en los músculos proximales y 5/5 en los distales. No se encuentra dolor muscular a la palpación. Se realiza una biopsia del deltoides y la tinción tricrómica de Gomori revela agregados subsarcolémicos de inclusiones intracitoplásmicas con forma de bastón. Las pruebas de laboratorio muestran creatinina cinasa sérica normal. ¿Cuál de las siguientes formas de miopatía es más probable que sufra esta niña?

A Canalopatía

B Miopatía congénita

C Glucogenosis

D Miopatía inflamatoria
E Miopatía mitocondrial

22 Un lactante a término presenta dificultad para moverse a partir del primer mes de vida. Cuando tiene 1 año, muestra una parálisis flácida. Se realiza una biopsia muscular, que revela atrofia panfascicular de miofibrillas con algunas miofibrillas grandes dispersas y sin inflamación. La creatina cinasa sérica no está elevada. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Esclerosis lateral amiotrófica
B Distrofia muscular de Becker
C Enfermedad de McArdle
D Miastenia grave
E Distrofia miotónica
F Atrofia muscular espinal

23 Un hombre de 40 años se somete a una cirugía programada para reparación de una hernia por vía laparoscópica. Se anestesia con halotano y suxametonio. La pérdida de sangre es mínima. A los 30 min de iniciar la intervención, la temperatura aumenta hasta 39,5 °C y la frecuencia cardíaca a 115/min. El anestesista nota espasmos musculares y rigidez de las extremidades. Las pruebas de laboratorio revelan aumento de la creatina cinasa sérica y mioglobinuria. ¿Cuál de los genes que codifican las proteínas implicadas en las funciones siguientes es más probable que esté mutado en este caso?

A Canales de calcio
B Placa motora terminal
C Enzima de la fosforilación oxidativa
D Complejo sarcoglucano
E Filamentos gruesos

24 Una mujer de 42 años ha presentado un número creciente de nódulos subcutáneos durante los últimos 20 años. En la exploración física se identifican nódulos de 0,5 a 1,5 cm de diámetro, firmes e indoloros. También tiene múltiples máculas café con leche en la piel. Actualmente refiere dolor en la parte posterior del muslo izquierdo. La RM revela una masa de 8 cm. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que esté mutado en esta paciente?

A Gen codificador de actina

B Gen codificador de cardamomo
C Gen codificador de caveolina
D Gen codificador de distrofina
E Gen codificador de neurofibromina
F Gen codificador de troponina

Respuestas

1 **E** Los axones distales al punto de lesión o corte degeneran. Las células de Schwann residuales pueden guiar el recrecimiento de los nervios. Los macrófagos ayudan a eliminar los restos derivados de la mielina de la zona de lesión nerviosa, pero la inflamación aguda no es un rasgo típico de las enfermedades que afectan a los nervios periféricos. Los neuromas traumáticos pueden producirse cuando se corta el nervio, pero esta situación se evita con una disección cuidadosa y el objetivo de un injerto es guiar un crecimiento ordenado. Es poco probable que un tumor siga a un nervio, aunque los tumores malignos muestran tendencia a infiltrarlos. La desmielinización segmentaria es más típica de la neuropatía diabética.

2 **D** La laceración del nervio tibial provoca una degeneración walleriana distal a la lesión. El realineamiento del nervio se asocia a la aparición de gemaciones axónicas. Los nuevos axones se encuentran con las vainas de mielina residuales y crecen por ellas a una velocidad de unos 2 mm/día, de forma que tardan 1 año en atravesar toda la longitud de la pantorrilla. Se puede reinervar el músculo, pero se encontrará un agrupamiento por tipo de los fascículos musculares reinervados. La fisioterapia puede ayudar durante este período. Puede que no se consiga recuperar por completo las funciones sensitiva y motora.

3 **B** La distribución se corresponde con C7, posiblemente en relación con una herniación de disco que comprime la raíz nerviosa. La rama digital del nervio mediano es puramente C7. El atrapamiento nervioso o la compresión afectan típicamente al axón. Si el nervio no se secciona, puede producirse un recrecimiento del axón. La neurapraxia ocurre cuando la lesión es transitoria (cuando se «nos duerme» un pie) porque hay pérdida de la conducción, pero no lesión axónica. La axonotmesis implica una pérdida de axones y degeneración

walleriana, sin lesiones en la vaina de mielina, de forma que el axón puede crecer de nuevo. La neurotmesis es un corte del nervio y este puede volver a crecer solo cuando se produce un alineamiento exacto de los extremos cortados, lo que permitiría a los brotes axónicos encontrar la vaina de mielina adecuada. La vasculitis puede afectar a la arteriola que irriga un nervio, pero es poco probable que afecte solo a una raíz nerviosa. La pérdida sensitiva y motora de este caso no sugiere una lesión ganglionar. El componente sensitivo en este caso implica que están afectadas más miofibrillas y las que están inervadas por C7 tendrán una atrofia neurógena. Las parestesias, no la anestesia, sugieren que el nervio no se ha cortado y que persisten las células de Schwann.

4 **B** El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno infrecuente que suele aparecer tras una infección bacteriana *(Campylobacter jejuni),* vírica (citomegalovirus) o por micoplasmas, y se cree que aparece por la aparición de linfocitos T reactivos frente a la mielina o por una similitud molecular, que de alguna manera es activada por la infección. La parálisis de los músculos respiratorios puede poner en riesgo la vida, aunque muchos pacientes se recuperan tras semanas de soporte ventilatorio. La esclerosis lateral amiotrófica se asocia a una debilidad muscular lentamente progresiva. La esclerosis múltiple puede debutar de múltiples formas, pero, en general, las placas de desmielinización no son lo bastante extensas o difusas para paralizar los músculos respiratorios. Al final puede ser necesaria la ventilación mecánica. La infección por el virus de la varicela zóster suele afectar a la piel siguiendo la distribución de un dermatoma dependiente de una raíz raquídea. La deficiencia de vitamina B_{12} produce una degeneración progresiva subaguda de la médula con trastornos sensitivomotores en las extremidades.

5 **D** La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC) puede encontrarse en pacientes con enfermedades inmunológicas. El tratamiento puede facilitar la recuperación, aunque a veces sigue un curso crónico. Las infecciones bacterianas provocan signos de inflamación aguda con enrojecimiento y tumefacción, y no suelen provocar una afectación específica de los nervios. Algunos síndromes

paraneoplásicos se asocian a carcinomas, como el síndrome miasténico de Eaton-Lambert, que cursa con debilidad. Los carcinomas son menos probables a esta edad y no son complicaciones frecuentes de la infección por el VIH. La hiperglucemia es característica de la diabetes mellitus, y la neuropatía diabética suele ser progresiva y no remitir. Las lesiones traumáticas no suelen producir alteraciones tan generalizadas y es poco probable que sigan una evolución variable.

6 **E** Cuando se pasa una infección por varicela, el virus de la varicela-zóster (VVZ) responsable queda durmiente en los ganglios de la raíz dorsal, y se reactiva solo más tarde cuando el sistema inmunitario no consigue ya mantenerlo contenido. Estos fallos de control son más probables con la edad y en cuadros de inmunodepresión, y esto condiciona la aparición clásica de la culebrilla de distribución dermatomérica. Esta paciente presenta también una neuralgia postherpética, un cuadro incapacitante de dolor crónico difícil de tratar. El mero envejecimiento no explica esta enfermedad, aunque los ancianos tienen más riesgo de sufrir estos procesos patológicos. La diabetes mellitus provoca neuropatías con pérdida de sensibilidad e incluso dolor, pero no se asocia a lesiones cutáneas. La esclerosis múltiple puede involucrar a la sustancia blanca de la médula espinal con hallazgos neurológicos variables, pero no presenta lesiones cutáneas, y la EM suele debutar a una edad más temprana. El dolor desproporcionado para los hallazgos patológicos sugiere un trastorno de dolor somatoforme, pero la paciente no presenta unos hallazgos patológicos importantes para explicar el dolor persistente. La deficiencia de cobalamina con anemia perniciosa y degeneración combinada subaguda de la médula puede producir parestesias y pérdida de función, pero no lesiones cutáneas.

7 **B** La causa más frecuente de una neuropatía periférica de predominio sensitivo es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus de larga evolución provoca también una nefropatía con insuficiencia renal crónica. Los trastornos sensitivomotores no se asocian típicamente a la presencia de masas intracraneales, como los astrocitomas. Los infartos cerebrales podrían reducir la

actividad motora y/o producir pérdida de sensibilidad, aunque en general no siguiendo un patrón simétrico; los pequeños infartos que culminan en una demencia pueden no ocasionar una pérdida motora o sensitiva significativa. La enfermedad de Hansen (lepra) provoca anestesia focal. Las lesiones desmielinizantes de la esclerosis múltiple en distintas regiones de la sustancia blanca y en momentos distintos pueden ocasionar muchos síntomas y signos, pero la presencia de lesiones simétricas sugiere otra enfermedad. La neuropatía urémica recuerda a la neuropatía diabética, pero típicamente mejora con la diálisis.

8 **D** Los rasgos descritos se corresponden con una neuropatía periférica asociada a la diabetes mellitus. Puede haber afectación de nervios sensitivos y motores, y puede asociarse también una neuropatía autónoma. El estudio histológico revela una neuropatía axónica con desmielinización segmentaria. La dificultad para vaciar la vejiga durante la micción y la impotencia son secundarias a una neuropatía autónoma. Los nervios largos se afectan en primer lugar, lo que explica la afectación de la parte distal de la pierna, y esto explica muchos casos de pie diabético, con traumatismos y posterior ulceración. En las neuropatías no suele encontrarse inflamación aguda. Pueden aparecer infiltrados linfocíticos en el síndrome de Guillain-Barré. La formación de capas de cebolla es un rasgo de una neuropatía hereditaria llamada *enfermedad de Refsum.* La degeneración walleriana se asocia típicamente a un corte traumático con sección del nervio.

9 **C** El síndrome del túnel del carpo es una variante de neuropatía por compresión, secundaria al atrapamiento del nervio mediano por debajo del retináculo flexor en la muñeca. Las mujeres se afectan más que los hombres y suele ser un problema bilateral. Se ha discutido la implicación de un uso repetitivo excesivo de la muñeca como causa de este proceso, y se emplean modificaciones en la forma de vida y medidas ergonómicas como tratamiento conservador inicial. Algunos trastornos, como el hipotiroidismo, la amiloidosis y el edema asociado al embarazo, también pueden reducir el espacio en el túnel del carpo. La porfiria intermitente aguda puede ser causa de una

forma hereditaria de neuropatía sensitiva y motora. La diabetes mellitus provoca una neuropatía sensitivomotora distal simétrica más extensa. El lupus eritematoso sistémico es causa de artralgias y mialgias, pero no se asocia a lesiones nerviosas focales. Las infecciones por el virus de la varicela-zóster producen una neuropatía dolorosa con un patrón de distribución siguiendo los dermatomas.

10 **C** La moda puede tener un precio. Esta paciente tiene un neuroma de Morton, que es un tipo de neuropatía compresiva en la que el nervio plantar queda atrapado entre las cabezas de los metatarsianos. Las lesiones crónicas determinan que crezca una masa de axones, fibroblastos y células perineurales entremezclados. La neuropatía diabética, que puede asociarse a la diabetes de tipo 1 o 2, es bilateral. Se caracteriza por pérdida de sensibilidad, que puede predisponer a los traumatismos de los pies. Los trastornos tóxicos (intoxicación por plomo) y metabólicos (beriberi por deficiencia de tiamina) no son focales. La degeneración walleriana es una neuropatía retrógrada asociada a la sección de un nervio; en el lugar de una lesión puede formarse un neuroma.

11 **A** La miastenia grave provoca debilidad muscular por pérdida de la función de la placa motora terminal. Este trastorno se debe a la pérdida mediada por anticuerpos de los receptores para la acetilcolina en las uniones neuromusculares. El edrofonio inhibe la colinesterasa para mejorar la transmisión sináptica. Los anticuerpos frente a Jo-1 aparecen en la polimiositis. El síndrome de Sjögren no produce debilidad muscular por el uso. Las enfermedades miopáticas, como las distrofias musculares, se asocian a incrementos de las concentraciones de creatina cinasa sérica. La debilidad muscular generalizada con atrofia de las fibras musculares de tipo II se describe en el exceso de glucocorticoides. La infección por el parásito *Trichinella spiralis* puede producir eosinofilia.

12 **E** El síndrome miasténico de Eaton-Lambert es una forma infrecuente de síndrome paraneoplásico. Se suelen afectar primero los músculos proximales. Igual que sucede en otros muchos síndromes paraneoplásicos, suele asociarse sobre todo al carcinoma de células pequeñas pulmonar. Los

autoanticuerpos se dirigen contra los canales de calcio de las membranas de las terminaciones de los nervios motores. Los pacientes con una hepatitis vírica crónica pueden sufrir malestar y debilidad generalizados, que no guardan relación con una miopatía específica. La diabetes mellitus también puede ocasionar neuropatía periférica, aunque suele involucrar antes a las regiones distales, no a las proximales. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad ligada al cromosoma X que se manifiesta en la primera infancia. La intoxicación por plomo origina una neuropatía periférica, a menudo con hallazgos en el sistema nervioso central.

13 **A** Consumieron alimentos contaminados por la toxina de *Clostridium botulinum.* Esta potente neurotoxina interrumpe la unión neuromuscular porque inhibe la liberación de acetilcolina. Este microorganismo anaerobio crece en alimentos envasados sin acidez. La cocaína es un potente vasoconstrictor, pero no afecta de forma directa a los nervios. La neuropatía diabética suele progresar lentamente. El síndrome de Guillain-Barré es causa de una parálisis ascendente. El timoma se asocia a una miastenia grave, que suele evolucionar más lentamente, aunque en algunos casos se produce una crisis miasténica aguda con dificultad respiratoria.

14 **A** La esclerosis lateral amiotrófica se denomina también *enfermedad de Lou Gehrig,* en recuerdo del famoso primera base de los Yankees de Nueva York que la sufrió. Pueden afectarse las motoneuronas superiores e inferiores, con la consiguiente atrofia muscular por denervación. Este cuadro se produce porque una neurona determinada inerva un grupo de fibras musculares. La afectación bulbar (pares craneales) indica una evolución más rápida. La enfermedad de Werdnig-Hoffman es también una neuropatía con atrofia por grupos, pero debuta en la lactancia. Las demás opciones recogidas no se asocian a denervación.

15 **A** La dermatomiositis es una variante de miopatía inflamatoria de mecanismo inmunológico. En estos pacientes se produce lesión por anticuerpos y complemento de los capilares pequeños, con la característica atrofia perifascicular de las miofibrillas. La expansión de tripletes CTG se encuentra en la

distrofia miotónica. Las mutaciones de los genes de los canales iónicos son causa de diversas canalopatías, incluida la parálisis periódica hipopotasémica y la hipertermia maligna. Los linfocitos T CD8+ se consideran importantes para la patogenia de la polimiositis. La lesión de la mielina mediada por linfocitos T se encuentra en el síndrome de Guillain-Barré y produce una parálisis ascendente aguda.

16 **A** La atrofia de fibras musculares de tipo II se puede asociar a un exceso de glucocorticoides y también a la inmovilización prolongada. El estudio con microscopio óptico convencional puede no diferenciar la atrofia de tipo II de la atrofia por denervación. Se podría realizar la tinción histoquímica para la ATPasa (pero no es precisa la biopsia, ante la historia). Se produce una deficiencia de la enzima miofosforilasa en la enfermedad de McArdle, lo que se traduce en dolor muscular y calambres con el ejercicio enérgico. La distrofia muscular de Duchenne es un proceso ligado al cromosoma X, infrecuente en mujeres. La enfermedad debuta en la primera infancia. Los anticuerpos frente al receptor de acetilcolina producen la debilidad muscular en la miastenia grave. La polimiositis es un cuadro inflamatorio con afectación de todos los tipos de fibras.

17 **D** Esta paciente sufre una miopatía inducida por estatinas, con un incremento 10 veces por encima del normal de la concentración de creatina cinasa en relación con la rabdomiólisis (la mioglobina que se libera del músculo se puede detectar en la tira reactiva de orina). Las estatinas son inhibidores de la HMG-CoA reductasa, que reducen la síntesis hepática de colesterol endógeno. La colestiramina se une a los ácidos biliares intestinales e interrumpe la circulación enterohepática de ácidos biliares, para aumentar la conversión de colesterol a ácidos biliares en el hígado. El clofibrato estimula la captación y oxidación de los ácidos grasos libres en el músculo. La ecetimiba interfiere en la absorción de lípidos intestinales. El ácido nicotínico inhibe la movilización de los ácidos grasos libres periféricos para reducir la síntesis hepática de triglicéridos y la secreción de VLDL.

18 **B** En la biopsia hay una cantidad reducida de distrofina, pero no ausencia completa, lo que sugiere una distrofia muscular de

Becker. En la distrofia muscular de Duchenne se produce una falta completa de distrofina por una deleción génica. A favor del diagnóstico de distrofia muscular de Becker destaca también la mayor edad del paciente y que la afectación no es grave. Los dos procesos se vinculan al cromosoma X. La esclerosis lateral amiotrófica es una atrofia por denervación que afecta a adultos por pérdida de las células del asta anterior de la médula y los núcleos de los pares craneales. La miastenia grave ocurre por la presencia de anticuerpos frente a los receptores de acetilcolina y se encuentra un mínimo cambio estructural en el músculo. La polimiositis es una enfermedad autoinmunitaria secundaria al ataque por los linfocitos T de las fibras musculares, que produce una degeneración de las fibras musculares con inflamación. La enfermedad de Werdnig-Hoffmann es una forma de atrofia muscular espinal, que aparece desde el nacimiento y se debe a una pérdida de origen genético de las células del asta anterior.

19 **B** La aparición de debilidad muscular en la infancia sugiere una distrofia muscular hereditaria. La biopsia muestra variabilidad del tamaño de las fibras musculares, con aumento del tejido conjuntivo entre las fibras. La identificación de estos hallazgos en un varón sugiere una distrofia muscular asociada al cromosoma X. La tinción inmunohistoquímica frente a la distrofina debería confirmar la ausencia de esta sustancia y confirmar el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. Podría encontrarse una eosinofilia en procesos alérgicos y enfermedades parasitarias, como la triquinosis. La expansión de tripletes CGG en Xq27.3 diagnostica el retraso mental familiar. La presencia de bandas oligoclonales de inmunoglobulinas en el líquido cefalorraquídeo caracteriza a la esclerosis múltiple. Los anticuerpos frente al receptor de la acetilcolina son un rasgo de la miastenia grave, que se caracteriza por debilidad muscular tras un uso repetitivo de los músculos.

20 **E** La producción de ATP mediante fosforilación oxidativa en las mitocondrias puede verse afectada por los genes mitocondriales, que son distintos de los presentes en los cromosomas del núcleo celular. Estos genes anormales pueden ser origen de las miopatías mitocondriales, de encefalopatías y de sordera. En este caso se trata de una encefalopatía

mitocondrial con acidosis láctica y episodios parecidos a ictus (MELAS). Los genes mitocondriales tienen un patrón de herencia materna. En una de las canalopatías se encuentra un canal de calcio regulado por voltaje anormal que produce una parálisis periódica hipopotasémica. Las canalopatías se heredan típicamente de forma autosómica dominante. Los anticuerpos frente al receptor de acetilcolina producen la miastenia grave, cuya única manifestación es la debilidad muscular. Los linfocitos citotóxicos CD8+ intervienen en las lesiones musculares de la polimiositis. En la distrofia muscular de Becker hay una disminución de la distrofina en el sarcolema, mientras que en la de Duchenne falta por completo. El gen de la distrofina se localiza en el cromosoma X. En la distrofia miotónica se produce un aumento de los tripletes CTG.

21 **B** La miopatía nemalínica por bastones, una variante de miopatía congénita, puede debutar en la lactancia o la infancia y puede no progresar o hacerlo lentamente. Las miopatías congénitas suelen denominarse según sus rasgos histológicos. Las canalopatías debutan típicamente con una parálisis periódica con alteraciones del potasio sérico. Las dos glucogenosis que con más frecuencia afectan al músculo estriado son la enfermedad de Pompe (tipo II) y la enfermedad de McArdle (tipo V). Se reconocen depósitos aumentados de glucógeno con el ácido peryódico de Schiff (PAS). Las neuropatías afectan al músculo por denervación, provocando agrupaciones de fibras musculares atróficas. La polimiositis y la dermatomiositis son miopatías inflamatorias que se asocian a mialgias y degeneración de las fibras con aumento de la creatina cinasa sérica. Las miopatías mitocondriales pueden debutar en la infancia, pero en general son progresivas y afectan con frecuencia a otros órganos, como el corazón o el encéfalo.

22 **F** La enfermedad de Werdnig-Hoffman es una forma de atrofia muscular espinal secundaria a la pérdida de motoneuronas en la lactancia, de forma que la biopsia mostrará atrofia agrupada de miofibrillas. La muerte se produce de forma constante antes de los 3 años. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad progresiva con una forma neurógena de atrofia muscular secundaria a la pérdida de motoneuronas. La distrofia muscular

de Becker se hereda de forma ligada al cromosoma X y debuta en la edad adulta, a diferencia de la distrofia muscular de Duchenne, aunque en ambos casos existe una mutación del gen de la distrofina. La enfermedad de McArdle es un proceso autosómico recesivo, secundario a una deficiencia de la fosforilasa muscular, y no provoca una debilidad progresiva. La miastenia grave es consecuencia de la presencia de anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina y cursa con debilidad progresiva. La distrofia miotónica se caracteriza por debilidad facial y en la mitad superior del cuerpo, cataratas, atrofia gonadal, miocardiopatía y demencia.

23 **A** La hipertermia maligna es un trastorno infrecuente, aunque con riesgo de muerte, que afecta solo a 1 de cada 20.000 adultos, pero como se realizan millones de intervenciones quirúrgicas con anestesia, se debe recordar cuando se observe un aumento rápido de la temperatura del paciente. En pacientes con mutaciones del receptor de rianodina se altera la recaptación de calcio al retículo sarcoplásmico con aumento del calcio intracelular, que produce hipermetabolismo. Las placas terminales motoras incluyen acetilcolina y receptores de acetilcolina, implicados en la miastenia grave. Los genes del ADN mitocondrial están implicados fundamentalmente en la fosforilación oxidativa y se hereda por vía materna, con posible debilidad muscular, pero no hipertermia. El complejo sarcoglucano comprende muchas proteínas, incluida la distrofina, que pueden estar implicadas en las distrofias musculares, pero no son causa de hipertermia. Los filamentos gruesos incluyen la proteína contráctil miosina; se pueden encontrar mutaciones de la β-miosina en algunos casos de miocardiopatía hipertrófica.

24 **E** Esta paciente padece una neurofibromatosis de tipo 1 (NF-1) con múltiples neurofibromas subcutáneos y ha desarrollado un gran tumor de vaina nerviosa periférica maligno (TVNPM). Estos TVNPM pueden aparecer sobre un neurofibroma previo. La neurofibromina actúa como supresor de tumores. La actina es una de las proteínas contráctiles del músculo y su ausencia no es compatible con la vida. El cardamomo es una especia aromática de la familia del jengibre que se utiliza en medicina tradicional

para los procesos orales e intestinales. La caveolina es una proteína de las vesículas de transporte intracelular, y pueden aparecer mutaciones de la misma en algunas variantes de distrofia muscular de las cinturas. La distrofina estabiliza la membrana sarcolémica y su ausencia produce una distrofia muscular de Duchenne. La troponina forma parte de la unidad de las miofibrillas y se emplea para detectar las lesiones del músculo estriado, en concreto la isquemia miocárdica y el infarto.

CAPÍTULO

28

Sistema nervioso central

PEF9 Capítulo 28: Sistema nervioso central

PH9 Capítulo 22: Sistema nervioso central

1 En un estudio sobre el shock hipoglucémico se analizan los cambios celulares en el cerebro. Se observa que un tipo celular en el hipocampo presenta eosinofilia citoplásmica intensa, cromatólisis central, tumefacciones esferoidales y picnosis nuclear. Tales cambios aparecen 12 h después de que la glucemia disminuya por debajo de 20 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes células es más probable que esté implicada?

A Astrocitos
B Células endoteliales
C Microglía
D Neuronas
E Oligodendroglía

2 Un hombre de 75 años tiene antecedentes de episodios transitorios de pérdida de visión. Las únicas anomalías detectadas en la exploración física son soplos carotídeos en el cuello. Dos días después sufre una hemiplejía con pérdida de conocimiento. Es llevado al servicio de urgencias y la TC muestra signos de infarto cerebral. Se le aplican medidas de soporte vital, pero fallece 15 días más tarde. En la autopsia se observa un área de necrosis y al microscopio se aprecia que las lesiones presentan aumento del número de células distribuidas en torno a la zona central de necrosis. ¿Cuál de los siguientes tipos celulares es más probable que tenga una función fagocítica en estas lesiones?

A Células aracnoideas
B Astrocitos
C Células ependimarias
D Microglía

E Oligodendroglía

3 Una mujer de 49 años ha sufrido cefaleas intensas durante 2 días. En la exploración física está afebril y normotensa. La oftalmoscopia muestra papiledema derecha. Un día después presenta dilatación pupilar derecha y alteración del movimiento ocular. A continuación presenta un estado de obnubilación. ¿Cuál de las siguientes lesiones explica mejor estos hallazgos?

A Hematoma subdural crónico
B Absceso en el lóbulo frontal
C Glioblastoma con edema
D Hidrocefalia *ex vacuo*
E Infarto del lóbulo occipital
F Aneurisma en fresa de la arteria cerebral media roto

4 Un adolescente de 16 años sin problemas médicos previos refiere cefaleas que le han afectado en los últimos 9 meses. En la exploración física no hay signos o síntomas anómalos. La TC craneal muestra aumento de tamaño de los ventrículos cerebrales laterales y del tercer ventrículo. Se efectúa una punción lumbar con presión de apertura normal, y se obtiene un LCR transparente, con contenido de proteínas levemente elevado, glucosa normal y sin leucocitos. ¿Cuál de las siguientes lesiones craneales es más probable que cause estos hallazgos?

A Estenosis del acueducto
B Absceso cerebral
C Meningitis criptocócica
D Ependimoma
E Esclerosis múltiple
F Malformación vascular

5 Un hombre de 61 años ha experimentado deterioro de la función mental con confusión y cefaleas a lo largo del último año. Al principio las cefaleas se presentaban por la mañana, pero en los últimos 3 meses se han hecho continuas, con náuseas y visión borrosa. En la exploración física se observa papiledema bilateral. Una TC craneal muestra aumento de tamaño de todo el sistema ventricular. ¿Cuál de las siguientes enfermedades previas es más probable que sea el origen de los problemas actuales?

A Estenosis del acueducto
B Papiloma del plexo coroideo

C Infarto cerebral
D Malformación de Dandy-Walker
E Infección por el VIH
F Meningitis neumocócica

6 Una mujer de 67 años ha padecido cefaleas de nuevo desarrollo con náuseas durante el último mes. En la actualidad presenta empeoramiento de las cefaleas con debilidad en la pierna derecha. En la exploración física se aprecian 4/5 de fuerza motora en la pierna derecha. El movimiento de los músculos extraoculares está intacto. ¿Cuál de las siguientes localizaciones es más probable que se encuentre afectada por una neoplasia en esta mujer?

A Lóbulo frontal inferior izquierdo
B Lóbulo temporal lateral izquierdo
C Lóbulo occipital superior izquierdo
D Lóbulo occipital inferior derecho
E Lóbulo temporal medial derecho
F Lóbulo frontal superior derecho

7 Un hombre de 81 años con antecedentes de fibrilación auricular mal controlada sufre un síncope repentinamente mientras veía la televisión en su casa. Los servicios de urgencia acuden de inmediato, aunque son necesarias varias maniobras de cardioversión hasta que se restablecen el pulso y la presión arterial estables. Al día siguiente presenta papiledema bilateral y la RM cerebral muestra unión de sustancia gris-sustancia blanca cortical indiferenciada y estrechamiento de los ventrículos. ¿Cuál de las siguientes anomalías intracraneales es más probable que se desarrolle en este paciente?

A Inflamación aguda
B Edema citotóxico
C Adenocarcinoma metastásico
D Obstrucción del flujo de LCR
E Hemorragia subaracnoidea



8 Un hombre de 45 años desarrolla cefalea intensa y fiebre durante 2 días. En la exploración física presenta rigidez de nuca y papiledema bilateral. Su temperatura es de 38,5 °C. Un hemocultivo muestra cocos grampositivos en cadenas y se identifica *Streptococcus pneumoniae.* La figura muestra el aspecto macroscópico de un corte cerebral. En función de dicho aspecto, ¿cuál de las siguientes complicaciones de esta infección es más probable en este paciente?

A Formación de absceso
B Hernia
C Hidrocefalia
D Necrosis cortical laminar
E Hemorragia subaracnoidea



9 Una mujer de 30 años, G3, P2, se encuentra en el tercer trimestre de gestación. A lo largo del embarazo ha notado movimientos fetales mínimos. Una ecografía fetal revela volumen de líquido amniótico normal, implantación de la placenta normal y la anomalía mostrada en la figura. ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio es más probable en esta mujer?

A Cariotipo 45, XX, t(14;21)(p11;q11)
B Concentración sérica elevada de α-fetoproteína
C Título de IgM contra citomegalovirus elevado
D Hiperbilirrubinemia con anemia
E Concentración aumentada de hemoglobina A_{1c}

10 Una primigrávida de 22 años se somete a un estudio ecográfico de seguimiento fetal a las 18 semanas de gestación; en él se muestra un único ventrículo aumentado de tamaño y tálamos fusionados. En la exploración física tras el nacimiento a las 36 semanas de embarazo, el lactante es pequeño para su edad gestacional y presenta múltiples malformaciones, como polidactilia postaxial, en manos y pies, ciclopía, microcefalia, labio leporino y paladar hendido, y pies en mecedora. Muere 1 h después de nacer. ¿Cuál de las siguientes anomalías del SNC es la que mejor explica estos hallazgos?

A Anencefalia
B Malformación de Arnold-Chiari II
C Malformación de Dandy-Walker

D Holoprosencefalia
E Leucomalacia periventricular

11 Un hombre de 24 años sufre un traumatismo craneal y cervical en un accidente de tráfico. Presenta disminución de la sensación de dolor y de la sensibilidad de la temperatura desde los hombros hasta los pies, con preservación de la propiocepción y la sensibilidad vibratoria. Experimenta debilidad motora con atrofia muscular, a partir de las manos y con extensión a los antebrazos y los hombros. Una RM de la médula espinal cervical muestra una cavidad con forma de hendidura que se extiende de C2 a C7. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Malformación de Dandy-Walker
B Lesión axónica difusa
C Raquisquisis
D Espina bífida
E Siringomielia



12 Una joven de 15 años ha presentado dificultad progresiva para hablar durante los últimos 6 meses. Se marea y sufre caídas con frecuencia. Se queja de cefalea y dolor facial y de cuello. En el último mes ha desarrollado pérdida del control vesical e intestinal. En la exploración física se observa reducción de la sensibilidad al dolor y a la temperatura en la nuca, los hombros y la parte superior de los brazos, aunque la percepción de la vibración y la posición está preservada. Presenta emaciación muscular en la parte inferior del cuello y los hombros. La RM de la médula espinal pone de manifiesto aumento de tamaño cervical y torácico, con acumulación de LCR que dilata el conducto central. La RM cerebral muestra hallazgos macroscópicos similares a los de la figura. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Malformación de Arnold-Chiari II

B Parálisis cerebral

C Agenesia del cuerpo calloso
D Holoprosencefalia
E Polimicrogiria

13 Un niño nace prematuramente a las 28 semanas de gestación de una primigrávida de 22 años. El lactante está al principio estable y su exploración física no muestra anomalías. A las 24 h sufre hipoxemia grave y se observa actividad convulsiva. Durante la lactancia, el desarrollo neurológico es malo. La TC craneal muestra ventrículos cerebrales aumentados de tamaño simétricamente a los 8 meses de edad. ¿Cuál de las siguientes complicaciones perinatales es más probable que genere estos hallazgos?

A Infección congénita por citomegalovirus
B Síndrome de Down
C Hemorragia de la matriz germinal
D Quernícter
E Meduloblastoma

14 Una mujer de 21 años padece un traumatismo craneal al sufrir una caída practicando ciclismo de montaña, tras la cual perdió el conocimiento durante 5 min. En la exploración física, los reflejos tendinosos profundos están disminuidos. Una TC craneal obtenida 6 h después no registra anomalías. Se recupera a lo largo de la semana siguiente, sin déficits neurológicos, pero no recuerda el episodio de la caída. Durante el año siguiente presenta irritabilidad, cefaleas, dificultad para conciliar el sueño y para concentrarse y fatiga. ¿Cuál de las siguientes consecuencias es más probable que determine esta lesión?

A Arterioloesclerosis
B Conmoción
C Hidrocefalia
D Leucoencefalopatía
E Demencia postraumática
F Mielinólisis

15 Una mujer de 83 años resbala en la bañera de su casa y cae de espaldas, golpeándose en la cabeza. Es llevada a urgencias, donde en la exploración se le aprecia un área rojiza de 3 cm levemente inflamada en el occipucio. Se la puede despertar, pero permanece somnolienta. No hay déficits motores ni sensitivos, ni tampoco papiledema. Se realiza una TC craneal. ¿En cuál de las siguientes

localizaciones es más probable que se detecte una hemorragia aguda?

A Ganglios basales
B Base de la protuberancia
C Ventrículo cerebral
D Espacio epidural
E Lóbulo frontal inferior
F Silla turca

16 Un joven de 19 años que practica *snowboard* con equipo de protección consistente en una gorra de béisbol, pantalones anchos y un chaleco reforzado se golpea contra un árbol tras realizar un salto. Queda inicialmente inconsciente, aunque poco después se recupera y desea continuar, pero sus amigos creen que es mejor pedir ayuda. Camino del servicio de urgencias, el accidentado entra en estado comatoso. La exploración física muestra papiledema izquierdo. Las radiografías craneales ponen de manifiesto una fractura lineal en la región temporoparietal izquierda. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más compatible con este cuadro clínico?

A Leptomeningitis aguda
B Contusión de los lóbulos frontales
C Laceración de la arteria meníngea media
D Aneurisma en fresa roto
E Desgarro de las venas comunicantes cerebrales

17 Una mujer de 72 años tropieza y cae por las escaleras. No pierde el conocimiento. Unas 30 h después experimenta cefaleas y confusión, por lo que es llevada a urgencias. En la exploración física está consciente y se le aprecia una lesión en el cuero cabelludo del occipucio. ¿Cuál de las siguientes localizaciones es más probable que presente una hemorragia intracraneal en esta paciente?

A Ganglios basales
B Epidural
C Pontina
D Subaracnoidea
E Subdural

18 Una mujer de 80 años que vive en una residencia de ancianos es hospitalizada, por desarrollo de niveles fluctuantes de consciencia,

con cefaleas y confusión en los últimos 2 días. En la exploración física está consciente, pero desorientada e irritable. Las constantes vitales son temperatura de 36,9 °C y presión arterial de 130/85 mmHg. Hay papiledema derecho. La TC craneal muestra acumulación de sangre en el espacio subdural derecho. ¿Cuál de las siguientes lesiones vasculares es más probable que genere estos hallazgos?

A Hemorragia por malformación arteriovenosa
B Laceración de la arteria meníngea media
C Rotura de un aneurisma sacular
D Desgarro de las venas comunicantes cerebrales
E Trombosis de la arteria cerebral media

19 Un hombre de 22 años es atrapado por una corriente de resaca mientras nadaba cerca de la costa de cabo San Lucas, en México, y se agota intentando salir de ella. Los socorristas consiguen devolverlo a la playa, pero cuando llega a ella no tiene pulso. Las medidas de reanimación aplicadas durante 20 min restablecen el pulso. Sin embargo, no recupera la consciencia. Un mes más tarde, un electroencefalograma (EEG) no muestra actividad ondulatoria cerebral. ¿Cuáles de las siguientes células es más probable que predominen en la corteza cerebral en el momento del EEG?

A Fibroblastos
B Linfocitos
C Macrófagos
D Neutrófilos
E Oligodendrocitos
F Neuronas rojas



20 Una mujer de 68 años con fibrilación auricular súbitamente pierde el conocimiento y cae al suelo. Cuando recupera la consciencia, no puede mover el brazo izquierdo y habla con dificultad. En la exploración física, su temperatura es de 37 °C; la frecuencia cardíaca, 81 latidos/min; la frecuencia respiratoria, 18 respiraciones/min; y la presión arterial, 135/85 mmHg. La figura muestra el aspecto macroscópico representativo de su cerebro en la orientación radiológica. Tres meses más tarde, en una RM se detecta un espacio quístico. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable que produzca esta lesión?

A Malformación arteriovenosa
B Oclusión arterial embólica
C Carcinoma metastásico
D Hematoma subdural en organización
E Contusión cortical superficial

21 Un hombre de 79 años con síndrome metabólico ha padecido seis episodios de disartria repentina, sensación de debilidad en la mano y mareo durante los últimos 3 meses. Los episodios suelen durar menos de 1 h, tras la cual se recupera. Hoy ha perdido repentinamente el conocimiento y ha caído en el suelo del baño. Al recuperar el conocimiento 4 min después, no podía mover el brazo derecho. ¿Cuál de las siguientes lesiones subyacentes es más probable que se encuentre en el cerebro del paciente?

A Malformación arteriovenosa
B Ateroesclerosis cerebral
C Astrocitoma del lóbulo frontal
D Meningoencefalitis
E Hematoma subdural

22 Se desarrolla un estudio para identificar las causas de la pérdida neuronal en pacientes de entre 18 y 90 años muertos en el hospital de forma natural y a los que se les realizó autopsia. El examen de cortes microscópicos revela neuronas rojas retraídas, reducción del número de neuronas o ausencia de neuronas. Las células piramidales del hipocampo, las células cerebelosas de Purkinje y las células piramidales neocorticales parasagitales superiores se ven afectadas. ¿Cuál de los siguientes procesos es más probable que sea la principal causa de la pérdida neuronal en estos pacientes?

A Autoinmunidad
B Quimioterapia
C Diabetes mellitus
D Hipoxia global
E Ingestión de plomo
F Malnutrición

23 Una mujer de 70 años ha sufrido hace 2 días un episodio durante el cual perdió el conocimiento durante varios minutos. En la exploración física se aprecian 4/5 de fuerza motora en la extremidad superior derecha y disminución de la sensibilidad a la punción en el brazo y la mano derechos. Hay soplos carotídeos bilaterales. La TC craneal no revela hemorragia intracraneal, aunque sí leve desviación de la línea media. La RM cerebral muestra edema cerca de la cápsula interna izquierda. Se realiza una punción lumbar con presión de apertura normal. las pruebas de laboratorio de 10 ml de LCR transparente incoloro ponen de manifiesto 2 leucocitos mononucleares/mm^3, ausencia de eritrocitos, concentración de proteínas de 40 mg/dl y concentración de glucosa de 70 mg/dl. La glucemia es 95 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más indicativo del factor de riesgo de su enfermedad?

A Anticuerpos antifosfolipídicos
B Hemocultivo positivo para *Streptococcus pneumoniae*

C Concentración sérica elevada de ácidos grasos de cadena muy larga
D Hiperamoniemia
E Hipercolesterolemia
F Prueba serológica de sífilis positiva

24 Una mujer de 59 años sufrió una súbita pérdida de conocimiento hace 4 meses. En la exploración física actual presenta hemiplejía. La TC muestra un gran espacio quístico en la región parietal derecha. La angiografía por RM revela oclusión de una arteria cerebral periférica en la unión sustancia gris-sustancia blanca cerca de la lesión. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos subyacentes es más probable que presente?

A Sida con recuento de linfocitos T CD4+ bajo
B Alcoholismo crónico con cirrosis micronodular
C Insuficiencia renal crónica con hipertensión
D Adenocarcinoma de colon con síndrome de Trousseau
E Cardiopatía isquémica con trombosis ventricular izquierda

25 Un hombre de 39 años presenta cefalea y alteración del estado mental de 60 h de duración. En la exploración está afebril y normotenso, con nivel de consciencia reducido y afasia. Se realiza una punción lumbar, y se obtiene LCR con pleocitosis linfocítica y leve elevación de las proteínas. Una RM cerebral muestra lesiones corticales hiperintensas focales. Una biopsia cerebral estereotáctica revela inflamación crónica con granulomas, que afecta a arteriolas y vénulas. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas es más adecuada en este caso?

A Antibióticos
B Antihipertensivos
C Antipiréticos
D Inmunodepresores
E Infusión de manitol



26 Un hombre de 55 años pierde repentinamente el conocimiento mientras conduce su camión, que, sin embargo, al ir a baja velocidad, se detiene sin colisionar. Los servicios de asistencia llegan puntuales, pero no consiguen reanimar al conductor. En la exploración física se aprecia papiledema bilateral. No hay movimientos espontáneos. La figura muestra el aspecto macroscópico del cerebro en la autopsia. ¿Cuál de las siguientes alteraciones subyacentes es más probable que haya dado lugar a este cuadro?

A Alcoholismo crónico
B Carcinoma metastásico
C Esclerosis múltiple
D Hipertensión sistémica
E Tromboembolia

27 Un hombre de 72 años ha padecido hipertensión mal controlada durante los últimos 20 años. Ayer experimentó una cefalea intensa con náuseas, seguida de confusión y convulsiones. En la exploración está afebril, pero su presión arterial es de 260/150 mmHg. Hay papiledema bilateral. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más probable que se desarrollara en su cerebro el día de ayer?

A Necrosis fibrinoide arteriolar
B Telangiectasia cortical
C Infarto lagunar
D Hematoma en el putamen

E Hemorragia subaracnoidea

28 Un hombre de 72 años con diabetes mellitus ha experimentado un gradual deterioro cognitivo durante los últimos 5 años. En muchas ocasiones ha sufrido episodios agudos, como pérdidas del conocimiento o confusión, seguidos de empeoramiento de la capacidad para desarrollar las actividades de la vida diaria. En la exploración física presenta hemiparesia derecha leve, ataxia y disartria. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable que se encuentre y sea abundante en este hombre?

A Lagunas
B Cuerpos de Lewy
C Placas neuríticas
D Ovillos neurofibrilares
E Cuerpos de Pick
F Placas de desmielinización

29 Un hombre de 86 años ha ido perdiendo gradualmente la capacidad de llevar una vida independiente en los últimos 10 años y ahora necesita ayuda para bañarse, vestirse, ir al baño, alimentarse, sentarse o levantarse de los asientos, y meterse en la cama o levantarse de ella. En la exploración física no presenta déficits motores ni sensitivos. No puede decir la fecha del día o el lugar en el que vive. Seis meses más tarde, entra súbitamente en coma y fallece. En la autopsia se detecta una extensa hemorragia superficial en el lóbulo parietal izquierdo. El examen histológico del cerebro muestra placas neuríticas y ovillos neurofibrilares neocorticales numerosos. Las arterias cerebrales periféricas y el centro de cada una de las placas se tiñen positivamente con rojo Congo. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es más probable que ocasione esta enfermedad?

A Agregación de péptido Aβ
B Cambio conformacional en la proteína priónica (PrP)
C Carencia de dopamina
D Expansión de las repeticiones de poliglutamina
E Mutaciones en el gen *tau*

30 Una mujer de 50 años desarrolla súbitamente cefalea intensa y es llevada al servicio de urgencias. En la exploración física presenta rigidez de la nuca. Su presión arterial es de 115/83 mmHg. El LCR obtenido en una punción lumbar muestra numerosos eritrocitos,

ausencia de neutrófilos, pocos monocitos y concentración de glucosa normal. El resultado de la tinción de Gram es negativo. La TC muestra hemorragia subaracnoidea en la base del cerebro. ¿Cuál de los siguientes episodios vasculares es más probable que haya afectado a esta mujer?

A Hemorragia por angiopatía amiloide cerebral
B Formación de hematoma por arterioloesclerosis
C Tromboembolia de la arteria cerebral media
D Rotura de un aneurisma en fresa intracraneal
E Desgarro de las venas comunicantes subdurales

31 Un hombre de 45 años, previamente sano, ha padecido cefaleas durante el último mes. En la exploración física no hay hallazgos reseñables. Una angiografía por RM cerebral muestra un aneurisma sacular de 7 mm en la trifurcación de la arteria cerebral media derecha. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que se asocie a esta lesión?

A Hernia de las amígdalas cerebelosas
B Hidrocefalia
C Hematoma epidural
D Hemorragia subaracnoidea
E Hematoma subdural

32 Un hombre de 25 años ha padecido cefaleas durante los últimos 5 meses. En ese tiempo, sus familiares han notado que el afectado no exhibía la misma agudeza mental que en el pasado y que presentaba mayor labilidad emocional. En un plazo de 2 semanas sufre cuatro convulsiones generalizadas. En la exploración física no se observan papiledema ni alteraciones motoras. La TC craneal revela una masa de 2 cm en el lóbulo frontal derecho. En una muestra de biopsia estereotáctica de esta lesión solo se aprecian gliosis e indicios de hemorragias recientes y antiguas. La masa es extirpada y en el análisis histológico se observa un conglomerado de vasos tortuosos de distinto tamaño rodeados de gliosis. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Angiosarcoma
B Malformación arteriovenosa
C Placa de esclerosis múltiple
D Absceso en organización
E Traumatismo craneal previo

F Aneurisma sacular roto



33 Un hombre de 19 años presenta dolor de garganta seguido 1 día después de cefalea intensa de inicio súbito. En la piel hay hemorragias petequiales. La exploración física revela faringitis leve y rigidez de la nuca. Su temperatura es de 38,8 °C; la frecuencia cardíaca, 98 latidos/min; la frecuencia respiratoria, 26 respiraciones/min; y la presión arterial, 95/45 mmHg. La figura muestra el aspecto macroscópico representativo de la superficie cerebral. ¿Cuál de los siguientes microorganismos infecciosos es el causante más probable de la enfermedad?

A *Cryptococcus neoformans*
B *Mycobacterium tuberculosis*
C *Neisseria meningitidis*
D Poliovirus
E *Toxoplasma gondii*

34 Una mujer de 44 años de edad, consumidora de drogas por vía intravenosa, es ingresada en el hospital con cefalea progresiva y fiebre alta registradas en las últimas 24 h. En la exploración física la temperatura es de 38,4 °C, la frecuencia cardíaca de 85 latidos/min, la frecuencia respiratoria de 18 respiraciones/min y la presión arterial de 125/85 mmHg. La TC craneal no detecta lesiones de masa ni desviación de la línea media. Se realiza una

punción lumbar. El LCR presenta 70.000 neutrófilos/mm^3, aumento de la concentración de proteínas y reducción de la de glucosa. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que genere estos hallazgos?

A Virus del herpes simple
B Poliomavirus JC
C *Mycobacterium tuberculosis*
D *Staphylococcus aureus*
E *Toxoplasma gondii*

35 Un hombre de 77 años, por lo demás sano, se ha mostrado irritable en los últimos 2 días. En la exploración física presenta una temperatura de 39,1 °C. Las pruebas de laboratorio del LCR de una punción lumbar ponen de manifiesto numerosos neutrófilos, leve aumento de la concentración de proteínas y disminución de la de glucosa. ¿Cuál de las siguientes opciones es más probable que se encuentre en el estudio con técnica de Gram del LCR?

A Bacilos gramnegativos
B Diplococos gramnegativos
C Cocos grampositivos
D Bacilos cortos grampositivos
E Ausencia de microorganismos

36 Una mujer de 43 años ha padecido cefalea y fiebre durante las últimas 2 semanas después de una infección respiratoria grave con bronquiectasias. En la exploración física la temperatura es de 38,3 °C. No hay papiledema. No experimenta pérdida de sensibilidad ni de función motora, pero se aprecia disminución de la visión en la mitad izquierda de ambos campos visuales. La TC craneal muestra una lesión con realce en anillo de 3 cm, netamente delimitada en la región occipital derecha. Se efectúa una punción lumbar y el análisis del LCR revela presencia de numerosos leucocitos, aumento de las proteínas y concentraciones de glucosa normales. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Absceso cerebral
B Glioblastoma
C Carcinoma metastásico
D Esclerosis múltiple
E Infarto subagudo

37 Un niño de 11 años ha padecido dolor en el oído derecho

durante 1 semana y cefalea intensa durante 1 día. En la exploración física su temperatura es de 37,5 °C. Presenta dolor significativo a la palpación del oído derecho. Hay exudado purulento en la membrana timpánica derecha y se obtiene un cultivo de *Streptococcus pneumoniae.* ¿Cuál de las siguientes complicaciones intracraneales es más probable que desarrolle este niño si no se aplica tratamiento?

A Encefalitis
B Absceso epidural
C Encefalopatía multiquística
D Hematoma subdural
E Neuralgia del trigémino

38 Una niña de 4 años que vive en las proximidades de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ha sufrido cefaleas y aumento de la irritabilidad en la última semana, y ahora presenta náuseas, vómitos y reducción de la respuesta a las órdenes verbales. En la exploración su temperatura es de 37,2 °C. Se aprecia temblor en las extremidades y en los ojos no se observa movimiento lateral. Se realiza una punción lumbar y el análisis del LCR revela 100 leucocitos/mm^3, un 75% de los cuales son mononucleares. La glucosa en el LCR está reducida, mientras que las proteínas están sensiblemente elevadas. La TC con contraste muestra engrosamiento meníngeo basilar y una masa focal de 2 cm que afecta al hemisferio cerebeloso derecho. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que genere estos hallazgos?

A A Virus de Coxsackie B
B B *Haemophilus influenzae*
C C *Mycobacterium tuberculosis*
D D *Treponema pallidum*
E E *Taenia solium*

39 Según indica su familia, un hombre de 65 años se ha mostrado apático, irritable e introvertido a lo largo del último año, con progresivo deterioro de la función mental. La exploración neurológica muestra signo de Romberg positivo. Las pupilas se contraen en el enfoque próximo, pero no con exposición a la luz. El paciente exhibe delirios de grandeza. Después de 5 min, reconoce solo uno de tres objetos. El LCR obtenido de la punción lumbar muestra pleocitosis linfocítica y proteínas elevadas con aumento

de la IgG. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que cause esta enfermedad?

A *Listeria monocytogenes*
B Virus de la rabia
C Virus del sarampión
D *Streptococcus pneumoniae*
E *Toxoplasma gondii*
F *Treponema pallidum*

40 Una mujer de 26 años ha padecido a lo largo de las últimas 4 semanas cefaleas y malestar general progresivo. En la exploración física no se encuentran hallazgos significativos. La TC craneal no registra anomalías. De una punción lumbar se obtiene LCR transparente e incoloro con presión de apertura normal. Los análisis del LCR muestran concentración de glucosa normal y mínima elevación de las proteínas. Se detectaron unos pocos linfocitos, pero no neutrófilos La tinción de Gram y una preparación con tinta china del LCR fueron negativas. Su trastorno mejoró gradualmente durante los 6 meses siguientes. ¿De cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que las pruebas serológicas muestren títulos de anticuerpos elevados?

A *Cryptococcus neoformans*
B Echovirus
C *Listeria monocytogenes*
D *Neisseria meningitidis*
E *Toxoplasma gondii*

41 Una mujer de 25 años, previamente sana, presenta un cuadro agudo de confusión y desorientación, seguido de convulsiones tonicoclónicas generalizadas. En el momento de su hospitalización está afebril y su presión arterial es de 110/65 mmHg. No se observa papiledema. Las pruebas de detección de drogas en sangre y orina son negativas. La TC craneal muestra una hemorragia reciente de 3 cm en el lóbulo temporal izquierdo. Se realiza una punción lumbar y el LCR revela solo unos pocos monocitos y concentraciones normales de glucosa y proteínas. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que cause esta enfermedad?

A *Aspergillus niger*
B Citomegalovirus
C Virus del herpes simple

D Virus de la encefalitis equina oriental
E *Neisseria meningitidis*

42 Una mujer de 33 años, G3, P2, tuvo dos embarazos previos de los que nacieron lactantes a término normales, pero esta gestación se interrumpe y alumbra un mortinato a las 34 semanas de gestación. En la exploración se observa que el feto es hidrópico. La autopsia fetal muestra organomegalia pronunciada y necrosis extensa en el cerebro, con patrón periventricular y calcificaciones focales. ¿Cuál de las siguientes infecciones congénitas es más probable que genere estos hallazgos?

A Citomegalovirus
B *Streptococcus* del grupo B
C Virus del herpes simple
D VIH
E *Listeria monocytogenes*

43 Una niña de 14 años, que vive en Nigeria y que ha recibido una pauta inadecuada de vacunas profilácticas, desarrolla diarrea leve durante 3 días y, a continuación, presenta fiebre con rigidez de la nuca y debilidad muscular bilateral. En la exploración se observa dolor muscular a la palpación con 3/5 de fuerza motora en todas las extremidades. Padece dificultad respiratoria que requiere ventilación mecánica. A lo largo de los 6 meses siguientes el dolor desaparece y la paciente recupera parte de la fuerza muscular. ¿Cuál de las siguientes estructuras del sistema nervioso se ha visto más afectada por la enfermedad?

A Astas anteriores
B Ganglios basales
C Vías corticoespinales
D Ganglios de la raíz dorsal
E Uniones mioneurales
F Neocorteza

44 Un niño de 12 años desarrolla fiebre acompañada ocasionalmente de cefaleas, malestar general, fatiga y náuseas 1 mes después de ser mordido por un perro. Al día siguiente, experimenta episodios de rigidez, alucinaciones, apnea inspiratoria y dificultad de deglución por secreciones orales incontrolables. Se consulta al doctor Louis Pasteur. El investigador francés escribe «La muerte de este niño parecía inevitable. Decidí,

no sin una vívida ansiedad como se puede entender, probar... el método que he comprobado con un éxito constante en perros. Consecuentemente, 60 h después de las mordeduras [el niño] fue inoculado bajo un pliegue de la piel con media jeringa de médula espinal de un conejo. En los días siguientes, hice nuevas inoculaciones frescas. En total fueron 13 inoculaciones». El niño sobrevive. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos es más probable que se encuentre en el cerebro del perro?

A Células gigantes multinucleadas
B Cuerpos de Negri
C Linfocitos perivasculares
D Seudoquistes con bradizoítos
E Cambio espongiforme

45 Un hombre de 37 años con el VIH-1 ha padecido crecientes problemas de memoria el último año y presenta depresión. Durante los últimos 3 meses ha experimentado alteraciones progresivas de la función motora y actualmente no es capaz de mantenerse en pie o caminar. En los últimos 3 días ha tenido fiebre, tos y disnea. Un lavado broncoalveolar muestra quistes de *Pneumocystis jiroveci*. En la RM cerebral se observa atrofia cerebral difusa, sin lesiones focales. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable en el examen microscópico del tejido cerebral?

A Cambios espongiformes cerebelosos
B Nódulos microgliales corticales
C Infartos lagunares corticales lentiformes
D Placas neuríticas neocorticales
E Placas de desmielinización en la sustancia blanca

46 Una mujer de 52 años con leucemia recibe quimioterapia. A los 2 meses desarrolla déficits neurológicos, con ataxia, debilidad motora en el brazo derecho, dificultad para tragar y alteraciones de la sensibilidad en la pierna izquierda. La RM cerebral pone de manifiesto áreas irregulares de aumento de la atenuación en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales y el cerebelo. Una muestra de biopsia estereotáctica revela inflamación crónica perivascular, gliosis pronunciada, astrocitos grandes reactivos con núcleos anómalos e inclusiones intranucleares en la oligodendroglía. ¿Cuál de los siguientes virus es más probable que cause estos hallazgos?

A Citomegalovirus
B Virus del herpes simple
C Poliomavirus JC
D Virus de la rabia
E Virus del sarampión
F Virus del Nilo occidental



47 Un hombre de 38 años con insuficiencia renal crónica recibe un trasplante de riñón. Mientras es tratado con ciclosporina, azatioprina y dosis altas de corticoesteroides, comienza a padecer cefaleas y cae en estado letárgico. En la exploración física presenta fiebre y rigidez de la nuca. Se realiza una punción lumbar y la presión de apertura está aumentada. El recuento celular del LCR revela aumento de los leucocitos. Una preparación con tinta china muestra los hallazgos que aparecen en la figura. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que cause la infección?

A *Aspergillus niger*
B *Blastomyces dermatitidis*
C *Coccidioides immitis*
D *Cryptococcus neoformans*
E *Histoplasma capsulatum*

48 Un hombre previamente sano de 21 años que ha padecido cefalea intensa durante 5 días presenta ahora una convulsión de nueva aparición. En la oftalmoscopia se observa papiledema. Una RM cerebral muestra múltiples lesiones quísticas periventriculares y meníngeas de 0,5 a 1,5 cm. ¿Cuál de los siguientes microorganismos infecciosos es más probable que genere estos hallazgos?

A *Aspergillus fumigatus*
B *Cryptococcus neoformans*
C *Plasmodium falciparum*
D *Taenia solium*
E *Toxoplasma gondii*
F *Trypanosoma gambiense*

49 Un hombre de 20 años con el VIH ha experimentado disminución del nivel de consciencia en la última semana y ahora padece una convulsión tonicoclónica generalizada. En la exploración física su temperatura es de 37,6 °C. La RM cerebral revela varias lesiones con realce en anillo de 1 a 3 cm bilaterales en la sustancia gris cerebral. Se realiza una biopsia estereotáctica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos patológicos es más probable en el examen microscópico de la muestra de biopsia?

A Células en gemación con seudohifas
B Grandes linfocitos atípicos
C Carcinoma epidermoide metastásico
D Encefalopatía espongiforme
E Seudoquistes de *Toxoplasma*

50 Una mujer de 63 años previamente sana experimentó episodios de pérdida de memoria durante 6 semanas. Un mes después presenta dificultades para la deambulación y no puede cuidar de sí misma. En la exploración física se observan mioclonías. Está afebril. La TC craneal muestra mínima atrofia cerebral. Un EEG revela actividad de fondo lenta de baja amplitud, con complejos periódicos y ocasionales ondas agudas repetitivas, con intervalos de 0,5 a 1 s. ¿Cuál de las siguientes anomalías histológicas es más probable que se encuentre en la corteza cerebral de la paciente?

A Cuerpos de Lewy
B Nódulos microgliales
C Numerosas placas neuríticas

D Placas de desmielinización
E Encefalopatía espongiforme

51 Una mujer de 27 años experimentó hace 3 meses un episodio de debilidad que atribuyó al estrés del trabajo y la fatiga. La exploración neurológica revela una leve debilidad residual con 4/5 de fuerza motora en la extremidad inferior derecha. Se realiza una punción lumbar y el análisis del LCR muestra aumento de las concentraciones de IgG, con bandas oligoclonales prominentes. La RM cerebral revela pequeñas áreas dispersas de 0,5 cm compatibles con desmielinización, la mayoría de las cuales se localizan en la sustancia blanca periventricular. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que se desarrolle?

A Linfoma no hodgkiniano
B Demencia progresiva
C Tetraplejía
D Trastorno convulsivo
E Temblor en reposo
F Pérdida de visión

52 Un hombre de 28 años afirma que hace 3 años experimentó parestesias en el brazo izquierdo con dificultad para caminar, aunque esos problemas remitieron. El pasado año desarrolló dificultad de visión en el ojo izquierdo. Hace 6 meses tuvo también un episodio de dificultad para escribir con la mano derecha. En la exploración física se observan disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo y ausencia de papiledema y lesiones retinianas. Se aprecia disminución de la fuerza motora y la sensibilidad en la mano y el antebrazo derechos. La RM cerebral muestra áreas focales de aumento de la intensidad de señal en la sustancia blanca periventricular y el nervio óptico izquierdo. Se efectúa una punción lumbar. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable en el análisis del LCR?

A Anticuerpos antitreponémicos
B Antígeno criptocócico
C Células malignas
D Bandas oligoclonales
E Xantocromía



53 Una mujer de 74 años sufre un traumatismo craneal cerrado en un accidente de tráfico. En el momento de la hospitalización está consciente, pero desorientada. La TC craneal muestra una fractura del hueso temporal derecho y leve edema cerebral. Su concentración de alcohol en sangre es de 0,24 g%. A los 2 días, los análisis muestran los siguientes valores séricos: Na^+, 109 mmol/l; K^+, 3,9 mmol/l; Cl^-, 82 mmol/l; CO_2, 23 mmol/l; glucosa, 73 mg/dl; y creatinina, 1 mg/dl. La hiponatremia se corrige en las 2 h siguientes con líquidos intravenosos y tratamiento electrolítico y diuréticos. A continuación experimenta rápidamente un estado de confusión con debilidad de las extremidades. En la oftalmoscopia no se aprecia papiledema. Una RM muestra el hallazgo representado en la figura. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que se haya producido?

A Mielinólisis pontina central
B Hernia amigdalina cerebelosa
C Hemorragia intraventricular
D Degeneración combinada subaguda de la médula
E Síndrome de Wernicke-Korsakoff

54 Un niño de 8 años se recuperó sin incidencias de una infección

vírica de las vías respiratorias altas hace 2 semanas, pero ahora presenta letargo e irritabilidad de inicio brusco. En la exploración neurológica se aprecia disminución bilateral de los reflejos pupilares y ataxia en las extremidades. El examen microscópico del LCR obtenido en una punción lumbar revela una cantidad escasa de linfocitos y eritrocitos. La RM muestra múltiples lesiones hiperintensas en la unión sustancia gris-sustancia blanca. ¿Cuál de los siguientes mecanismos patógenos es la causa más probable de las lesiones cerebrales del niño?

A Formación de un absceso
B Desmielinización
C Embolización
D Metástasis
E Carencia de tiamina
F Vasculitis



55 Se efectúa un estudio en pacientes que presentaban en el LCR aumento de la proteína fosforilada tau y disminución del péptido Aβ de 5 a 10 años antes de su muerte, con edades comprendidas entre 55 y 80 años de edad. En las autopsias, los pesos cerebrales eran inferiores a los normales para la edad y la complexión física.

En la exploración macroscópica, los cerebros presentaban hidrocefalia *ex vacuo* y atrofia cortical, pero no lesiones focales. La figura muestra el aspecto histológico a gran aumento de la neocorteza cerebral con tinción de plata de Bielschowsky. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más probable que revele la anamnesis de estos pacientes?

A Movimientos coreiformes
B Trastornos de la marcha
C Convulsiones tonicoclónicas generalizadas
D Pérdida progresiva de memoria
E Debilidad muscular simétrica

56 Una mujer de 68 años con antecedentes de demencia progresiva de 7 años de evolución fallece por una bronconeumonía. En la autopsia se aprecia atrofia cerebral, predominante en los lóbulos frontal y parietal. El examen microscópico del tejido cerebral muestra numerosas placas neuríticas en el hipocampo, la amígdala y la neocorteza. Los ovillos neurofibrilares del hipocampo contienen proteína tau. La tinción con rojo Congo revela amiloide en la media de las arterias cerebrales periféricas pequeñas. ¿Cuál de las siguientes anomalías genéticas es el factor más importante para el desarrollo de esta enfermedad?

A Expansión de las repeticiones CAG en el cromosoma 4p16
B Alelos HLA-DR3/DR4
C Aumento de las repeticiones en tándem en el gen *FMR1*
D Mutación de un gen de proteínas priónicas
E Presencia del alelo e4 en el gen *ApoE*

57 Un hombre de 63 años ha experimentado irritabilidad creciente en los últimos 3 años. Solía vagar por las calles de su barrio, quejándose de todo a los vecinos. No presentaba pérdida de memoria y siempre era capaz de regresar a su casa. Los vecinos agradecieron que el paciente desarrollara afasia. En la exploración física no se apreciaron alteraciones motoras ni sensitivas, ni trastornos de la marcha o temblor. Murió de neumonía 1 año después. En el examen microscópico en la autopsia se apreció extensa pérdida neuronal, y algunas de las neuronas restantes presentaban inclusiones intracitoplásmicas redondeadas, débilmente eosinófilas, que se teñían inmunohistoquímicamente con la proteína tau. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más

probable?

A Enfermedad de Alzheimer
B Enfermedad de Huntington
C Enfermedad de Leigh
D Atrofia sistémica múltiple
E Enfermedad de Parkinson
F Enfermedad de Pick
G Demencia vascular

58 Una mujer de 60 años había padecido trastornos motores durante 5 años. La exploración física reveló rigidez en rueda dentada en las extremidades y marcha festinante, con dificultad para iniciarla. Su rostro era inexpresivo. Se le administró levodopa/carbidopa y su estado mejoró. Dos años después tenía dificultad para desarrollar las actividades de la vida diaria y presentó un claro deterioro cognitivo. Murió por una neumonía por aspiración. En la autopsia se observaron leve atrofia cerebral y pérdida de pigmentación en la sustancia negra. Microscópicamente, las neuronas corticales presentaban inclusiones esferoideas intraneuronales, citoplásmicas y eosinófilas. ¿Cuál de las siguientes proteínas es más probable que sea positiva en las inclusiones en el estudio inmunohistoquímico?

A α-sinucleína
B Proteína precursora del amiloide
C Apolipoproteína E
D Huntingtina
E Presenilina
F Proteína tau



59 Un hombre de 55 años presenta dificultad creciente para iniciar los movimientos voluntarios e incapacidad progresiva para realizar las actividades de la vida diaria desde hace 1 año. En la exploración física se constata la dificultad de inicio de los movimientos, aunque se aprecia que puede caminar si alguien va delante de él. Su rostro es inexpresivo. El lado izquierdo de la figura muestra el aspecto macroscópico del mesencéfalo de este paciente; a la derecha aparece un corte de un mesencéfalo normal. ¿Cuál de los siguientes rasgos clínicos adicionales es más probable que se asocie de forma más estrecha a esta anomalía?

A Ataxia con la deambulación
B Movimientos coreiformes
C Pérdida de memoria a corto plazo
D Debilidad simétrica en las extremidades
E Temblor en reposo

60 Una mujer venezolana de 47 años ha tenido dificultades para desarrollar las actividades de la vida diaria durante el último año. Es emocionalmente lábil y a menudo rompe a llorar. Se siente alterada y deprimida porque su madre y su hermano murieron hace 5 años con los mismos síntomas. En la exploración física se aprecian movimientos coreiformes en sus extremidades. Los pares craneales están intactos. No presenta debilidad motora ni carencias sensitivas. Su memoria se mantiene intacta. ¿Cuál de las siguientes anomalías genéticas es más probable que presente esta mujer?

A Proteína priónica anómala
B Disminución de la concentración de la enzima hexosaminidasa A
C Cromosoma 21 extra
D Expansión de repeticiones CAG
E Mutación en los genes de la presenilina

61 Una niña de 4 años ha desarrollado torpeza de movimientos y dificultad para la deambulación en los últimos 6 meses. En la exploración física se aprecian dificultad de equilibrio al caminar, disartria, mala coordinación de manos, reflejos tendinosos profundos ausentes y signo de Babinski bilateral. El tacto ligero y la sensibilidad vibratoria estaban sensiblemente disminuidos. No había debilidad muscular. En los 5 años siguientes la niña

desarrolló insuficiencia cardíaca congestiva por miocardiopatía hipertrófica. También presentaba hiperglucemia. En la autopsia se observó incremento de depósito de hierro perinuclear en los miocitos cardíacos. ¿Cuál de las siguientes anomalías genéticas con expansión de las repeticiones de trinucleótidos es más probable que presente esta paciente?

A Repeticiones CAG en el gen de la *huntingtina*
B Repeticiones CGG en el gen *FMR1*
C Repeticiones CTG en el gen de la *proteína cinasa de la distrofia miotónica*
D Repeticiones GAA en el gen de la *frataxina*

62 Un hombre de 36 años sano durante toda su vida presenta ahora debilidad muscular simétrica progresiva. Hace 1 año sintió debilidad en el área de la cabeza y el cuello, que le provocaba dificultad en el habla, los movimientos oculares y la deglución. El pasado año aumentó la debilidad en las extremidades superiores e inferiores, hasta no poder mantenerse en pie, caminar o alimentarse por sí mismo. Su función mental permanece intacta. ¿Cuáles de las siguientes células es más probable que se estén destruyendo en este paciente?

A Células ependimarias
B Neuronas motoras inferiores
C Células microgliales
D Oligodendrocitos
E Neuronas pigmentadas
F Neuronas espinosas

63 Una niña de 12 años ha padecido disminución progresiva de la función neurológica en los últimos 3 años. Presenta dificultad para la deambulación, reducción de la capacidad mental, convulsiones y pérdida del control de las funciones vesical e intestinal. Una RM cerebral revela atrofia y retracción del centro semioval y la sustancia blanca central. Estos hallazgos se correlacionan con pérdida generalizada microscópica de mielina, aunque la mielina subcortical está preservada. ¿Cuál de las siguientes enfermedades degenerativas del SNC es probable que explique mejor este cuadro?

A Encefalomielitis diseminada aguda
B Leucodistrofia metacromática

C Esclerosis múltiple
D Leucoencefalopatía multifocal progresiva
E Enfermedad de Tay-Sachs

64 Un hombre de 49 años desarrolla una psicosis aguda. Tiene antecedentes de alcoholismo crónico de larga evolución. Tiene dificultad para realizar la prueba de dedo a nariz y parálisis de los músculos rectos laterales. ¿Cuál de los siguientes nutrientes es más probable que sea deficitario en función de estos datos?

A Cobalamina
B Folato
C Niacina
D Piridoxina
E Tiamina

65 Un hombre de 53 años con antecedentes prolongados de consumo excesivo crónico de alcohol ha presentado obnubilación durante los últimos 2 días. En la exploración física se observa un temblor aleteante con las manos extendidas. La RM cerebral no revela anomalías. El examen microscópico del cerebro muestra aumento del número de astrocitos neocorticales y en los ganglios basales, con núcleos pálidos tumefactos (células de Alzheimer de tipo II). ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio en la sangre del paciente es más probable que se relacione con estos hallazgos?

A Concentración de amoníaco de 100 μmol/l
B Concentración de carboxihemoglobina del 5%
C Glucosa de 30 mg/dl
D Hemoglobina A_{1c} del 10%
E Sodio de 111 mmol/l

66 Un hombre de 55 años de edad ha sufrido por primera vez en su vida cefaleas de repetición, que se iniciaron hace 2 meses. Llegó al servicio de urgencias tras sufrir convulsiones tonicoclónicas generalizadas. En la exploración física se aprecia debilidad en el lado izquierdo. La RM cerebral muestra una masa grande irregular de 6 cm en el centro semioval del hemisferio cerebral derecho, que se extiende a través del cuerpo calloso. Se obtiene una biopsia estereotáctica de la masa, que microscópicamente muestra células pleomorfas positivas para la proteína ácida fibrilar de la glía (GFAP). El análisis molecular revela anomalías del gen *TP53* y del

factor de crecimiento α derivado de plaquetas (PDGF-α). ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que presente este paciente?

- A Linfoma de linfocitos B grandes difuso
- B Glioblastoma
- C Hemangioblastoma
- D Meduloblastoma
- E Astrocitoma pilocítico

67 Un niño de 10 años de edad ha padecido cefaleas persistentes durante los últimos 3 meses. En la exploración física se encuentra afebril y presenta marcha atáxica y disdiadococinesia. La TC craneal muestra una masa quística de 4 cm en el hemisferio cerebeloso derecho. Los ventrículos laterales cerebrales están aumentados de tamaño. Se efectúa una punción lumbar. La concentración de proteínas en el LCR está elevada, mientras que la de glucosa es normal. Se realiza una intervención neuroquirúrgica, durante la cual se extirpa y corta la masa. En la exploración macroscópica se observa que la masa es un quiste lleno de material gelatinoso. El quiste presenta una pared delgada y un nódulo mural de 1 cm. Al microscopio, la masa está compuesta por células con tinción positiva de la proteína ácida fibrilar de la glía (GFAP), con largas prolongaciones filiformes. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

- A Astrocitoma
- B Ependimoma
- C Hemangioblastoma
- D Meduloblastoma
- E Meningioma
- F Schwannoma

68 Un hombre de 40 años ha padecido cefaleas durante los últimos 6 meses. El día anterior sufrió una convulsión. En la exploración física no se aprecian hallazgos reseñables. La RM cerebral muestra una masa solitaria circunscrita de 3 cm en el centro semioval parietal derecho. La masa presenta pequeños quistes y áreas de calcificación y hemorragia. Se procede a neurocirugía y la masa es extirpada. Al microscopio se observa que está integrada por láminas de células con núcleos redondeados con cromatina granular. Las células presentan una cantidad moderada de

citoplasma claro y son positivas para GFAP en la tinción inmunohistoquímica. El paciente recibe radioterapia y quimioterapia complementarias y no hay recidiva. ¿Cuál de los siguientes marcadores moleculares es más probable encontrar en las células de esta masa?

A Mutación de *BRAF*
B Expresión de CD20
C Amplificación de *c-MYC*
D Amplificación de *EGFR*
E Codeleciones de 1p y 19q

69 Una mujer de 46 años ha experimentado debilidad y pérdida de sensibilidad graduales en las extremidades inferiores durante los últimos 5 meses. En la última semana no ha podido caminar sin ayuda. En la exploración física se registran 4/5 de fuerza motora en la extremidad inferior derecha y 3/5 de fuerza motora en la extremidad inferior izquierda. Hay pérdida bilateral de sensibilidad al tacto superficial desde la mitad del muslo lateral distal. La RM de la columna vertebral muestra una lesión de 1 × 4 cm en el *filum* terminal. La masa es extirpada. Al microscopio consta de células cúbicas en torno a unos ejes papilares en un fondo mixoide. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más probable que esté presente en esta paciente?

A Papiloma del plexo coroideo
B Ependimoma
C Meningioma
D Neurofibroma
E Astrocitoma pilocítico
F Schwannoma

70 Una niña de 11 años ha experimentado cefaleas de intensidad creciente al levantarse durante el último mes. En la exploración se observa papiledema bilateral. Una RM cerebral revela una masa sólida circunscrita de 3 cm en el cuarto ventrículo. Se reconoce dilatación del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales. La masa es extirpada y, al microscopio, muestra seudorrosetas perivasculares con células tumorales regulares redondeadas dispuestas alrededor de los vasos ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que padezca la paciente?

A Astrocitoma

B Ependimoma
C Glioblastoma
D Meduloblastoma
E Schwannoma

71 Un niño de 5 años ha referido cefaleas en la última semana. Su marcha se hace atáxica. Tras la súbita aparición de vómitos, es llevado a urgencias, donde entra en estado comatoso. En la exploración física se encuentra afebril. Se realiza una punción lumbar y en el examen citológico del LCR se observan células anaplásicas con núcleos azules oscuros y citoplasma escaso. ¿Cuál de las siguientes localizaciones es más probable que presente una masa en la RM?

A Centro semioval
B Vermis cerebeloso
C Par craneal VIII
D Cuarto ventrículo
E Unión de las sustancias gris y blanca en el lóbulo parietal

72 Un hombre de 39 años con el VIH no ha recibido tratamiento antirretrovírico. Ha presentado debilidad en el lado izquierdo durante el último mes y ayer sufrió un episodio de convulsión generalizada. En la exploración física se encuentra afebril. La TC craneal no revela indicios de hemorragia intracraneal, pero sí desviación de la línea media. La RM cerebral muestra una masa de 4 cm en la región del putamen cerca de la cápsula interna derecha, otra masa de 3 cm en el centro semioval derecho y una masa de 1 cm cerca del esplenio del cuerpo calloso. Estas masas son circunscritas y sólidas. El LCR de una punción lumbar muestra concentración de proteínas elevada y concentración de glucosa normal. El examen citológico revela células grandes, con núcleos también grandes y escaso citoplasma, que se marcan con CD19, pero no con GFAP o citoqueratina. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Encefalitis por citomegalovirus
B Glioblastoma
C Sarcoma de Kaposi
D Linfoma de linfocitos B grandes
E Leucoencefalopatía multifocal progresiva
F Toxoplasmosis



73 Una mujer de 45 años ha padecido cefaleas unilaterales en el lado derecho del cráneo durante 5 meses. La exploración física no detecta hallazgos reseñables. El aspecto macroscópico representativo de la lesión se muestra en la figura. La masa es resecada quirúrgicamente y en el examen microscópico exhibe células alargadas con núcleos oblongos claros y citoplasma rosado, con ocasionales cuerpos de psamoma. El análisis citogenético muestra 22q-. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Astrocitoma
B Ependimoma
C Meningioma
D Metástasis
E Tuberculoma

74 Un hombre de 76 años experimenta un episodio aislado de convulsión tonicoclónica generalizada. En la exploración física se encuentra afebril y normotenso. La fuerza motora está intacta y no hay pérdida de sensibilidad. Los pares craneales están intactos y la función mental no está disminuida. En la parte superior de la espalda hay una lesión cutánea de 1 cm con pigmentación oscura. La RM cerebral muestra tres masas sólidas, de 1 a 3 cm, sin realce en anillo ni edema circundante, localizadas en la unión de las sustancias gris y blanca en los lóbulos frontales derecho e

izquierdo. Los ventrículos cerebrales son de tamaño normal. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Glioblastoma
B Hemangioblastoma
C Meningioma
D Carcinoma metastásico
E Linfoma no hodgkiniano
F Oligodendroglioma

75 Una estudiante de 18 años ha experimentado pérdida de visión en el ojo derecho a lo largo de los últimos 6 meses. En la exploración física se aprecia papiledema derecho. En las extremidades y el tronco, presenta 14 lesiones cutáneas dispersas, hiperpigmentadas, planas, de 2 a 5 cm y con bordes irregulares. La TC craneal no muestra hemorragia intracraneal, edema o desviación de la línea media, pero hay una masa en la región del nervio óptico derecho. Se extirpa un glioma del nervio óptico. A los 8 meses, la paciente se somete a una exploración de seguimiento y se le palpa una masa en la muñeca derecha. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que se identifique en el examen histológico?

A Fibrosarcoma
B Lipoma
C Hemangioma
D Meningioma
E Schwannoma

76 Una mujer de 41 años ha experimentado pérdida de audición en los últimos 4 meses. En la exploración física se aprecia pérdida de capacidad auditiva en el oído izquierdo. En la prueba del diapasón de Weber, el sonido se lateraliza hacia el oído derecho. Una RM craneal muestra una masa netamente circunscrita de 4 cm adyacente a la protuberancia izquierda, que se extiende hacia el hemisferio cerebeloso inferior izquierdo. Se observa una lesión menor, de 1 cm, en una localización similar a la derecha. Las pruebas de cribado familiar identifican una afectación similar en un hermano de la paciente, de 38 años. ¿Cuál de los siguientes genes es más probable que presente una mutación hereditaria en esta paciente?

A *NF2*

B *TP53*
C *PTCH*
D *TSC1*
E *VHL*

77 Una mujer de 20 años con dificultades de aprendizaje ha sentido dolor en un costado durante la última semana. La exploración física registró dolor a la palpación en el ángulo costovertebral derecho. Dispersos en la piel de la paciente se apreciaron parches de aspecto coriáceo (placas achagrinadas) e hipopigmentados (parches en hoja de fresno). Se identificó un nódulo subungueal en el dedo índice derecho. La TC abdominal mostró quistes y masas tumorales renales bilaterales. En la RM cerebral se observaron nódulos subependimarios y focos corticales de 1 a 4 cm, con pérdida de la diferenciación de las sustancias gris y blanca. Una TC torácica mostró una masa de 3 cm que afectaba al tabique interventricular. Dos años más tarde, la paciente presenta una súbita cefalea intensa. Actualmente, la RM revela un nódulo que obstruye el acueducto cerebral. Se procede a neurocirugía, y se extirpa un astrocitoma de células gigantes subependimario. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

A Síndrome de Down
B Enfermedad de Krabbe
C Neurofibromatosis de tipo 1
D Neurofibromatosis de tipo 2
E Esclerosis tuberosa
F Enfermedad de von Hippel-Lindau

78 Un estudio de adultos con neoplasias cerebelosas revela que algunos de ellos presentan un patrón de herencia autosómica dominante con enfermedad de von Hippel-Lindau. Sus tumores cerebelosos son quísticos con un nódulo mural. El análisis molecular de las células tumorales muestra cantidades aumentadas de factor inducible por la hipoxia (HIF). En estas personas está aumentada la incidencia de los carcinomas de células renales. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones paraneoplásicas es más probable en estos adultos?

A Síndrome de Cushing
B Hipercalcemia
C Policitemia

D Síndrome de secreción inadecuada de ADH
E Síndrome de Trousseau

Respuestas

1 **D** Las lesiones hipóxicas e hipoglucémicas condicionan la formación de neuronas «rojas» como reacción inicial. Las neuronas piramidales más grandes son las más sensibles, en especial en el hipocampo en caso de hipoglucemia, junto con las células de Betz neocorticales y las células cerebelosas de Purkinje. Los astrocitos proliferan como reacción a lesiones cerebrales en el proceso conocido como *gliosis.* Las células endoteliales es más probable que proliferen en las neoplasias. La microglía responde a la lesión cerebral con una función similar a la de los macrófagos. Las células oligodendrogliales proporcionan mielinización a los axones neuronales cerebrales.

2 **D** Las células microgliales forman parte del sistema de macrófagos fijos corporales, originalmente derivados del mesodermo. La microglía puede responder a las lesiones cerebrales, asumiendo una función similar a la de los macrófagos. La membrana aracnoides forma parte de las meninges que cubren el cerebro. Los astrocitos proliferan en respuesta a las lesiones cerebrales, en un proceso denominado *gliosis*, pero en ellos no se registra fagocitosis. Las células ependimarias revisten el sistema ventricular que contiene el LCR. Las células de la oligodendroglía forman las vainas de mielina de los axones neuronales en el SNC.

3 **C** El papiledema y la hernia son consecuencia de la tumefacción cerebral, típicamente de la forma vasógena de edema desarrollada por rotura de la barrera hematoencefálica adyacente a una neoplasia. Una gran neoplasia agresiva, por ejemplo un glioblastoma, puede producir un hemorragia debido al aumento de tamaño generado por el crecimiento rápido, la hemorragia y el edema circundante. El hemorragia derivado de la herniación del lóbulo temporal medial determina parálisis del tercer par craneal a medida que el nervio se comprime. Una hemorragia subdural crónica se acumula tan lentamente que es posible que la herniación no se produzca. Un absceso puede provocar un hemorragia con cierto grado de tumefacción

cerebral asociada, pero esta paciente se encuentra afebril. El efecto de presión está ausente en la hidrocefalia *ex vacuo*, consecuencia de una atrofia cerebral. No es probable que un infarto genere una llamativa tumefacción cerebral asociada, y un hemorragia en el lóbulo occipital es también improbable que afecte al tercer par craneal. La rotura de un aneurisma en fresa produce hemorragia subaracnoidea en la base del cerebro, por lo que el hemorragia es poco probable.

4 **D** Se trata de un caso de hidrocefalia no comunicante con obstrucción por debajo del nivel del tercer ventrículo. Si la hidrocefalia está presente en el nacimiento, puede aumentar el perímetro craneal, porque las suturas no estén aún cerradas, con la consiguiente sospecha de estenosis del acueducto. A esta edad se debería sospechar la presencia de una neoplasia, y los ependimomas se desarrollan en el sistema ventricular, a menudo en el cuarto ventrículo, causando obstrucción del flujo de LCR. El aumento de las proteínas en el LCR se debe a este tumor, aunque la diseminación de células de la masa al LCR es improbable. Excepto la malformación vascular, las restantes opciones son poco frecuentes a esta edad. Un absceso suele ir acompañado de fiebre y, en la mayoría de los casos, se localiza en los hemisferios cerebrales, a distancia del sistema ventricular. La meningitis criptocócica va acompañada de fiebre, y el exudado puede hallarse en el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo, aunque es más probable que se deba a edema cerebral que a hidrocefalia. Las placas desmielinizantes de la esclerosis múltiple son pequeñas y no suelen cursar como masas. Las malformaciones vasculares se desarrollan habitualmente en los hemisferios cerebrales.

5 **F** El paciente presenta una hidrocefalia comunicante y, en adultos, es frecuente que la meningitis neumocócica afecte al vértice, donde se hallan las granulaciones aracnoideas que reabsorben el LCR. La sobreproducción de LCR por un papiloma en el plexo coroideo también genera hidrocefalia, aunque rara vez. La hidrocefalia no comunicante se registra cuando hay obstrucción en el sistema ventricular. Tanto la estenosis del acueducto como la malformación de Dandy-Walker son trastornos congénitos que provocan obstrucción del sistema

ventricular. Los infartos cerebrales y la infección por el VIH producen lesiones en el parénquima cerebral y es difícil que obstruyan el flujo de LCR, a no ser que haya un hemorragia (por edema o hemorragia asociados al infarto o por un linfoma del SNC en el sida), pero en la TC de este paciente no se observó masa alguna.

6 **A** La debilidad en la pierna derecha contralateral de la paciente es consecuencia de una hernia subfalcina con compresión de la arteria cerebral anterior ipsolateral, causada por una lesión en el lóbulo frontal adyacente. Una masa que se expanda rápidamente puede producir una herniación. Es mucho menos probable que las otras opciones enumeradas, localizadas por encima de la tienda, expliquen la compresión de la arteria cerebral anterior. Las lesiones del lóbulo frontal pueden ser responsables de una hernia transtentorial. Asimismo, es posible que el hemorragia importante por encima de la tienda cause una hernia amigdalina.

7 **B** El edema cerebral puede ser citotóxico o vasógeno. En el citotóxico, la barrera hematoencefálica permanece intacta y el edema se debe a disfunción del transporte de iones dependiente del ATP, con retención celular de sodio y agua. Procesos globales, como la isquemia (en este caso por insuficiencia cardíaca) o las alteraciones metabólicas, se ven implicados y son compatibles con una tumefacción difusa con papiledema bilateral. Es más probable que la inflamación y las neoplasias originen edema vasógeno. Una meningitis aguda puede producir inflamación difusa, aunque en este caso no hay signos de infección. Es raro que las metástasis den lugar a masas de crecimiento rápido. La obstrucción del flujo de LCR induce hidrocefalia con aumento del tamaño ventricular, no con estrechamiento. La hemorragia subaracnoidea es una posible consecuencia de la rotura de un aneurisma en fresa, sin hemorragia.

8 **B** La figura muestra hemorragias lineales de la línea media, denominadas *hemorragias de Duret*, en la protuberancia. La meningitis bacteriana aguda provoca tumefacción cerebral con edema y posterior herniación del lóbulo temporal medial, con hemorragias de Duret en la protuberancia. Aunque no se

observa en la figura, es posible que una infección se organice con cicatrización de los agujeros, dando lugar a una hidrocefalia no comunicante, o bien puede cicatrizar el vértice o alterar la reabsorción de LCR en las granulaciones aracnoideas, generando en este caso una hidrocefalia comunicante. Un absceso rara vez complica la meningitis, aunque los abscesos en un seno paranasal o en las celdillas aéreas mastoideas pueden extenderse a la cavidad craneal, provocando meningitis. La necrosis laminar aparece en ocasiones tras la muerte cerebral, aunque no se trata de un hallazgo específico de la meningitis. Los pequeños vasos meníngeos no suelen sangrar por la inflamación debida a la meningitis.

9 **B** La anencefalia es una forma grave de defecto del tubo neural debido al fracaso de la formación de la bóveda craneal fetal. Se trata de una de las malformaciones congénitas del SNC más frecuentes. El defecto hace que la α-fetoproteína fetal pase al líquido amniótico y alcance la circulación. El cariotipo citado corresponde a un portador de síndrome de Down robertsoniano; el síndrome de Down (trisomía 21) se asocia a braquicefalia, pero rara vez a anencefalia. La infección congénita por citomegalovirus produce extensa necrosis parenquimatosa cerebral fetal, pero no pérdida de la bóveda craneal del feto. Los defectos del tubo neural no se relacionan con ictericia materna o neonatal. La diabetes mellitus, indicada por la elevación de la concentración de hemoglobina A_{1c}, puede aumentar el riesgo de malformaciones (p. ej., de holoprosencefalia en el SNC), pero no de defectos del tubo neural.

10 **D** La holoprosencefalia es un defecto de la línea media en el que hay ausencia de desarrollo de los hemisferios cerebrales completa (alobular) o parcial (semilobular). Se produce en la trisomía 13, como en este caso, y se acompaña de otros defectos de la línea media. Asimismo, se puede encontrar en casos de diabetes mellitus materna. La anencefalia es la ausencia de bóveda craneal fetal, que condiciona la ausencia de la mayor parte del encéfalo. La malformación de Arnold-Chiari II determina una fosa posterior pequeña, cerebelo deforme en la línea media con desplazamiento hacia abajo del vermis y abombamiento de la placa tectal. La malformación de Dandy-

Walker se caracteriza por aplasia o hipoplasia del vermis del cerebelo, aumento de tamaño quístico del cuarto ventrículo e hidrocefalia. La leucomalacia periventricular es una forma de lesión perinatal causada por episodios hipóxico-isquémicos o por infecciones.

11 **E** La cavidad de la siringomielia se debe a un defecto tubular que se extiende lateralmente, que alterando las vías espinotalámicas y las astas anteriores, y genera déficits sensitivos y motores. Cuando la cavidad se extiende al bulbo raquídeo, se denomina *siringobulbia*. No tiene tratamiento, aunque la lesión no tiende a progresar. La malformación de Dandy-Walker es un trastorno congénito con agrandamiento de la fosa posterior. La lesión axónica difusa afecta a las vías de sustancia blanca del cerebro. La raquisquisis es un defecto amplio abierto del tubo neural, y la espina bífida lo es del tubo neural posterior.

12 **A** La malformación de Arnold-Chiari II se caracteriza por una fosa posterior pequeña, cerebelo en la línea media deforme con desplazamiento hacia abajo del vermis y abombamiento de la placa tectal, causantes de hidrocefalia. La RM es en este caso característica de la hidromielia. *Parálisis cerebral* es un término general que describe las alteraciones motoras no progresivas presentes desde el nacimiento. El cuerpo calloso se observa en la figura; su agenesia se relaciona con otras anomalías o puede encontrarse en personas normales. La holoprosencefalia es una malformación grave con separación total (alobular) o parcial (semilobular) de los hemisferios cerebrales en el desarrollo. La polimicrogiria se caracteriza por numerosos pliegues pequeños irregulares en las circunvoluciones.

13 **C** La hemorragia de la matriz germinal es la causa más común de hemorragia intraventricular en lactantes prematuros. La matriz germinal, compuesta por tejido altamente vascularizado con células primitivas, es más prominente entre las semanas 22 y 30 de gestación. Las hemorragias en esta área se dan fácilmente en problemas neonatales frecuentes, como hipoxemia, hipercapnia, acidosis y cambios de la presión arterial. Las hemorragias en la matriz germinal se extienden en ocasiones a los ventrículos cerebrales y, desde ellos, al espacio

subaracnoideo. Las hemorragias menores pueden resolverse sin secuelas. En las mayores, la organización de la sangre en el acueducto de Silvio, en el cuarto ventrículo o en los agujeros de Luschka y Magendie obstruye a veces el flujo de LCR y genera hidrocefalia. La infección por citomegalovirus puede inducir una considerable necrosis en el parénquima cerebral, especialmente en localización periventricular, pero no hemorragia con obstrucción del flujo de LCR. Los lactantes con síndrome de Down presentan a menudo malformaciones vasculares que pueden dar lugar a hemorragias en el parénquima. La tinción con bilirrubina del querníctero no causa cicatrización meníngea o del acueducto. Los meduloblastomas son tumores agresivos de la fosa posterior que afectan a niños (no típicamente a lactantes) y provocan obstrucción del flujo de LCR.

14 **B** La conmoción induce una alteración de la consciencia, que comienza con una disfunción neurológica transitoria instantánea en relación con un traumatismo craneal, amnesia del episodio y posterior recuperación neurológica o desarrollo de un síndrome posconmoción, con manifestaciones neuropsiquiátricas incapacitantes que empeoran si se producen conmociones sucesivas. No hay signos radiológicos ni patológicos. La arterioloesclerosis es característica de la hipertensión. La hemorragia que sucede a un episodio traumático puede obstruir el flujo o la absorción de LCR, aunque ello se identificaría en la TC original. El término *leucoencefalopatía* designa los cambios degenerativos de la sustancia blanca, característicos de las alteraciones metabólicas o infecciosas. La demencia postraumática por golpes repetidos en la cabeza origina a menudo hallazgos patológicos como los ovillos neurofibrilares y las placas neuríticas similares a los de la enfermedad de Alzheimer.

15 **E** Esta paciente presenta la característica lesión de tipo «contragolpe», en la que la cabeza en movimiento golpea contra un objeto y la fuerza se transmite al lado opuesto del cráneo. Lo más probable es que una caída hacia atrás genere contusiones en el lóbulo frontal inferior, las puntas temporales y los lóbulos temporales inferiores. Un impacto en el cráneo estacionario es más probable que ocasione una lesión de tipo «golpe»,

directamente adyacente al punto de choque. La hemorragia en el putamen de los ganglios basales es más probable en la hipertensión. La hemorragia en la protuberancia es característica de la hemorragia de Duret, registrada en la hernia del lóbulo temporal medial. La hemorragia dentro de los ventrículos cerebrales puede darse en la matriz germinal de lactantes prematuros; en adultos es infrecuente, aunque se puede encontrar cuando la sangre procedente de una lesión intraparenquimatosa empieza a disecar el tejido. Es más probable que un impacto en el cráneo lateral induzca laceración de la arteria meníngea media y un hematoma epidural. La hemorragia subaracnoidea en la base del cerebro puede disecar hasta llegar a la silla.

16 **C** El intervalo de «lucidez» es característico del hematoma epidural con acumulación rápida de sangre de la arteria meníngea media lesionada. La duramadre es presionada contra el cerebro y da lugar a acumulación de sangre, que se aprecia con forma lenticular en las técnicas radiológicas, en especial en la TC. La leptomeningitis no se asocia a traumatismo. Las contusiones no empeoran de forma progresiva. En un hematoma subdural agudo o un aneurisma roto no suele haber intervalo de lucidez, sino empeoramiento de inicio súbito y progresivo de los síntomas.

17 **E** El hematoma subdural se debe al desgarro de las venas comunicantes situadas bajo la duramadre. Estas venas se exponen a riesgo de desgarro con los traumatismos craneales, particularmente en personas de edad avanzada, en las que hay a veces cierto grado de atrofia cerebral. La hemorragia originada en las venas de baja presión determina una evolución variable en la aparición de signos y síntomas, de horas a días o semanas. Las hemorragias de los ganglios basales suelen asociarse a hipertensión. Las hemorragias epidurales van a menudo precedidas de traumatismo craneal que desgarra la arteria meníngea media. Suele haber un intervalo «lúcido» entre la pérdida inicial de conocimiento causada por el traumatismo y la ulterior acumulación de sangre. Las hemorragias pontinas se asocian a hemorragias de Duret. Las subaracnoideas pueden darse en las contusiones por traumatismo.

18 **D** El desgarro de las venas comunicantes genera un hematoma subdural agudo, casi siempre como consecuencia de un traumatismo craneal por caída, que a veces es menor y puede pasar desapercibido. El riesgo de hemorragia es mayor en ancianos, por su potencial atrofia cerebral, que hace que las venas comunicantes debajo de la duramadre en el vértice sean más vulnerables al desgarro traumático. Las malformaciones arteriovenosas (vasculares) se localizan a menudo en el parénquima de un hemisferio, y la hemorragia debida a ellas es más habitual en adultos jóvenes. En la rotura de aneurismas saculares (en fresa), la hemorragia es típicamente subaracnoidea o de la base del cerebro. Se puede producir un desgarro de la arteria meníngea media tras un traumatismo craneal (p. ej., un golpe), pero origina un hematoma epidural agudo. La trombosis de una arteria intracraneal puede causar un infarto, potencialmente hemorrágico, aunque la hemorragia no suele extenderse a localizaciones subaracnoideas o subdurales.

19 **C** En este paciente se ha producido una isquemia cerebral global, que ocasiona la muerte cerebral. Hay necrosis licuefactiva en curso, y en 2 o 3 semanas habrá numerosos macrófagos que fagociten los residuos celulares y que pueden persistir durante meses. La neocorteza tiene capas de células piramidales más vulnerables, con patrón de necrosis seudolaminar. La proliferación fibroblástica con depósito de colágeno es infrecuente en el SNC, excepto alrededor de los abscesos en organización. Los neutrófilos se encuentran en los abscesos y en las meninges con meningitis aguda. La inflamación del parénquima cerebral suele ser linfocítica. Los oligodendrocitos aportan mielinización a los axones. Las neuronas rojas moribundas se observan 12 h después de una lesión isquémica y persisten durante días, pero no durante semanas.

20 **B** Este infarto cerebral ocupa una extensa área hemorrágica y reblandecida de necrosis licuefactiva inicial tras una lesión vascular en el territorio de la arteria cerebral media. Los émbolos pueden originarse en el corazón. Hasta que los macrófagos eliminen los residuos de necrosis y dejen un espacio quístico pueden transcurrir semanas o meses. Una malformación vascular presenta conductos vasculares

irregulares que producen un hemorragia de color rojo azulado oscuro. Las metástasis pueden ser masas solitarias, aunque más a menudo son múltiples, con hemorragia o necrosis central. Un hematoma subdural en organización deja un área uniforme de compresión con aplanamiento del hemisferio subyacente. Una contusión produce a veces mínima pérdida focal de corteza con tinción parda de hemosiderina.

21 **B** Los episodios breves de disfunción neurológica corresponden a ataques isquémicos transitorios (AIT) y, en muchos casos, son prodrómicos de accidente cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular ateroesclerótica es un antecedente frecuente del infarto cerebral, y el síndrome metabólico con dislipidemia e hiperglucemia es un factor de riesgo significativo. Una malformación vascular produce a menudo síntomas causados por hemorragia en adultos jóvenes. La neoplasia es improbable que genere estos signos y síntomas súbitos episódicos. La meningoencefalitis puede dar lugar a alteraciones generales, como fiebre, cefalea, confusión y convulsiones, pero no a signos repentinos localizados. Un hematoma subdural, con frecuencia asociado a traumatismo craneal por caída, es difícil que se desarrolle en pocos minutos y no explica los AIT.

22 **D** Las neuronas más sensibles a la anoxia se sitúan en el hipocampo, junto con las células cerebelosas de Purkinje y las neuronas neocorticales, más grandes. Además, las primeras áreas afectadas en la neocorteza son las áreas vasculares divisorias o limítrofes *(áreas de penumbra)* entre las tres circulaciones cerebrales mayores, incluida el área divisoria localizada superiormente entre las circulaciones de las arterias cerebrales anterior y media, como en este estudio. Las neuronas «rojas» retraídas, especialmente en las áreas citadas, suelen observarse en las etapas iniciales de la hipoxia global, como sucede en un episodio de hipotensión grave. La hipoxia focal provoca infartos, y la autoinmunidad induce vasculitis y ulterior hipoxemia. La quimioterapia tiende a afectar más gravemente a las células en división activa. La diabetes mellitus causa ateroesclerosis y, potencialmente, hipoxemia. La intoxicación por plomo genera encefalopatía, no isquemia. La malnutrición con carencia de tiamina (vitamina B_1) puede provocar una

enfermedad de Wernicke, que afecta más gravemente a los cuerpos mamilares y la sustancia gris periacueductal.

23 **E** Un infarto cerebral agudo es consecuencia de la obstrucción del flujo sanguíneo, causante de isquemia cerebral focal. Después de 2 días, se registran cierto ablandamiento cerebral y edema con isquemia neuronal, pero poco más. La hipercolesterolemia es factor de riesgo de ateroesclerosis, la principal causa de oclusiones arteriales cerebrales trombóticas. El síndrome antifosfolipídico puede ocasionar una enfermedad trombótica y embólica, aunque el «accidente cerebrovascular» típico es hemorrágico, y el síndrome antifosfolipídico es infrecuente a esa edad. Un hemocultivo positivo es indicativo de sepsis, con posible diagnóstico de meningitis o formación de un absceso cerebral, aunque los abscesos suelen presentar realce en anillo en la TC. Las concentraciones séricas elevadas de ácidos grasos de cadena muy larga se presentan en la adrenoleucodistrofia, trastorno infrecuente inductor de pérdida de mielina a edad temprana. La hiperamoniemia se da en la encefalopatía hepática con insuficiencia hepática, que provoca gliosis de Alzheimer de tipo II, pero no lesiones focales o macroscópicas. La neurosífilis es actualmente infrecuente y no causa lesiones isquémicas focales.

24 **E** Hay un infarto cerebral antiguo. La enfermedad tromboembólica con infarto cerebral suele deberse a cardiopatía (p. ej., endocarditis, trombosis mural, trombosis por válvula protésica). Los infartos hemorrágicos son más probables cuando los émbolos obstruyen parcialmente un vaso o sufren disolución. La trombosis sobre lesiones ateroescleróticas es más fácil que produzca infartos no hemorrágicos. El sida no suele relacionarse con enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. El traumatismo craneal con hemorragia es más frecuente en alcohólicos crónicos. La hipertensión suele asociarse a hemorragias de los ganglios basales, pontinas y cerebelosas, y a pequeños infartos lagunares. Las neoplasias malignas pueden asociarse a síndromes paraneoplásicos, incluyendo hipercoagulabilidad y trombosis, aunque son causas de enfermedad cerebrovascular y accidente cerebrovascular mucho menos frecuentes que la cardiopatía.

25 **D** La vasculitis primaria del SNC es inusual. Afecta a vasos periféricos pequeños y su causa no se conoce, aunque parece ser inmunomediada, por lo que el tratamiento inmunodepresor, con ciclofosfamida y prednisolona, resulta beneficioso. No es probable que las infecciones produzcan esta afectación focal en vasos pequeños. La encefalopatía hipertensiva causa necrosis fibrinoide de las arteriolas. Los AINE o el ácido acetilsalicílico, como fármacos antiinflamatorios y antipiréticos, no tienen potencia suficiente para tratar este proceso inflamatorio. La infusión de manitol se aplica al tratamiento del edema cerebral pronunciado, que no es el hallazgo principal en este caso.

26 **D** Las hemorragias hipertensivas son más probables en los ganglios basales (mostrados en la figura), tálamo, sustancia blanca cerebral, protuberancia o cerebelo. Las hemorragias múltiples son infrecuentes. Los pequeños vasos debilitados por la arterioloesclerosis hialina son propensos a romperse. El alcoholismo crónico predispone a las caídas, con hematomas o contusiones subdurales. Las metástasis son típicamente múltiples y periféricas en la unión sustancia gris-sustancia blanca. Las placas de la esclerosis múltiple se desarrollan en la sustancia blanca y no sangran. Los tromboémbolos pueden provocar infartos cerebrales isquémicos, a veces con hemorragia, y suelen afectar a la corteza cerebral.

27 **A** El paciente ha desarrollado una encefalopatía hipertensiva aguda por elevación brusca y significativa de la presión arterial. Hay edema cerebral extenso con presión intracraneal incrementada, pero sin signos de localización. Las arteriolas se ven afectadas y, como en la hipertensión maligna que afecta al riñón, hay necrosis fibrinoide y hemorragias petequiales. Las telangiectasias pueden ser una forma de malformación vascular, y constituyen generalmente una lesión localizada no relacionada con la hipertensión. Los infartos lagunares se relacionan con la hipertensión, pero tienden a ser pequeños y a menudo silentes, aunque a veces provocan un deterioro neurológico significativo, que suele ser focal en el contexto de una afectación focal. Las hemorragias hipertensivas son en ocasiones extensas, y es frecuente su localización en los ganglios basales; no obstante, este tipo de lesiones pueden inducir un hemorragia unilateral

con papiledema en un lado. Las hemorragias subaracnoideas son más comunes por la rotura de aneurismas saculares.

28 **A** La pérdida gradual de función cognitiva de este paciente es compatible con la demencia vascular, y sus antecedentes de diabetes mellitus hacen que sean más probables una cardiopatía subyacente con episodios embólicos o una enfermedad vascular cerebral. Algunos casos presentan necrosis laminar cortical difusa por episodios hipóxicos globales, mientras que en otros hay infartos lagunares múltiples o infartos embólicos. La demencia por cuerpos de Lewy se asemeja a la enfermedad de Alzheimer (EA), caracterizada por un deterioro cognitivo progresivo, y también son frecuentes los trastornos motores parkinsonianos. Las placas neuríticas y los ovillos neurofibrilares son característicos de la EA, que condiciona un deterioro cognitivo progresivo. Las placas de desmielinización de la sustancia blanca son propias de la esclerosis múltiple, en tanto que la sustancia gris queda relativamente preservada, por lo que no es habitual el deterioro cognitivo grave.

29 **A** La enfermedad de Alzheimer (EA) puede complicarse por una angiopatía amiloide cerebral y un accidente cerebrovascular hemorrágico terminal. La formación y agregación de péptido Aβ actualmente se considera un elemento central de la patogenia de la EA. Dicho péptido deriva del procesamiento anómalo de la proteína precursora del amiloide (APP). Cuando la APP, una proteína transmembrana, se escinde por acción de la α-secretasa en la secuencia Aβ, seguida de las γ-secretasas, se forma un fragmento no tóxico soluble. La división de la secuencia Aβ por la β-secretasa y a continuación por la γ-secretasa da lugar a péptidos Aβ que se agregan y forman núcleos de amiloide desencadenante de una respuesta microglial y astrocítica para formar las placas neuríticas. El cambio conformacional en la proteína priónica desencadena la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, demencia de progresión rápida con encefalopatía espongiforme, pero sin placas neuríticas ni depósito de amiloide. La pérdida de neuronas dopaminérgicas con carencia de dopamina es un elemento esencial en la patogenia de la enfermedad de Parkinson. La expansión de las repeticiones de poliglutamina, debida a la expansión de las repeticiones de

trinucleótidos GAG, se relaciona con la enfermedad de Huntington. Aunque las formas anormalmente fosforiladas de la proteína tau están presentes en los ovillos neurofibrilares de la EA, no hay mutación del gen *tau*, por lo que los ovillos no se consideran esenciales en la patogenia de la EA. Puede encontrarse una mutación del gen *tau* en las demencias de lóbulo frontotemporal.

30 **D** Alrededor de 1 de cada 50 personas presenta un aneurisma sacular (en fresa). Aunque esta lesión está presente desde el nacimiento como anomalía congénita de la túnica media arterial en los puntos de ramificación arterial intracerebrales, puede manifestarse en etapas posteriores de la vida con dilatación aneurismática y posible rotura. Estos aneurismas son la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea en adultos. La hemorragia por angiopatía amiloide se produce en la corteza periférica y es probable que se asocie a la enfermedad de Alzheimer. La hemorragia hipertensiva por arterioloesclerosis tiende a limitarse al parénquima cerebral. Los tromboémbolos causan infartos, generalmente en el territorio de la arteria cerebral media en la corteza, y los infartos embólicos pueden ser hemorrágicos, pero no suelen extenderse al LCR. Un hematoma subdural sobre la superficie cerebral se relaciona con un desgarro de las venas comunicantes.

31 **D** Los aneurismas intracraneales son habitualmente saculares y aumentan de tamaño con el tiempo. Aquellos que alcanzan los 4-7 mm muestran un mayor riesgo de rotura. Esta se produce hacia el espacio subaracnoideo en la base del cerebro, donde la distribución arterial se organiza en torno al polígono de Willis y donde es más probable que se desarrollen estos aneurismas saculares. Ni los aneurismas en fresa ni las hemorragias es probable que originen hemorragia o herniación. En ciertos casos de supervivencia tras la rotura de un aneurisma en fresa, se desarrolla una hidrocefalia por organización de la hemorragia subaracnoidea que obstruye los agujeros de Luschka y Magendie. Los hematomas epidurales se desarrollan a partir de un desgarro en la arteria meníngea media, habitualmente por un traumatismo craneal. Los traumatismos también inducen desgarro de las venas comunicantes, causante de hematoma

subdural.

32 **B** Las malformaciones arteriovenosas (vasculares) son más frecuentes en los hemisferios cerebrales de adultos jóvenes y a menudo se extirpan por completo sin complicaciones. Con el tiempo, es posible que haya una fuga lenta de sangre a partir de la lesión, dando lugar a los síntomas clínicos y la gliosis observados en la biopsia en este caso. El angiosarcoma con células de aspecto maligno no es una lesión primaria propia del parénquima cerebral. La placa de desmielinización de la esclerosis múltiple aparece como una masa, pero sus características incluyen pérdida de mielina con gliosis y macrófagos, no anomalías vasculares. Un absceso puede presentar una pared en organización con colágeno y gliosis, pero no vasos grandes prominentes. Los traumatismos craneales habitualmente producen contusiones y hematomas en la superficie, aunque no hemorragias en el parénquima cerebral. Un aneurisma roto se extiende en ocasiones hacia el interior del parénquima y tal complicación es siempre mortal.

33 **C** La meningitis aguda, con exudado purulento en las convexidades cerebrales, según se muestra en la figura, es indicativa de infección bacteriana. A esta edad, un microorganismo etiológico común es *Neisseria meningitidis,* que inicialmente se presenta con faringitis y, sin tratamiento, evoluciona a síndrome de Waterhouse-Friderichsen, con coagulopatía intravascular diseminada. La criptococosis debe considerarse en pacientes inmunodeprimidos, aunque también se dan casos con función inmunitaria normal; es posible la meningoencefalitis. La meningitis tuberculosa no se manifiesta de manera tan aguda y el exudado aparece habitualmente en la base del cerebro. La poliomielitis se desarrolla a veces tras una faringitis, pero su inicio es gradual, con parálisis progresiva por pérdida de neuronas motoras. No causa meningitis. La toxoplasmosis cerebral afecta a pacientes inmunodeprimidos, pero sus lesiones son abscesos parenquimatosos no relacionados con meningitis.

34 **D** La cefalea, la fiebre, la neutrofilia pronunciada y la concentración de proteínas alta en el LCR apuntan a una posible meningitis bacteriana. *Staphylococcus aureus* es un

microorganismo infeccioso común entre los consumidores de drogas por vía intravenosa. El virus del herpes simple genera encefalitis, no meningitis. La meningitis tuberculosa es de inicio más progresivo. Esta paciente no presenta lesiones de tipo masa por toxoplasmosis ni las lesiones focales propias de la leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), posiblemente asociadas a sida. La LMP se relaciona con el poliomavirus JC. La toxoplasmosis, posible en pacientes inmunodeprimidos, produce abscesos parenquimatosos, no meningitis.

35 **C** El microorganismo etiológico más común de la meningitis bacteriana aguda en este grupo de edad, debido a las vacunaciones, es actualmente *Streptococcus pneumoniae,* un coco grampositivo. Los neumococos son también probables en adultos. El número de infecciones del SNC por *Haemophilus influenzae,* bacilo grampositivo, en este grupo de edad ha disminuido debido a la vacunación generalizada. Los diplococos gramnegativos de *Neisseria meningitidis* son frecuentes en adultos jóvenes. Los bacilos gramnegativos de *Escherichia coli* se detectan con mayor frecuencia en recién nacidos. Los bacilos grampositivos cortos de *Listeria monocytogenes* aparecen esporádicamente o en epidemias causadas por contaminación alimentaria. Con los rasgos clínicos y de LCR indicados, la infección sería poco probable en ausencia de bacterias en el LCR.

36 **A** El absceso cerebral es habitualmente una complicación de infecciones como la neumonía o la endocarditis, con inicio días o semanas antes. Las bacterias se diseminan por vía hematógena. Cuando el absceso se organiza, se rodea por fibroblastos que depositan colágeno; este rasgo es característico de los abscesos en el SNC. Ocasionalmente, las neoplasias presentan realce en anillo, aunque el glioblastoma tiende a aparecer como una neoplasia maligna agresiva no bien delimitada. Las metástasis son lesiones de tipo masa típicamente multifocales. Las placas de esclerosis múltiple generalmente no son extensas, se localizan en la sustancia blanca y no suelen tener realce en anillo. Un infarto puede producir signos y síntomas repentinos que mejoran con el tiempo, y las proteínas en el LCR no están aumentadas.

37 **B** La otitis media aguda puede verse complicada por diseminación de la infección a las celdillas aéreas mastoideas y, a continuación, al hueso craneal y el espacio epidural. Este cuadro también se denomina *paquimeningitis* o *empiema epidural*. Es posible que posteriormente haya diseminación a las meninges subyacentes. La encefalitis afecta a la sustancia del cerebro. La encefalopatía multiquística es una complicación grave de la lesión cerebral perinatal con infarto. Los hematomas subdurales suelen deberse a traumatismos. El nervio trigémino está alejado de las celdillas aéreas mastoideas, por lo que es improbable que se vea afectado, a diferencia del nervio facial adyacente al oído.

38 **C** La meningitis tuberculosa es una complicación de la meningitis diseminada, y los niños de corta edad están expuestos a mayor riesgo de padecerla en lugares de alta prevalencia de tuberculosis. Tiende a presentar una evolución crónica. Los pares craneales, como el motor ocular externo *(abducens)* en este caso, pueden verse implicados. En ocasiones, el cuadro se ve complicado por una gran masa granulomatosa, llamada tuberculoma. La meningitis vírica «aséptica» se caracteriza por la presencia de células mononucleares, aunque las proteínas no suelen estar significativamente elevadas y no se desarrollan masas. La meningitis bacteriana a menudo se asocia a baja concentración de glucosa, pero no a masa, y la respuesta inflamatoria es predominantemente polimorfonuclear. *T. pallidum* es el microorganismo causal de la neurosífilis, de evolución prologada y gradual y sin efecto masa. *T. solium* puede provocar una cisticercosis, con masas quísticas cerebrales.

39 **F** El paciente padece neurosífilis debida a la infección por *Treponema pallidum*. Esta forma de sífilis terciaria se desarrolla años después de la infección primaria. El hallazgo ocular es compatible con la pupila de Argyll Robertson; el signo de Romberg positivo se debe a una tabes dorsal. Su estado mental se ha visto alterado a partir de un estado de paresia general. La listeriosis y las infecciones estreptocócicas es más probable que provoquen meningitis aguda. La rabia tiene un período de incubación de 1 a 3 meses, pero posteriormente se manifiesta como una encefalitis grave aguda. El sarampión ocasionalmente causa la panencefalitis esclerosante subaguda años después,

caracterizada por espasticidad y convulsiones. La toxoplasmosis es una infección oportunista, con desarrollo de encefalitis y abscesos en semanas.

40 **B** La meningitis linfocítica aguda suele deberse a la infección por el virus del Nilo occidental, el virus de la encefalitis equina o un echovirus. A veces se llama *meningitis aséptica,* porque la tinción de Gram y los cultivos de rutina son negativos. La mayoría de los casos remiten espontáneamente sin secuelas importantes en ausencia de inmunodepresión. Las infecciones criptocócicas y por toxoplasma afectan a pacientes inmunodeprimidos, aunque la prueba de tinta china es positiva en las primeras y la TC muestra lesiones con realce en anillo focales en las segundas. Las infecciones por listeria o meningococo se observan esporádicamente y presentan una respuesta neutrofílica.

41 **C** Las lesiones hemorrágicas en los lóbulos temporales son características de la encefalitis por el virus del herpes simple; los casos son pocos y generalmente esporádicos, y afectan a personas en apariencia sanas. Las lesiones de la aspergilosis son a veces hemorrágicas y se suelen registrar en pacientes inmunodeprimidos. La infección por citomegalovirus afecta a recién nacidos y adultos inmunodeprimidos, pero no induce lesiones hemorrágicas. Las infecciones por arbovirus provocan lesiones focales en ocasiones asociadas a vasculitis con hemorragia, aunque las proteínas del LCR suelen estar elevadas y se registra pleocitosis neutrófila. Las infecciones meningocócicas causan meningitis.

42 **A** La infección por citomegalovirus (CMV) es una de las infecciones congénitas del complejo TORCH y puede diseminarse, afectando al SNC. La leucomalacia periventricular es característica de la infección por CMV. Las infecciones por *Streptococcus* del grupo B causan rotura prematura de las membranas y sepsis, sin hallazgos significativos en el SNC. La insuficiencia cardíaca intrauterina ocasiona hidropesía fetal. La infección por el virus del herpes simple en recién nacidos se contrae habitualmente al pasar por la vía del parto, no de forma intrauterina. La infección por el VIH no genera hallazgos significativos en el SNC en el período perinatal. La listeriosis

puede inducir microabscesos focales en varios órganos, pero en ella la necrosis suele ser mínima.

43 **A** La evolución descrita corresponde a un caso de poliomielitis, que debuta con una alteración digestiva menor seguida de la enfermedad mayor aguda y con ulterior recuperación, seguida del síndrome pospolio tardío. Este enterovirus ataca a las neuronas motoras inferiores, produciendo debilidad y atrofia musculares neurógenas. Las astas anteriores de la médula espinal comprenden las neuronas motoras inferiores. También pueden verse afectados los núcleos de los pares craneales con neuronas motoras inferiores. Los ganglios basales modulan el movimiento muscular y su afectación causa trastornos motores, pero no parálisis. Las vías corticoespinales son axones de las neuronas motoras superiores presentes en la neocorteza y no se relacionan con la polio. Los ganglios de la raíz dorsal están implicados en las vías sensitivas. Las uniones mioneurales se relacionan con la miastenia grave o las infecciones por clostridios (botulismo, tétanos).

44 **B** El niño padecía rabia, una enfermedad infecciosa en la que el virus se desplaza desde el punto de mordedura de un animal infectado por los nervios al SNC. Los cuerpos de Negri patognomónicos son inclusiones citoplásmicas presentes en las células piramidales del hipocampo y las células cerebelosas de Purkinje. A escala mundial, los perros sin vacunar continúan siendo el principal vector de transmisión a humanos de este virus con forma de bala. El animal sospechoso debe ser sacrificado para localizar el virus en su cerebro. Las neuronas infectadas generalmente no experimentan muerte celular, sino que el virus induce en ellas producción de neurotoxinas, que afecta a los receptores superficiales de interacción con los neurotransmisores. Cuando aparecen los síntomas, la supervivencia es infrecuente. Pueden identificarse células multinucleadas en los nódulos microgliales asociados a la infección por el VIH. Los infiltrados linfocíticos perivasculares se observan en diversas infecciones víricas, como las inducidas por arbovirus o echovirus, causantes de encefalitis. La infección por *Toxoplasma gondii* se caracteriza por presencia de células infectadas hipertrofiadas llenas de bradizoítos. El cambio

espongiforme es propio de la enfermedad priónica.

45 **B** El complejo demencia sida sobreviene en la fase tardía de la evolución de la infección por el VIH. El VIH-1 produce una encefalitis caracterizada por acumulación de células microgliales reactivas (nódulos microgliales). Las células mononucleares infectadas por el VIH-1, particularmente los macrófagos, pueden fusionarse formando células multinucleadas, que se observan en el interior de los nódulos microgliales. El cambio espongiforme es indicativo de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una demencia de progresión rápida no relacionada con la infección por el VIH. Los infartos lagunares son pequeños infartos cavitarios inducidos por la arterioloesclerosis de las arteriolas y las arterias penetrantes profundas. Estas lesiones arteriolares se producen en personas con hipertensión de larga duración y es improbable que se presenten en una persona de 37 años. Las placas neuríticas y los ovillos neurofibrilares neocorticales son típicos de la enfermedad de Alzheimer, y tampoco es previsible que estén presentes en un paciente de esta edad. Las placas de desmielinización son características de la esclerosis múltiple.

46 **C** La leucoencefalopatía multifocal progresiva es causada por el poliomavirus JC y afecta a personas inmunodeprimidas, incluidos los enfermos de sida. El paciente fue tratado por una leucemia mieloide crónica. La infección por citomegalovirus también complica la evolución de los pacientes inmunodeprimidos, pero provoca grandes inclusiones mononucleares, habitualmente en células endoteliales. El virus del herpes simple es infrecuente, incluso en inmunodeprimidos, y habitualmente es causa de una encefalitis hemorrágica en los lóbulos temporales. El virus de la rabia causa excitabilidad con convulsiones, meningismo e hidrofobia. La panencefalitis esclerosante subaguda es una complicación infrecuente de la infección por el virus del sarampión y provoca deterioro mental progresivo, espasticidad y convulsiones. El virus del Nilo occidental, como muchos arbovirus, induce una meningoencefalitis.

47 **D** La meningoencefalitis criptocócica es una complicación de la inmunodepresión. *Cryptococcus neoformans* presenta una característica cápsula gruesa, que lo hace visible en las

preparaciones con tinta china, que se obtienen en pocos minutos en una muestra de LCR. La prueba de antígeno criptocócico en el LCR también podría ser útil para este paciente. Las biopsias cerebrales no suelen obtenerse, y se deben probar antes otros abordajes menos invasivos. La meningitis bacteriana es posible y el neumococo es una causa frecuente de la misma, aunque esta descripción es más compatible con una criptococosis. De los restantes microorganismos fúngicos enumerados, ninguno es fácil de identificar con tinta china. *Aspergillus* aparece como un conjunto de hifas tabicadas ramificadas, no como levadura. *Blastomyces dermatitidis* se caracteriza por la presencia de levaduras en gemación de base ancha, y las levaduras de *Coccidioides immitis* forman grandes esférulas que contienen endosporas. Los hongos *Histoplasma capsulatum* son pequeños y tienden a encontrarse dentro de los macrófagos.

48 **D** C La cisticercosis por comer carne de cerdo poco cocinada da lugar a liberación de larvas que penetran en la pared intestinal y se diseminan por vía hematógena, asentándose con frecuencia en la sustancia gris y blanca del tejido cerebral, donde se convierten en formas quísticas. Los quistes pueden causar una hidrocefalia obstructiva. La neurocisticercosis es una causa importante de convulsiones en las zonas del mundo en las que es prevalente la tenia del cerdo. La aspergilosis es una enfermedad fúngica en la que los focos de inflamación se asemejan macroscópicamente a granulomas, si bien en ella la respuesta inflamatoria es a menudo mínima y la tendencia a la invasión vascular produce un borde hemorrágico en las lesiones. La criptococosis suele afectar a los pulmones y las meninges. El paludismo, causado por *Plasmodium falciparum,* produce anemia hemolítica, esplenomegalia y trombosis cerebral. La toxoplasmosis puede ser una infección congénita. En adultos inmunodeprimidos a veces induce inflamación de múltiples tejidos, aunque es más frecuente la inflamación abscesificante crónica en el cerebro. La tripanosomiasis africana es la enfermedad del sueño.

49 **E** La toxoplasmosis es una infección oportunista frecuente que afecta al SNC en inmunodeprimidos, incluidos los enfermos de sida, y genera abscesos que se organizan en la periferia,

originando un anillo brillante en la TC y la RM. Las infecciones fúngicas por *Candida* del SNC son infrecuentes, como también lo es la candidiasis sistémica en el sida. Los linfomas malignos también pueden generar un cuadro similar a este, aunque sin fiebre, y generalmente se manifiestan con masas menos numerosas o aisladas, de mayor tamaño. El carcinoma metastásico suele presentarse con lesiones múltiples y es infrecuente a esta edad. Las encefalopatías espongiformes, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, no presentan hallazgos macroscópicos o radiográficos aparentes.

50 **E** La demencia de progresión rápida es más compatible con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ). La ECJ forma parte de las llamadas *encefalopatías espongiformes*, que generan un aspecto microscópico vacuolado en la neocorteza. La ECJ puede ser esporádica o familiar y es causada por proteínas priónicas. La proteína priónica normal del cerebro, la PrP^{c}, puede experimentar un cambio conformacional y transformarse en PrP^{sc}, lo que a su vez induce un mayor grado de transformación de PrP^{c} en PrP^{sc}. La edad del paciente y los hallazgos clínicos son característicos de la ECJ esporádica, originada por mutación espontánea o por exposición a la PrP^{sc}. La ECJ variante, que puede relacionarse con la encefalopatía espongiforme bovina, afecta a pacientes mucho más jóvenes y no produce los hallazgos EEG característicos. Los nódulos microgliales se observan en pacientes con sida y las placas neuríticas son propias de la enfermedad de Alzheimer, que evoluciona a lo largo de varios años. Las placas desmielinizantes de la esclerosis múltiple también se desarrollan a lo largo de años, como los cuerpos de Lewy, propios de la enfermedad de Parkinson y la enfermedad por cuerpos de Lewy difusos.

51 **F** La esclerosis múltiple (EM) produce placas de desmielinización en la sustancia blanca y la mayoría de los afectados desarrollan neuritis del nervio óptico con dificultades visuales, a menudo unilaterales. La evolución de la EM es cambiante, con sucesivas recidivas y remisiones, y la gravedad de la afectación es también variable. Ciertos pacientes presentan problemas mínimos, aunque es previsible que la mayoría padezcan con el tiempo trastornos neurológicos. El deterioro

neurológico grave y la muerte son improbables, y la mayor parte de los afectados sobreviven durante décadas. No hay un patrón de herencia definido. Aunque la EM es una patología inmunomediada, la desregulación inmunitaria causante de neoplasias linfoides es poco probable. La focalidad de las lesiones en la sustancia blanca y la conservación de la sustancia gris hacen que pocas veces la EM se vea complicada por demencia o tetraplejía. Los trastornos convulsivos son inusuales en la EM. El temblor en reposo es propio de la enfermedad de Parkinson.

52 **D** Este espectro cambiante de hallazgos clínicos en un adulto joven sugiere un posible diagnóstico de esclerosis múltiple. Las placas de desmielinización que generan los diversos síntomas pueden hallarse en varias localizaciones, pero son más comunes en la sustancia blanca periventricular. Las inmunoglobulinas en el LCR están elevadas y la mayoría de los pacientes muestran bandas oligoclonales de IgG. La neurosífilis, una forma de sífilis terciaria, es infrecuente a esta edad y probablemente no genera signos localizados cambiantes. La meningitis criptocócica se manifiesta de manera más aguda, con signos meníngeos. Los tumores cerebrales primarios o malignos son infrecuentes a esta edad y no determinarían una evolución prolongada sin secuelas importantes. La xantocromía por hemorragia puede indicar un trastorno más agudo.

53 **A** La corrección rápida de la hiponatremia es un antecedente habitual en la mielinólisis pontina central, con desmielinización en la base de la protuberancia y con el área redondeada de disminución de la intensidad de señal que se aprecia en la figura. También es posible la mielinólisis extrapontina. Los antecedentes de alcoholismo aumentan el riesgo. Un edema cerebral de intensidad suficiente para causar herniación puede inducir papiledema, no reseñado en este caso. Las hemorragias intracraneales no se deben a alteraciones hidroelectrolíticas. La degeneración combinada subaguda de la médula espinal se desarrolla de forma lenta como consecuencia de una carencia de vitamina B_{12} (cobalamina). El síndrome de Wernicke-Korsakoff es un cuadro, actualmente infrecuente, que acompaña en ocasiones al alcoholismo crónico y que afecta a los cuerpos

mamilares y a la sustancia gris periacueductal.

54 **B** La encefalomielitis diseminada aguda es una enfermedad desmielinizante inmunomediada con ciertas similitudes con la esclerosis múltiple, aunque suele afectar a pacientes más jóvenes y es de inicio brusco y rápido desenlace mortal. La mayoría de los casos van precedidos de una infección. Las restantes opciones es improbable que generen una neuritis óptica bilateral. Es previsible que los abscesos sean de origen bacteriano. Los émbolos son poco frecuentes en niños y pueden ocasionar infartos. Las metástasis también son raras en esta edad. La carencia de tiamina es una potencial causa de enfermedad de Wernicke, que cursa con lesiones hemorrágicas no relacionadas con infección. Las vasculitis pueden originar lesiones focales, pero tampoco son frecuentes en niños.

55 **D** La figura muestra una capa neurítica con un halo de neuritas distróficas alrededor de un núcleo de amiloide, lo que resulta compatible con enfermedad de Alzheimer (EA), la forma más común de demencia progresiva. La EA se caracteriza por aumento del número de placas neuríticas y ovillos neurofibrilares al microscopio, en comparación con controles de edad similar. Los movimientos coreiformes son indicativos de enfermedad de Huntington. Los trastornos de la marcha son propios de la enfermedad de Parkinson. Las convulsiones se asocian a diversas lesiones, aunque muchas veces en ellas no hay hallazgos patológicos discernibles. La debilidad muscular simétrica es indicativa de esclerosis lateral amiotrófica.

56 **E** Los antecedentes clínicos de demencia y la presencia de numerosas placas neuríticas y depósito de amiloide en las paredes de los vasos sanguíneos son característicos de la enfermedad de Alzheimer (EA). El alelo e4 del gen *ApoE4* aumenta el riesgo de desarrollo de EA por mecanismos desconocidos. La expansión de las repeticiones CAG en el cromosoma 4p16 causa la enfermedad de Huntington. No hay asociación entre los genes HLA y la EA. El incremento de las repeticiones en el gen *FMR1* es propio del síndrome del cromosoma X frágil. Los genes priónicos mutantes inducen encefalopatías espongiformes, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

57 **F** La enfermedad de Pick es la forma más conocida de degeneración del lóbulo frontotemporal, con inclusiones que contienen proteína tau (FTLD-tau), y presenta rasgos clínicos similares a los de la enfermedad de Alzheimer (EA), aunque inicialmente la FTLD-tau provoca menos pérdida de memoria y más cambios conductuales. La atrofia de las circunvoluciones «en filo de cuchillo» de los lóbulos frontal y temporal, y la relativa preservación de los lóbulos parietal y occipital son características de la enfermedad de Pick. Los cuerpos de Pick con proteína tau se observan en las neuronas remanentes, mientras que no se registra el aumento de las placas neuríticas y los ovillos neurofibrilares propio de la EA. La enfermedad de Huntington afecta sobre todo a los núcleos caudados y los ganglios basales; suele iniciarse en pacientes de mediana edad y los movimientos coreiformes son comunes en ella. La enfermedad de Leigh es una encefalomiopatía mitocondrial causante de debilidad muscular y deterioro neurológico, y que se presenta en la juventud. La atrofia de múltiples sistemas (AMS) tiene rasgos que se solapan con los de la degeneración nigroestriada, la atrofia olivopontocerebelosa y el síndrome de Shy-Drager. La mayoría de los pacientes con AMS exhiben síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson. Microscópicamente, la AMS se caracteriza por la presencia de inclusiones citoplásmicas gliales. En la enfermedad de Parkinson, la pérdida de neuronas pigmentadas en la sustancia negra induce alteraciones motoras. La demencia vascular, o demencia multiinfarto, tiene signos clínicos similares a los de la EA, pero en ella la demencia es provocada colectivamente por múltiples infartos y el deterioro neurológico es escalonado.

58 **A** La demencia por cuerpos de Lewy (DCL) combina rasgos clínicos de la enfermedad de Alzheimer (EA) y la enfermedad de Parkinson idiopática. Las mutaciones en el gen de la α-sinucleína se han asociado a enfermedad de Parkinson idiopática, y los cuerpos de Lewy pueden encontrarse en las neuronas de la sustancia negra, aunque la demencia clínica y los cuerpos de Lewy corticales apuntan a una DCL. La proteína precursora de amiloide (APP) es codificada por un gen del cromosoma 21 (lo que tal vez explica el desarrollo precoz de EA

en la trisomía 21), y es procesada para formar el Aβ amiloide de las placas neuríticas en la EA. El alelo e4 de la apolipoproteína E se une al Aβ y aumenta el riesgo de EA. La huntingtina es el producto proteínico del gen *HD* en la enfermedad de Huntington. Las mutaciones 1 y 2 de la presenilina aumentan el riesgo de EA de desarrollo temprano. La proteína tau se halla en los ovillos neurofibrilares de la EA y en los cuerpos de Pick en la enfermedad homónima.

59 **E** La pérdida de neuronas dopaminérgicas pigmentadas en la sustancia negra del mesencéfalo es sobre todo característica de la enfermedad de Parkinson. Los temblores de «rodamiento de píldora» en reposo son propios de este trastorno. Son varias las anomalías genéticas asociadas a diversas formas de la enfermedad de Parkinson, como las mutaciones en los genes de *α-sinucleína, parkina, DJ-1* y *PINK1,* y la disfunción mitocondrial. La ataxia indica alteración de las vías de control motor, como las del cerebelo, o de la propiocepción, por afectación de las columnas de la médula espinal dorsal. Los movimientos coreiformes indican enfermedad de Huntington, que afecta al núcleo caudado, no a la sustancia negra. Los problemas de memoria a corto plazo se asocian a lesiones del hipocampo, y la debilidad simétrica se relaciona con la enfermedad de las neuronas motoras.

60 **D** La enfermedad de Huntington es un trastorno degenerativo progresivo que afecta a los ganglios basales, incluidos el putamen y el núcleo caudado, por pérdida de neuronas estriadas espinosas, que normalmente modulan la actividad motora. Esta enfermedad, heredada según un patrón autosómico dominante, se debe a una expansión anómala del trinucleótido CAG en el gen *huntingtina* del cromosoma 4, que habitualmente presenta entre seis y 35 copias de CAG. En pacientes con enfermedad de Huntington típica puede haber entre 40 y 55 copias, y en los que presentan la forma temprana de la enfermedad, el número de repeticiones llega a 70. La penetrancia se reduce cuando hay una «premutación» con entre 36 y 39 repeticiones. Estos pacientes padecen atrofia, con pérdida de neuronas y gliosis, que se inicia en el caudado, el putamen y el globo pálido. Alrededor del 10% de los casos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob son

determinados genéticamente, con herencia de una proteína priónica anómala causante de encefalopatía espongiforme en la vida adulta. La enfermedad de Tay-Sachs, propia de lactantes y niños, se debe a la carencia de hexosaminidasa A. La trisomía 21 provoca retraso mental desde el nacimiento. Las mutaciones en los genes de la presenilina producen enfermedad de Alzheimer (EA) familiar. El riego de EA es mayor al aumentar la concentración de apolipoproteína E.

61 **D** La paciente padece una ataxia de Friedreich, enfermedad progresiva autosómica recesiva que suele manifestarse en la primera década de vida. El gen *frataxina* codifica una proteína implicada en la regulación celular del hierro, y la expansión de las repeticiones de nucleótidos GAA reduce las proteínas y la fosforilación oxidativa mitocondrial. Las otras opciones citadas no tienen repercusiones cardíacas. Las mutaciones en el gen *huntingtina* se observan en la enfermedad de Huntington, caracterizada por coreoatetosis desarrollada en adultos jóvenes o de mediana edad. El aumento de las repeticiones en tándem en el gen *FMR1* ocasiona el síndrome del cromosoma X frágil, que cursa con retraso mental. El gen de la *proteína cinasa de la distrofia miotónica* es anómalo en casos de distrofia miotónica con debilidad muscular y demencia.

62 **B** La naturaleza progresiva y simétrica de la afectación de este paciente es clásica de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Los músculos presentan atrofia agrupada de tipo desnervación por pérdida de neuronas motoras en las astas anteriores de la médula espinal. La forma «bulbar» afecta sobre todo a los núcleos de los pares craneales y es de evolución más agresiva. Las neuronas motoras superiores corticales pueden también perderse, aunque la función mental se conserva en la ELA. Las células ependimarias revisten los ventrículos, que son normales en la ELA. Las células microgliales ejercen una función similar a la de los macrófagos y pueden verse implicadas en las placas desmielinizantes de la esclerosis múltiple, causantes de diversos signos y síntomas motores, aunque la simetría no es propia de esta enfermedad. Los oligodendrocitos proporcionan mielina a los axones en el SNC. La enfermedad de Parkinson, con pérdida de neuronas pigmentadas de la sustancia negra, se caracteriza

por rigidez y movimientos involuntarios, no por debilidad muscular. La enfermedad de Huntington, con pérdida de neuronas espinosas en el núcleo caudado, provoca movimientos anómalos, no debilidad, y con el tiempo se puede asociar a demencia.

63 **B** En niños, debe sospecharse una forma hereditaria de enfermedad del SNC que sea responsable del empeoramiento progresivo. Las leucodistrofias son metabolopatías congénitas que alteran las enzimas lisosómicas o peroxisómicas (en este caso a la arilsulfatasa A), y que afectan extensamente a la sustancia blanca e inducen pérdida de mielina o acumulaciones anómalas de esta, por fallos en su generación, mantenimiento o catabolismo. No hay placas de desmielinización aisladas, a diferencia de lo que sucede en la esclerosis múltiple. En ocasiones, en las leucodistrofias se conserva la mielina subcortical (fibras U). La encefalomielitis diseminada aguda es un proceso postinfeccioso de inicio brusco. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una afectación infecciosa que afecta a adultos inmunodeprimidos. La enfermedad de Tay-Sachs es propia de lactantes.

64 **E** La enfermedad de Wernicke se debe a una carencia de vitamina B_1 (tiamina). Este cuadro es infrecuente en personas con una dieta variada, algo que no se encuentra en los alcohólicos crónicos. Con frecuencia se observan proliferación capilar, hemorragia, necrosis y depósitos de hemosiderina en los cuerpos mamilares y la sustancia gris periacueductal, que ocasionan parálisis de los músculos extraoculares. Si se aprecian problemas de memoria y fabulación, será indicativo de afectación talámica y el diagnóstico será síndrome de Wernicke-Korsakoff. Aunque la carencia de vitamina B_{12} o folato causa a veces una anemia macrocítica, la degeneración combinada subaguda de la médula espinal es más propia de la carencia de vitamina B_{12} (cobalamina), en tanto que la de folato no origina signos en el SNC. La demencia puede asociarse a una carencia de niacina y la deficiencia de piridoxina causa una neuropatía periférica.

65 **A** La insuficiencia hepática con encefalopatía hepática se da en casos de hepatopatías graves de diversas causas, entre ellas el

alcoholismo crónico. La hiperamoniemia es propia de la insuficiencia hepática. La intoxicación por monóxido de carbono produce obnubilación y coma, y la hipoglucemia grave puede dañar las neuronas del hipocampo y la neocorteza. Una concentración alta de hemoglobina A_{1c} es diagnóstica de diabetes mellitus, y los diabéticos son más propensos a padecer neuropatías periféricas y autónomas. La hiponatremia por diabetes insípida provoca obnubilación.

66 **B** El paciente puede haber padecido inicialmente un astrocitoma infiltrante, que es la neoplasia cerebral primaria más común en adultos, y que suele desarrollarse en un hemisferio cerebral. Los astrocitomas de bajo grado en adultos suelen evolucionar con escasa malignidad. Algunos pacientes desarrollan un glioma de alto grado, conocido como glioblastoma *secundario.* La mayoría de los glioblastomas se desarrollan *de novo (primarios)* y presentan mutaciones en *MDM2.* Con independencia de su origen, los glioblastomas son agresivos y tienen mal pronóstico. El linfoma B difuso de células grandes es el tipo más común de linfoma del SNC «primario» (sin evidencia de enfermedad en otra localización); algunos casos afectan a pacientes inmunodeprimidos. Los hemangioblastomas son neoplasias infrecuentes que se desarrollan en el cerebelo, a menudo en pacientes con una enfermedad de von Hippel-Lindau y en asociación a policitemia. Los meduloblastomas y los astrocitomas pilocíticos suelen ser tumores cerebrales infantiles originados en la fosa posterior.

67 **A** Las neoplasias cerebrales malignas primarias infantiles suelen localizarse en la fosa posterior. Las dos más frecuentes en esta localización son el astrocitoma pilocítico (quiste cerebeloso) y el meduloblastoma. El primero es de crecimiento lento y presenta mejor pronóstico global que las neoplasias gliales de adultos. Ambos pueden expandirse y bloquear el flujo de LCR, ocasionando hidrocefalia. Los ependimomas se dan en niños, pero lo más probable es que se desarrollen en el cuarto ventrículo. El hemangioblastoma es una masa quística infrecuente propia de adultos, que se suele formar en el cerebelo y se asocia a policitemia. Los meduloblastomas a menudo se presentan en la línea media cerebelosa, constan de células

azules redondas primitivas y tienen mal pronóstico. Los meningiomas son masas sólidas circunscritas, propias de adultos, adyacentes a la duramadre y que, en la neurofibromatosis, pueden ser múltiples. El schwannoma afecta típicamente al par craneal VIII en adultos.

68 **E** Los oligodendrogliomas tienden a presentar mejor pronóstico que las demás neoplasias gliales. Los astrocitomas pilocíticos con mutaciones en el gen *BRAF* son en general menos circunscritos. El linfoma B difuso de células grandes se relaciona en ocasiones con el sida; es negativo para la proteína ácida fibrilar de la glía (GFAP), pero positivo para CD19 y CD20. Los meduloblastomas son tumores de la fosa posterior infantiles, y los de peor pronóstico a menudo presentan amplificación de c-MYC. Los glioblastomas clásicos son gliomas infiltrantes y muy agresivos, que a menudo presentan alteraciones de *EGFR*.

69 **B** La variante mixopapilar del ependimoma es más habitual en adultos que en niños. Los ependimomas que se forman en los ventrículos (generalmente en el cuarto) son más comunes en las dos primeras décadas de vida. Los papilomas del plexo coroideo son tumores infrecuentes, desarrollados en los ventrículos cerebrales. Los meningiomas a menudo se forman en la cavidad craneal y presentan células rechonchas, rosadas y redondeadas o fusiformes, a veces con cuerpos de psamoma. Las metástasis en la médula espinal son infrecuentes. Los neurofibromas son más probables en los nervios periféricos, si bien, en la neurofibromatosis de tipo 1, pueden aparecer en diversas localizaciones. El astrocitoma pilocítico es una neoplasia intracraneal primaria infantil, frecuente y que se origina en la fosa posterior. El schwannoma afecta casi siempre al par craneal VIII, pero en la neurofibromatosis puede ser de localización múltiple.

70 **B** En niños, los ependimomas se suelen desarrollar en el suelo del cuarto ventrículo y obstruyen el flujo de LCR (hidrocefalia no comunicante obstructiva). La mayoría de las neoplasias cerebrales infantiles se localizan en la fosa posterior, incluidos los astrocitomas pilocíticos, que se desarrollan en un hemisferio del cerebelo y aparecen como una masa quística con un nódulo mural y células tumorales con prolongaciones pilosas. Los

meduloblastomas son también tumores infantiles, que se desarrollan en la línea media del cerebelo y están constituidos por células azules primitivas indiferenciadas. Los glioblastomas son neoplasias de adultos que se forman en los hemisferios cerebrales. Los schwannomas suelen originarse en el ángulo pontocerebeloso en el par craneal VIII.

71 **B** La RM muestra una masa de 4 cm en el vermis cerebeloso, además de dilatación de los ventrículos cerebrales tercero y lateral, lo que resulta compatible con la presencia de un meduloblastoma. La mayoría de las neoplasias intracraneales en niños se localizan en la fosa posterior. El meduloblastoma, uno de los «tumores de células azules» de la infancia, se forma en la línea media y sus células pueden diseminarse al LCR. Los glioblastomas son también tumores de alto grado de malignidad, que podrían diseminarse por el LCR, pero se trata de una neoplasia de adultos y que se origina en un hemisferio cerebral. Los schwannomas afectan generalmente al par craneal VIII, son benignos y no pasan al LCR. Los ependimomas se dan en niños, aunque son típicos de los ventrículos. Por su parte, las lesiones metastásicas afectan a la unión sustancia gris-sustancia blanca, pero los casos infantiles son inusuales.

72 **D** Los linfomas no hodgkinianos, incluidos los B de célula grande, son infrecuentes en el cerebro, aunque se registran casos en personas inmunodeprimidas, sobre todo con sida. Tienden a ser multifocales. La infección por citomegalovirus es común en el sida, aunque no es fácil que provoque lesiones de tipo masa. Un glioblastoma puede cursar como una masa infiltrante y destructiva grande, aunque sus células suelen ser positivas para la proteína ácida fibrilar de la glía (GFAP) y negativas para CD19. El sarcoma de Kaposi aparece asociado al sida, pero la afectación del SNC es infrecuente y sus células son positivas para CD34. La leucoencefalopatía multifocal progresiva produce lesiones granulares en la sustancia blanca, con grandes oligodendrocitos de formas singulares infectados por poliomavirus JC. La toxoplasmosis puede producir múltiples lesiones de tipo masa que, sin embargo, son abscesos crónicos llenos de material necrótico y rodeados de gliosis; en estos abscesos se encuentran seudoquistes de *Toxoplasma.*

73 **C** Esta masa parduzco-grisácea es un meningioma que, típicamente, corresponde a una lesión delimitada desarrollada a partir de las células meningoteliales de la aracnoides y que da la impresión de estar firmemente adherida a la duramadre que la cubre. Es más común en mujeres. Es típica la localización parasagital, en el reborde esfenoideo o subfrontal. La mayoría de los meningiomas son biológicamente benignos, aunque algunos son invasivos y agresivos. Los gliomas, incluidos los astrocitomas, suelen hallarse en los hemisferios cerebrales de los adultos. Los ependimomas se observan en los ventrículos o en la médula espinal distal. La localización parasagital es infrecuente para las lesiones metastásicas, aunque ciertas neoplasias malignas, como los carcinomas de mama, afectan a las meninges de forma difusa (en la llamada meningitis carcinomatosa). Los tuberculomas son granulomas lo suficientemente grandes para producir un hemorragia y son complicaciones inusuales de la tuberculosis diseminada, que a menudo aparecen en la base del cerebro.

74 **D** Lo más probable es que las neoplasias aisladas múltiples en el SNC, localizadas en la unión sustancia gris-sustancia blanca, sean metástasis en lugar de tumores cerebrales primarios. Las células tumorales pueden llegar al cerebro en forma de émbolos a través de la circulación arterial cerebral. La mayoría de los episodios embólicos se localizan en la unión sustancia gris-sustancia blanca, donde el estrechamiento y la ramificación aguda de los vasos tiende a atrapar los émbolos. El territorio de la arteria cerebral media, que recibe la mayor parte de la sangre, es la localización más previsible. Las metástasis de los melanomas suelen estar muy diseminadas, con múltiples lesiones de tipo masa en diferentes órganos. Los glioblastomas son grandes neoplasias malignas gliales primarias; son infiltrantes, pero no suelen manifestarse como múltiples lesiones pequeñas. El hemangioblastoma es una masa quística infrecuente propia de adultos, que se suele formar en el cerebelo y se asocia a policitemia. Los meningiomas son masas sólidas circunscritas, adyacentes a la duramadre; pueden ser múltiples en pacientes con neurofibromatosis. Los linfomas cerebrales son infrecuentes excepto en pacientes VIH positivos. Los

oligodendrogliomas son lesiones de tipo masa circunscritas solitarias desarrolladas en los hemisferios cerebrales de los adultos.

75 **E** Las múltiples lesiones cutáneas pigmentadas y el glioma del nervio óptico constituyen importantes datos a favor del diagnóstico de neurofibromatosis de tipo 1. Los pacientes aquejados de este trastorno, con patrón de herencia autosómico dominante, presentan numerosas manchas café con leche extensas y tendencia al desarrollo de diversos tumores de la vaina nerviosa (schwannomas o neurofibromas). También presentan gliomas del SNC. Los tumores de la vaina nerviosa pueden malignizarse y metastatizar, habitualmente en los pulmones. De las otras neoplasias enumeradas, solo el meningioma se asocia a la neurofibromatosis de tipo 1, aunque en localización intracraneal.

76 **A** El schwannoma en esta localización se conoce también como *tumor del ángulo pontocerebeloso.* Los schwannomas en esta localización se desarrollan a partir del par craneal VIII y también se conocen como *neuromas del acústico.* La mayor parte de los schwannomas son tumores benignos de crecimiento lento que pueden extirparse por completo. La presencia de schwannomas acústicos bilaterales es virtualmente patognomónica de la neurofibromatosis de tipo 2. Otros síndromes tumorales familiares que afectan al cerebro son el síndrome de Li-Fraumeni, con mutaciones en *p53* y meduloblastomas; el síndrome de Gorlin, con mutaciones en *PTCH* y meduloblastomas; la esclerosis tuberosa, con mutaciones en *TSC1* y hamartomas corticales; y el síndrome de von Hippel-Lindau, con mutaciones en *VHL* y hemangioblastomas.

77 **E** La esclerosis tuberosa es una de las llamadas facomatosis, un grupo de trastornos congénitos infrecuentes en los que se desarrollan hamartomas y neoplasias por todo el cuerpo, junto con anomalías cutáneas. Los pacientes con esclerosis tuberosa presentan tuberosidades corticales, que son hamartomas de tejido neuronal y glial; otros rasgos característicos son angiomiolipomas o quistes renales, fibromas subungueales y rabdomiomas cardíacos. En el síndrome de Down (trisomía 21),

los pacientes desarrollan en ocasiones leucemia aguda, pero no neoplasias cerebrales, y los supervivientes hasta una edad intermedia desarrollan enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Krabbe es una leucodistrofia asociada a una carencia de galactocerebrósido β-galactosidasa y que determina deterioro neurológico durante la lactancia. La neurofibromatosis de tipo 1 se caracteriza por la presencia de neurofibromas cutáneos deformantes y viscerales, manchas cutáneas café con leche y neurofibrosarcomas. En la neurofibromatosis de tipo 2 hay schwannomas del acústico, meningiomas, gliomas y ependimomas. La enfermedad de von Hippel-Lindau se caracteriza por hemangioblastomas en el cerebelo, la retina y la médula espinal, y por feocromocitomas.

78 **C** Los hemangioblastomas forman parte del espectro de las neoplasias observadas en asociación a la enfermedad von Hippel-Lindau. El gen *VHL* codifica un componente de la ubicuitina ligasa importante en la vía de degradación del HIF, que activa la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), con objeto de impulsar la proliferación vascular. El síndrome de Cushing, que implica aumento de la producción de corticoesteroides, se relaciona con producción de ACTH ectópica por parte de un carcinoma. Dicho síndrome es provocado por un adenoma adenohipofisario productor de ACTH. La hipercalcemia secundaria a una neoplasia maligna suele ser consecuencia de la producción de péptido relacionado con la parathormona por parte del tumor. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) puede deberse a tumores neuroendocrinos, como el carcinoma pulmonar de células pequeñas. Los carcinomas, especialmente los adenocarcinomas, ocasionan a veces hipercoagulabilidad (síndrome de Trousseau).

CAPÍTULO

29

Ojo

PEF9 Capítulo 29: Ojo

1 Un hombre de 39 años presenta dolor progresivo en relación con el movimiento del ojo izquierdo, asociado a edema desde hace 1 semana. En la exploración se observa proptosis y oftalmoplejía. Se observa edema y eritema palpebral con marcada hipersensibilidad a la palpación. Se asocia a rinorrea purulenta. ¿Cuál de los siguientes trastornos orbitarios es más probable que tenga este paciente?

A Celulitis
B Enfermedad de Graves
C Hemangioma
D Linfoma no hodgkiniano
E Sarcoidosis

2 Un niño de 7 años ha empeorado su rendimiento escolar en los últimos 4 meses porque su visión se ha reducido. La exploración del ojo derecho muestra inflamación puntiforme difusa en la córnea y paño, que se extiende como una proliferación de tejido fibrovascular desde la conjuntiva a la córnea. El estudio histológico de un raspado corneal revela linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos y células epiteliales corneales dispersas, con cuerpos de inclusión citoplásmicos. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que ocasione estos hallazgos?

A *Chlamydia trachomatis*
B Citomegalovirus
C Virus del herpes simple
D Virus de la rubéola
E *Treponema pallidum*

3 Un hombre de 82 años sigue practicando el surf todas las semanas en la playa de Waikiki. Durante el último año ha

observado que la visión del ojo derecho se volvía borrosa. En la exploración del ojo derecho se identifica una lesión blanquecina irregular en la conjuntiva, que se extiende hacia la córnea. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que ocasione esta lesión ocular?

A Infección por *Chlamydia trachomatis*
B Hiperglucemia
C Hipertensión
D Exposición a la luz solar
E Deficiencia de vitamina A

4 Una mujer de 27 años ha presentado dolor con visión borrosa en el ojo derecho en los últimos 2 días. Tuvo un episodio similar hace 1 año. La exploración física no revela eritema conjuntival ni inyección vascular. La exploración del fondo de ojo no identifica lesiones retinianas. La lámpara de hendidura con colorante de fluoresceína revela una úlcera dendrítica en la córnea derecha. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que ocasione estos hallazgos?

A *Chlamydia trachomatis*
B Citomegalovirus
C Virus del herpes simple
D *Neisseria gonorrhoeae*
E *Staphylococcus aureus*

5 Un hombre de 26 años ha presentado un deterioro visual grave desde el nacimiento. Es legalmente ciego cuando no lleva gafas y su astigmatismo es tan importante en los dos ojos que no consigue una corrección superior a 20/100 cuando las lleva. Con lentillas rígidas consigue una corrección 20/40. ¿Cuál de los siguientes trastornos oculares es más probable que tenga?

A Queratocono
B Terigión
C Distrofia del estroma
D Tracoma
E Deficiencia de vitamina A

6 Un hombre de 34 años ha presentado un deterioro de la visión en los últimos 3 años y en este momento tiene una grave alteración visual en los dos ojos. Su hermano tiene un proceso parecido. Los dos padres tienen una visión normal. La exploración ocular revela

una opacidad difusa del estroma anterior con agregados de opacidades de color blanco grisáceo en la región axial del estroma corneal. Se somete a un trasplante bilateral de córnea. Las córneas enfermas presentan depósitos basófilos en el estroma, que son positivos con sulfato de queratano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Formación de cataratas
B Queratomalacia
C Distrofia macular
D Terigión
E Tracoma

7 Una mujer de 29 años ha desarrollado malestar con náuseas durante el último mes. En la exploración física presenta un exantema eritematoso en las mejillas. Las pruebas de laboratorio revelan creatinina sérica de 3,3 mg/dl; nitrógeno ureico, 33 mg/dl; ANA positivos con título 1:2.048; y anticuerpos frente a ADN bicatenarios positivos con título 1:512. La biopsia renal muestra una glomerulonefritis proliferativa. Se le administra tratamiento con dosis altas de glucocorticoides a largo plazo. ¿Cuál de las siguientes complicaciones oculares es más probable que desarrolle esta paciente?

A Retinopatía de base
B Cataratas
C Distrofia del estroma corneal
D Uveítis granulomatosa
E Degeneración macular



8 Una mujer de 82 años ha presentado problemas visuales progresivos, más graves en el ojo derecho, en los últimos 2 años. No consigue ver con claridad cuando mira de frente porque tiene opacificaciones y sensación de visión turbia, y refiere una gran dificultad para leer el material impreso. La visión periférica es mejor. El ojo izquierdo tiene una afectación similar, que muestra la figura. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que haya presentado esta paciente?

A Queratomalacia corneal
B Esclerosis nuclear del cristalino
C Glaucoma de ángulo abierto
D Degeneración de la mácula retiniana
E Oftalmía simpática

9 Una mujer de 77 años ha desarrollado dolor progresivo asociado a visión borrosa en el ojo derecho en las últimas 36 h. Durante los últimos 70 años ha empleado gafas para la corrección de una hipermetropía. En la exploración física no se identifican lesiones en la córnea o el cristalino. La exploración del fondo de ojo revela una excavación de la copa óptica del ojo derecho. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que produzca estos hallazgos?

A Depósitos de amiloide en el vítreo de la cámara posterior
B Luxación del cristalino hacia la cámara anterior
C Aumento de la producción de humor acuoso por el cuerpo

ciliar

D Resistencia al flujo del humor acuoso hacia el conducto de Schlemm

E Cámara anterior poco profunda, que obstruye el flujo del humor acuoso

F Tromboembolia en la arteria central de la retina

10 Un hombre de 48 años no estaba empleando gafas de protección para cortar madera con una sierra doméstica y sufrió una lesión penetrante en el ojo izquierdo. Se le extrae una astilla de madera. La exploración del fondo de ojo muestra un prolapso parcial de la úvea, pero conserva la visión del ojo izquierdo. A las 3 semanas, el paciente ha perdido la acomodación, con fotofobia y visión borrosa en el ojo derecho. La exploración del fondo de ojo revela infiltrados en la coroides. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Infección por *Aspergillus fumigatus*

B Distrofia de Fuchs

C Sarcoidosis

D Oftalmía simpática

E Traumatismo no diagnosticado



11 Una mujer de 61 años ha presentado una reducción de la agudeza visual en el ojo derecho durante los últimos 6 meses. Posteriormente sufrió una pérdida súbita de parte de la visión en el ojo izquierdo, que describió como «si pasara una sombra» por su campo visual. La exploración del fondo de ojo revela una masa oscura en la úvea. La figura se corresponde con un corte transversal del ojo enucleado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Uveítis granulomatosa
B Hipertensión maligna
C Melanoma
D Traumatismo ocular con hematoma
E Retinoblastoma
F Toxoplasmosis

12 Una mujer de 68 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva del ventrículo izquierdo ha presentado una

reducción de la agudeza visual en los últimos 5 años. No refiere dolor ocular. La presión intraocular es normal. La exploración del fondo de ojo incluye estenosis arteriolar, hemorragias en llama, manchas algodonosas y exudados céreos duros. ¿Cuál de las siguientes enfermedades de base es más probable que sufra esta paciente?

A Ateroesclerosis avanzada
B Edema cerebral
C Diabetes mellitus
D Hipertensión
E Retinitis pigmentaria



13 Una mujer de 68 años sufre una insuficiencia renal crónica desde hace 10 años y ha estado en hemodiálisis. El año pasado tuvo un infarto de miocardio. Ahora refiere un deterioro de la visión de ambos ojos. La figura corresponde a los hallazgos representativos de la retina de esta paciente. ¿Cuál de los

siguientes hallazgos de laboratorio en la sangre es más probable que tenga esta paciente?

A Título de anticuerpos antinucleares 1:1.024
B Ferritina de 555 ng/ml
C HbA_{1c} del 9,6%
D Actividad de renina de 9 ng/ml/h
E Colesterol total de 265 mg/dl

14 Un hombre de 74 años perdió de repente la mitad superior del campo visual del ojo derecho. Antes de este episodio llevaba 6 años con un deterioro progresivo de la agudeza visual de ambos ojos. En la exploración física mide 170 cm y pesa 92,5 kg (índice de masa corporal, 32). Las pruebas de laboratorio muestran una glucemia en ayunas de 165 mg/dl. ¿Cuál es el proceso patológico de base más probable que explique esta súbita pérdida de visión en el ojo derecho?

A Úlcera dendrítica corneal
B Degeneración macular
C Retinitis pigmentaria
D Desprendimiento de retina por tracción
E Melanoma de úvea

15 Una mujer de 23 años primigrávida con preeclampsia da a luz de forma prematura en la semana 32 de gestación. Los valores de la escala de Apgar del lactante son 4 y 6 en los minutos 1 y 5 de vida, respectivamente. El lactante presenta una enfermedad de membrana hialina, y es intubado y se le administra ventilación con presión positiva con oxígeno inspirado al 100%. El lactante sobrevive y recibe el alta el día 23 de vida. A los 2 meses, la madre observa que el lactante no siempre responde visualmente a su presencia. Se explora al lactante y se encuentra que tiene una ceguera de los campos visuales nasales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Cataratas
B Queratomalacia
C Degeneración macular
D Retinitis pigmentaria
E Fibroplasia retrocristalina

16 Un hombre de 15 años de la parte este de Arabia ha presentado episodios de dolor torácico, abdominal y lumbar, además de fatiga

durante los últimos 10 años. La exploración física es anodina. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina, 8 g/dl; hematocrito, 24,7%; VMC, 95 μm^3; y bilirrubina sérica total, 2,1 mg/dl. Las concentraciones de AST, ALT, albúmina y proteínas totales son normales. El tiempo de protrombina y el de tromboplastina parcial también son normales. El análisis de un frotis de sangre periférica identifica reticulocitosis y policromasia con presencia de ocasionales eritrocitos deformados con forma de semiluna. ¿Cuál de las siguientes complicaciones oculares tiene más riesgo de desarrollar este paciente?

A Cataratas
B Hemorragia intrarretiniana
C Queratocono
D Glaucoma de ángulo cerrado secundario
E Uveítis

17 Una mujer de 75 años con diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca congestiva ha perdido de repente la visión del ojo izquierdo. La exploración del fondo de ojo revela una fovéola de color rojo cereza, mientras que el resto de la retina está pálido. No se observan alteraciones en el ojo derecho. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que explique la súbita pérdida de visión unilateral?

A Oclusión de la arteria central de la retina
B Retinitis por citomegalovirus
C Glaucoma de ángulo cerrado primario
D Retinopatía proliferativa
E Enfermedad de Tay-Sachs

18 Se realiza un estudio en niños de 1 a 2 años de edad que parecían sanos al nacer a término, pero posteriormente desarrollaron ceguera e incapacidad de alcanzar los hitos del desarrollo neurológico. En la exploración del fondo de ojo presentan retinas pálidas con prominentes regiones maculares rojizas. ¿Cuál de las siguientes enzimas es más probable que sea deficitaria en estos niños?

A α-l-iduronidasa
B Galactosilceramidasa
C Glucocerebrosidasa
D Hexosaminidasa A

E Glucosidasa lisosómica

19 Una empresa farmacéutica está desarrollando un producto que podría servir para prevenir la pérdida de visión secundaria al envejecimiento. Se realiza el seguimiento durante 5 años de una cohorte de individuos de 60 a 80 años, en los que se valora de forma periódica la agudeza visual, el fondo de ojo y la angiografía con fluoresceína. Algunos de estos pacientes desarrollan una pérdida progresiva de visión caracterizada inicialmente por depósitos difusos en la membrana de Bruch y por atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Posteriormente un subgrupo de estos pacientes experimenta un deterioro mayor de la visión por aparición de una neovascularización en la coroides. ¿Un antagonista de cuál de las siguientes moléculas es más probable que sea útil para reducir la pérdida de visión en este subgrupo de pacientes?

A Factor de crecimiento epidérmico (EGF)
B Factor de crecimiento seudoinsulínico (IGF)
C Factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF)
D Factor de crecimiento transformante β (TGF-β)
E Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF)

20 Un hombre de 78 años con antecedentes de tabaquismo con un consumo de 30 paquetes-año ha presentado un deterioro de la visión, sobre todo de distribución central, durante los últimos 3 años. No presenta dolor ocular. Las presiones intraoculares son normales. No presenta alteraciones corneales o del cristalino. La exploración del fondo de ojo identifica un epitelio pigmentario retiniano atrófico y se encuentran depósitos en la membrana de Bruch. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Degeneración macular
B Retinopatía proliferativa
C Desprendimiento de retina
D Retinitis pigmentaria
E Fibroplasia retrocristalina

21 Un hombre de 33 años ha presentado dificultad progresiva para ver por la noche, sin problemas visuales durante el día. A los 3 años empieza a notar también deterioro de la agudeza visual diurna. La exploración del fondo de ojo en este caso revela un patrón reticulado ramificado en la retina. La papila óptica está

pálida y de aspecto céreo, y los vasos retinianos están atenuados. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que presente estos hallazgos característicos?

A Retinopatía arterioesclerótica
B Retinopatía hipertensiva
C Degeneración macular
D Retinopatía proliferativa
E Retinitis pigmentaria

22 Una mujer de 22 años da a luz un niño a término tras un embarazo no complicado. La exploración física del recién nacido no revela alteraciones. Durante la lactancia, una revisión de salud del niño identifica una leucocoria en el ojo derecho. Se procede a su enucleación. El análisis molecular del tumor enucleado indica pérdida del control del ciclo celular en las células tumorales. Por el contrario, los fibroblastos de la piel del lactante no tienen alteraciones moleculares. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre este lactante es más precisa?

A Herencia de un *locus* mutado del gen *RB* de los padres
B Pérdida de las dos copias del gen *RB* en el tumor ocular
C Riesgo de desarrollar un tumor en el otro ojo durante la infancia
D Riesgo de desarrollar en el futuro un osteosarcoma
E Hermanos con riesgo de sufrir un tumor parecido



23 Los padres de un niño de 3 años observan que desde hace 6 meses está cada vez más torpe. En la exploración física se encuentra una leucocoria con ausencia del reflejo rojo en el ojo izquierdo. Se procede a la enucleación del ojo; la figura muestra el aspecto histológico de la masa intraocular. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable que sufra este paciente?

A Glioma
B Melanoma
C Meduloblastoma
D Retinoblastoma
E Carcinoma epidermoide

24 Un hombre de 70 años con una fibrilación auricular e hipertensión mal controlada se está recuperando de una cirugía de una prótesis de cadera derecha. Ha tenido una cefalea cada vez más intensa durante el último día. Está en tratamiento anticoagulante. La exploración física revela que está afebril con una presión arterial de 170/110 mmHg. La exploración del fondo de ojo encuentra edema de papila en el ojo izquierdo. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que cause este edema de papila?

A Enfermedad de Alzheimer
B Glaucoma
C Degeneración macular
D Neuritis óptica
E Hemorragia intracraneal
F Schwannoma

25 Una mujer de 72 años refiere un deterioro de la visión durante el último año. Actualmente presenta cada vez más cefaleas. La paciente lleva gafas desde la infancia por miopía. La exploración del fondo de ojo revela una copa óptica excavada y más profunda. La retina circundante es normal. ¿Cuál de los siguientes factores es más probable que se debiera haber cribado en esta paciente para explicar los hallazgos de esta enfermedad?

A Presión arterial
B Homocistinuria
C Presión intraocular
D Glucemia
E Agudeza visual

Respuestas

1 **A** La celulitis orbitaria puede deberse a una infección originada en los senos paranasales adyacentes, como las celdillas aéreas etmoidales. Los microorganismos pueden ser *Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae.* En la cetoacidosis diabética se debería plantear también la mucormicosis. La inflamación orbitaria idiopática (seudotumor inflamatorio) puede debutar de forma parecida, pero no es un proceso infeccioso. La enfermedad de Graves puede debutar con una proptosis bilateral, pero sin cambios inflamatorios, porque la causa es una acumulación de proteínas de la matriz extracelular. Los hemangiomas en niños y los linfomas en adultos son masas orbitarias, posiblemente sin cambios inflamatorios asociados. La sarcoidosis produce una inflamación granulomatosa sin cambios agudos.

2 **A** El tracoma es una causa importante de ceguera a escala mundial. La inflamación inicial secundaria a la infección se sigue de una progresiva cicatrización conjuntival con afectación palpebral, de forma que las pestañas se giran hacia dentro (triquiasis) y ocasionan cicatrices en la conjuntiva y la córnea. En los niños, el citomegalovirus (CMV), uno de los virus del herpes, es una causa poco frecuente de infección ocular. El CMV produce prominentes inclusiones intranucleares. La queratitis herpética puede ser origen de úlceras y cicatrices; los virus del herpes se asocian a inclusiones intranucleares. La rubéola congénita, que actualmente es infrecuente por la vacunación, produce retinopatía. Las infecciones congénitas por *Treponema pallidum* se asocian a queratitis intersticial.

3 **D** El terigión puede extenderse hacia la córnea, pero no atraviesa el eje pupilar; puede ser causa de un astigmatismo leve con deterioro de la visión. La pinguécula no empuja a la córnea, pero afecta a la distribución de la película lagrimal y ocasiona deshidratación focal con depresión corneal. Estas dos lesiones están constituidas por tejido conjuntivo fibrovascular y la luz ultravioleta es la causa responsable. El tracoma determina cicatrices conjuntivales que no son tan focales. La diabetes mellitus con hiperglucemia suele afectar más al cristalino o la retina. Puede producirse una retinopatía hipertensiva. La

deficiencia de vitamina A puede ser causa de queratomalacia, pero no de una cicatriz localizada.

4 **C** La causa más frecuente de úlceras dendríticas corneales es la infección por el virus del herpes simple. Estas úlceras pueden perforar el globo ocular, lo que representa una emergencia médica. Algunas infecciones herpéticas crónicas de la córnea provocan opacidad localizada. Se identificarán linfocitos, células plasmáticas e inclusiones víricas en las células del epitelio corneal. El tracoma, una infección por *Chlamydia trachomatis,* se produce principalmente en niños, y cursa con inflamación que determina cicatrices extensas en la córnea y la conjuntiva. La infección por citomegalovirus no suele producir lesiones corneales. Puede ser causa de retinitis en las infecciones congénitas y en adultos inmunodeprimidos. La infección por *Neisseria gonorrhoeae* afecta a personas con actividad sexual, pero puede transmitirse al neonato en el momento del parto, motivo por el que se administran gotas de nitrato de plata profiláctico en dicho momento para prevenir la oftalmía neonatal. La infección por *Staphylococcus aureus* es frecuente en muchos tejidos y puede producir una conjuntivitis, que no era evidente en este caso.

5 **A** Los pacientes con un queratocono no son candidatos a la realización de una técnica de queratomileusis *in situ* con láser (LASIK), dado el marcado adelgazamiento corneal con roturas en la capa de Bowman, que explica la forma cónica de su córnea. Puede realizarse una queratoplastia penetrante. Es posible plantear un trasplante de córnea como tratamiento del queratocono. El terigión es un área localizada de opacificación corneal por cambios degenerativos; a diferencia de la pinguécula, se extiende hacia la córnea y puede interferir en la visión. Las distrofias estromales son trastornos hereditarios poco frecuentes con opacificación corneal por depósito de mucopolisacáridos. El tracoma es consecuencia de la infección por *Chlamydia trachomatis* y puede producir cicatrices corneales con ceguera. La deficiencia de vitamina A provoca una queratomalacia y al final ceguera si no se trata.

6 **C** La distrofia hereditaria del estroma corneal tiene varias formas y la mayoría son autosómicas dominantes. Sin embargo,

la variante más grave es la distrofia macular, que se hereda de forma autosómica recesiva. Se trata básicamente de un tipo de mucopolisacaridosis limitada a la córnea en la que se deposita sulfato de queratano. Las cataratas son más frecuentes en ancianos y se deben a opacificaciones del cristalino. La queratomalacia puede ser consecuencia de la deficiencia de vitamina A. El terigión es un área localizada de degeneración basófila del epitelio conjuntival que se extiende hacia la córnea. El tracoma se debe a la infección por *Chlamydia trachomatis.*

7 **B** Las cataratas del cristalino son una complicación importante del tratamiento con glucocorticoides sistémicos. Esta paciente tiene un lupus eritematoso sistémico con nefritis lúpica. Las cataratas pueden deberse al envejecimiento, la diabetes mellitus, el glaucoma, la luz ultravioleta o la radiación. La retinopatía suele asociarse a diabetes mellitus o hipertensión. Las distrofias del estroma son procesos hereditarios que afectan a la córnea. La uveítis granulomatosa se asocia a la sarcoidosis. La degeneración macular suele ser una enfermedad que afecta a la visión central de ancianos.

8 **B** La esclerosis nuclear del cristalino produce cataratas en ancianos, que se caracterizan por la opacificación del cristalino que muestra la figura. Este cambio produce opacificación por la compresión de las fibras del cristalino en la porción central (nuclear) del mismo. La queratomalacia puede originar cicatrices corneales con opacificación, pero no sigue una distribución central. El glaucoma es consecuencia del aumento de la presión intraocular con lesión del nervio óptico, pero no se caracteriza por pérdida de la visión central, sino más de la periférica. La degeneración macular se puede producir también en ancianos y condicionar una pérdida de visión central, pero no se asocia a opacificaciones. La oftalmía simpática aparece en un ojo tras un traumatismo en el contralateral.

9 **E** En algunos ancianos con hipermetropía se produce un desplazamiento hacia delante del iris que estrecha el ángulo de la cámara anterior y obstruye el flujo del humor acuoso, lo que produce el denominado glaucoma de ángulo cerrado primario, que cursa con dolor agudo. El aumento de presión sobre el nervio óptico condiciona excavación e induce una pérdida

progresiva de visión. Las mutaciones de los genes de la *miocilina (MYOC)* y la *optineurina (OPTN)* pueden explicar algunos casos de glaucoma de ángulo abierto primario. El depósito de amiloide es bastante infrecuente y no aumenta la presión intraocular. La luxación del cristalino se asocia a traumatismos y también al síndrome de Marfan. El aumento de la producción de humor acuoso es una causa infrecuente de glaucoma. El aumento de la resistencia al paso del humor acuoso hacia el conducto de Schlemm es típico del glaucoma de ángulo abierto primario, que se describe en pacientes miopes. La trombosis o la embolia de la arteria central de la retina pueden ocluirla con edema, palidez y aparición de una mancha de color rojo cereza en la fóvea; salvo que la isquemia dure poco tiempo, el paciente quedará ciego.

10 **D** La oftalmía simpática es una variante infrecuente, pero devastadora, de uveítis, que puede complicar los traumatismos oculares penetrantes. Se produce por la liberación de un antígeno secuestrado en un ojo, que determina una respuesta inmunitaria con reacción inflamatoria en el ojo contralateral. Para prevenir esta complicación, es preciso extirpar el ojo traumatizado antes de que se inicie la inflamación en el otro ojo. Los traumatismos por sí solos no pueden provocar este espectro de hallazgos. Louis Braille, el creador del alfabeto que lleva su nombre para la lectura de textos mediante el tacto, sufrió un traumatismo ocular que indujo una oftalmía simpática. La infección por *Aspergillus* no suele diseminarse en pacientes inmunocompetentes ni se asocia típicamente a traumatismos oculares. La sarcoidosis puede afectar al ojo, pero las lesiones coroideas son infrecuentes. La distrofia de Fuchs es un trastorno hereditario con afectación del endotelio corneal.

11 **C** La masa pigmentada uveal es un melanoma que produjo desprendimiento de la retina, porque la masa separó la retina suprayacente. Después de la piel, el ojo es el lugar de origen más frecuente del melanoma primario. Se trata del tumor intraocular maligno más frecuente en adultos. Los melanomas de úvea pueden afectar a la coroides, el iris o el cuerpo ciliar. A menudo son pigmentados. Además de producir un desprendimiento de retina, como sucede en este caso, pueden producir una

hemorragia coroidea o edema macular. La uveítis granulomatosa puede ser secundaria a sarcoidosis, pero la inflamación no produce una masa de gran tamaño. La retinopatía hipertensiva puede producir hemorragias pequeñas. Los traumatismos oculares pueden provocar un desprendimiento de retina, pero no una masa; los traumatismos pueden ser origen también de una respuesta autoinmunitaria, que se denomina *oftalmía simpática* con inflamación del ojo contralateral, pero no se asocian a masa. El retinoblastoma suele afectar a niños, pero el tumor no es pigmentado. La toxoplasmosis puede producir pequeños focos de inflamación, pero no una masa.

12 **D** La retinopatía hipertensiva es consecuencia de una hipertensión mantenida con cambios progresivos que debutan con una estenosis generalizada de las arteriolas y evolucionan a lesiones como las que se muestran en este ejemplo. La carga de presión causada por la hipertensión sistémica determina hipertrofia e insuficiencia del lado izquierdo del corazón. La retinopatía ateroesclerótica produce cambios vasculares, como los repliegues arteriovenosos y la arterioloesclerosis hialina con presencia de arteriolas en «hilo de cobre» o «hilo de plata». El edema cerebral puede producir edema de papila. La retinopatía diabética se asocia a diversos hallazgos, entre los que destacan los microaneurismas capilares, las manchas algodonosas, la hialinización de las arteriolas y los cambios más graves de la retinopatía proliferativa con neovascularización. El término retinitis pigmentaria describe una serie de alteraciones que aparecen como un trastorno hereditario, que puede debutar en fases tardías de la vida (aunque suelen aparecer más pronto), y produce una palidez cérea de la papila óptica.

13 **C** La figura muestra una retinopatía proliferativa con neovascularización secundaria a una diabetes mellitus de larga evolución. En la diabetes pueden aparecer otros cambios oculares, como hemorragias, hialinización de las arteriolas, manchas algodonosas y fibroplasia. La insuficiencia renal y la enfermedad cardiovascular de este paciente son típicas de la diabetes mellitus. Este hallazgo en el fondo de ojo no se encuentra en las enfermedades autoinmunitarias, la hemocromatosis, la hipertensión o la hiperlipidemia.

14 **D** Los datos clínicos que se describen sugieren un desprendimiento de retina, que se produce en una fase tardía de la retinopatía proliferativa asociada a la diabetes mellitus. La neovascularización produce una membrana con fibrosis, que aumenta la tracción sobre la retina y determina su desprendimiento súbito. Las úlceras dendríticas corneales sugieren una infección por el virus del herpes simple. La degeneración macular es una causa frecuente de disminución de la visión en ancianos, pero no se asocia a desprendimiento de retina. La retinitis pigmentaria es un proceso hereditario degenerativo, sin relación con la diabetes mellitus. Los melanomas de úvea pueden ser causa de desprendimiento de retina, pero no caracterizan a la diabetes mellitus.

15 **E** La fibroplasia retrocristalina es una complicación del parto prematuro y se produce por la toxicidad del oxígeno sobre la vasculatura renal inmadura, que se traduce en una neovascularización de la retina con crecimiento hacia el vítreo. Las superficiales laterales de la retina, que están vascularizadas de forma incompleta, suelen ser las más afectadas por la isquemia y por la consiguiente regulación al alza del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). En algunos casos se siguen produciendo cicatrices y aparece un desprendimiento de retina. Las cataratas afectan a personas ancianas. La queratomalacia es una característica de la deficiencia de vitamina A que se desarrolla en un tiempo más prolongado. La degeneración macular afecta a ancianos. La retinitis pigmentaria puede heredarse con distintos patrones y aparece en cualquier momento, desde la infancia a la ancianidad.

16 **B** En la drepanocitosis, los eritrocitos con forma de hoz pueden ocluir la microvasculatura retiniana cuando disminuye la tensión de oxígeno y los eritrocitos adoptan la morfología falciforme. Estas oclusiones vasculares pueden provocar hemorragias prerretinianas, intrarretinianas y subretinianas. La organización de las hemorragias prerretinianas puede traccionar sobre la retina y desprenderla. Las cataratas se suelen asociar al envejecimiento, aunque pueden ser secundarias a enfermedades sistémicas, como la galactosemia, la diabetes mellitus o la enfermedad de Wilson. El queratocono se caracteriza por un

adelgazamiento progresivo de la córnea sin inflamación, lo que determina una morfología anormal, más cónica que esférica, y ocasiona un astigmatismo importante. Esta tipo de degeneración corneal puede producirse de forma esporádica o asociarse a enfermedades sistémicas, como el síndrome de Marfan. El glaucoma de ángulo cerrado secundario se debe a la inflamación de la úvea con consiguiente formación de una membrana neovascular, que bloquea la malla trabecular. La uveítis puede aparecer localmente o ser parte de una enfermedad sistémica, como la sarcoidosis.

17 **A** La tromboembolia desde el corazón enfermo a la arteria central de la retina produce un infarto retiniano difuso, que oculta la coroides vascular subyacente, salvo en los lugares en los que la retina es más delgada que la fóvea, porque allí parece roja en comparación con la retina pálida circundante. Las otras opciones enumeradas son típicamente procesos bilaterales. La retinitis por citomegalovirus se asocia a lesiones edematosas y hemorrágicas, y suele afectar a inmunodeprimidos. El glaucoma de ángulo cerrado primario aparece típicamente en ojos hipermétropes y algunos casos son agudos con dolor ocular en relación con el aumento de la presión intraocular. La retinopatía proliferativa puede asociarse a la diabetes mellitus, aunque el principal cambio es la neovascularización retiniana. La enfermedad de Tay-Sachs aparece en la lactancia y primera infancia, y se caracteriza por una mancha de color rojo cereza, porque la fóvea situada en el centro de la mácula está relativamente preservada. Contiene pocas células ganglionares, que contienen el producto de depósito.

18 **D** La enfermedad de Tay-Sachs es un trastorno congénito del metabolismo, autosómico recesivo, relacionado con una deficiencia de hexosaminidasa A, uno de los gangliósidos GM_2, que produce el depósito lisosómico de metabolitos intermedios en las células ganglionares de la retina y las neuronas neocorticales. La mancha rojo cereza es el área menos afectada, en la que la fóvea más delgada permite visualizar de forma más llamativa la coroides vascularizada que destaca sobre la retina pálida circundante afectada por el proceso. Las demás opciones son trastornos autosómicos recesivos que tienen poca

probabilidad de afectar al ojo. La mucopolisacaridosis de tipo I (síndrome de Hurler) con deficiencia de α-l-iduronidasa afecta fundamentalmente a los tejidos conjuntivos. La deficiencia de galactosilceramidasa es responsable de la enfermedad de Krabbe, una leucodistrofia que afecta a la sustancia blanca cerebral. La enfermedad de Gaucher por deficiencia de glucocerebrosidasa suele ser no neuropática. La deficiencia de glucosidasa lisosómica provoca la enfermedad de Pompe.

19 **E** La degeneración macular asociada al envejecimiento (DME) es la principal causa de pérdida de la visión en el mundo occidental. Sus estadios avanzados (DME exudativa o forma «húmeda» con neovascularización coroidea) se caracterizan por extensa neovascularización de la coroides, regulada por la producción local de VEGF. Los ensayos clínicos indican que los fármacos frente a VEGF reducen la neovascularización y la pérdida de visión. Ninguno de los demás factores enumerados afecta de forma significativa sobre la angiogenia.

20 **A** La degeneración macular se suele asociar a la edad (DME) y es la causa más frecuente de reducción de la visión en los ancianos. La ausencia de vasos retinianos en el centro de la mácula puede contribuir a esta enfermedad, porque la retina tiene unas elevadas exigencias metabólicas. La enfermedad puede provocar metaplasia fibrosa con cicatrización de la región macular, que provoca una pérdida permanente de la visión central. La mayor parte de los casos de DME pueden guardar relación con mutaciones hereditarias en el gen del *factor de complemento H (CFH),* que empeora por la exposición medioambiental, como el tabaquismo. La retinopatía proliferativa se caracteriza por neovascularización de la retina. El desprendimiento de retina puede ser una complicación de la retinopatía proliferativa diabética, pero no de la degeneración macular. La retinitis pigmentaria es un trastorno hereditario, que produce una palidez cérea característica de la papila óptica. La fibroplasia retrocristalina es una complicación del tratamiento con oxígeno en dosis altas de los neonatos (con frecuencia prematuros).

21 **E** La retinitis pigmentaria es una serie de alteraciones retinianas que se pueden heredar con diversos patrones, y la

progresión de la enfermedad es variable. La ceguera nocturna causada por la pérdida de los bastones fotorreceptores es un síntoma precoz. Más tarde también empiezan a degenerar los conos fotorreceptores y se produce ceguera. Se producen cambios vasculares en la retinopatía hipertensiva y arterioesclerótica, pero estos procesos suelen afectar a adultos mayores sin diferencia en los efectos sobre la visión diurna y nocturna. La degeneración macular afecta a ancianos y afecta primero a la visión central. La neovascularización es una característica de la retinopatía proliferativa diabética.

22 **B** Este lactante sufre una forma esporádica de retinoblastoma. Posiblemente ambas mutaciones afecten a los retinoblastos. El lactante no ha heredado la susceptibilidad a desarrollar un retinoblastoma dado que las dos copias del gen *RB* son normales en las células somáticas no afectadas (fibroblastos). Si este niño hubiera heredado una copia del gen *RB* mutado (o delecionado), todas las células del organismo tendrían solo una copia normal del gen *RB.* Los hermanos de este paciente no tienen un riesgo aumentado de desarrollar un retinoblastoma y el propio paciente no tiene más riesgo de sufrir un osteosarcoma. Por motivos parecidos, el riesgo de desarrollar un retinoblastoma en el ojo izquierdo no es superior al de la población general.

23 **D** El retinoblastoma es la neoplasia ocular maligna más frecuente en niños. Histológicamente se observan cúmulos de células cúbicas o cilíndricas bajas pequeñas azules alrededor de una luz central. Estos cúmulos se denominan *rosetas de Flexner-Wintersteiner,* como muestra la figura. Este tumor puede diseminarse a la órbita o siguiendo el nervio óptico. La mayor parte de los casos en niños son familiares por herencia de una mutación de *RB.* Los gliomas pueden afectar al nervio óptico en un niño, pero el patrón histológico no suele incluir las rosetas que muestra esta imagen. Los melanomas oculares afectan a adultos, tienen patrón de células poligonales o fusiformes y con frecuencia son pigmentados. Los meduloblastomas son tumores malignos cerebelosos de niños. Los retinoblastomas, los meduloblastomas y los neuroblastomas son todos tumores de células pequeñas azules y redondas de la infancia. Los adenocarcinomas y los carcinomas epidermoides son

infrecuentes en niños y es poco probable que sean intraoculares.

24 **E** El edema de papila se debe al aumento de la presión intracraneal producido por edema cerebral, por hemorragia intracraneal o por masas que crecen con rapidez. Este paciente posiblemente presente una hemorragia de los ganglios basales en relación con la hipertensión como factor de riesgo. Otra opción es un ictus hemorrágico secundario a una embolización, dado el antecedente de fibrilación auricular. Los pacientes tratados con anticoagulantes, que podrían administrarse tras una cirugía mayor, también tienen un riesgo aumentado de hemorragia intracraneal. La sangre que se acumula en el espacio subdural aumenta la presión intracraneal. La angiopatía amiloidea cerebral puede asociarse a la enfermedad de Alzheimer y producir una hemorragia intracraneal, pero este no es el riesgo en este caso. El glaucoma, con aumento de la presión intraocular, produce una excavación de la copa óptica (lo contrario del edema). La degeneración macular afecta con mayor gravedad a la fóvea. La neuritis óptica reduce la agudeza visual y suele ser una complicación de la esclerosis múltiple. Los schwannomas se originan en los nervios periféricos, incluidos los pares craneales, pero el nervio óptico en realidad es un tracto, una prolongación del diencéfalo del prosencéfalo. Por eso en el tracto óptico puede aparecer un glioma, pero no un schwannoma.

25 **C** El aumento de la presión intraocular con glaucoma parece provocar una pérdida de fibras nerviosas, lo que justifica el típico aspecto excavado de la papila óptica. Dado que no produce signos o síntomas precoces evidentes, es importante el cribado de la presión para detectarlo. El glaucoma se asocia a varias causas y existen varios fármacos para tratar la enfermedad. La hipertensión puede producir una retinopatía, pero no aumentar la presión intraocular. La homocistinuria es un cuadro infrecuente, que también aumenta el riesgo de ateroesclerosis. La hiperglucemia sugiere el diagnóstico de diabetes mellitus, que puede incrementar el riesgo de glaucoma. Puede conservarse la agudeza visual mientras progresa el glaucoma, y la mera pérdida de agudeza visual no identifica la causa.

CAPÍTULO

30

Repaso final y evaluación

1 Un hombre de 33 años presenta dolor torácico, diaforesis y disnea en las 6 h anteriores. En el servicio de urgencias, la troponina I sérica es 6 ng/ml. Otros hallazgos de laboratorio son hematocrito, 41%, hemoglobina A_{1c}, 4,2%; colesterol sérico total, 482 mg/dl; y triglicéridos séricos, 160 mg/dl. Una coronariografía urgente revela estenosis del 65% de la arteria circunfleja izquierda y del 70% de la arteria descendente anterior izquierda. Se somete a angioplastia con inserción de endoprótesis vasculares. Sufre una serie de ataques isquémicos transitorios 1 año después. También tiene dolor en las extremidades inferiores cuando camina más de 300 m. Recibe un fármaco que inhibe la HMG-CoA reductasa hepática. ¿Cuál de los siguientes receptores celulares es más probable que esté reducido en relación con la patogenia de su enfermedad de base?

A Acetilcolina
B Glucosa
C Hepcidina
D Insulina
E LDL

2 Una joven de 18 años ha tenido ataques repetidos de disnea en los últimos 10 años. Aparte de los ataques, no tiene problemas médicos. Es remitida al servicio de urgencias en la hora siguiente al inicio del último episodio. En la exploración física, la temperatura es 37,1 °C; frecuencia cardíaca, 110 latidos/min; frecuencia respiratoria, 28 respiraciones/min; y presión arterial, 110/70 mmHg. Se auscultan sibilancias espiratorias bilaterales en el tórax. Los estudios de función pulmonar muestran una limitación grave del flujo aéreo, que mejora con una inyección de adrenalina. El examen citológico del esputo pone de manifiesto moco abundante y un infiltrado inflamatorio con predominio de eosinófilos, pero mezclados con neutrófilos y macrófagos. ¿Cuál de los siguientes mecanismos inmunitarios es más probable que tenga importancia en la patogenia de su enfermedad?

A Activación de neutrófilos y macrófagos por IL-8
B Quimioatracción de los eosinófilos por exotoxina
C Proliferación del subgrupo T_H2 de los linfocitos T CD4+
D Reclutamiento de los monocitos por el interferón γ
E Estimulación de las células del músculo liso bronquial por ADAM-33



3 Un hombre de 64 años lleva 2 meses con diarrea mucosa de escaso volumen, con cinco deposiciones diarias acompañadas de dolores cólicos abdominales. En ocasiones, las heces muestran hebras de sangre. En la exploración física está pálido. Se realiza una colonoscopia; la figura muestra una imagen representativa de la mucosa intestinal desde el recto hasta la porción distal del colon sigmoide. El resto de la mucosa cólica parece normal. Las biopsias del colon afectado ponen de manifiesto distorsión de las criptas mucosas, abscesos focales de las criptas e infiltrados inflamatorios

mixtos que se extienden hasta la lámina propia. En los 2 años siguientes desarrolla poliartritis sin deformidad articular y uveítis. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que desarrolle también?

A Gastritis atrófica
B Dermatitis herpetiforme
C Orquitis
D Colangitis esclerosante primaria
E Artritis reumatoide
F Tiroiditis

4 Una mujer de 26 años previamente sana ha desarrollado fiebre y un exantema macular eritematoso difuso y generalizado parecido a las quemaduras solares en el día anterior. Los ciclos menstruales son regulares. Tiene náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, mialgias, odinofagia, cefalea y mareo. En la exploración física la temperatura es 39,4 °C; frecuencia cardíaca, 101 latidos/min; frecuencia respiratoria, 23 respiraciones/min; y presión arterial, 90/40 mmHg. Presenta hiperemia bucofaríngea y conjuntival. La mucosa vaginal está eritematosa. En la cúpula de la vagina se encuentra un tampón. Está desorientada, pero no hay déficits neurológicos focales. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 13,5 g/dl; hematocrito, 41,4%; plaquetas, 100.000/mm^3; leucocitos, 13.200/mm^3; glucosa, 70 mg/dl; creatinina, 2,5 mg/dl; bilirrubina total, 2,4 mg/dl; AST, 82 U/l; y ALT, 29 U/l. Recibe nafcilina con clindamicina y mejora, pero a los 10 días se observa descamación de las membranas mucosas. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que elabore la toxina causante de estos hallazgos?

A *Bacillus anthracis*
B *Clostridium perfringens*
C *Enterococcus*
D *Listeria monocytogenes*
E *Staphylococcus aureus*
F *Vibrio vulnificus*

5 Encuentran inconsciente a un joven de 19 años y lo llevan a urgencias. En la exploración física, la temperatura es 41,2 °C; frecuencia cardíaca, 103 latidos/min; frecuencia respiratoria, 27 respiraciones/min, superficiales; y presión arterial, 145/100 mmHg.

Desarrolla una arritmia cardíaca intratable y muere. En la autopsia, el corazón está discretamente aumentado de tamaño; al microscopio, las arterias coronarias distales se encuentran engrosadas. Los cortes del encéfalo revelan un área de hemorragia de 2 cm en el lóbulo parietal superior derecho y otra de 0,5 cm en el bulbo. Hay un área de 1 cm parcialmente quística de color marrón en el lóbulo frontal anterior izquierdo. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que haya causado este cuadro clínico?

A Barbitúricos
B Cocaína
C Etanol
D Heroína
E Marihuana
F Metanfetamina
G Fenciclidina

6 Un hombre de 49 años presenta progresivo creciente en rodillas y caderas desde hace 10 años. El dolor es máximo al final del día. En el último año, cada vez está más adormilado en el trabajo. Su esposa refiere que es un «campeón del ronquido». En el último mes ha sufrido ataques de dolor agudo tipo cólico en el hipocondrio derecho. En la exploración física, la temperatura es 37 °C; frecuencia cardíaca, 82 latidos/min; frecuencia respiratoria, 10 respiraciones/min; y presión arterial, 140/85 mmHg. Mide 175 cm y pesa 156 kg (índice de masa corporal: 51). Las pruebas de laboratorio muestran glucosa de 139 mg/dl; HbA_{1c}, 10; colesterol total, 229 mg/dl; y colesterol de HDL, 33 mg/dl. Una gasometría arterial revela un pH de 7,35; Pco_2, 50 mmHg; y Po_2, 75 mmHg. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que presente también este hombre?

A Tiroiditis de Hashimoto
B Miocardiopatía hipertrófica
C Papilomatosis laríngea
D Hepatopatía grasa no alcohólica
E Enfisema panlobulillar
F Artritis reumatoide

7 Un hombre de 70 años presenta pérdida de memoria y menor capacidad para realizar las actividades de la vida diaria en los

últimos 2 años. Cada vez tolera peor el esfuerzo y tiene problemas para respirar desde hace 1 año. En la exploración física, la auscultación del tórax revela estertores en las bases pulmonares y un soplo diastólico. La sensibilidad al tacto y el pinchazo está muy disminuida en las extremidades inferiores. La marcha es atáxica, con los pies muy separados. No es capaz de nombrar ninguno de los tres objetos a los 3 min. Cree que es un astronauta de vuelta de Marte. Un ecocardiograma pone de manifiesto insuficiencia aórtica con ensanchamiento de la raíz y el cayado de la aorta. La RM encefálica revela atrofia cortical difusa leve y engrosamiento meníngeo. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es el causante más probable de los hallazgos?

A *Borrelia burgdorferi*
B Virus de Coxackie B
C VIH
D *Mycobacterium leprae*
E *Mycobacterium tuberculosis*
F *Treponema pallidum*
G Virus del Nilo occidental

8 Una joven de 19 años presenta súbitamente dolor abdominal y lumbalgia intensos y disnea. Ha tenido episodios similares en los últimos 12 años. Sufrió una osteomielitis de la cadera izquierda hace 1 año; el cultivo del hueso resultó positivo para *Salmonella enteritidis.* En la exploración física tiene taquicardia. La palpación del abdomen revela dolor difuso con rigidez de la musculatura abdominal sin masas aparentes. La TC torácica pone de manifiesto venas pulmonares prominentes sin infiltrados. Una TC abdominal muestra la presencia de múltiples cálculos de 0,5 a 1 cm en la vesícula biliar, bazo muy pequeño y venas hepáticas prominentes. En el hemograma, la hemoglobina es 10,2 g/dl; hematocrito, 30,9%; VCM, 99 μm^3; ADE, 22; plaquetas, 189.300/mm^3; y leucocitos, 6.320/mm^3. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable encontrar en este caso?

A Amilasa, 694 U/l
B Anticuerpos anticardiolipina
C Calcio, 12,3 mg/dl
D Colesterol, 250 mg/dl
E Haptoglobina, 1 mg/dl

F Triglicéridos, 1.140 mg/dl

9 Un hombre de 49 años solicita una medicación para la disfunción eréctil. Mide 168 cm y pesa 93 kg (índice de masa corporal de 33). En la exploración física se encuentran soplos carotídeos bilaterales y una masa pulsátil abdominal palpable en la línea media. Las extremidades inferiores tienen menos vello y hay una úlcera superficial de 1 cm en la piel situada por encima de la cabeza del primer metatarso. La sensibilidad al tacto y pinchazo es menor en las extremidades inferiores. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 12,9 g/dl; hematocrito, 42%; leucocitos, 8.950/mm^3; y creatinina, 1,7 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que esté presente en este hombre?

A Bandas de IgG oligoclonales en el LCR

B Hemoglobina A_{1c}, 8,8%

C ACTH plasmática, 119 pg/ml

D Homocisteína plasmática, 23 μmol/l

E Anticuerpos séricos contra las células parietales



10 Un lactante de 10 meses no está alcanzando los hitos del desarrollo y se sitúa por debajo del peso y la talla ideales. Los padres observaron un episodio de convulsiones hace 1 semana. En la exploración física, el lactante tiene hepatoesplenomegalia y adenopatías no dolorosas generalizadas. Hay dolor a la palpación

en la extremidad superior derecha. No se encuentran déficits neurológicos focales, pero la atención y el movimiento están reducidos. Una radiografía del brazo derecho muestra una fractura en vías de consolidación. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 9,7 g/dl; hematocrito, 28,4%; plaquetas, 76.700/mm^3; leucocitos, 4.200/mm^3; glucosa, 78 mg/dl; y creatinina 0,4 mg/dl. Se realiza una biopsia de médula ósea y la figura muestra su imagen microscópica. ¿Cuál de las siguientes enzimas es más probable que esté prácticamente ausente en este lactante?

A α-l-iduronidasa
B α-1,4-glucosidasa
C Arilsulfatasa A
D Glucocerebrosidasa
E Hexosaminidasa A
F Esfingomielinasa

11 Un hombre de 54 años lleva 6 meses con náuseas, pero no refiere hematemesis. Presenta malestar general progresivo. En la exploración física tiene menor sensibilidad al tacto y el pinchazo en ambas extremidades inferiores. Muestra una ataxia leve al caminar. Una endoscopia digestiva alta revela la ausencia de pliegues rugosos gástricos, sin úlceras ni masas. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que se detecte en las siguientes pruebas complementarias?

A Anticuerpos anti-Smith positivos
B Déficit de factor V
C Anticuerpos positivos frente a *Helicobacter pylori*
D VCM, 125 μm^3
E Glucosa en orina, 4+

12 Un hombre galés de 46 años ha tenido artritis progresiva en las manos, rodillas, caderas y codos en los últimos 3 años. Presenta ortopnea y edema en los pies cada vez más importantes desde hace 1 año. En la exploración física, la amplitud del movimiento de las articulaciones de las piernas está reducida, pero no hay deformidades, calor ni tumefacción aparentes en las mismas. Aunque casi nunca está al aire, la piel tiene un tono pardo. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 13,7 g/dl; hematocrito, 40,8%; VCM, 90 μm^3; plaquetas, 213.500/mm^3; leucocitos, 6.690/mm^3; glucosa, 201 mg/dl; creatinina, 1,2 mg/dl; y

calcio, 8,2 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que esté alterada por una mutación génica y explique estos hallazgos?

A β-globina
B Glucocinasa
C Receptor de LDL
D HFE
E TNF

13 Una mujer de 33 años presenta letargo progresivo y sensibilidad a la luz solar desde hace 8 meses. Tiene dolor en las manos, codos, rodillas y pies, y mialgias en los brazos y piernas. En la última semana nota disnea creciente. La exploración física no revela deformidad, tumefacción ni rubor en las articulaciones. En la auscultación del tórax se escucha un roce. La radiografía de tórax pone de manifiesto derrame pleural bilateral. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 11,6 mg/dl; hematocrito, 34,3%; VCM, 84 μm^3; plaquetas, 133.400/mm^3; leucocitos, 4.610/mm^3; glucosa, 80 mg/dl; creatinina, 2,4 mg/dl; y calcio, 7,9 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio sería más útil para diagnosticar su enfermedad de base?

A Anticuerpos antirreceptores de acetilcolina
B Anticuerpos anti-ADN topoisomerasa
C Anticuerpos contra la membrana basal glomerular
D Anticuerpos antimicrosómicos
E Anticuerpos antimitocondriales
F Anticuerpos antinucleares

14 Una mujer de 31 años lleva 2 meses con fiebre persistente. La temperatura oscila entre 38,3 y 38,6 °C en numerosas ocasiones. En la exploración física tiene dolor abdominal difuso y esplenomegalia leve, sin hepatomegalia ni adenopatías. Las pruebas de laboratorio muestran Hb de 13,2 g/dl; hematocrito, 39,8%; VCM, 93 μm^3; plaquetas, 242.000/mm^3; y leucocitos, 12.290/mm^3, con el 71% de neutrófilos, el 19% de linfocitos y el 10% de monocitos. Una TC abdominal revela una masa pélvica mal delimitada de densidad correspondiente a tejidos blandos con un centro transparente moteado y una pequeña área cuadrangular radiopaca. La anamnesis pone de manifiesto que hace 3 meses se realizó una ovariosalpingectomía izquierda por embarazo ectópico.

¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de la fiebre persistente?

A Absceso
B Linfoma no hodgkiniano
C Cistoadenocarcinoma ovárico
D Sarcoidosis
E Enfermedad inflamatoria pélvica



15 Una mujer de 52 años presenta cansancio con el esfuerzo, mareo y episodios sincopales de 3 meses de evolución. Le cuesta mantener los ojos abiertos al final del día y tiene visión doble. En la exploración física está afebril y muy pálida, pero no se aprecia hepatoesplenomegalia ni adenopatías. La fuerza motora disminuye con los movimientos repetitivos, sin atrofia muscular aparente ni deformidad, dolor o rubor en las articulaciones. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 6,6 g/dl; hematocrito, 19,9%; plaquetas, 199.800/mm^3; leucocitos, 4.780/mm^3; y reticulocitos, 0,1%. Una biopsia de médula ósea pone de manifiesto que la eritropoyesis está muy reducida. La figura muestra una TC torácica. ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio serológicas es más probable que esté presente en esta mujer?

A Anticuerpos antirreceptores de acetilcolina
B Anticuerpos anti-ADN topoisomerasa
C Anticuerpos frente a la membrana basal glomerular
D Anticuerpos antimitocondriales
E Anticuerpos antinucleares

16 Un hombre de 24 años previamente sano ha desarrollado tos con esputos sanguinolentos y disminución de la diuresis con orinas oscuras en los últimos 2 días. Fuma un paquete de cigarrillos al día y trabaja como técnico de anatomía patológica. La radiografía de tórax muestra infiltrados difusos más pronunciados en los lóbulos inferiores. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 13,7 g/dl; hematocrito, 40,6%; VCM, 91 μm^3; plaquetas, 361.000/mm^3; leucocitos, 7.385/mm^3; creatinina, 3,8 mg/dl; nitrógeno ureico, 36 mg/dl; y glucosa, 75 mg/dl. La ecografía abdominal pone de manifiesto riñones de tamaño normal. Una biopsia renal revela glomerulonefritis semilunar. ¿Cuál de los siguientes mecanismos patológicos es más probable que haya producido la enfermedad pulmonar de este paciente?

A Anticuerpos dirigidos contra el colágeno de la membrana basal
B Apoptosis inducida por linfocitos CD8+
C Activación del complemento por complejos antígeno-anticuerpo circulantes
D Activación de macrófagos por linfocitos CD4+
E Liberación de mediadores inflamatorios por los mastocitos

17 Un hombre de 58 años refiere aumento del perímetro abdominal y disminución de la libido en los últimos 7 meses. La exploración física muestra aumento del tamaño del abdomen con oleada ascítica, sin dolor ni masas; la punta del bazo es palpable. En la auscultación del tórax se escuchan crepitantes en ambas bases. Hay edema con fóvea 1+ hasta las rodillas. Los testículos son más pequeños de lo normal, sin masas. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 12,2 g/dl; hematocrito, 36,9%; VCM, 103 μm^3; plaquetas, 189.400/mm^3; leucocitos, 5.762/mm^3; creatinina, 1,1 mg/dl; glucosa, 88 mg/dl; proteínas totales, 5,7 g/dl; albúmina, 2,7 g/dl; AST, 167 U/l; ALT, 69 U/l; fosfatasa alcalina, 48 U/l; bilirrubina total, 1,5 mg/dl; y tiempo de protrombina, 23 s. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Atrofia suprarrenal
B Estenosis de la válvula aórtica
C Gastritis autoinmunitaria
D Glomerulonefritis crónica
E Miocardiopatía hipertrófica
F Cirrosis micronodular

18 Una mujer de 72 años con bronquitis crónica segundaria a tabaquismo ha estado encamada en las últimas 2 semanas. Presenta disnea súbita intensa con dolor torácico. En la exploración, la temperatura es 37 °C; frecuencia cardíaca, 104 latidos/min; frecuencia respiratoria, 31 respiraciones/min; y presión arterial, 100/60 mmHg. La pierna izquierda está tumefacta y dolorosa al levantarla. La paciente está cianótica. En la región pulmonar se ausculta un tono de eyección sistólico y soplo diastólico. La radiografía de tórax revela un borde derecho prominente del corazón. Las pruebas de laboratorio muestran aumento del dímero D. Después, la paciente desarrolla debilidad de la pierna derecha. Una RM encefálica muestra un infarto en sus etapas iniciales en el hemisferio izquierdo. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías explica mejor estos hallazgos?

A Pericarditis constrictiva
B Miocardiopatía dilatada
C Defecto del tabique ventricular
D Endocarditis infecciosa
E Cardiopatía reumática

19 Una mujer de 24 años desarrolla dolor en la hemicara derecha en las últimas 24 h. Ha perdido 5 kg de peso en los 6 meses anteriores a pesar de una mayor ingesta calórica. En la exploración física hay tumefacción con dolor intenso a la palpación en el maxilar derecho, exoftalmos derecho, dolor abdominal difuso, escasa turgencia de la piel y sequedad de las mucosas. La temperatura es 37,7 °C. Tiene taquicardia sin soplos y taquipnea; en los campos pulmonares no se auscultan ruidos sobreañadidos. Las pruebas de laboratorio muestran Na^+ de 131 mmol/l; K^+, 4,6 mmol/l; Cl^-, 92 mmol/l; CO_2, 9 mmol/l; glucosa, 481 mg/dl; y creatinina, 1 mg/dl. Una gasometría arterial pone de manifiesto pH de 7,2; Po_2, 98 mmHg; Pco_2, 28 mmHg; y HCO_3^-, 10 mmol/l. Se realiza una punción-aspiración con aguja fina de la región maxilar

derecha. ¿Qué microorganismo es más probable encontrar en este aspirado?

A *Actinomyces israelii*
B *Bacillus anthracis*
C Citomegalovirus
D *Clostridium perfringens*
E *Cryptococcus neoformans*
F *Mucor circinelloides*

20 Se realiza un estudio de infertilidad en un hombre de 31 años. Tiene aspermia. También presenta diarrea crónica con aumento cuantitativo de la grasa en las heces. Desde el inicio de la infancia ha sufrido infecciones de repetición graves de las vías respiratorias. En el período neonatal tuvo una obstrucción intestinal por íleo meconial. ¿Cuál de los genes siguientes es más probable que esté mutado en este paciente?

A *CFTR*
B *FGFR*
C *G6PD*
D *HFE*
E *NF1*
F *p53*

21 En una comunidad, el médico local evalúa a niños de 6 a 10 años con mal rendimiento escolar, que ha sido atribuido a problemas de conducta. Sus padres refieren que esos niños tienen poco apetito, se quejan de náuseas y tienen cefaleas frecuentes. En la exploración física, muestran menor sensibilidad táctil en las extremidades inferiores. Presentan una pérdida del control motor fino del movimiento y su marcha es ligeramente atáxica. Un hemograma representativo revela hemoglobina de 11,8 g/dl; hematocrito, 35,2%; VCM, 82 μm^3; plaquetas, 282.300/mm^3; y leucocitos, 4.745/mm^3. El examen del frotis de sangre periférica pone de manifiesto un punteado basófilo en los eritrocitos. ¿Cuál de las sustancias siguientes es más probable que hayan ingerido de forma crónica como causa de estas alteraciones?

A Cadmio
B Cobre
C Hierro
D Plomo

E Níquel

22 Una mujer de 45 años previamente sana lleva 2 meses con tos crónica seca. Hace 1 semana, la tos se volvió productiva con esputos veteados de sangre. No fuma. La exploración física pone de manifiesto una temperatura de 37,5 °C y una presión arterial de 140/90 mmHg. En la auscultación se aprecian crepitantes bilaterales en los pulmones. La radiografía de tórax revela infiltrados nodulares y cavitados bilaterales, sin masas. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 11,7 g/dl; hematocrito, 35,2%; plaquetas, 217.000/mm^3; leucocitos, 6.330/mm^3; glucosa sérica, 72 mg/dl; creatinina, 2,6 mg/dl; y nitrógeno ureico, 25 mg/dl. En el análisis de orina se encuentra proteinuria 1+, hematuria 2+, y ausencia de glucosa y cetonas. Una biopsia transbronquial pone de manifiesto vasculitis granulomatosa necrosante de los capilares alveolares y arterias pulmonares periféricas pequeñas. El examen microscópico de una biopsia renal arroja una imagen de glomerulonefritis con semilunas. ¿Cuál de las siguientes pruebas serológicas es más probable que resulte positiva en esta mujer?

A Anticuerpos anti-ADN topoisomerasa I
B Anticuerpos antimembrana basal glomerular
C Anticuerpos anti-Jo-1
D Anticuerpos antimitocondriales
E Autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos
F Anticuerpos anti-ADN bicatenario
G Anticuerpos antirribonucleoproteína

23 Un hombre de 52 años tiene la enfermedad de Crohn desde hace 20 años. En los últimos 14 meses presenta cansancio progresivo con edemas periféricos progresivos. La exploración física revela edema con fóvea hasta las rodillas. Las pruebas de laboratorio muestran nitrógeno ureico de 35 mg/dl y creatinina de 3,8 mg/dl. En el análisis de orina hay proteinuria sin hematuria, glucosuria ni cetonuria. Una biopsia renal pone de manifiesto depósitos de material rosado amorfo en los glomérulos, las arteriolas y el intersticio peritubular. Con el microscopio electrónico se observa que esos depósitos rosados están compuestos por fibrillas no ramificadas de 7,5 a 10 nm. ¿Cuál de las siguientes proteínas es más probable que forme esas fibrillas?

A Asociada al amiloide
B Péptido natriurético auricular
C β_2-microglobulina
D Calcitonina
E Cadenas ligeras λ
F Transtiretina

24 Un hombre de 40 años ha presentado candidiasis oral, fiebre y diarrea en el último año. En la exploración física tiene atrofia muscular. Su peso es el 70% del normal para su talla y edad. Presenta adenopatías generalizadas no dolorosas, sin hepatoesplenomegalia. En los últimos 3 meses ha desarrollado tres lesiones cutáneas irregulares y nodulares de 1-2 cm y color morado rojizo en el antebrazo. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 12,2 g/dl; hematocrito, 36,5%; VCM, 85 μm^3; plaquetas, 188.000/mm^3; y leucocitos, 2.460/mm^3, con el 82% de neutrófilos, el 4% de cayados, el 6% de linfocitos, el 6% de monocitos y el 2% de eosinófilos. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que cause la infección responsable de estos hallazgos?

A Virus de la hepatitis C
B Virus herpes simple
C VIH
D *Mycobacterium leprae*
E *Staphylococcus aureus*
F *Streptococcus pyogenes*

25 Un hombre de 30 años presenta dolor articular en la cadera derecha y el codo izquierdo, junto con cefalea, en la última semana. Hace 1 mes tuvo un dolor similar en la cadera y rodilla izquierdas, que cedió lentamente. Recuerda haber tenido un exantema cutáneo en forma de anillo en el muslo izquierdo hace 4 meses, tras una acampada en los bosques de Connecticut. En la exploración física hay dolor articular a la palpación, sin tumefacción ni deformidad de la cadera derecha y el codo izquierdo. La frecuencia cardíaca es ligeramente irregular. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es más probable que esté produciendo esos hallazgos?

A *Borrelia burgdorferi*
B *Mycobacterium tuberculosis*

C *Streptococcus pyogenes*
D *Staphylococcus aureus*
E *Yersinia enterocolitica*



26 Un hombre de 63 años se ha vuelto más retraído, menos hablador y menos activo en los últimos 3 años. En este momento pasa la mayor parte del día en la cama, aunque apenas tiene dificultades para moverse. En la exploración física presenta una fuerza motora de 5/5 en todas las extremidades; no hay temblor ni ataxia aparentes. No se aprecian déficits neurológicos focales. Solo es capaz de recordar uno de tres objetos a los 3 min. Está deprimido. Su estado mejora con el uso de un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Un año después tiene un episodio de aspiración al comer y fallece 1 semana después por neumonía. En la autopsia, el encéfalo pesa 1.000 g. La figura muestra su imagen macroscópica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos microscópicos es más probable que se observe en la corteza frontal?

A Depósitos de amiloide Aβ
B Ausencia de células de Betz
C Células de Alzheimer de tipo II
D Arterioloesclerosis
E Neuronas rojas
F Cambio espongiforme

27 Un hombre de 51 años presenta apatía creciente en el último año. En la exploración física, la presión arterial es 165/100 mmHg. Tiene deformidad y menor amplitud de la movilidad articular en las tres primeras articulaciones metacarpofalángicas (MCF) de la mano derecha y las dos primeras articulaciones MCF de la izquierda. Hay un nódulo firme indoloro de 2 cm en la bolsa del olécranon izquierdo. En la hélice de la oreja derecha se palpa un nódulo similar de 1 cm y otro de 1,5 cm sobre el tendón de Aquiles derecho. El análisis de orina revela densidad de 1,012; pH, 5,5; hematuria, 1+; proteinuria, 1+; y ausencia de glucosa. La concentración de nitrógeno ureico sérico es 31 mg/dl, y la creatinina, 3,2 mg/dl. Se realiza una punción-aspiración de material del nódulo situado en el codo izquierdo. ¿Cuál de los siguientes tipos de cristales es más probable que se encuentre en el examen microscópico de este aspirado?

A Pirofosfato cálcico dihidratado
B Colesterol
C Cistina
D Hidroxiapatita
E Urato sódico

28 Una mujer de 38 años presenta malestar general y artralgias desde hace 14 meses. En la exploración física tiene ictericia escleral y áreas de 1-3 cm de color morado rojizo en la piel. Varias de esas áreas muestran úlceras focales. Las pruebas de laboratorio muestran proteínas totales de 7,1 g/dl; albúmina, 3,3 g/dl; AST, 127 U/l; ALT, 145 U/l; fosfatasa alcalina, 80 U/l; bilirrubina total, 4 mg/dl; y bilirrubina directa, 3,1 mg/dl. Las pruebas serológicas arrojan un resultado positivo para anti-VHC y negativo para anti-HBs e IgM anti-VHA. El análisis de orina revela proteinuria 4+ y hematuria 1+. La TC abdominal pone de manifiesto una pequeña cantidad de ascitis, hepatomegalia leve y ausencia de esplenomegalia y adenopatías. La biopsia de una lesión cutánea ulcerada muestra vasculitis leucocitoclástica en la dermis superior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Anemia hemolítica autoinmunitaria
B Carcinoma hepatocelular
C Hemocromatosis hereditaria
D Crioglobulinemia mixta

E Mieloma múltiple



29 Una mujer de 22 años sufre un politraumatismo cerrado con fracturas en ambos fémures y el húmero derecho por una caída. Las fracturas se tratan con reducción abierta y fijación interna. Permanece estable hasta 3 días después, momento en que presenta confusión creciente y entra en coma. En la exploración física no hay fiebre. La TC craneal revela edema encefálico generalizado. La figura muestra una imagen macroscópica representativa del encéfalo. Una punción lumbar pone de manifiesto LCR transparente sin eritrocitos, un leucocito mononuclear, y glucosa y proteínas normales. La glucosa sérica es 102 mg/dl, y la creatinina, 0,9 mg/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Mielinólisis central pontina
B Lesión axónica difusa
C Embolia grasa
D Rotura de aneurisma sacular
E Abscesos por *Staphylococcus aureus*
F Meningitis vírica

30 Un proyecto de investigación traslacional está dedicado al desarrollo de un compuesto farmacológico que afecte a las vías de señales moleculares entre las células. Este compuesto se une al receptor de TNF de tipo 1 (TNFR1), lo que desencadena la

activación de las caspasas intracelulares. ¿Para qué enfermedad es más probable que resulte útil este fármaco?

A Adenocarcinoma
B Ateroesclerosis
C Bronquiectasias
D Cirrosis
E Demencia
F Osteoporosis



31 Una mujer de 32 años ha observado un deterioro de la destreza y fuerza de la mano derecha en su trabajo como mecánica de automóviles durante los últimos 2 años. Hace 1 año sufrió una sensación quemante dolorosa en la extremidad superior izquierda. Tuvo un episodio de reducción de la agudeza visual en el ojo izquierdo que duró 3 días. Ha perdido la sensibilidad al calor. En la

exploración física no hay fiebre y la presión arterial es normal. La fuerza de la extremidad derecha es 4/5, pero llega a 5/5 en el resto. La visión es 20/100 en el ojo izquierdo y 20/40 en el derecho. Un año después refiere estreñimiento crónico e incontinencia. La figura muestra una imagen de resonancia magnética del encéfalo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Diabetes mellitus
B Enfermedad de Graves
C Infección por el VIH
D Esclerosis múltiple
E Miastenia grave
F Lupus eritematoso sistémico

32 Una mujer de 32 años cuya gestación cursa sin complicaciones da a luz a término. La exploración física del recién nacido revela una pequeña depresión en la piel de la región lumbar baja con un mechón de pelo sobresaliente. Una radiografía pone de manifiesto que en la vértebra L4 subyacente no se han cerrado los arcos posteriores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Malformación de Arnold-Chiari
B Malformación de Dandy-Walker
C Mielomeningocele
D Espina bífida oculta
E Esclerosis tuberosa

33 Una mujer de 22 años es diagnosticada de trastorno bipolar. En el año siguiente desarrolla manifestaciones neurológicas consistentes en temblor de reposo e intencional, rigidez, corea, disfagia y disartria. En la exploración física hay signo de Babinski bilateral. Se encuentran depósitos en anillo de un material verde en ambas córneas, pero su visión no está reducida. Un año después presenta una enfermedad de 3 semanas de duración, con náuseas, vómitos, malestar general e ictericia escleral. Las pruebas de laboratorio en el suero muestran AST de 100 U/l; ALT, 122 U/l; fosfatasa alcalina, 105 U/l; bilirrubina total, 4,5 mg/dl; glucosa, 77 mg/dl; y creatinina, 0,9 mg/dl. Las pruebas serológicas de hepatitis A, B y C resultan negativas. Este episodio cede sin tratamiento, pero acaba desarrollando cirrosis. ¿Cuál de los productos siguientes es más probable que esté alterado en esta paciente por una mutación génica?

A α_1-antitripsina
B *CFTR*
C ATPasa transportadora de cobre
D Galactosa-1-fosfato uridiltransferasa
E Glucocerebrosidasa
F Glucosa-6-fosfatasa



34 Una mujer de 57 años pierde el conocimiento bruscamente. Tiene antecedentes de hipertensión no tratada y lleva 40 años fumando un paquete de cigarrillos al día. En la exploración física, la temperatura es 37,1 °C; frecuencia cardíaca, 70 latidos/min, irregular; frecuencia respiratoria, 18 respiraciones/min; y presión arterial, 90/40 mmHg. Los pulsos carotídeos y radiales están reducidos comparados con los femorales y tibiales posteriores. La auscultación torácica revela tonos cardíacos apagados; los campos pulmonares están limpios. La radiografía de tórax muestra ensanchamiento del mediastino. La figura ilustra la TC torácica con contraste. Se realiza una pericardiocentesis y hay sangre en el líquido aspirado. ¿Qué trastorno es más probable que produzca estos hallazgos?

A Disección de la aorta
B Válvula aórtica bicúspide
C Carcinoma anaplásico de células pequeñas
D Arteritis de Takayasu
E Sífilis terciaria
F Tromboangitis obliterante

35 Una mujer de 62 años tiene tos crónica y disnea progresiva desde hace 10 años. Una radiografía de tórax realizada hace 1 año mostraba mayor radiotransparencia de los campos pulmonares superiores y aplanamiento bilateral de las cúpulas diafragmáticas. Lleva 6 meses con náuseas y molestias abdominales mal definidas. La biopsia de una endoscopia digestiva alta muestra gastritis crónica inespecífica sin *Helicobacter pylori* detectable. En el último mes ha eliminado orina de color rojo en varias ocasiones. El examen cistoscópico pone de manifiesto una masa exofítica de 3 cm en la cúpula de la vejiga y la biopsia revela un carcinoma urotelial. ¿Cuál es el factor de riesgo más probable para este conjunto de hallazgos?

A Déficit de α_1-antitripsina
B Alcoholismo crónico
C Fumar cigarrillos
D Exposición a anilinas
E Déficit de vitamina C

36 Una mujer de 42 años presenta debilidad progresiva, náuseas, vómitos, diarrea acuosa y pérdida de 5 kg de peso en los últimos 7 meses. Tiene debilidad muscular generalizada, atrofia muscular y aumento de la pigmentación cutánea en la exploración física. Tras una infección de las vías respiratorias superiores que duró 1 semana, desarrolla dolor abdominal y pérdida de conocimiento, y entra en coma. La temperatura es 36,9 °C; frecuencia cardíaca, 83 latidos/min; frecuencia respiratoria, 17 respiraciones/min, superficiales; y presión arterial, 80/40 mmHg. Las pruebas de laboratorio muestran Na^+ de 129 mmol/l; K^+, 3,5 mmol/l; Cl^-, 95 mmol/l; CO_2, 23 mmol/l; glucosa, 48 mg/dl; y creatinina, 0,6 mg/dl. ¿Cuál de los tejidos siguientes es más probable que presente atrofia?

A Corteza suprarrenal
B Hipotálamo

C Islotes de Langerhans
D Células C parafoliculares tiroideas
E Glándula pineal
F Epitelio tiroideo

37 Un hombre de 39 años refiere disminución de la libido en los últimos 4 meses. La revisión por sistemas indica que ha tenido cefaleas frecuentes en los 2 meses anteriores. En la exploración física está normotenso, tiene ginecomastia bilateral, testículos de tamaño normal en el escroto y muestra problemas de visión periférica. La agudeza visual es 20/20 en ambos ojos. Las pruebas de laboratorio muestran Na^+ de 141 mmol/l; K^+, 4,1 mmol/l; Cl^-, 102 mmol/l; CO_2, 25 mmol/l; glucosa, 75 mg/dl; y creatinina, 1,2 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes neoplasias es más probable que tenga?

A Prolactinoma
B Tumor carcinoide
C Carcinoma medular
D Feocromocitoma
E Carcinoma de células renales
F Carcinoma anaplásico de células pequeñas

38 Una mujer de 41 años da a luz un varón tras una gestación sin complicaciones. Al nacer, el niño está en el percentil 70 de talla y peso. En la exploración física tiene pliegues palmares transversales bilaterales y ausencia de los pliegues de flexión distales de ambos quintos dedos. Las fisuras palpebrales son oblicuas. Presenta braquicefalia. En la auscultación torácica destaca un soplo holosistólico. Durante la infancia muestra discapacidad intelectual, pero es capaz de realizar las actividades de la vida diaria. A los 17 años, el joven tiene una serie de infecciones graves de las vías respiratorias superiores. El hemograma muestra hemoglobina de 10,2 g/dl; hematocrito, 30,5%; VCM, 89 μm^3; plaquetas, 103.000/mm^3; y leucocitos, 19.200/mm^3, con el 14% de neutrófilos, el 6% de cayados, el 22% de linfocitos, el 13% de monocitos y el 45% de blastos. ¿Qué cariotipo es más probable que esté presente en este paciente?

A 45,X
B 46,XY
C 47,XY,13
D 47,XY,18

E 47,XY,21
F 47,XXY



39 Una mujer de 62 años refiere aumento de la sed y la diuresis desde hace 6 meses. En el último mes ha tenido dolor en el costado derecho. En la exploración física, la temperatura es 37 °C; frecuencia cardíaca, 77 latidos/min; frecuencia respiratoria, 14 respiraciones/min; y presión arterial, 150/95 mmHg. Hay masas palpables bilaterales en el abdomen. La figura ilustra su TC abdominal. El análisis de orina muestra densidad de 1,01; pH, 6,5; proteinuria, 2+; hematuria, 2+; y ausencia de glucosa y cetonas. Los análisis de laboratorio revelan hemoglobina de 10,4 g/dl; hematocrito, 31,3%; glucosa, 102 mg/dl; creatinina, 5,5 mg/dl; y nitrógeno ureico, 53 mg/dl. Un año después desarrolla cefalea brusca e intensa. La TC craneal pone de manifiesto una hemorragia subaracnoidea en la base del encéfalo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A Enfermedad quística medular de inicio en la etapa adulta
B Vasculitis granulomatosa asociada a ANCA
C Poliquistosis renal autosómica dominante
D Cistinosis

E Diabetes mellitus de tipo 2
F Panarteritis nudosa de tipo clásico

40 Una niña de 13 años ha estado en régimen de acogimiento con 10 cuidadores diferentes en los últimos 11 años. En la exploración física hay equimosis en el tronco, extremidades y encías. Se observa un exantema papular hiperqueratósico, con lesiones de 0,4 cm bordeadas de hemorragia, en la misma distribución. La niña tiene dolor con el movimiento de brazos y piernas. Hay una depresión anómala del esternón con prominencia de las costillas y las uniones condrocostales. Las radiografías de brazos y piernas revelan arqueamiento de los huesos largos y ensanchamiento de las metáfisis, con calcificación normal. Hay un hematoma subperióstico en el fémur derecho. No se aprecian fracturas. El hemograma muestra hemoglobina de 10,8 g/dl; hematocrito, 32,4%; VCM, 77 μm^3; plaquetas, 201.300/mm^3; y leucocitos 5.730/mm^3. ¿Cuál de los siguientes procesos metabólicos es más probable que esté alterado en esta paciente?

A Concentración de anhidrasa carbónica
B Actividad del factor VIII
C Receptor del factor de crecimiento de fibroblastos
D Hidroxilación del colágeno
E Síntesis de vitamina D
F Escorbuto

41 Una niña de 11 años tiene una infección de las vías respiratorias y recibe trimetoprim-sulfametoxazol. A los 3 días desarrolla faringitis, malestar general, fiebre y un exantema cutáneo macular en el tronco y las extremidades. Algunas lesiones cutáneas tienen un área elevada central de eritema más pronunciado. A los 4 días se aprecian erosiones de la mucosa oral y pequeñas ampollas que se desarrollan sobre las máculas cutáneas purpúricas. Las ampollas aumentan ligeramente de tamaño y después se despegan de la epidermis. La superficie corporal total afectada por las ampollas y descamación es inferior al 10%. ¿Cuál de los siguientes tipos de células es más probable que intervenga en la aparición de las lesiones cutáneas?

A Linfocitos CD8+
B Eosinófilos
C Células de Langerhans

D Macrófagos
E Neutrófilos
F Linfocitos citolíticos naturales

42 Un niño de 21 meses ha presentado otitis medias de repetición complicadas por mastoiditis en los últimos 3 meses. En la exploración física hay una erupción seborreica en la piel del tronco y el cuero cabelludo. Se aprecia hepatoesplenomegalia y adenopatías generalizadas no dolorosas. La radiografía de tórax revela nódulos pulmonares bilaterales de 0,5 a 2 cm, y hay una lesión de 1 cm en la clavícula derecha y otra de 1,5 cm en la séptima costilla izquierda, ambas osteolíticas. Las pruebas de laboratorio muestran pancitopenia. La biopsia de médula ósea pone de manifiesto hematopoyesis reducida con un mayor número de células grandes que tienen núcleos vesiculares ovalados y citoplasma vacuolado, que son positivas con CD1a mediante inmunocitología. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Leucemia linfoblástica aguda
B Enfermedad de Gaucher
C Histiocitosis de células de Langerhans
D Leishmaniosis
E Mieloma múltiple
F Síndrome mielodisplásico

43 Un hombre de 26 años previamente sano sufre un traumatismo cerrado importante en el brazo izquierdo. En la exploración física hay tumefacción local y rubor. A las 3 semanas, la contusión superficial se ha resuelto, pero se palpa una masa ligeramente dolorosa en la cara externa del brazo izquierdo. Una radiografía de este brazo revela una masa de 5 cm en los tejidos blandos. Tiene un centro radiotransparente y formación de hueso irregular alrededor. Un mes después, la masa mide 3 cm y es indolora. Una TC del brazo pone de manifiesto una masa bien delimitada dentro del músculo con áreas de calcificación brillante en toda su superficie. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Tofo gotoso
B Hemartrosis
C Miositis osificante
D Osteocondroma
E Osteosarcoma

F Polimiositis



44 Un hombre de 35 años ha sufrido brotes de dolor abdominal intenso y difuso acompañado de fiebre, malestar general y mialgias en los últimos 4 meses. En la exploración física, la temperatura es 37,7 °C; frecuencia cardíaca, latidos/min; frecuencia respiratoria, 20 respiraciones/min; y presión arterial, 145/90 mmHg. Hay dolor abdominal difuso a la palpación, sin masas, y se escuchan ruidos hidroaéreos. Una muestra de heces resulta positiva para sangre oculta. Las pruebas de laboratorio muestran glucosa sérica de 73 mg/dl; amilasa, 44 U/l; AST, 54 U/l; ALT, 23 U/l; creatinina, 2,4 mg/dl; y nitrógeno ureico, 22 mg/dl. Una biopsia renal pone de manifiesto vasculitis transmural aguda de las arterias de tamaño intermedio; los glomérulos y túbulos no presentan hallazgos de interés. Se realiza una angiografía de la arteria mesentérica con la imagen mostrada en la figura. ¿Cuál de las siguientes pruebas serológicas es más probable que resulte positiva en este paciente?

A Anticuerpos antimitocondriales
B ANA
C C-ANCA
D Antígeno de *Cryptococcus neoformans*
E HBsAg
F Anticuerpos contra *Histoplasma capsulatum*

45 Una niña de 4 años está cada vez más apagada en el último año. Se encuentra en el percentil 25 de talla y peso. En la exploración física hay vello púbico y aumento de tamaño del clítoris y las mamas. No se aprecia hepatomegalia, esplenomegalia ni adenopatías. La exploración neurológica no revela datos de interés. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 13,7 g/dl; hematocrito, 41,8%; leucocitos, 7.120/mm^3; Na$^+$, 128 mmol/l; K$^+$, 4,8 mmol/l; Cl$^-$, 99 mmol/l; CO$_2$, 21 mmol/l; glucosa, 69 mg/dl; creatinina, 0,5 mg/dl; y ACTH, 95 pg/ml, con pérdida del ritmo de secreción circadiano. ¿Qué proceso patológico es más probable que se asocie con estos hallazgos?

A Hiperplasia cortical suprarrenal
B Adenoma de células de los islotes
C Microadenoma hipofisario
D Neuroblastoma retroperitoneal
E Craneofaringioma supraselar
F Carcinoma medular de tiroides



46 Un hombre de 39 años ha perdido 4 kg de peso en 8 meses, con diarrea acuosa y ventosidades. Tiene placas de urticaria en las superficies de extensión de los codos y rodillas y la parte superior de la espalda desde hace 1 mes. Algunas de las placas presentan pequeñas vesículas agrupadas. La biopsia de una de las lesiones cutáneas revela neutrófilos en las puntas de las papilas dérmicas con vacuolización de las células basales suprayacentes. Con el microscopio de inmunofluorescencia se observan depósitos granulares de IgA en las puntas de las papilas dérmicas. La figura muestra la imagen microscópica de una biopsia yeyunal. Más de 20 años después, desarrolla un linfoma de linfocitos T del yeyuno. ¿Contra cuál de las siguientes moléculas es más probable que las pruebas serológicas revelen anticuerpos?

A Desmogleína 3
B ADN bicatenario
C Péptido citrulinado cíclico
D Histona
E Ribonucleoproteína
F Transglutaminasa tisular

47 Durante el último mes, una mujer de 33 años ha tenido dolor epigástrico urente, náuseas y vómitos. Una endoscopia digestiva alta muestra múltiples úlceras superficiales de 1 cm en el antro gástrico y duodeno proximal. Recibe omeprazol y mejora. Un año después tiene un episodio de dolor abdominal bajo intenso tipo cólico y hematuria, y elimina un cálculo de oxalato cálcico. Nota galactorrea al mes siguiente, y en los 2 meses posteriores presenta amenorrea. Se le administra un agonista dopaminérgico y mejora. Las pruebas de laboratorio muestran calcio de 11,1 mg/dl; fósforo, 2,4 mg/dl; y creatinina, 1,1 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes mutaciones de genes y neoplasias asociadas es característica de este trastorno?

A *MEN1;* adenoma de células de los islotes
B *RET;* carcinoma medular
C *BCL6;* linfoma no hodgkiniano
D *APC;* osteoma
E *RET;* feocromocitoma
F *VHL;* carcinoma de células renales

48 Un hombre de 60 años presenta disnea progresiva y tos seca

desde hace 2 años. En la exploración física, la temperatura es 37,4 °C; frecuencia cardíaca, 74 latidos/min; frecuencia respiratoria, 20 respiraciones/min; y presión arterial, 110/70 mmHg. La radiografía de tórax revela enfermedad pulmonar intersticial extensa y borde cardíaco derecho prominente. La espirometría pone de manifiesto un descenso de la FEV_1 y la CVF. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que haya ocasionado su enfermedad pulmonar?

A Monóxido de carbono
B Hifas fúngicas
C Polen de plantas
D Cristales de sílice
E Dióxido de azufre
F Serrín

49 Un hombre de 42 años refiere mialgias progresivas y dificultades para deglutir crecientes en los últimos 2 años. Cuando se expone al frío, la piel de las manos se vuelve blanca. En la exploración física tiene un exantema eritematoso que se extiende por el puente nasal. Las articulaciones de las manos están tumefactas y calientes. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 12,2 g/dl; hematocrito, 36,5%; plaquetas, 180.000/mm^3; leucocitos, 4.510/mm^3; glucosa sérica, 72 mg/dl; bilirrubina total, 1 mg/dl; AST, 41 U/l; ALT, 19 U/l; fosfatasa alcalina, 69 U/l; creatina cinasa, 483 U/l; y creatinina, 1,3 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes anticuerpos es más característico de su enfermedad?

A ANCA
B Péptido citrulinado cíclico
C Histona
D Smith
E Peroxidasa tiroidea
F U1-RNP

50 Un genograma revela familiares mujeres de la primera y segunda generación con menopausia prematura y hombres con un trastorno neurodegenerativo progresivo de comienzo en la sexta década. Hay más hombres que mujeres con retraso mental desde la infancia en la cuarta generación. El análisis genético de las personas afectadas muestra expansión de tripletes CGG en un gen que codifica una proteína que se une a transcriptos de ARNm en

las neuronas y los traslada a las sinapsis. ¿Cuál de los siguientes órganos es más probable que sea anómalo en los hombres afectados?

A Glándulas suprarrenales
B Páncreas
C Hipófisis
D Testículos
E Tiroides



51 Una mujer de 44 años refiere dolor sordo en el hipocondrio derecho desde hace 1 año. En la exploración física hay dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. La TC abdominal revela una masa bien delimitada de 5 cm en la parte superior del lóbulo hepático derecho. La figura muestra una imagen macroscópica representativa de una masa similar. La paciente presenta dolor torácico agudo con disnea súbita y sudoración 1 mes después. En una gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión se observan múltiples defectos de perfusión periféricos. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de fármacos tomada regularmente por esta mujer es más probable que se asocie a estos hallazgos?

A Alopurinol y sulfametoxazol
B Etinilestradiol y noretindrona
C Ibuprofeno y ácido acetilsalicílico

D Isoniacida y rifampicina
E Fenacetina y paracetamol

52 Una primigrávida de 37 años, en la semana 30 de la gestación, sufre edemas progresivos en los pies, cefalea, confusión y reducción de la diuresis en las últimas 2 semanas. Entonces presenta actividad comicial y a continuación entra en coma. En la exploración física, la temperatura es 36,8 °C; frecuencia cardíaca, 82 latidos/min; frecuencia respiratoria, 24 respiraciones/min; y presión arterial, 145/95 mmHg. La frecuencia cardíaca es regular y la auscultación pulmonar está limpia. El abdomen es blando y hay ruidos hidroaéreos. Se aprecia edema con fóvea hasta los muslos. No hay hemorragia vaginal y el cuello uterino no está borrado. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 11,9 g/dl; hematocrito, 35,8%; plaquetas, 63.500/mm^3; leucocitos, 8.180/mm^3; glucosa, 151 mg/dl; proteínas totales, 6,1 g/dl; albúmina, 3,2 g/dl; bilirrubina total, 2,3 mg/dl; AST, 88 U/l; ALT, 103 U/l; fosfatasa alcalina, 253 U/l; y tiempo de protrombina, 32 s (INR de 2,8). El análisis de orina revela densidad de 1,024; pH, 6; proteinuria, 4+; glucosuria, 1+; y ausencia de sangre. La ecografía pone de manifiesto un feto viable de 30 semanas. ¿Qué enfermedad es más probable que tenga la paciente?

A Desprendimiento prematuro de placenta
B Síndrome de Budd-Chiari
C Miocardiopatía dilatada
D Síndrome HELLP
E Mola hidatiforme
F Síndrome de Reye
G Síndrome de Sheehan

53 Un hombre de 29 años presenta cansancio creciente, pérdida de 2 kg de peso y febrícula en las últimas 2 semanas. En la exploración física, la temperatura es 37,5 °C; frecuencia cardíaca, 80 latidos/min; frecuencia respiratoria, 21 respiraciones/min; y presión arterial, 150/70 mmHg. La punta del bazo es palpable y presenta dolor en el hipocondrio izquierdo. Presenta dolor en ambas fosas renales. Se ausculta un soplo diastólico en el borde esternal izquierdo. Los dedos de las manos tienen hemorragias subungueales. En la fosa antecubital izquierda se aprecian marcas de aguja. Las pruebas de laboratorio muestran leucocitos de

12.700/mm^3; glucosa, 66 mg/dl; AST, 101 U/l; y ALT, 28 U/l. El análisis de orina revela hematuria 1+, leucocitos y cilindros leucocíticos. La radiografía de tórax pone de manifiesto un nódulo de 3 cm con un nivel hidroaéreo en el lóbulo superior derecho. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable que crezca en el hemocultivo?

A *Candida albicans*
B *Cryptococcus neoformans*
C *Escherichia coli*
D *Listeria monocytogenes*
E *Staphylococcus aureus*
F *Streptococcus pyogenes*
G *Yersinia enterocolitica*

54 Una mujer de 41 años lleva 3 días con cefalea y visión borrosa, junto con confusión mental creciente en las últimas 24 h. En la exploración, la temperatura es 37,9 °C; frecuencia cardíaca, 104 latidos/min; frecuencia respiratoria, 25 respiraciones/min; y presión arterial, 70/40 mmHg. Tiene hemorragias petequiales en los brazos y el tronco. Una muestra de heces resulta positiva para sangre oculta. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 9,1 g/dl; hematocrito, 27,2%; VCM, 92 μm^3; ADE, 19%; plaquetas, 8.900/mm^3; y leucocitos, 8.950/mm^3. El frotis de sangre periférica revela esquistocitos. La bioquímica sérica muestra creatinina de 3,3 mg/dl; nitrógeno ureico, 32 mg/dl; y glucosa, 80 mg/dl. En el plasma hay multímeros ultragrandes del factor de von Willebrand. ¿Qué tratamiento debería recibir inmediatamente?

A Dos unidades de concentrado de eritrocitos
B Seis unidades de plaquetas
C Dobutamina
D Laparotomía exploradora
E Plasmaféresis
F Prednisona

55 Una mujer de 30 años ha presentado un aumento de 5 kg de peso en los últimos 3 meses; no ha tenido menstruaciones durante ese tiempo. Refiere dolor en la parte alta del abdomen en el último mes. La exploración física revela aumento del perímetro abdominal con aparente ascitis. No hay edemas periféricos. La prueba de gestación es positiva. Otros resultados de laboratorio

son hemoglobina de 13,2 g/dl; hematocrito, 39,7%; leucocitos, 12.300/mm^3; glucosa, 80 mg/dl; AST, 581 U/l; ALT, 611 U/l; bilirrubina total, 1,3 mg/dl; proteínas totales, 6,2 g/dl; y albúmina, 3,5 g/dl. Como tiene antecedentes familiares de embolia pulmonar, se procede a estudiar la mutación del factor V de Leiden, que resulta positiva. La ecografía abdominal revela hepatomegalia con ecogenicidad heterogénea y hay una gestación intrauterina con un feto de tamaño estimado en 12 semanas. ¿Qué hallazgo patológico es más probable que esté presente en el hígado?

A Coledocolitiasis
B Congestión pasiva crónica
C Trombosis venosa hepática
D Adenoma hepatocelular
E Coriocarcinoma metastásico
F Esteatosis microvesicular

56 Una mujer de 26 años presenta infecciones cada vez más frecuentes desde hace 5 años. La infección respiratoria más reciente se debió a *Streptococcus pneumoniae.* Ahora tiene diarrea acuosa. En la exploración física está por debajo del peso ideal. Hay un exantema vesicular en el dermatoma T10 izquierdo. Las pruebas de laboratorio incluyen leucocitos de 7.200/mm^3 con el 55% de neutrófilos, el 2% de cayados, el 35% de linfocitos, el 6% de monocitos y el 2% de eosinófilos. La determinación cuantitativa de inmunoglobulinas revela IgA de 22 mg/dl; IgG, 175 mg/dl; e IgM, 40 mg/dl. La citometría de flujo de subpoblaciones linfocíticas pone de manifiesto un recuento de linfocitos CD4+ (absoluto) de 630/µl; CD8+ (absoluto), 785/µl; linfocitos B, 280/µl; y linfocitos T, 2.010/µl. En una muestra de heces examinada en busca de huevos y parásitos se encuentran quistes de *Giardia lamblia.* ¿Cuál es la inmunodeficiencia más probable en esta paciente?

A Enfermedad granulomatosa crónica
B Inmunodeficiencia variable común
C Síndrome de hiper-IgM
D Déficit de adhesión leucocítica
E Inmunodeficiencia combinada grave

57 Un hombre de 44 años presenta intolerancia progresiva al ejercicio y edemas periféricos en los últimos 5 años. Ha notado opacidades centrales crecientes que interfieren en su visión. Tiene

calvicie frontal. En los últimos 2 años sufre pérdida de memoria progresiva con menor capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. En la exploración física se aprecia atrofia significativa en los músculos masetero, temporal, escaleno, deltoides, trapecio y esternocleidomastoideo. Hay atrofia testicular bilateral. Una prueba de tolerancia a la glucosa de 2 h arroja una glucemia de 156 mg/dl. Hay hipogammaglobulinemia. El cuadro clínico empeora los 3 años siguientes, con debilidad muscular progresiva. ¿Cuál de los siguientes productos génicos es más probable que esté alterado en este hombre?

A α-1,4-glucosidasa
B Distrofina
C Receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos
D Fosforilasa oxidativa mitocondrial
E Miofosforilasa
F Proteína cinasa de la distrofia miotónica

58 Encuentran a un hombre de 53 años en coma en el suelo del cuarto de baño. Los vecinos refieren que se celebró una fiesta en el domicilio y vieron a muchas personas con intoxicación aguda tambaleándose en el exterior de la casa. Las constantes vitales a la llegada a urgencias son temperatura de 36 °C; frecuencia cardíaca, 88 latidos/min; frecuencia respiratoria, 16 respiraciones/min; y presión arterial, 95/60 mmHg. No hay señales de traumatismos. Las pruebas de laboratorio revelan una concentración sanguínea de etanol de 0,2 g%. ¿Cuál de las siguientes sustancias presentes en su orina es más probable que cause una lesión renal aguda?

A Cristales de cistina
B Glucosa
C Cilindros hialinos
D Cetonas
E Mioglobina

59 Una mujer de 22 años presenta bruscamente un intenso dolor abdominal bajo o. Sus antecedentes médicos incluyen cervicitis por *Chlamydia trachomatis.* En la exploración física, la temperatura es 36,9 °C; frecuencia cardíaca, 90 latidos/min; frecuencia respiratoria, 17 respiraciones/min; y presión arterial, 90/50 mmHg. Hay dolor a la palpación en la parte inferior del abdomen, sin masas palpables. No hay hemorragia vaginal. El tacto rectal es

anodino y la muestra de heces resulta negativa para sangre oculta. Los ruidos hidroaéreos están reducidos. Se realiza una ecografía abdominal y el útero tiene un tamaño normal sin visualizarse masas, pero hay una masa anexial derecha. Se realiza una culdocentesis y hay sangre en el aspirado. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 9,5 g/dl; hematocrito, 28,6%; plaquetas, 269.300/mm^3; y leucocitos, 9.110/mm^3. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que tenga esta mujer?

A Reducción del factor XIII de la coagulación
B Descenso de la folitropina
C Aumento del antígeno carcinoembrionario
D Aumento de la gonadotropina coriónica humana
E Quistes de *Entamoeba histolytica* en las heces
F Huevos de *Schistosoma haematobium* en la orina



60 Una mujer de 43 años presenta cansancio y apatía progresivos desde hace 5 meses. Lleva 3 meses con menometrorragia. En la exploración física no hay hallazgos de interés, excepto un resultado positivo en la prueba de guayacol en las heces. Las pruebas de

laboratorio muestran hemoglobina de 9,2 g/dl; hematocrito, 27,3%; y VCM, 75 μm^3. La ecografía pélvica revela un útero aumentado de tamaño. La citología cervicovaginal pone de manifiesto células anómalas de probable origen endometrial. Se realiza una colonoscopia seguida de una colectomía parcial; la figura muestra una imagen macroscópica de la lesión. ¿Cuál de las siguientes anomalías moleculares es más probable que haya provocado estos hallazgos?

A Herencia en la línea germinal de una mutación en el gen *APC*
B Pérdida homocigota del gen *PTEN*
C Inactivación de la proteína Rb por el VPH-16
D Mutación en un gen de reparación de errores de emparejamiento del ADN
E Activación de la tirosina cinasa causada por mutación de *c-KIT*

61 Un hombre de 51 años residente en la isla de Santa Elena ha sufrido un revés de su suerte política. En los últimos 3 años, y especialmente en el año anterior, ha presentado episodios cada vez más frecuentes de dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos, disuria, letargo, fiebre en picos, diarrea, estreñimiento, debilidad excesiva, sudoración profusa y pérdida de peso. Se le administra una gran dosis de calomel (un compuesto que contiene mercurio) unos días antes de su muerte el 5 de mayo de 1821, tratamiento que se ha dejado de utilizar desde entonces por buenas razones. La autopsia revela hepatomegalia (¿con esteatosis?) y úlceras con engrosamiento del estómago. El informe de la autopsia no recoge alteraciones de la piel y uñas, como hiperqueratosis o hiperpigmentación. De haber estado presentes esas alteraciones y un carcinoma escamoso cutáneo, ¿por cuál de los siguientes metales serían estos hallazgos más indicativos de envenenamiento crónico?

A Arsénico
B Berilio
C Cromo
D Cobalto
E Plomo
F Níquel



62 Una mujer de 90 años falleció de repente. La autopsia revela una úlcera cutánea de 5 cm que se extiende hasta el sacro. Tenía atrofia muscular difusa; un corte histológico muestra fibras musculares pequeñas sin inflamación ni fibrosis. Los huesos muestran osteoporosis marcada y hay cifosis de la columna vertebral. La figura muestra un hallazgo del examen de los pulmones. Hay neumonía en el lóbulo inferior del pulmón derecho. ¿Cuál de los siguientes trastornos es más probable que hubiera predispuesto a los hallazgos patológicos observados en la autopsia de esta paciente?

A Síndrome antifosfolipídico
B Anemia aplásicas
C Alcoholismo crónico
D Maltrato de ancianos con traumatismos cerrados
E Inmovilización
F Malnutrición

63 Un hombre de 29 años presenta dolor urente con la micción y secreción uretral de 3 días de evolución. Una muestra del exudado resulta positiva para *Chlamydia trachomatis* mediante ELISA. El hombre tiene rigidez progresiva de rodillas y tobillos y lumbalgia 3 semanas después. Una radiografía de la columna lumbar muestra estrechamiento con esclerosis de las articulaciones sacroilíacas. Un mes después desarrolla un eritema doloroso del glande peniano y las conjuntivas están rojas. En una consulta de seguimiento se aprecia frecuencia cardíaca ligeramente irregular y un soplo indicativo de insuficiencia aórtica. La lumbalgia persiste de forma intermitente durante 5 meses más. ¿Cuál de los siguientes parámetros es más probable que sea positivo en este hombre?

A ANCA
B ANA
C Genotipo HLA-B27
D Anticuerpos contra *Borrelia*
E Reagina plasmática rápida
F Factor reumatoide
G U1-RNP



64 Un joven de 19 años lleva 1 mes con cefaleas. En la exploración física, la presión arterial es 160/95 mmHg. En el examen del fondo de ojo hay angiomas retinianos bilaterales. Una TC abdominal revela una masa de 3 cm en la glándula suprarrenal derecha. Los análisis de laboratorio muestran aumento de catecolaminas urinarias. La masa se extirpa quirúrgicamente. Desarrolla un trastorno del movimiento 5 años después, con descoordinación y ataxia. La RM encefálica pone de manifiesto una masa de 2 cm en el hemisferio cerebeloso izquierdo y otra de 1 cm en el vermis. Ambas se resecan mediante cirugía. A los 6 años tiene dolor en el costado derecho con hematuria; la figura ilustra su TC abdominal. La concentración de hemoglobina es 20,3 g/dl, y el hematocrito, 60,9%. ¿Cuál de las siguientes mutaciones génicas y síndrome asociado es más probable que tenga?

A *APC*-síndrome de Gardner
B *MET*-síndrome de Denys-Drash
C *NF2*-neurofibromatosis de tipo 2
D *TSC1*-esclerosis tuberosa
E *VHL*-enfermedad de Von Hippel-Lindau

F *WT1*-síndrome de Beckwith-Wiedemann

65 Una mujer de 43 años presenta dificultades crecientes para deglutir en el último año. Nota que las manos se vuelven blancas y dolorosas al exponerse al frío. Comenta: «Es posible que me esté haciendo mayor, pero al menos no tengo arrugas en la cara ni en las manos.» En la exploración física, la presión arterial es 115/75 mmHg. La piel de la cara y manos está tensa y brillante. Una biopsia en sacabocados de la piel de la mano muestra fibrosis colágena dérmica y calcificaciones focales. En los 20 años siguientes se somete anualmente a una dilatación esofágica; en todo este tiempo no desarrolla enfermedades graves. ¿Cuál de las siguientes pruebas serológicas es más probable que resulte positiva en esta mujer?

A Anticuerpos anticentrómero
B Anticuerpos anti-ADN topoisomerasa
C Anticuerpos antimicrosómicos
D Anticuerpos antimitocondriales
E Autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos
F Anticuerpos antitransglutaminasa



66 Una mujer de 32 años tiene malestar general progresivo y pérdida de 10 kg de peso en los últimos 6 meses. La exploración física revela atrofia muscular y en la lengua hay una cubierta de

color marrón amarillento parecida a una placa. El examen microscópico del material raspado de la lengua pone de manifiesto células con gemaciones y seudohifas. Desarrolla diarrea acuosa 6 meses después; una muestra de heces contiene quistes de *Cryptosporidium parvum.* Después presenta fiebre, tos y disnea intensa. Se realiza un lavado broncoalveolar; la figura ilustra la imagen microscópica con tinción de metenamina de plata de Gomori. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que esté presente en esta mujer?

A Título de ANA de 1:1.024
B Recuento de linfocitos CD4+ de 111/μl
C C2 del complemento indetectable
D IgG de 88 mg/dl
E Prueba del estallido oxidativo de los neutrófilos inferior al 5%
F Reagina plasmática rápida positiva

67 Un hombre de 73 años tiene dolor en ambas caderas y rodillas desde hace 25 años y ha tomado medicación para ese dolor en los últimos 5 años. Durante el año pasado ha notado una frecuencia creciente de cefalea, mareo, acúfenos, confusión y náuseas. Hace 1 semana sufrió una hematemesis. En la exploración física hay petequias diseminadas en los brazos y piernas. La frecuencia cardíaca es regular y no hay ruidos pulmonares añadidos. No se aprecian déficits neurológicos. Las pruebas de laboratorio muestran hemoglobina de 11,1 g/dl; hematocrito, 33,1%; VCM, 72 μm^3; plaquetas, 317.200/mm^3; y leucocitos, 5.915/mm^3. Los tiempos de tromboplastina parcial y de protrombina son normales. El análisis de la función plaquetaria revela menor agregación en respuesta a la estimulación con ADP y colágeno. Una endoscopia digestiva alta muestra eritema de la mucosa gástrica y una úlcera antral de 1,8 cm, superficial y muy bien delimitada. ¿Cuál de los compuestos farmacológicos siguientes es más probable que se relacione con estos hallazgos tras un uso crónico?

A Ácido acetilsalicílico
B Paracetamol
C Adalimumab
D Metotrexato
E Oxicodona
F Propoxifeno

68 Una adolescente de 16 años tiene ciclos menstruales irregulares desde la menarquia, hace 2 años, y lleva 3 meses sin menstruación. No ha usado anticonceptivos. Hace 1 semana observó una pequeña hemorragia vaginal y ahora presenta dolor abdominal intenso de comienzo brusco. En la exploración física hay dolor importante a la palpación en el hipocondrio derecho y los ruidos hidroaéreos están reducidos. Una muestra de heces resulta negativa para sangre oculta. Se observa salida de un líquido parduzco originado en una masa de color pardo rojizo de 2 cm en la cúpula vaginal. La concentración de hCG sérica es alta. Una ecografía abdominal muestra múltiples masas de 3 a 6 cm en el hígado y el útero está aumentado de tamaño. La radiografía de tórax revela nódulos de 1 a 3 cm en los pulmones. Se realiza una paracentesis y hay sangre en el aspirado. ¿Qué neoplasia produciría con más probabilidad esos hallazgos?

A Adenocarcinoma
B Coriocarcinoma
C Carcinoma de células claras
D Leiomiosarcoma
E Tumor de Müller mixto maligno
F Sarcoma botrioideo

69 Una mujer de 44 años presenta cansancio fácil junto con dolor y rigidez de ambas muñecas y otras pequeñas articulaciones de las manos desde hace 8 años. La rigidez es notable por la mañana y cede a medida que avanza el día. Las radiografías de las manos revelan estrechamiento de los espacios articulares en las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas debido a sinovitis y erosión del cartílago. Las pruebas de laboratorio muestran Hb de 8,4 g/dl; hematocrito, 23,5%; VCM, 65 fl; y HCM, 23 pg. El frotis de sangre periférica pone de manifiesto eritrocitos hipocrómicos y microcíticos. Las concentraciones séricas de hierro y capacidad de fijación de hierro están bajas y la concentración de ferritina es alta. ¿De cuál de las siguientes sustancias es una concentración elevada la causa más probable de la anemia en esta mujer?

A Proteína C reactiva
B GM-CSF
C Hepcidina

D Factor reumatoide
E TNF



70 Un estudio sobre niños con deformidades óseas evalúa los factores de riesgo de su enfermedad. Se descubre que una cohorte de esos niños tiene huesos con la imagen microscópica mostrada en el panel de la izquierda, comparados con los huesos de niños normales, a la derecha. Las deformidades simétricas consisten en prominencia frontal, arqueamiento de huesos largos, lordosis lumbar pronunciada y ensanchamiento de las articulaciones condrocostales. No se aprecian anomalías en la piel ni en los tejidos blandos. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es más probable que explique este conjunto de deformidades óseas?

A Carencia dietética de fruta fresca
B Exposición reducida a la luz solar
C Hipopituitarismo
D Mutación heredada en el receptor de vitamina D
E Traumatismos por maltrato infantil

71 Una mujer de 18 años, G1, P0, dio a luz a término un bebé que ahora tiene 4 meses, tras un embarazo normal. Una tarde, al volver del trabajo, su novio, que estaba en casa, le comunica que el niño ha fallecido de repente. La autopsia no muestra anomalías externas. El peso y la talla del lactante están en el percentil 45. El

examen interno revela una hemorragia subaracnoidea en el vértice y una hemorragia subdural en el lóbulo parietal derecho. El ojo derecho tiene petequias en la *ora serrata.* Hay una hemorragia de tejidos blandos en el brazo derecho. Se aprecia una fractura reciente del hueso occipital. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A Sífilis congénita
B Hemofilia A
C Osteogenia imperfecta
D Lesiones por maltrato infantil
E Síndrome de muerte súbita del lactante
F Displasia tanatofórica

72 Un hombre de 35 años consulta por una disnea de esfuerzo progresiva. En la exploración física, la talla es 208 cm, con brazos largos y dedos afilados. Las articulaciones son extraordinariamente flexibles. También tiene una subluxación bilateral del cristalino. La ecocardiografía revela prolapso de la válvula mitral y un aneurisma en la aorta ascendente. ¿Cuál de los siguientes tratamientos experimentales es probable que resulte útil a este paciente?

A Anticuerpos anti-TGF-β
B Trasplante de médula ósea
C Dieta baja en calorías y colesterol
D Compuestos estabilizadores de lisosomas
E Transducción del gen *fibrilina 1* a los linfocitos T



73 Un niño de 5 años que no ha recibido atención médica desde el nacimiento presenta un descenso notable de la visión bilateral de inicio gradual. El niño también tiene antecedentes de un número mayor de infecciones respiratorias causadas por *Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae* y rubéola. La figura muestra una imagen microscópica representativa de la mucosa bronquial. El niño también ha eliminado cálculos urinarios. En la exploración física se aprecia una dermatosis papulosa generalizada. El niño tiene xeroftalmía, y hay queratomalacia marcada con opacidad corneal. En la auscultación pulmonar se escuchan crepitantes bilaterales. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que provoque estos hallazgos?

A Fibrosis quística
B Sífilis congénita
C Infección por el VIH
D Síndrome de Kartagener
E Déficit de vitamina A

74 Una mujer de 47 años presenta un aumento progresivo del perímetro abdominal, sin dolor importante, y diarrea en los últimos 3 meses. En la exploración del abdomen se encuentra una oleada ascítica. La TC abdominal muestra ascitis masiva y nódulos quísticos diseminados de 0,5 a 1,5 cm en las superficies del intestino y la pared abdominal. La paracentesis arroja un líquido amarillo ligeramente turbio con contenido elevado de proteínas. El examen citológico del líquido pone de manifiesto acúmulos de células malignas. Las pruebas de laboratorio muestran CA-125 positivo, concentración de HCG no elevada y antígeno carcinoembrionario negativo. ¿Cuál es la neoplasia más probable?

A Adenocarcinoma del íleo
B Tumor carcinoide
C Coriocarcinoma
D Mesotelioma maligno
E Cistoadenocarcinoma seroso
F Cistoadenoma mucinoso

75 ¿Cuál es el axioma definitivo en el cuidado de la salud, igual que en la vida?

A Prevalece una dieta razonable con ejercicio

B Diagnostique precozmente y trate correctamente
C Los controles ambientales ayudan a la prevención
D El amor es el remedio de todos nuestros males
E Investigación y desarrollo de nuevos tratamientos

76 Como estudiante de las ciencias de la salud, acaba de terminar este libro de revisión, aprendiendo a aplicar la base de conocimiento de anatomía patológica a situaciones clínicas y experimentales de enfermedades humanas. ¿Cuál de las aplicaciones de este conocimiento siguientes consideraría óptima?

A Consulta a los colegas
B Asistencia con humanidad
C Diagnóstico diferencial
D Aprendizaje durante toda la vida
E Educación de pacientes
F Proyectos de investigación

Respuestas

1 **E** El infarto agudo de miocardio, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica en edades tempranas apuntan a hipercolesterolemia familiar heterocigota con una mutación del gen que codifica el receptor de LDL. Estos pacientes desarrollan una ateroesclerosis acelerada y precoz. Las estatinas son fármacos inhibidores de la HMG-CoA reductasa que suprimen la síntesis endógena de colesterol y aumentan la producción de receptores de LDL. Los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular son la diana de anticuerpos en la miastenia grave. El paciente no tiene hallazgos compatibles con diabetes mellitus, otra enfermedad que promueve la ateroesclerosis, porque su concentración de hemoglobina A_{1c} es normal, lo que indica que no ha habido hiperglucemia. En la diabetes mellitus de tipo 1, la masa de células β está reducida; en la de tipo 2, es posible que haya una disminución del transporte de glucosa, pero, por lo general, los receptores de insulina no están afectados. La hepcidina participa en el control de la absorción de hierro.

2 **C** El asma bronquial atópica suele comenzar en la infancia. Aunque muchos de los síntomas del asma bronquial pueden

estar relacionados con la hipersensibilidad de tipo I, esta enfermedad consiste fundamentalmente en una inflamación crónica de la pared bronquial mediada por linfocitos T. Los linfocitos T CD4+ de tipo T_H2 impulsan la hipersensibilidad de tipo I, al favorecer la producción de IgE y el reclutamiento de eosinófilos. La predominancia de linfocitos colaboradores T_H2 se acompaña de una regulación a la baja de los T_H1, porque la diferenciación de linfocitos T CD4+ está desplazada hacia los T_H2. En los exudados inflamatorios también puede haber neutrófilos, eosinófilos y macrófagos, pero estas células son reclutadas secundariamente a la respuesta de T_H2. La ADAM-33, una metaloproteinasa, ha sido relacionada con el remodelado de las vías respiratorias observado en el asma bronquial. En concreto, ciertos polimorfismos del gen de ADAM-33 están asociados a la proliferación de células de músculo liso bronquial y fibroblastos. Sin embargo, no hay indicios de que ADAM-33 contribuya a las alteraciones inmunitarias presentes en el asma bronquial.

3 **D** La edad de inicio de la colitis ulcerosa alcanza el máximo entre los 15 y los 30 años. Hay un segundo máximo de los 60 a los 80 años. La imagen colonoscópica e corresponde a una superficie mucosa eritematosa y finamente granular que parece papel de lija. Las posibles manifestaciones extraintestinales de la colitis ulcerosa son la colangitis esclerosante primaria (CEP), la uveítis, la poliartritis migratoria y el eritema nudoso. El 60-70% de las personas con CEP tienen enfermedad inflamatoria intestinal concomitante. La gastritis atrófica causa anemia perniciosa y puede coexistir con otros trastornos autoinmunitarios, como tiroiditis de Hashimoto. La dermatitis herpetiforme aparece en pacientes con celiaquía; ambas están causadas por sensibilidad al gluten. La orquitis es con más frecuencia una complicación de la infección por el virus de la parotiditis, especialmente en adultos. La artritis reumatoide se asocia típicamente con el síndrome de Sjögren. Puede aparecer tiroiditis junto con otras endocrinopatías autoinmunitarias, por ejemplo, la enfermedad de Addison.

4 **E** El síndrome del shock tóxico está causado por algunas cepas de *Staphylococcus aureus* productoras de exotoxinas que actúan

como superantígenos, por ejemplo, TSST-1, que son mitógenos de los linfocitos T. Estos superantígenos pueden estimular más del 10% de los linfocitos T del organismo, provocando una respuesta inmunitaria exuberante y desregulada caracterizada por la liberación de citocinas mediadoras de lesión celular. *Bacillus anthracis* es la causa del carbunco, una enfermedad grave con neumonía y meningitis como hallazgos predominantes. Conocemos la capacidad de *Clostridium perfringens* de causar infecciones de heridas con gangrena gaseosa. Por lo general, *Enterococcus* no provoca una enfermedad tan rápidamente progresiva. La listeriosis se asocia con intoxicación alimentaria y puede dar lugar a una enfermedad potencialmente mortal, pero típicamente sin descamación. Los microorganismos *Vibrio vulnificus* son causa de dermatitis ampollosas, pero esta infección se debe al consumo de mariscos contaminados.

5 **B** Aparecen manifestaciones de una intoxicación aguda por cocaína, como hipertermia, y del consumo crónico de esta droga, con enfermedad arterial coronaria y accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. El color marrón secundario a depósito de hemosiderina en la parte anterior del lóbulo frontal izquierdo indica hemorragia subaguda antigua. La cocaína es un potente vasoconstrictor. Del mismo modo que la cocaína, la anfetamina y la metanfetamina son excitantes o estimulantes; sin embargo, típicamente no producen alteraciones arteriales. Los barbitúricos son sedantes o depresores. El etanol es un depresor que puede causar hepatopatía, pero su efecto cardíaco es inaparente y provoca una miocardiopatía dilatada tras años de abuso. La heroína es un opiáceo con efectos mínimos por sí misma, pero su vía de administración habitual es la intravenosa, y esto puede dar lugar a numerosas complicaciones infecciosas, como hepatitis, endocarditis, meningitis y sida. La marihuana es un tranquilizante suave. La fenciclidina es un esquizofrenomimético causante de comportamientos erráticos, pero carece de efectos tisulares claros.

6 **D** La obesidad mórbida se asocia con complicaciones tales como síndrome de hipoventilación por obesidad, probable apnea del sueño, intolerancia a la glucosa, colelitiasis y artrosis.

En la obesidad aparece esteatosis macrovesicular con hepatomegalia, que incluso puede progresar a cirrosis. El aumento de peso secundario al hipotiroidismo, que se produciría en la tiroiditis de Hashimoto, es leve y no provoca obesidad mórbida. La «miocardiopatía de la obesidad» recuerda a la miocardiopatía dilatada, pero no a la hipertrófica, que afecta típicamente al tabique interventricular con desorganización de las miofibrillas. La papilomatosis laríngea, causante de obstrucción de las vías respiratorias (sin ronquidos), es más frecuente en niños y no se asocia con obesidad. Los resultados de la gasometría en este caso podrían observarse en el enfisema, que no es una complicación de la obesidad; el enfisema panlobulillar es mucho menos frecuente que el centrolobulillar asociado al tabaquismo. La artritis reumatoide suele afectar a las pequeñas articulaciones y no se relaciona con la obesidad.

7 **F** La sífilis terciaria puede manifestarse por aortitis sifilítica secundaria a una endoarteritis obliterante de los *vasa vasorum,* que es más prominente en la aorta proximal. Además, el paciente tiene hallazgos de neurosífilis, con tabes dorsal y paresia generalizada. Un resultado positivo en la prueba de VDRL en el LCR ayuda al diagnóstico. Ninguno de los demás microorganismos reseñados produce enfermedad aórtica. La neuroborreliosis debida a la enfermedad de Lyme puede causar una meningitis aséptica, encefalopatía y polineuropatía. El virus de Coxsackie B es una causa de meningoencefalitis y miocarditis. El VIH provoca una encefalitis caracterizada por demencia y alteraciones sensitivas y motoras. La enfermedad de Hansen, causada por la infección por *Mycobacterium leprae,* afecta principalmente a los nervios periféricos. La tuberculosis produce meningoencefalitis o una masa denominada *tuberculoma;* en la meningitis crónica puede aparecer hidrocefalia obstructiva. El virus del Nilo occidental causa con más frecuencia meningoencefalitis grave en personas ancianas.

8 **E** La anemia drepanocítica (hemoglobina SS) puede manifestarse por crisis abdominal e infartos de la médula ósea vertebral. La haptoglobina está baja debido a la crisis falciforme con hemólisis. La hemólisis mantenida conduce a la formación de cálculos biliares pigmentados. La autoesplenectomía es un

hallazgo compatible. Hay una predisposición a la necrosis aséptica y osteomielitis, especialmente por *Salmonella.* El VCM está elevado por la reticulocitosis, y la ADE es bastante alta por la transformación en drepanocitos y la hemólisis. Sería posible encontrar una concentración elevada de amilasa en la pancreatitis, que puede aparecer con la litiasis biliar, pero esto no explicaría la anemia ni la ausencia de bazo. El síndrome antifosfolipídico (SAF) con anticuerpos anticardiolipina provoca trombosis, pero el abdomen no es su localización habitual, y el SAF no explica la anemia. La pancreatitis es una complicación posible de la hipercalcemia y la hipertrigliceridemia, pero no causa anemia ni la ausencia de bazo. Un colesterol elevado constituye un factor de riesgo de enfermedades ateroescleróticas.

9 **B** La elevación de la hemoglobina A_{1c} se describe en la diabetes mellitus. El paciente tiene complicaciones de la diabetes mellitus de tipo 2 que son típicas de la obesidad: «pie diabético» como consecuencia de la neuropatía periférica y menor sensibilidad, ateroesclerosis avanzada con oclusión de las arterias carótidas y un aneurisma ateroesclerótico de la aorta. La disfunción autónoma con neuropatía provoca disfunción eréctil. Las bandas oligoclonales de IgG son características de la esclerosis múltiple, que habitualmente afecta al SNC de forma más focal. La enfermedad de Cushing secundaria a un adenoma hipofisario secretor de ACTH provoca obesidad troncal, piel en la que aparecen hematomas fácilmente y posiblemente diabetes mellitus secundaria, pero no ateroesclerosis avanzada. La hiperhomocisteinemia es un factor de riesgo de ateroesclerosis, pero no lo es de neuropatía. Los anticuerpos frente a las células parietales aparecen en la anemia perniciosa con déficit de vitamina B_{12}, que puede dar lugar a una menor sensibilidad en las extremidades inferiores; no provoca complicaciones ateroescleróticas.

10 **D** La forma neuropática aguda de la enfermedad de Gaucher (tipo 2) es siempre mortal en la infancia y afortunadamente resulta mucho menos frecuente que la de tipo 1, más leve, con supervivencia prolongada en la edad adulta. La médula está infiltrada por células grandes con abundante citoplasma claro

que parece papel tisú arrugado. El déficit de α-1-iduronidasa se observa en el síndrome de Hurler, caracterizado por manifestaciones progresivas de opacidad corneal, rasgos faciales toscos y retraso mental. La carencia de α-1,4-glucosidasa produce la enfermedad de Pompe, glucogenosis que causa cardiomegalia marcada. El déficit de arilsulfatasa A caracteriza a la leucodistrofia metacromática y provoca degeneración del SNC sin afectación de órganos viscerales. La enfermedad de Tay-Sachs con máculas de color rojo cereza y deterioro neurológico progresivo se debe a la reducción de hexosaminidasa A. El déficit de esfingomielinasa ocasiona la enfermedad de Niemann-Pick, con macrófagos de aspecto espumoso que ocupan los tejidos del sistema mononuclear fagocítico.

11 **D** La anemia perniciosa puede deberse a una gastritis atrófica, con carencia de factor intrínseco que se une a la vitamina B_{12} dietética para ser absorbida. Este trastorno ha provocado una anemia megaloblástica y degeneración combinada subaguda de la médula espinal. Los anticuerpos anti-Smith son característicos del lupus eritematoso sistémico, que tiene múltiples manifestaciones, pero no es típica la gastritis ni la degeneración medular. La carencia de factor V (Leiden) es un factor de riesgo de trombosis de repetición. La infección por *Helicobacter pylori* produce gastritis (habitualmente no atrófica), pero no causa problemas neurológicos. Una concentración elevada de glucosa en la orina indica diabetes mellitus, que puede dar lugar a una neuropatía periférica, pero no produce gastritis.

12 **D** La mutación C282Y en el gen *HFE* está presente en una de cada nueve personas de ascendencia celta y causa una mayor absorción de hierro dietético. En los hombres, los depósitos de hierro aumentados provocan disfunción de órganos – típicamente el corazón (miocardiopatía con insuficiencia cardíaca congestiva), el páncreas (diabetes mellitus), la piel (mayor pigmentación) y las articulaciones (artritis)–, que comienzan alrededor de los 40 años. En las mujeres, la mayor pérdida de hierro por la menstruación retrasa el inicio de esta enfermedad 20 años. Un paciente con β-talasemia tendría anemia, aunque la eritropoyesis ineficaz provoca una absorción excesiva de hierro. Aunque este paciente tiene diabetes mellitus

y una concentración de glucosa elevada, la diabetes mellitus no explica todos los hallazgos, por ejemplo, la artritis. La hipercolesterolemia familiar produciría una enfermedad arterial coronaria e insuficiencia cardíaca, pero no explica la diabetes ni la artritis. La artritis reumatoide con inflamación articular mediada en parte por el TNF provoca habitualmente deformidades articulares y afecta sobre todo a las pequeñas articulaciones.

13 **F** Las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico (LES) comprenden fotosensibilidad, insuficiencia renal, derrames en las cavidades corporales, pericarditis, artralgias, mialgias y citopenias. Los anticuerpos antinucleares son la prueba de cribado más sensible para el LES y, de ser positivos, a continuación puede realizarse la determinación, más específica, de anticuerpos anti-ADN bicatenario. Los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina aparecerían en la miastenia grave, cuadro que explica la debilidad muscular, pero no el dolor. Los anticuerpos anti-ADN topoisomerasa se observan en la esclerodermia, que cursa con insuficiencia renal y engrosamiento de la piel, sin fotosensibilidad. Los anticuerpos contra la membrana basal glomerular caracterizan al síndrome de Goodpasture, con insuficiencia renal, pero no hay artralgias, mialgias ni citopenias. Los anticuerpos antimicrosómicos (antiperoxidasa tiroidea) se asocian con enfermedades tiroideas autoinmunitarias, fundamentalmente tiroiditis de Hashimoto, pero también enfermedad de Graves. Los anticuerpos antimitocondriales pueden aparecer en la cirrosis biliar primaria, que causaría malestar general, no insuficiencia renal ni fotosensibilidad.

14 **A** La paciente tiene fiebre de origen desconocido (FOD), al menos hasta que una revisión de la anamnesis junto con las imágenes de la TC indique que la masa es una gasa hemostática residual olvidada durante la cirugía. Es posible incorporar marcadores radiopacos o chips de identificación por radiofrecuencia (RFID) para identificar esos objetos. La esplenomegalia leve es compatible con un absceso intraabdominal. La lista de diagnóstico diferencial de la FOD es muy larga. Una masa podría ser una neoplasia, pero los linfomas

no suelen tener necrosis significativa y un centro transparente. La sarcoidosis afecta a múltiples órganos, pero habitualmente cursa con aumento de tamaño de los ganglios linfáticos sin necrosis caseosa central. En la cirugía previa se habría identificado una neoplasia ovárica, al igual que la enfermedad inflamatoria pélvica causante de un absceso tuboovárico.

15 **A** La TC torácica muestra un timoma por detrás del esternón inmediatamente por debajo de las clavículas. Los hallazgos reseñados describen una miastenia grave con complicaciones del timoma, incluido el hallazgo excepcional de una aplasia eritrocítica pura, que se caracteriza por la supresión selectiva de la línea eritroide en la médula ósea. En cerca de la mitad de los casos, la extirpación del tumor tímico mejora la aplasia eritroide y apunta a algún mecanismo autoinmunitario como causa de la aplasia. Los trastornos del timo son frecuentes en la miastenia grave, ya se traten de hiperplasias tímicas o timomas (como en este caso). Los anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina alteran la función de la unión neuromuscular. Los anticuerpos anti-ADN topoisomerasa aparecen en la esclerodermia, que cursa con insuficiencia renal y engrosamiento de la piel, pero no hay debilidad muscular con el uso. Los anticuerpos antimembrana basal glomerular se observan en el síndrome de Goodpasture, un tipo de glomerulonefritis rápidamente progresiva, acompañada a menudo de hemorragia pulmonar. Los anticuerpos antimitocondriales pueden aparecer en la cirrosis biliar primaria. Los ANA son característicos de muchas enfermedades autoinmunitarias, sobre todo lupus eritematoso sistémico, que puede acompañarse de mialgias, pero no cursa con debilidad muscular ante el movimiento repetitivo.

16 **A** En el síndrome de Goodpasture hay anticuerpos dirigidos contra la membrana basal glomerular, que también actúan sobre la membrana basal en los pulmones, y se produce hemorragia pulmonar y hemoptisis. Los linfocitos CD8+ citotóxicos pertenecen a la respuesta inmunitaria mediada por células que resulta eficaz para eliminar infecciones intracelulares como la gripe. Los inmunocomplejos circulantes aparecen con más frecuencia en enfermedades autoinmunitarias, como el lupus

eritematoso sistémico. La activación de los macrófagos es más típica de la inflamación crónica y granulomatosa con hipersensibilidad de tipo IV. La liberación de mediadores como la histamina de los mastocitos es característica de la anafilaxia con hipersensibilidad de tipo I.

17 **F** La ascitis, los edemas y la esplenomegalia, junto con los resultados de laboratorio de disfunción hepática, apuntan a una hepatopatía con hipertensión portal, y una causa frecuente es la cirrosis hepática por alcoholismo crónico. La reducción del metabolismo de los estrógenos da lugar a atrofia testicular. Los hallazgos de insuficiencia cardíaca congestiva izquierda y derecha se asocian con miocardiopatía dilatada alcohólica. La anemia macrocítica es frecuente, y la AST está un poco más elevada que la ALT, características típicas del alcoholismo crónico. La enfermedad de Addison secundaria a atrofia suprarrenal no produce hipoalbuminemia ni elevación de las enzimas hepáticas, y la concentración de glucosa suele ser menor. Una estenosis aórtica podría explicar el edema de pulmón. La gastritis autoinmunitaria produce atrofia de la mucosa gástrica, pérdida de células parietales y anemia megaloblástica, pero no provoca anomalías hepáticas. En una glomerulonefritis crónica tan grave como para causar un síndrome hepatorrenal, la insuficiencia renal sería mucho peor y estaría indicada por una creatinina sérica elevada. La miocardiopatía dilatada es un tipo de miocardiopatía característico del alcoholismo crónico.

18 **C** Tan huidiza como el yeti, la embolia paradójica explica los hallazgos. La paciente tiene tromboflebitis con embolia pulmonar como resultado del encamamiento prolongado. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha provocado un corazón pulmonar con aumento de tamaño del corazón derecho, invirtiendo el cortocircuito a través de una comunicación interventricular. La inversión del cortocircuito permite que un tromboémbolo originado en la circulación venosa alcance la circulación arterial sistémica en el encéfalo. La pericarditis constrictiva provoca un pulso paradójico debido a la alteración del llenado cardíaco y una disminución superior a la normal en la presión arterial sistólica con la inspiración; no se asocia con

tromboembolia. La miocardiopatía dilatada produciría un aumento global del tamaño cardíaco no solo del lado derecho del corazón y, aunque es posible la trombosis mural con embolia, habitualmente no se asocia con tromboflebitis. La endocarditis infecciosa es una causa de embolias, pero en este caso no hay fiebre ni infección. La cardiopatía reumática afecta a una o más válvulas, y con frecuencia provoca un aumento de tamaño de la aurícula izquierda con trombosis murales y embolias, pero el borde de la aurícula izquierda sería prominente y la válvula pulmonar casi nunca está afectada.

19 **F** Una diabetes mellitus de tipo 1 con cetoacidosis es antecedente que permite la infección por *Mucor* de los senos paranasales, una infección inusual en otras circunstancias. La función de los linfocitos T y B suele estar preservada en la diabetes mellitus, pero la función de los neutrófilos puede ser menor, de modo que las infecciones bacterianas (estafilococos, estreptococos y coliformes) complican con más frecuencia la diabetes. La actinomicosis es una causa de abscesos subcutáneos crónicos, habitualmente en el cuello, pulmón o abdomen, y, por lo general, tras traumatismos o desvitalización tisular. El carbunco cutáneo es infrecuente y produce una escara o región ulcerada localizada. Las infecciones por citomegalovirus y criptococo se observan típicamente en personas inmunodeprimidas con reducción de la inmunidad celular. *Clostridium perfringens* aparece en infecciones de tejidos blandos con gangrena gaseosa.

20 **A** La fibrosis quística puede acompañarse de agenesia del conducto deferente, un hallazgo frecuente causante de infertilidad. Con una buena asistencia médica, los pacientes con fibrosis quística están viviendo más años, y tener hijos se ha convertido en una opción. Los trastornos del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos *(FGFR)* incluyen enanismo. El déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) provoca hemólisis con la exposición a oxidantes como fármacos antipalúdicos (p. ej., primaquina). El gen *HFE* es anómalo en la hemocromatosis hereditaria; sin embargo, el paciente es joven para que aparezca esta enfermedad. El gen *NF1* (neurofibromatosis) se asocia con la aparición de distintas

neoplasias, como neurofibromas, feocromocitomas y gliomas. El gen *p53* es un gen supresor de tumores y la pérdida de ambos alelos promueve el desarrollo de distintas neoplasias malignas, principalmente carcinomas.

21 **D** La intoxicación por plomo se manifiesta fundamentalmente por trastornos neurológicos, especialmente en los niños. La absorción de plomo se potencia con el déficit de cinc; el cinc es un oligoelemento. El plomo inhibe la incorporación del hemo a la hemoglobina y provoca una mayor cantidad de protoporfirina de cinc con anemia. El cadmio es un metal pesado asociado a toxicidad del aparato digestivo, riñones y pulmón. El cobre es un oligoelemento que rara vez causa efectos tóxicos con fuentes ambientales, aunque en la enfermedad de Wilson se acumula cobre. La intoxicación aguda por hierro se asocia con efectos tóxicos digestivos, renales y del SNC. La bisutería de níquel puede causar exantemas cutáneos; el níquel inhalado provoca problemas respiratorios.

22 **E** La granulomatosis con polivasculitis (vasculitis asociada a ANCA) es una vasculitis multisistémica que afecta con más frecuencia al riñón y el pulmón. Los C-ANCA son positivos en el 95% de los pacientes. Los anticuerpos anti-ADN topoisomerasa I se observan en la esclerodermia difusa, que produce fibrosis intersticial pulmonar y arterioloesclerosis hiperplásica renal. Los anticuerpos contra la membrana basal glomerular aparecen en el síndrome de Goodpasture, que produce glomerulonefritis con semilunas y hemorragia pulmonar, pero no vasculitis necrosante. Los anticuerpos anti-Jo-1 acompañan a la polimiositis/dermatomiositis. Los anticuerpos antimitocondriales son característicos de la cirrosis biliar primaria. Los anti-ADNbc son positivos principalmente en el lupus eritematoso sistémico (LES), que puede causar vasculitis, pero no vasculitis granulomatosa necrosante. Los anticuerpos anti-RNP son positivos en la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, con características superpuestas de LES, esclerodermia, artritis reumatoide y polimiositis, pero por lo general no hay una afectación significativa del riñón ni del pulmón.

23 **A** La amiloidosis sistémica reactiva se ha desarrollado a partir

de la ileítis granulomatosa subyacente, y la proteína asociada al amiloide sérico está generada por la inflamación crónica. El péptido natriurético auricular se observa en la amiloidosis auricular aislada. En la amiloidosis asociada a hemodiálisis aparece β_2-microglobulina. La calcitonina es un precursor para el depósito local de amiloide en los carcinomas medulares de tiroides. El exceso de cadenas ligeras predispone al depósito de amiloide en el mieloma múltiple. La transtiretina se asocia con amiloidosis sistémica senil.

24 **C** Las lesiones rojizas violáceas son típicas del sarcoma de Kaposi en un paciente con síndrome de emaciación, muguet oral y linfopenia característicos de la infección por el VIH con sida. No es frecuente que el virus de la hepatitis C cause lesiones cutáneas ni linfopenia de este grado. Las infecciones por el virus del herpes simple pueden aparecer con más frecuencia en la enfermedad por el VIH, pero las lesiones son típicamente vesiculares y localizadas en la región perioral o perianal. La enfermedad de Hansen, causada por la infección por *Mycobacterium leprae,* puede producir un exantema rojizo apenas visible que se resuelve, seguido de hipopigmentación o anestesia de la piel afectada y a veces lesiones nodulares deformantes que se desarrollan a lo largo de años. Las infecciones cutáneas estafilocócicas suelen producir abscesos localizados, como forúnculos y diviesos. Las infecciones estreptocócicas de la piel pueden manifestarse con abscesos o celulitis.

25 **A** La artritis de Lyme se caracteriza por la presencia de meningitis, carditis y antecedentes de eritema crónico migratorio. La artritis aparece de semanas a años después de la picadura del vector, la garrapata de los venados *(Ixodes),* y puede ser migratoria y afectar a las articulaciones grandes. La tuberculosis rara vez produce artritis crónica asociada a osteomielitis de las grandes articulaciones, que provoca anquilosis y deformidad. Los estreptococos son una causa de artritis aguda, aunque es posible la poliartritis con fiebre reumática debida a infección por estreptococos del grupo A junto con la carditis. *Staphylococcus aureus* ocasiona una artritis supurativa aguda. *Yersinia enterocolitica* es una causa de artritis

enteropática de comienzo brusco; es posible una evolución de 1 año en personas con HLA-B27.

26 **A** La enfermedad de Alzheimer es progresiva a lo largo de años, y el encéfalo disminuye de tamaño, con circunvoluciones más estrechas y surcos ensanchados, por lo general en todos los lóbulos salvo los occipitales. La atrofia da lugar a dilatación ventricular *ex vacuo.* Al microscopio se observan placas neuríticas neocorticales con centros de amiloide Aβ. La ausencia de células de Betz puede constatarse en la esclerosis lateral amiotrófica, en la que hay debilidad muscular progresiva. Las células de tipo II de Alzheimer, a pesar del epónimo, no pertenecen a la enfermedad de Alzheimer, sino que aparecen ante el aumento de las concentraciones sanguíneas de amoníaco debido a insuficiencia hepática (en la encefalopatía hepática). La arterioesclerosis puede presentarse asociada a la hipertensión. Las neuronas rojas se observan en el infarto agudo. El cambio espongiforme aparece con más frecuencia en las demencias rápidamente progresivas (en semanas o meses), como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

27 **E** Los hallazgos son sobre todo característicos de la artritis gotosa. La gota puede producir insuficiencia renal y tofos en los tejidos blandos y las articulaciones, y a menudo se acompaña de hiperlipidemia. El depósito de pirofosfato cálcico dihidratado es más frecuente en ancianos y suele ser asintomático; las rodillas son las articulaciones más afectadas y no es frecuente el depósito de cristales en los tejidos blandos fuera de las articulaciones. Los cristales de colesterol se forman en las cavidades articulares ante traumatismos con hemorragia. Los cristales de cistina aparecen en la orina en la cistinosis, un error innato del metabolismo infrecuente. Los cristales de hidroxiapatita están presentes en las articulaciones afectadas por artrosis, de presentación aguda o crónica.

28 **D** Los pacientes con infección por hepatitis C pueden desarrollar hepatitis crónica con elevación persistente de las enzimas hepáticas. Algunos pacientes con hepatitis C desarrollan crioglobulinemia mixta con un incremento policlonal de IgG. Es frecuente la afectación renal, con características nefróticas o nefríticas. La vasculitis

crioglobulinémica provoca hemorragias cutáneas y úlceras. Una anemia hemolítica autoinmunitaria puede dar lugar a hiperbilirrubinemia predominantemente indirecta. Aunque el carcinoma hepatocelular es una complicación posible de la infección por hepatitis C, una lesión de tipo masa se observaría en la TC, y la concentración de fosfatasa alcalina suele estar elevada en presencia de masas intrahepáticas. La hemocromatosis hereditaria puede complicarse con una hepatopatía crónica, pero estos pacientes no tienen por lo general hepatitis C, y la piel presenta un color pizarra, no púrpura. El mieloma múltiple aumenta las globulinas séricas y produce enfermedad renal, pero la hepatitis no suele formar parte del mieloma, como tampoco la vasculitis.

29 **C** El retraso en el inicio tras el traumatismo es compatible con embolia grasa en el encéfalo, y la figura muestra petequias predominantemente en la sustancia blanca de la púrpura encefálica. La embolia grasa causante de dificultad respiratoria o alteraciones neurológicas comienza típicamente de 1 a 3 días después del traumatismo. No conocemos el mecanismo exacto del desarrollo de estas lesiones vasculares, pero están implicadas la oclusión vascular con liberación de ácidos grasos libres y la activación plaquetaria. La mielinólisis central pontina aparece cuando la hiponatremia se corrige rápidamente, provocando edema de la sustancia blanca más marcado en las fibras cruzadas densamente dispuestas de la protuberancia. La lesión axónica difusa es una consecuencia posible de los traumatismos, pero los síntomas y signos deberían aparecer poco después de la lesión y las lesiones de la sustancia blanca suelen ser microscópicas. Por lo general, la rotura de un aneurisma no está relacionada con traumatismos, y la mayor parte de las hemorragias se localizan en la base del encéfalo. Como la paciente no tiene fiebre, es improbable un absceso, y la TC no mostraba una lesión focal. La meningitis vírica puede producir edema encefálico y la infección por el virus del herpes simple es capaz de causar hemorragias, pero no hay relación con los traumatismos y debería haber leucocitosis en el LCR en caso de infección.

30 **A** La investigación traslacional lleva una idea desde el pupitre

a la cabecera del paciente. El mecanismo descrito corresponde a la apoptosis, o muerte de células individuales. La activación de la apoptosis en las células cancerosas sería un efecto farmacológico muy útil para hacer que el tumor se autodestruyera. Los demás trastornos reseñados no se beneficiarían en el mismo grado de la inducción de la apoptosis.

31 **D** La imagen de RM muestra múltiples áreas de intensidad de señal que representan placas de desmielinización en la sustancia blanca típicas de la esclerosis múltiple, enfermedad que cursa con manifestaciones neurológicas variadas. La edad media de inicio es de 30 años, y casi nunca aparece después de los 60. La neuritis óptica, la debilidad y las alteraciones sensitivas son manifestaciones frecuentes. La diabetes mellitus puede producir neuropatía periférica y retinopatía, pero típicamente de forma más simétrica, y no hay placas en la sustancia blanca. Es posible que la enfermedad de Graves cause hipertiroidismo con intolerancia al calor, pero las manifestaciones neurológicas no son frecuentes y suele haber diarrea. La infección por el VIH puede provocar encefalitis por el VIH, que afecta a la sustancia blanca, aunque las placas delimitadas son infrecuentes, igual que la neuropatía periférica. La miastenia grave es causa de debilidad generalizada, que empeora con los movimientos repetitivos, y no es focal; no hay alteraciones en la sustancia blanca. El lupus eritematoso sistémico puede provocar cerebritis, pero sin placas de desmielinización, y los déficits neurológicos focales son un hallazgo infrecuente.

32 **D** La espina bífida oculta es la forma más leve de los defectos del tubo neural. Se caracteriza por un cierre defectuoso de los arcos vertebrales, pero con las meninges y la médula espinal indemnes, y «cerradas» por piel y tejido conjuntivo. Las radiografías podrían mostrar su presencia en el 20% de la población. A pesar de la ausencia de un defecto abierto, hay un riesgo mayor de meningitis. En la malformación de Arnold-Chiari existe una fosa posterior pequeña y protrusión del cerebelo hacia el agujero magno, con mielomeningocele lumbar. La malformación de Dandy-Walker se detecta mediante indicios ecográficos de un quiste en el cuarto ventrículo y agenesia del vermis cerebeloso. Los mielomeningoceles son defectos del tubo

neural abiertos. La esclerosis tuberosa es una enfermedad infrecuente que causa «tubérculos» hamartomatosos de consistencia firme en la corteza, y no se asocia con defectos del tubo neural.

33 **C** La enfermedad de Wilson (degeneración hepatolenticular) con anillos corneales de Kayser-Fleischer se relaciona con una mutación en el gen que codifica una ATPasa transportadora de cobre *(ATP7B).* Se produce un depósito excesivo de cobre, especialmente en el hígado, el putamen y la córnea. Los trastornos psiquiátricos y neurológicos son frecuentes en la enfermedad de Wilson, y los pacientes desarrollan con frecuencia hepatopatías crónicas, desde hepatitis aguda hasta hepatitis crónica y cirrosis. En el déficit de α_1-antitripsina puede haber hepatitis crónica y enfisema pulmonar, pero no aparecen alteraciones neurológicas. La fibrosis quística puede provocar enfermedad pulmonar e insuficiencia pancreática. La galactosemia es una causa posible de hepatopatía y cirrosis al comienzo de la infancia. En su forma más grave, la enfermedad de Gaucher, debida a la carencia de glucocerebrosidasa, es responsable de deterioro neurológico, pero no causa hepatopatía crónica. La enfermedad de von Gierke es un tipo de glucogenosis que por lo general no progresa a cirrosis.

34 **A** Una disección de la aorta puede extenderse proximalmente hasta afectar y ocluir parcialmente los grandes vasos. Es posible que las disecciones proximales apenas provoquen dolor. La sangre ha pasado al mediastino, causando su ensanchamiento, y a la cavidad pericárdica, ocasionando taponamiento. Los factores de riesgo son hipertensión y ateroesclerosis. Además, la necrosis quística de la media hace que la disección aórtica sea un riesgo importante en personas con síndrome de Marfan. Una válvula aórtica bicúspide provoca estenosis valvular aórtica, no rotura de la aorta. Los tumores que afectan el mediastino, típicamente neoplasias malignas hematológicas, como los linfomas, pueden producir un síndrome de la vena cava superior, pero las neoplasias prácticamente nunca invaden la media arterial, y las hemorragias secundarias a tumores se producen en vasos mucho más pequeños. La arteritis de Takayasu afecta en ocasiones al cayado de la aorta y causa disección, pero esta enfermedad es

excepcional y aparece con más frecuencia en mujeres menores de 30 años. La aortitis sifilítica puede provocar dilatación de la raíz aórtica y posible rotura, pero es mucho menos frecuente que la disección de la aorta secundaria a hipertensión y ateroesclerosis. La tromboangitis obliterante (enfermedad de Buerger) es un trastorno infrecuente que afecta a las arterias de tamaño intermedio y pequeño en los brazos y las piernas de hombres fumadores de mediana edad.

35 **C** El enfisema pulmonar y la gastritis están relacionados con el tabaquismo. Múltiples neoplasias malignas se asocian al tabaquismo, como el carcinoma urotelial y el carcinoma de células renales. El déficit de α_1-antitripsina (AAT) explicaría el enfisema, pero sería panlobulillar, y la carencia de AAT no se asocia con neoplasias uroteliales. El alcoholismo crónico explica la gastritis, no el enfisema ni el carcinoma. Los tintes de anilina aumentan el riesgo de carcinoma urotelial, pero no de enfisema ni gastritis. Un déficit de vitamina C puede provocar hemorragias de tejidos blandos y dolor óseo, pero no causa carcinomas ni enfisema.

36 **A** La enfermedad de Addison con atrofia bilateral de la corteza suprarrenal suele ser idiopática y provoca alteraciones electrolíticas debido a la falta de secreción de mineralocorticoides, principalmente aldosterona; cuando la atrofia es marcada, también disminuye la secreción de glucocorticoides. El aumento de las hormonas precursoras de ACTH, secundario a la pérdida de la retroalimentación ejercida por la producción de cortisol, estimula los melanocitos de la piel. El estrés, infecciones incluidas, puede precipitar una crisis addisoniana. La pérdida de islotes de Langerhans es una característica de la diabetes mellitus de tipo 1, con hiperglucemia y posible cetoacidosis como complicaciones. La falta de liberación o las hormonas inhibidoras del hipotálamo afectan a la hipófisis y provocan múltiples endocrinopatías, pero no pérdida de ACTH específicamente. Las células C parafoliculares del tiroides producen calcitonina, que tiene una participación poco importante en la homeostasis del calcio. La glándula pineal produce melatonina, implicada en los ritmos circadianos, que no resulta significativa en los estados de

enfermedad. La ausencia de hormona tiroidea del epitelio folicular provoca hipotiroidismo, ejemplificado por aumento discreto de peso, piel gruesa y seca, y estreñimiento, pero no hay alteraciones electrolíticas significativas.

37 **A** El prolactinoma es el tumor más frecuente de la hipófisis anterior. Los macroadenomas producen hemianopsia homónima y la prolactina que secretan genera ginecomastia. Los tumores carcinoides pueden elaborar varias hormonas, pero no prolactina. Los carcinomas medulares de tiroides producen calcitonina, que tiene un efecto mínimo sobre la homeostasis del calcio. Los feocromocitomas pueden generar catecolaminas en exceso; su manifestación más frecuente es hipertensión. Los carcinomas de células renales dan lugar a varios síndromes paraneoplásicos, con más frecuencia policitemia, hipercalcemia y síndrome de Cushing, pero no hiperprolactinemia. Del mismo modo, los cánceres de pulmón anaplásicos de células pequeñas (en avena) de origen neuroendocrino también son causa de síndromes paraneoplásicos: los más frecuentes son síndrome de Cushing y síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.

38 **E** El niño tiene trisomía 21 (síndrome de Down) y ha desarrollado una leucemia aguda como complicación. El cariotipo 45,X corresponde al síndrome de Turner, presente solo en mujeres. El cariotipo normal, 46,XY, es improbable ante el conjunto de anomalías presentes en este caso. Es mucho menos probable que las trisomías 13 y 18 se asocien con supervivencia a largo plazo que la trisomía 21; los niños afectados tienen con más frecuencia anomalías graves. El cariotipo 47,XXY del síndrome de Klinefelter se asocia con hombres de aspecto casi normal e inteligencia normal.

39 **C** Cerca del 10% de las personas con poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) tienen un aneurisma sacular en el polígono de Willis, que en ocasiones se complica con rotura y hemorragia en el espacio subaracnoideo. Los quistes de la PQRAD pueden aparecer en el hígado y rara vez en el páncreas. Los quistes de la enfermedad quística medular de inicio en el adulto tienen una localización central en el riñón. Aunque aparece insuficiencia renal en la mediana edad, igual que en la

PQRAD, los riñones son pequeños y parecen encogidos, y no hay quistes en otros órganos. Una reabsorción renal anómala de aminoácidos, cistina incluida, puede llevar a la formación de cristales de cistina y cálculos en la orina; la enfermedad con orina de jarabe de arce y una hepatopatía grave causarían ese hallazgo. La granulomatosis con polivasculitis (vasculitis asociada a ANCA) puede afectar a múltiples órganos, sobre todo los riñones y los pulmones, pero no produce quistes. La nefropatía diabética comprende nefroesclerosis, glomeruloesclerosis, pielonefritis y necrosis papilar, pero no enfermedad quística. La panarteritis nudosa puede producir minúsculos microaneurismas en las arterias, típicamente en el riñón, y es posible que afecte a múltiples órganos, pero no aparecen quistes.

40 **D** El escorbuto debido al déficit de vitamina C se manifiesta por una reducción de la síntesis de colágeno secundaria a una hidroxilación inadecuada del procolágeno. La disminución de la síntesis de colágeno afecta a la formación de matriz ósea, integridad vascular y función epitelial. Hay hemorragias en las articulaciones y tejidos blandos ante traumatismos mínimos. Se observan concentraciones reducidas de anhidrasa carbónica en algunas formas de osteopetrosis, con riesgo de fracturas, pero no los demás hallazgos. La hemofilia A, que en ciertos casos se debe a un inhibidor adquirido del factor VIII, ocasiona hemorragias en los tejidos blandos con hemartrosis y deformidades articulares, pero esta enfermedad suele estar ligada al cromosoma X y es improbable que afecte a niñas; la piel y el hueso no se ven afectados primariamente. Las mutaciones del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos explican algunos tipos de enanismo. El déficit de vitamina D podría producir las deformidades óseas, pero la calcificación está reducida y no hay anemia ni hemorragias.

41 **A** El síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) es una forma grave de eritema multiforme que puede complicar infecciones y tratamientos farmacológicos. Las sulfonamidas, el alopurinol, la difenilhidantoína y la carbamacepina son los fármacos más asociados al SSJ. Los linfocitos citotóxicos (CD8+) son los mediadores de este síndrome a través de la necrosis de células

epidérmicas. Los eosinófilos son frecuentes en las reacciones alérgicas, incluidas las alergias a fármacos, pero la mayoría de estas reacciones se acompañan de urticaria y eritema de corta duración, sin formación de ampollas ni descamación. Las células de Langerhans y los macrófagos son células presentadoras de antígenos localizadas en la epidermis y dermis que no causan directamente lesiones tóxicas a las células de alrededor. Los exudados de neutrófilos no son característicos del SSJ, aunque una vasculitis leucocitoclástica con púrpura es una forma de reacción farmacológica. Los linfocitos citolíticos naturales pertenecen a la inmunidad innata y no participan directamente en las reacciones a fármacos.

42 **C** La enfermedad de Letterer-Siwe es una forma aguda diseminada de histiocitosis de células de Langerhans. Por lo general, la leucemia linfoblástica aguda produce leucocitosis, y las manifestaciones cutáneas y esqueléticas son infrecuentes. En la enfermedad de Gaucher, un trastorno autosómico recesivo resultante de una menor actividad glucocerebrosidasa, hay células cuyo citoplasma recuerda al papel tisú arrugado, y su evolución no es tan agresiva. *Leishmania donovani* causa la leishmaniosis tisular, pero los amastigotos que infiltran la médula no son positivos para CD1a, y la evolución no suele ser tan agresiva. El mieloma múltiple aparece en ancianos y, aunque las lesiones líticas son frecuentes, están causadas por infiltrados de células plasmáticas. Las distintas formas de síndrome mielodisplásico se observan en ancianos, con células mieloides que no se marcan con CD1a, pero se acompañan de numerosos sideroblastos en anillo en la médula ósea; algunos casos progresan a leucemia mieloide aguda.

43 **C** La miositis osificante es una reacción reparadora exuberante e infrecuente secundaria a traumatismos de los tejidos blandos en los músculos, en los que se produce formación de hueso metaplásica. Las claves diagnósticas son su localización en los tejidos blandos, calcificación que comienza por la periferia y reducción del tamaño con el tiempo. En los tejidos blandos pueden formarse tofos gotosos, pero típicamente hay antecedentes de artritis gotosa, y las lesiones no se calcifican. Las hemartrosis se producen ante traumatismos articulares y

hemorragias en la cápsula articular y alrededor de esta, pero no hay calcificación. Un osteocondroma es una exóstosis ósea que sale del hueso al tejido blando. Los osteosarcomas originados rara vez en tejidos blandos deben diferenciarse de la miositis osificante; esta última se caracteriza por una corteza madura de hueso y ausencia de aumento de tamaño y de destrucción ósea o del tejido blando. La polimiositis consiste en inflamación con degeneración y regeneración de las fibras musculares, pero no hay un efecto de masa ni calcificación.

44 **E** En la panarteritis nudosa «clásica», el HBsAg es positivo en cerca de un tercio de los casos. La angiografía de la arteria mesentérica revela oclusiones distales focales y microaneurismas en las ramas de la arteria mesentérica superior. Los anticuerpos antimitocondriales aparecen en la cirrosis biliar primaria. Los ANCA se asocian con panarteritis «microscópica», pero no a la panarteritis clásica. Los ANA son positivos en una gran variedad de enfermedades autoinmunitarias, principalmente lupus eritematoso sistémico, que pueden afectar al riñón por glomerulonefritis, no vasculitis típicamente. El antígeno criptocócico se detectaría en el LCR de pacientes con meningitis, por lo general pacientes inmunodeprimidos. Es posible que en personas con exposición previa a *Histoplasma capsulatum* se detecten sus anticuerpos; este microorganismo causa principalmente enfermedad pulmonar.

45 **A** Este tipo de síndrome adrenogenital se caracteriza por la carencia de 21-hidroxilasa y pérdida de sal causada por un bloqueo en la síntesis de cortisol y un aumento de la secreción de ACTH que estimula una mayor producción de andrógenos. Los adenomas de células de los islotes pueden secretar varias hormonas, con frecuencia insulina, glucagón o somatostatina, que no producen signos virilizantes. Los adenomas hipofisarios en ocasiones destruyen la función del resto de la hipófisis y provocan hipopituitarismo, pero es improbable que un microadenoma se comporte así, y las manifestaciones de este caso indican un aumento de la secreción de ACTH. Los neuroblastomas aparecen en niños pequeños en los paraganglios suprarrenales o extrasuprarrenales, pero es posible

que su secreción hormonal solo produzca hipertensión. Los craneofaringiomas se observan típicamente en adolescentes o adultos jóvenes y son lesiones destructoras sin producción hormonal. El carcinoma medular de tiroides es un tumor de adultos que puede elaborar calcitonina.

46 **F** La celiaquía se ha complicado con una dermatitis herpetiforme en este hombre. Es posible detectar anticuerpos frente a la gliadina, la transglutaminasa y el endomisio. La biopsia yeyunal muestra aplanamiento de la mucosa y aumento de los linfocitos intraepiteliales. Las personas con HLA-DQ2 o HLA-DQ8 tienen más probabilidad de desarrollar estos hallazgos. Con la dieta sin gluten, las lesiones cutáneas se resuelven en algunos pacientes. Los anticuerpos dirigidos contra la desmogleína 3, una proteína de los desmosomas, están presentes en el pénfigo vulgar, enfermedad ampollosa de ancianos sin afectación digestiva. Los anticuerpos contra el péptido citrulinado cíclico son característicos de la artritis reumatoide. Los dirigidos al ADN bicatenario son muy específicos del lupus eritematoso sistémico (LES), que produce exantemas eritematosos sin ampollas. Los anticuerpos antihistonas son característicos sobre todo del LES inducido por fármacos. Los anti-RNP aparecen en la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, que presenta elementos de LES, esclerodermia, artritis reumatoide y polimiositis. Los anticuerpos dirigidos contra el colágeno de tipo IV están presentes en el síndrome de Goodpasture, que no cursa con exantemas cutáneos.

47 **A** En este caso, la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 (MEN 1) está asociada a un gastrinoma (originado en los islotes o el intestino delgado), una lesión paratiroidea (adenoma o hiperplasia) y un prolactinoma. El carcinoma medular y el feocromocitoma son más típicos de la MEN 2 con mutación del gen *RET.* Los linfomas no hodgkinianos resultan más característicos de síndromes que cursan con un estado de inmunodeficiencia, como el sida y el linfoma de células grandes con mutación de *BCL6.* Los osteomas pueden aparecer en el síndrome de Gardner con el gen de la poliposis adenomatosa del colon *(APC).* El carcinoma de células renales aparece en

ocasiones en la enfermedad de von Hippel-Lindau debida a la mutación del gen *VHL.*

48 **D** La neumoconiosis del paciente (con fibrosis masiva progresiva) está produciendo una enfermedad pulmonar restrictiva. La silicosis surge por exposición prolongada e intensa a polvos inorgánicos en trabajos como la minería. La intoxicación por monóxido de carbono provoca hipoxemia sin alteraciones patológicas de los tejidos pulmonares. Las hifas fúngicas causan reacciones alérgicas o bien neumonitis por hipersensibilidad. Los pólenes de plantas se asocian con más frecuencia a asma atópica episódica. El dióxido de azufre contribuye a la bronquitis crónica. El serrín suele producir broncoconstricción.

49 **F** La enfermedad mixta del tejido conjuntivo tiene características superpuestas correspondientes al lupus eritematoso sistémico (LES), esclerodermia, polimiositis y artritis reumatoide. Los ANCA aparecen con más frecuencia en vasculitis, como la vasculitis granulomatosa asociada a ANCA o la panarteritis microscópica. Los anticuerpos contra el péptido citrulinado cíclico (anti-CCP) tienen una especificidad superior al 99% para la artritis reumatoide, y estos pacientes padecerán enfermedad grave con más frecuencia. Los anticuerpos antihistona son característicos sobre todo del LES inducido por fármacos. Los anti-Smith son muy específicos del LES. Los anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea aparecen en trastornos autoinmunitarios del tiroides, como la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves.

50 **D** Esta familia presenta el síndrome del cromosoma X frágil. Se ha producido una anticipación, con premutaciones de expansiones limitadas de repeticiones del triplete en las dos primeras generaciones, mientras que las últimas tienen mutaciones completas con expansiones mayores de CGG. El gen *FMR1* codifica la proteína del retraso mental familiar (FMRP) expresada sobre todo en el encéfalo y los testículos, lo que explica la macrorquidia. La ausencia de esta proteína en el encéfalo conduce a una mayor traducción de ARNm, que afecta a las uniones sinápticas y su función. La proteína FMRP se expresa también en muchos otros tejidos, como los reseñados,

pero su función no resulta tan afectada como la del encéfalo y los testículos.

51 **B** Los episodios de tromboembolia en mujeres al final de la etapa fértil y el adenoma hepático presente en este caso son complicaciones del uso de anticonceptivos orales. Obsérvese el color verde (biliverdina) indicativo de que esta neoplasia, derivada de los hepatocitos, está produciendo bilis. El alopurinol y las sulfonamidas se asocian con la producción de granulomas hepáticos. El uso de ácido acetilsalicílico en los niños ha sido relacionado con síndrome de Reye con esteatosis microvesicular. La isoniacida se ha asociado a hepatitis aguda y crónica. El consumo de fenacetina y paracetamol se ha relacionado con nefropatía por analgésicos, y una ingesta excesiva de paracetamol puede producir una necrosis hepática aguda masiva.

52 **D** Los factores de riesgo del síndrome HELLP (hemólisis con elevación de las enzimas hepáticas y plaquetas bajas), una variante de la preeclampsia grave, son nuliparidad, edad materna avanzada, diabetes mellitus, hipertensión previa, antecedentes de preeclampsia y enfermedad renal. Las pacientes con síndrome HELLP pueden progresar a coagulación intravascular diseminada. Está indicado el parto urgente. El desprendimiento prematuro de la placenta es un proceso agudo caracterizado por dolor abdominal intenso y hemorragia vaginal. La trombosis de las venas hepáticas en el síndrome de Budd-Chiari puede producir necrosis del hígado con aumento de las enzimas; la gestación es un factor de riesgo, pero este síndrome no explica los hallazgos neurológicos y renales. Del mismo modo, una miocardiopatía dilatada que puede ocurrir durante la gestación tampoco explica las manifestaciones. En la mola hidatiforme, la preeclampsia es más frecuente, pero 30 semanas es un período demasiado prolongado para este cuadro y no habría feto. El hígado graso agudo de la gestación puede parecerse al síndrome de Reye (enfermedad que tiene lugar en los niños) y estar precedido de preeclampsia. El síndrome de Sheehan es una necrosis posparto de la hipófisis que produce hipopituitarismo.

53 **E** Los hallazgos corresponden a una endocarditis infecciosa y

las marcas de aguja en el brazo izquierdo apuntan al consumo de drogas por vía parenteral como factor de riesgo. Estas personas pueden tener lesiones valvulares del corazón derecho y/o izquierdo. Es probable que las vegetaciones embolicen y los émbolos sépticos provoquen infección o infarto de múltiples órganos en las lesiones izquierdas y de los pulmones en las derechas. El nódulo pulmonar es, con mucha probabilidad, un absceso del pulmón. Es muy posible que el paciente tenga pielonefritis aguda por infección hematógena. *Candida albicans* y *Cryptococcus neoformans* son causas de endocarditis en personas inmunodeprimidas. *Escherichia coli* es una causa probable de infecciones ascendentes de las vías urinarias con pielonefritis, pero resulta infrecuente en la endocarditis. La listeriosis se debe con más frecuencia a agua o alimentos contaminados y puede provocar sepsis con meningitis, rara vez endocarditis. Las infecciones estreptocócicas causan endocarditis con más frecuencia en personas con cardiopatía valvular preexistente, y el implicado con más frecuencia es *Streptococcus viridans.* La bacteria *Yersinia enterocolitica* produce enterocolitis, no endocarditis (este microorganismo puede persistir en la sangre almacenada y causar sepsis por transfusiones).

54 **E** La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) se manifiesta por la pentalogía clásica de alteraciones neurológicas, fiebre, trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y disminución de la función renal. La patogenia de la PTT está relacionada con el factor de von Willebrand (vWF). Los monómeros de vWF se unen mediante enlaces disulfuro hasta formar multímeros con masas moleculares que alcanzan millones de daltons. Normalmente, una metaloproteinasa que degrada el vWF evita la llegada a la circulación (o la persistencia) de multímeros inusualmente grandes de vWF. Esta metaloproteinasa se conoce como ADAMTS13 (desintegrina y metaloproteinasa, con dominios de tipo trombospondina 1). En la mayoría de los pacientes con PTT, la actividad plasmática de ADAMTS13 es inferior al 5% de la normal. La concentración de hemoglobina de la paciente no es tan baja como para justificar una transfusión de eritrocitos. La administración de plaquetas a un paciente con PTT se asemeja a «echar gasolina al fuego»,

porque las plaquetas causarían la formación de más trombos, provocando lesiones adicionales de órganos. Los presores simples, como la dobutamina, no son el principal tratamiento. No está indicada la cirugía, porque la lesión se está produciendo en los pequeños vasos de muchos órganos. Es posible administrar prednisona a un subgrupo de pacientes que no responde a la plasmaféresis.

55 **C** El síndrome de Budd-Chiari es un trastorno infrecuente que complica la gestación o el posparto. La oclusión venosa hepática provoca hepatomegalia con congestión centrolobulillar grave y necrosis, mucho más pronunciada que el típico hígado en nuez moscada de la congestión pasiva crónica en la insuficiencia cardíaca derecha. La obstrucción de la vía biliar por coledocolitiasis aumentaría la bilirrubina sérica en mayor grado que el observado en esta paciente, y la hepatomegalia sería improbable. Los adenomas hepáticos, que se asocian con el uso de anticonceptivos orales, son lesiones de tipo masa, habitualmente de varios centímetros. Con 12 semanas de gestación y un feto presente, el coriocarcinoma es muy improbable, y no cabría esperar un aumento notable de las enzimas hepáticas. El hígado graso agudo de la gestación con esteatosis microvesicular produce una densidad más uniforme con hepatomegalia, un trastorno infrecuente que, por lo general, aparece en el tercer trimestre.

56 **B** En la inmunodeficiencia variable común (IDVC) hay un número normal de linfocitos T con cifras normales o bajas de linfocitos B, y existe hipogammaglobulinemia con descenso de IgG y posiblemente de otras inmunoglobulinas. La IDVC aparece en adultos jóvenes de ambos sexos y causa un mayor número de infecciones bacterianas y giardiasis, junto con infecciones de repetición por el virus del herpes simple (y del herpes zóster). Los mecanismos son variados y comprenden fracaso de la maduración de linfocitos B a células plasmáticas, supresión excesiva de linfocitos T y función defectuosa de los linfocitos T colaboradores. Las mutaciones en genes que codifican proteínas de la NADPH oxidasa producen enfermedad granulomatosa crónica e infecciones de repetición por *Aspergillus, Staphylococcus, Serratia, Nocardia* y *Pseudomonas*. En el

síndrome de hiper-IgM, las mutaciones en el ligando de CD40 inducen insuficiencia de los linfocitos B, con concentraciones bajas de IgG, IgA e IgE, pero aumento de IgM; en la lactancia y la infancia hay más riesgo de infecciones graves por virus y bacterias y microorganismos oportunistas, como *Pneumocystis jiroveci*. Las mutaciones de CD18, la cadena β común de las integrinas, que colaboran en la unión de los leucocitos, dan lugar a un déficit de adhesión leucocítica con leucocitosis, pero sin inflamación supurativa en áreas de necrosis tisular y úlceras causadas por *Staphylococcus aureus* y bacterias entéricas gramnegativas. En la inmunodeficiencia combinada grave (IDCG), la mitad de los casos se deben a una mutación ligada al cromosoma X en la cadena γ común de IL-2, un receptor de muchas citocinas necesario para el desarrollo de los linfocitos T, y la otra mitad se debe a una mutación autosómica recesiva en la adenosina desaminasa con acumulación de metabolitos de purina tóxicos para los linfocitos T. En la IDCG, aunque los linfocitos T son los afectados primariamente, hay una alteración secundaria de la función de los linfocitos B, de modo que las personas afectadas tienen reducidas las concentraciones de IgG y ausencia de IgA e IgM, junto con una menor función de los linfocitos T, lo que provoca mayor susceptibilidad a prácticamente todos los microorganismos infecciosos.

57 **F** La distrofia miotónica es una forma de distrofia muscular en la que hay un mayor número de repeticiones del trinucleótido CTG en el gen. Se desarrolla debilidad en el músculo esquelético, cardíaco y liso, junto con cataratas, demencia, atrofia gonadal e hipogammaglobulinemia. El déficit de α-1,4-glucosidasa provoca la enfermedad de Pompe en la lactancia. La ausencia de distrofina caracteriza la distrofia muscular de Duchenne, que afecta a niños pequeños. La mutación de *FGFR3* se observa en la acondroplasia, una forma de enanismo con extremidades cortas. Las mutaciones en los genes de la fosforilación oxidativa mitocondrial (miopatías mitocondriales) producen trastornos neurodegenerativos y pérdida de audición, además de miopatía. La miofosforilasa está reducida en la enfermedad de McArdle, que causa dolor muscular ante el ejercicio extenuante.

58 **E** Tanto el etanol como la inmovilización con reducción del flujo sanguíneo local predisponen a la rabdomiólisis por lesión del músculo esquelético. Se libera mioglobina de las células musculares dañadas y resulta tóxica para los túbulos renales: puede causar necrosis tubular aguda tóxica. Los cristales de cistina son infrecuentes y representan cistinuria o hepatopatía grave. La glucosuria indica diabetes mellitus. Los cilindros hialinos pueden encontrarse en personas sanas y un gran número de ellos sugiere una diuresis reducida. La cetonuria se produce cuando disminuye la ingesta o el uso de los hidratos de carbono.

59 **D** Estos hallazgos son altamente sugestivos de un embarazo ectópico roto, lo que explicaría el incremento de la concentración de gonadotropina coriónica humana. Las infecciones por gonococos y clamidias son factores de riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, que aumenta el riesgo de embarazo ectópico. La rotura de un embarazo ectópico puede provocar coagulación intravascular diseminada con aumento del tiempo de tromboplastina parcial y de protrombina, pero la cifra normal de plaquetas en esta paciente indica que esta aún no se ha producido. El factor XIII, que estabiliza los coágulos de fibrina, puede ser deficiente, pero esto es absolutamente excepcional. Las hemorragias comienzan en el período neonatal; los pacientes de más edad pueden tener mala cicatrización de heridas, hemorragia intracerebral, infertilidad (hombres) y abortos (mujeres). El descenso de la folitropina es típico de la insuficiencia hipofisaria, que no explica la hemorragia. En algunas neoplasias digestivas aumenta el antígeno carcinoembrionario, pero esta paciente es joven para sufrir esas neoplasias malignas. La amebiasis produciría diarrea sanguinolenta, y la perforación del colon es infrecuente. La esquistosomiasis debida a *Schistosoma haematobium* es una causa de hematuria, pero la vejiga no está perforada.

60 **D** La figura muestra una masa característica del adenocarcinoma del colon ascendente. Esos cánceres no suelen obstruirse, pero pueden sangrar en pequeñas cantidades durante meses o años, causando anemia ferropénica. Esta mujer relativamente joven tiene indicios de otro cáncer, de endometrio,

y esta combinación se debe con más probabilidad a una mutación heredada en uno de los genes reparadores de emparejamientos erróneos del ADN, como *MSH2* y *MLH1*. La pérdida homocigota de estos genes da origen a cáncer del hemicolon derecho y de endometrio. Esas mutaciones se asocian típicamente con inestabilidad de los microsatélites. Por el contrario, el gen *APC*, un regulador negativo de la β-catenina en la vía de señales WNT, se asocia con el síndrome de poliposis adenomatosa familiar y la mayoría de los cánceres de colon esporádicos. Esta última vía también se denomina *secuencia adenoma-carcinoma*, porque los carcinomas se desarrollan a través de una serie identificable de pasos moleculares y morfológicos. La pérdida del gen supresor de tumores *PTEN* se observa en los carcinomas de endometrio no asociados a carcinoma de colon y algunos pólipos hamartomatosos del colon. La infección por ciertas cepas del virus del papiloma humano conduce a la inactivación de la proteína Rb y el desarrollo de carcinoma cervical. La mutación con activación de la función tirosina cinasa de *c-KIT* aparece en tumores del estroma gastrointestinal, que responden bien al tratamiento con mesilato de imatinib, un inhibidor de la tirosina cinasa usado también en la leucemia mieloide crónica.

61 **A** ¿Murió Napoleón Bonaparte envenenado por arsénico a manos de antiguos enemigos? El FBI analizó una muestra de cabello en 1995 y encontró una concentración elevada de arsénico, pero la cantidad no era concluyente. Otra hipótesis es que el papel pintado de la casa Longwood, donde vivía, contenía arseniato de cobre y enmoheció, liberando vapores de arsénico. Una tercera hipótesis indica que falleció por los efectos de un cáncer gástrico, no relacionado con la ingesta de arsénico, basándose en la observación en la autopsia de adenopatías adyacentes al estómago. La exposición crónica al arsénico se ha relacionado con un riesgo sumamente elevado de cáncer de piel y posiblemente también de pulmón, hígado (angiosarcoma), vejiga, riñón y colon. El berilio produce de forma aguda neumonitis, y la exposición crónica provoca granulomas no necrosantes, similares a los de la sarcoidosis. La exposición al cromo o al níquel podría causar cánceres de las vías

respiratorias. La intoxicación por cobalto es una causa de fibrosis intersticial pulmonar. La intoxicación por plomo produce dolor abdominal, anemia, neuropatía y deterioro de la agudeza mental, pero no se asocia con neoplasias malignas.

62 **E** Esta mujer tiene manifestaciones observadas en personas encamadas durante períodos prolongados. Hay un gran tromboémbolo en silla de montar en el tronco de la arteria pulmonar. El síndrome antifosfolipídico puede cursar con tromboembolias, pero la osteoporosis, las úlceras por decúbito y la atrofia muscular no son características. La anemia aplásica produce insuficiencia cardíaca congestiva de alto gasto, diátesis hemorrágica por trombocitopenia y mayor riesgo de infecciones. El alcoholismo crónico causa hepatopatía que predispone a problemas hemorrágicos, no a trombosis. Los traumatismos cerrados están marcados por contusiones y fracturas. La malnutrición explicaría la menor densidad ósea por osteomalacia, mala cicatrización de las heridas con úlceras cutáneas y atrofia muscular, pero es más frecuente la coagulopatía con hemorragias que la tromboembolia.

63 **C** La combinación de uretritis no gonocócica, artritis y conjuntivitis apunta a artritis reactiva, una de las espondiloartropatías; las alteraciones de la columna recuerdan a la espondilitis anquilosante y pueden ser igualmente debilitantes. Los ANCA son indicativos de varios tipos de vasculitis, como vasculitis granulomatosa y polivasculitis microscópica. La prueba de ANA resulta positiva en muchas enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico (LES), pero no es característica de las espondiloartropatías. La enfermedad de Lyme incluye la artritis de las grandes articulaciones, pero no la uretritis ni la conjuntivitis. La reagina plasmática rápida (RPR) es una prueba de cribado para la sífilis, que puede causar artritis de las grandes articulaciones (articulación de Charcot) en su forma terciaria, pero tarda décadas en desarrollarse. El factor reumatoide es una característica de la artritis reumatoide, que inicialmente se manifiesta con más frecuencia en las pequeñas articulaciones de las manos y pies. U1-RNP es un marcador de enfermedad mixta del tejido conjuntivo, que combina características de artritis

reumatoide, esclerodermia, polimiositis y LES; las artralgias no se acompañan de destrucción de la articulación ni deformidad.

64 **E** La enfermedad de von Hippel-Lindau es infrecuente y se debe a mutaciones heredadas o adquiridas en un gen supresor de tumores. Las neoplasias en este caso incluyen, en orden, angiomas retinianos, feocromocitoma suprarrenal, hemangioblastomas cerebelosos y carcinomas de células renales productores de eritropoyetina. El síndrome de Gardner tiene la misma mutación en el gen de la poliposis adenomatosa del colon *(APC)* que la poliposis familiar, pero también cursa con osteomas, quistes epidérmicos y fibromatosis. El oncogén *MET* está mutado en los carcinomas papilares renales (no se asocia con tumores en otras zonas) y el síndrome de Denys-Drash, que también asocia tumor de Wilms más disgenesia gonadal y nefropatía. La neurofibromatosis de tipo 2 incluye schwannomas, meningiomas, gliomas y ependimomas. La esclerosis tuberosa es una de las facomatosis con hamartomas corticales denominados *tubérculos, angiomiolipomas renales, rabdomiomas cardíacos* y *fibromas subungueales*. El síndrome de Beckwith-Wiedemann cursa con tumor de Wilms, hemihipertrofia y citomegalia suprarrenal.

65 **A** La esclerodermia limitada (previamente denominada síndrome CREST), un tipo de esclerosis sistémica, no progresa a fibrosis pulmonar grave ni enfermedad renal. Por tanto, es menos probable que la paciente tenga esclerodermia difusa, asociada a anticuerpos anti-ADN topoisomerasa. Los anticuerpos antimicrosómicos (antiperoxidasa tiroidea) aparecen en las enfermedades tiroideas autoinmunitarias, como la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves. Los anticuerpos antimitocondriales se observan con más frecuencia en la cirrosis biliar primaria. Los ANCA son un marcador de varios tipos de vasculitis. Los anticuerpos antitransglutaminasa están presentes en la celiaquía, enfermedad marcada por malabsorción, no dismotilidad esofágica.

66 **B** La neumonía por *Pneumocystis jiroveci* se pone de manifiesto con tinción de metenamina de plata de Gomori. El conjunto de infecciones oportunistas, síndrome de emaciación y linfopenia apunta a sida secundario a la infección por el VIH. Este grupo de

hallazgos no es típico de los pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES), que tienen ANA positivos. Cuando el LES se trata con inmunodepresores, las infecciones oportunistas son frecuentes. En el déficit de C2 aparece una enfermedad de tipo LES. La función de los linfocitos B suele estar preservada en la infección por el VIH, de modo que no es probable que haya hipogammaglobulinemia marcada. La prueba del estallido oxidativo de los neutrófilos se usa para evaluar la enfermedad granulomatosa crónica, estado de inmunodeficiencia en el que las infecciones bacterianas son más frecuentes en niños. La reagina plasmática rápida (RPR) es una prueba de cribado de la sífilis, enfermedad de transmisión sexual que no se acompaña de inmunodeficiencia.

67 **A** La acidosis metabólica, los acúfenos, las anomalías de la función plaquetaria y la gastritis con úlceras son efectos típicos de la ingesta excesiva de ácido acetilsalicílico. El paracetamol en grandes cantidades puede producir hepatotoxicidad. El adalimumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el factor de necrosis tumoral, y el metotrexato son fármacos usados para tratar la artritis reumatoide y no tienen efectos antiagregantes. La oxicodona es un opiáceo, y el propoxifeno, un analgésico no opiáceo; estos fármacos no tienen efectos significativos sobre el tubo digestivo ni las plaquetas.

68 **B** El coriocarcinoma es la forma más agresiva y menos frecuente de la enfermedad trofoblástica de la gestación. Puede producir metástasis generalizadas, especialmente en los pulmones y la vagina, pero también en el encéfalo, el hígado y el riñón. La neoplasia está formada por un sincitiotrofoblasto de aspecto maligno y forma una masa blanda y hemorrágica que puede romperse y sangrar. Además, la cantidad de gonadotropina coriónica humana (hCG) producida por un coriocarcinoma es notable; la hCG comparte la misma subunidad α con otras hormonas glucoproteínicas, como la tirotropina (TSH), y puede potenciar el efecto de la TSH, dando lugar a manifestaciones de hipertiroidismo. Muchos coriocarcinomas responden a la quimioterapia. El adenocarcinoma de endometrio aparece con más frecuencia en mujeres posmenopáusicas. Los carcinomas de células claras de

la vagina se presentan sobre todo en mujeres jóvenes cuyas madres recibieron dietilestilbestrol (DES) durante la gestación. Un leiomiosarcoma es una lesión infrecuente en las mujeres y por lo general produce una gran masa uterina. Del mismo modo, el tumor de Müller mixto maligno es una neoplasia excepcional de las mujeres. El sarcoma botrioideo es una neoplasia que aparece en niñas menores de 5 años.

69 **C** La paciente tiene artritis reumatoide con anemia de las enfermedades crónicas. A pesar de los abundantes depósitos de hierro almacenado, esas anemias están causadas por una alteración de la transferencia de hierro desde los macrófagos a las células eritroides en desarrollo. La hepcidina se sintetiza en el hígado y normalmente se libera en respuesta a un aumento de las concentraciones intrahepáticas de hierro. La hepcidina inhibe la función ferroportina en los macrófagos y así impide la transferencia de hierro. La producción hepática de hepcidina está aumentada en los estados de inflamación crónica por la acción de mediadores inflamatorios como la IL-6. El factor reumatoide probablemente esté presente, pero no influye en las concentraciones de hepcidina. El TNF participa en la inflamación articular. El GM-CSF puede provocar un aumento de la producción de macrófagos normales.

70 **B** El raquitismo en los niños (y la osteomalacia en adultos) se debe a una carencia de vitamina D. El panel izquierdo de la figura muestra una unión condrocostal que ha perdido la empalizada de cartílago, con trabéculas ensanchadas irregulares y osteoide no calcificado. Compárese con una unión condrocostal normal (panel derecho), con una transición ordenada de cartílago a hueso nuevo. La exposición a la luz del sol es esencial para la síntesis de vitamina D a partir de fuentes endógenas. Una cantidad suficiente de vitamina D reduce el riesgo de cáncer, enfermedades inflamatorias y ateroesclerosis. De ahí el sabio consejo dirigido a los niños: sal de casa y mantente activo. La falta de frutas frescas, verduras y hortalizas en la dieta puede provocar escorbuto por déficit de vitamina C, con mala formación del osteoide, pero también estarían afectados otros tejidos conjuntivos. El hipopituitarismo conduciría a una menor producción de hormona del crecimiento

con talla baja, pero no habría deformidades. Las mutaciones que afectan a genes del colágeno podrían provocar osteogenia imperfecta con riesgo de fracturas. Los traumatismos causan fracturas y el callo de las fracturas en consolidación tiene un proceso de osificación ordenado. Los polimorfismos del receptor de la vitamina D están implicados en la patogenia de la osteoporosis.

71 **D** La naturaleza súbita del fallecimiento requiere una investigación por parte del experto médico (forense), que notificará a las autoridades legales locales el descubrimiento de los hallazgos en este caso. El patrón de lesiones es compatible con sacudidas violentas del bebé. Como la cabeza de un lactante es más grande en proporción con el cuerpo que en los adultos, no puede contrarrestar las sacudidas con la musculatura del cuello. Agarrar fuertemente por los brazos al lactante y presionar o golpear la cabeza contra una superficie dura aumenta el riesgo de lesiones internas, fracturas incluidas. Otra característica de los traumatismos con sacudidas de la cabeza del bebé es la lesión axónica difusa con «bolas» de retracción axónica debido al notable estiramiento y rasgado con las fuerzas de aceleración y desaceleración. La sífilis congénita produce osteocondritis con deformidades esqueléticas, no fracturas, y sin tendencia hemorrágica. La hemofilia A podría explicar las hemorragias en niños y adultos, pero no las fracturas. La osteogenia imperfecta causaría fracturas, no hemorragias. En el síndrome de muerte súbita del lactante no habría señales de traumatismos. La displasia tanatofórica es una forma mortal de enanismo con extremidades cortas.

72 **A** El paciente tiene características del síndrome de Marfan y, aunque el defecto primario es una mutación del gen *fibrilina 1* y, por tanto, mala formación de las microfibrillas, hay un importante efecto secundario sobre la biodisponibilidad de factor de crecimiento transformante β (TGF-β). Normalmente, las microfibrillas secuestran TGF-β, pero, en el síndrome de Marfan, las microfibrillas anómalas permiten una señalización excesiva de TGF-β, que es responsable de los síntomas cardíacos. Los trasplantes de médula ósea resultan útiles en aquellas enfermedades cuyo defecto primario radica en las células

hematopoyéticas, o las células de la médula ósea pueden aportar genes normales a los tejidos afectados. Incluso si fuera posible transducir el gen *fibrilina 1* a los linfocitos T, la proteína no podría ser transportada a la matriz extracelular. En el síndrome de Marfan no hay lisosomas anómalos, y los trastornos vasculares no son el resultado de ateroesclerosis acelerada por factores dietéticos.

73 **E** El déficit de vitamina A provoca trastornos epiteliales que afectan a la córnea, piel, vías respiratorias y urinarias. Es la primera causa de ceguera prevenible en el mundo. La metaplasia escamosa (mostrada en la figura) en las vías respiratorias aumenta el riesgo de infección; la descamación de restos de queratina forma el nido de los cálculos urinarios. La hiperqueratosis y el taponamiento folicular afectan a la epidermis. La fibrosis quística aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, especialmente por *Pseudomonas,* a partir de bronquiectasias diseminadas; la piel y los ojos no resultan afectados. La sífilis congénita puede producir deformidades óseas y goma. La infección por el VIH se complica con infecciones oportunistas, incluidas las respiratorias, pero la queratomalacia no es una manifestación de esta infección. El síndrome de Kartagener provoca bronquiectasias debido a un epitelio respiratorio alterado en el que faltan los brazos de dineína de los cilios; hay un *situs inversus,* pero no cursa con alteraciones de los ojos y la piel.

74 **E** El patrón de metástasis con siembra en la cavidad peritoneal junto con la imagen microscópica y los marcadores tumorales séricos son muy característicos del cistoadenocarcinoma seroso ovárico, la neoplasia maligna más frecuente de los ovarios. Los adenocarcinomas de íleon son infrecuentes y probablemente provocarían una obstrucción intestinal. No es probable que los tumores carcinoides produzcan metástasis diseminadas. Los coriocarcinomas se asocian con concentraciones elevadas de hCG y metástasis hemorrágicas. Un mesotelioma maligno es una complicación infrecuente de la asbestosis. Es improbable que un cistoadenocarcinoma recidive 10 años después. Los cistoadenomas son benignos.

75 **D** Retrocedemos al siglo xiii para pedir prestada esta respuesta

a Rumí de Balkh, que es aplicable a todo tiempo y lugar. El arte de la medicina es algo más que ciencia y depende de las interacciones humanas. El concepto de empatía es parte de este. Los autores tenemos la experiencia médica suficiente para conocer su importancia y deseamos transmitirle ese concepto. No deje que pase de largo. Lo necesitará para su familia, amigos y pacientes.

76 **(Todas son correctas)** Esperamos que haya progresado en su conocimiento y ahora sea más capaz de ayudar a otros en la carrera de ciencias de la salud que ha emprendido. ¡Salga a convertir el mundo en un lugar mejor para todos!

Créditos de las figuras

Capítulo 5

FIGURA 5-11: Tomado de Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF: *Thompson and Thompson Genetics in Medicine*, ed 6, Philadelphia, Saunders, 2001, p 212.

FIGURA 5-18: Por cortesía del Department of Pathology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh.

FIGURA 5-26: Por cortesía del Dr. Vijay Tonk, Department of Pathology, The University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas.

FIGURA 5-28: Por cortesía de la Dra. Nancy R. Schneider y Jeff Doolittle, Cytogenetics Laboratory, The University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas.

Capítulo 6

FIGURA 6-21: Por cortesía del Dr. Richard Sontheimer, Department of Dermatology, The University of Texas Southwestern Medical School, Dallas.

FIGURA 6-31: Por cortesía del Dr. Trace Worrell, Department of Pathology, The University of Texas Southwestern Medical School, Dallas.

Capítulo 8

FIGURA 8-16: Por cortesía de la Dra. Arlene Sharpe, Brigham and Women's Hospital, Boston.

FIGURA 8-60: Por cortesía del Dr. Willy Pressens, Harvard School of Public Health, Boston.

Capítulo 9

FIGURA 9-25: Por cortesía de George Katsas, MD, anatomopatólogo forense, Boston.

FIGURA 9-27: Tomado de los materiales para la enseñanza del Department of Pathology, The University of Texas Southwestern Medical School, Dallas.

Capítulo 11

FIGURA 11-20: Tomado de los materiales para la enseñanza del Department of Pathology, The University of Texas Southwestern Medical School, Dallas.

FIGURA 11-22: Por cortesía de Tom Rogers, MD, Department of Pathology, The University of Texas Southwestern Medical School, Dallas.

FIGURA 11-47: Por cortesía de Tom Rogers, MD, Department of Pathology, The University of Texas Southwestern Medical School, Dallas.

Capítulo 12

FIGURA 12-10: Por cortesía de Arthur Weinberg, MD, Department of Pathology, The University of Texas Southwestern Medical School, Dallas.

Capítulo 13

FIGURA 13-53: Por cortesía de Dr. George Murphy, University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, Philadelphia.

Capítulo 15

FIGURA 15-41: Tomado de los materiales para la enseñanza del Department of Pathology, The University of Texas Southwestern Medical School, Dallas.

Capítulo 16

FIGURA 16-10: Por cortesía de los Dres. E. E. Vokes, S. Lippman et al., Department of Thoracic/Head and Neck Oncology, Texas Medical Center, Houston. Publicado con la autorización de *N Engl J Med* 328:184, 1993.

Capítulo 17

FIGURA 17-64: Por cortesía del Dr. Tad Wieczorek, Brigham and Women’s Hospital, Boston.

Capítulo 20

FIGURA 20-7: Por cortesía del Dr. M. A. Ventkatachalam, Department of Pathology, The University of Texas Health Sciences Center, San Antonio.

FIGURA 20-15: Por cortesía del Dr. Helmut Rennke, Department of Pathology, Brigham and Women's Hospital, Boston.

FIGURA 20-40: Por cortesía del Dr. M. A. Ventkatachalam, Department of Pathology, The University of Texas Health Sciences Center, San Antonio.

Capítulo 21

FIGURA 21-8: Por cortesía del Dr. Christopher Corless, University of Oregon, Eugene.

Capítulo 22

FIGURA 22-7: Por cortesía del Dr. Jag Bhawan, Boston University School of Medicine, Boston.

FIGURA 22-41: Por cortesía del Dr. Christopher Crum, Brigham and Women's Hospital, Boston.

Capítulo 23

FIGURA 23-26: Por cortesía del Dr. Jack G. Meyer, Brigham and Women's Hospital, Boston.

Capítulo 28

FIGURA 28-55: Por cortesía de Eileen Bigio, MD, Department of Pathology, The University of Texas Southwestern Medical School, Dallas.

FIGURA 28-59: Por cortesía de Eileen Bigio, MD, Department of Pathology, The University of Texas Southwestern Medical School, Dallas.

Capítulo 30

FIGURA 30-62: Por cortesía de la Dra. Linda Margraf, Department of Pathology, The University of Texas Southwestern Medical School, Dallas.



VALORES NORMALES	
SANGRE: PLASMA, SUERO	**Intervalo de referencia**
Ácido úrico sérico	3-8,2 mg/dl
Alanina aminotransferasa (ALT) sérica	< 30 U/l
Albúmina	3,5-5,5 g/dl
Amilasa sérica (adulto)	30-110 U/l
Aspartato aminotransferasa (AST) sérica	< 40 U/l
Bilirrubina sérica (adulto) total // directa	0,1-1 mg/dl // 0-0,3 mg/dl
Calcio sérico (Ca^{++})	8,4-10,2 mg/dl
Colesterol total // HDL	< 200 mg/dl // > 35 mg/dl
Creatinina sérica	0,5-1,2 mg/dl
Dímero D	< 0,5 µg/ml
Electrólitos séricos	
Sodio (Na^+)	135-145 mEq/l
Potasio (K^+)	3,5-5 mEq/l
Cloro (Cl^-)	95-105 mEq/l
HCO_3	22-28 mEq/l
Hiato aniónico	9-14 mEq/l
Fosfatasa alcalina sérica (adulto)	30-130 U/l
Fósforo (inorgánico) sérico	3-4,5 mg/dl
Gasometría arterial (aire ambiental)	
pH	7,35-7,45
Pco_2	35-45 mmHg
Po_2	80-100 mmHg
HCO_3	22-28 mEq/l
Globulina	2,3-3,5 g/dl
Glucosa sérica	70-110 mg/dl
Haptoglobina	16-200 mg/dl
Hemoglobina A_{1C}	< 6%
Hierro, capacidad total de fijación (TIBC)	250-450 µg/dl
Hierro sérico	50-160 µg/dl
Lactato deshidrogenasa (LHD) sérica	45-90 U/l
Lipasa sérica	16-63 U/l
Nitrógeno ureico sérico	7-20 mg/dl
Osmolalidad sérica	275-295 mOsmol/kg H_2O
Proteínas séricas totales	6-7,8 g/dl
Tirotropina (TSH)	0,5-5 µU/ml
Tiroxina (T4) sérica	5-12 µg/dl



Triglicéridos séricos	< 150 mg/dl
HEMATOLOGÍA	
Eritrocitos, recuento	Hombre: 4,1-5,9 × 10^6/mm^3
	Mujer: 3,6-5,5 × 10^6/mm^3
Hematocrito	Hombre: 41-50%
	Mujer: 36-46%
Hemoglobina corpuscular media (HCM)	26-34 pg/célula
Hemoglobina sanguínea	Hombre: 13,5-16,5 g/dl
	Mujer: 12-15 g/dl
Leucocitos, recuento total	4.500-11.000/mm^3
Neutrófilos segmentados	54-62%
Cayados	3-5%
Eosinófilos	1-3%
Basófilos	0-1%
Linfocitos	25-33%
Monocitos	3-7%
Plaquetas, recuento	150.000-400.000/mm^3
Tiempo de protrombina (TP)	11-15 s
Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTP a)	25-40 s
Velocidad de sedimentación globular (VSG)	Hombre: 0-15 mm/h
	Mujer: 0-20 mm/h
Volumen corpuscular medio (VCM)	80-100 µm^3
ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)	Adulto: 19-25 kg/m^2

Índice

Portada 2
Índice de capítulos 4
Página de créditos 7
Dedicatoria 10
Prólogo 11
A nuestros estudiantes 13
Agradecimientos 16
Unidad I: Patología general 18
Capítulo 1: La célula como unidad de salud y enfermedad 20
Capítulo 2: Patología celular 31
Capítulo 3: Inflamación y reparación 64
Capítulo 4: Trastornos hemodinámicos 101
Capítulo 5: Trastornos genéticos 138
Capítulo 6: Enfermedades del sistema inmunitario 178
Capítulo 7: Trastornos neoplásicos 235
Capítulo 8: Enfermedades infecciosas 288
Capítulo 9: Enfermedades ambientales y nutricionales 349
Capítulo 10: Enfermedades de la lactancia y la infancia 396
Unidad II: Enfermedades de los sistemas orgánicos 439
Capítulo 11: Vasos sanguíneos 441
Capítulo 12: Corazón 488
Capítulo 13: Hematopatología de los leucocitos 550
Capítulo 14: Hematopatología de los eritrocitos y trastornos hemorrágicos 615
Capítulo 15: Pulmón 679
Capítulo 16: Cabeza y cuello 760
Capítulo 17: Tubo digestivo 790
Capítulo 18: Hígado y vía biliar 862
Capítulo 19: Páncreas 920
Capítulo 20: Riñón 939

Capítulo 21: Vías urinarias bajas y aparato genital masculino 1000
Capítulo 22: Aparato genital femenino 1036
Capítulo 23: Mama 1085
Capítulo 24: Sistema endocrino 1114
Capítulo 25: Piel 1178
Capítulo 26: Huesos, articulaciones y tumores de tejidos blandos 1218
Capítulo 27: Nervios periféricos y músculos esqueléticos 1275
Capítulo 28: Sistema nervioso central 1298
Capítulo 29: Ojo 1370
Capítulo 30: Repaso final y evaluación 1393
Créditos de las figuras 1474